



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>



Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + *Beibehaltung von Google-Markenelementen* Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + *Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität* Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter <http://books.google.com> durchsuchen.





800036532P

g. 68. g. 27.



E. BIBL. RADCL.

7
- 7. 5
~~62. 13.~~ 5
2.

C

19188 e. 79 1/2





Гр. Монахъ и др.

Крѣпостное

и Удѣльное

Судовое

Судовое

Судовое

Судовое

Судовое

Судовое

Судовое

Судовое

Судовое

Судовое

Судовое

Судовое

Судовое

Судовое

Судовое

Судовое

Судовое

Судовое

Судовое

Судовое

Судовое

Судовое

Судовое

Судовое

Судовое

Судовое

Судовое

Судовое

Судовое

Судовое

Судовое

Судовое

Судовое

Судовое

Судовое

Судовое

Судовое

Судовое

[illegible]

17. x is a function of y .

18. x is a function of y and z .

$x = f(y, z)$

19. x is a function of y and z .

$x = f(y, z)$

20. x is a function of y and z .

$x = f(y, z)$

21. x is a function of y and z .

$x = f(y, z)$

22. x is a function of y and z .

$x = f(y, z)$

23. x is a function of y and z .

$x = f(y, z)$

24. x is a function of y and z .

$x = f(y, z)$

25. x is a function of y and z .

$x = f(y, z)$







Erklärung

Königliche Preussische
Vollmacht

Wir, Friedrich Wilhelm, König von Preussen,
in Person, oder durch Unseren
Minister, den wir beauftragen, Unseren
Minister, den wir beauftragen, Unseren

Minister, den wir beauftragen, Unseren
Minister, den wir beauftragen, Unseren
Minister, den wir beauftragen, Unseren
Minister, den wir beauftragen, Unseren

Minister, den wir beauftragen, Unseren
Minister, den wir beauftragen, Unseren
Minister, den wir beauftragen, Unseren
Minister, den wir beauftragen, Unseren

Minister, den wir beauftragen, Unseren
Minister, den wir beauftragen, Unseren
Minister, den wir beauftragen, Unseren
Minister, den wir beauftragen, Unseren

Minister, den wir beauftragen, Unseren
Minister, den wir beauftragen, Unseren
Minister, den wir beauftragen, Unseren
Minister, den wir beauftragen, Unseren

Minister, den wir beauftragen, Unseren
Minister, den wir beauftragen, Unseren
Minister, den wir beauftragen, Unseren
Minister, den wir beauftragen, Unseren

1998/1999

1. $\alpha \in \mathbb{R}$ is a real number.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

Downloaded At: 11:53 11 September 2009

Truffe (substantiv) 1.0000

G r u n d r i s s
der
K r ä u t e r k u n d e
zu Vorlesungen

entworfen

von

D. Carl Ludwig Willdenow,

Ritter des rothen Adler-Ordens, Professor der Botanik, Vorsteher
des botanischen Gartens, der Academie der Wissenschaften zu Ber-
lin, Stockholm und München Mitglieder u. s. w.

Nach dessen Tode

neu herausgegeben mit Zusätzen

von

D. H. F. Link,

Geheimen Medizinal-Rathe, Ritter des rothen Adler-Ordens, ordent-
lichem Professor der Arzneikunde, und Director des botanischen
Gartens, Mitgliede der Academie der Wissenschaften zu Berlin und
anderer Gelehrten-Gesellschaften.

Siebente vermehrte und verbesserte Auflage.

Erster (Theoretischer) Theil.

Mit zehn Kupfertafeln und einer Farbentabelle.

Berlin, 1831.

In der Haude und Spenerischen Buchhandlung.

(S. J. Joseephy.)

Grundriss
der
Kräuterkunde
zu Vorlesungen
entworfen

von
D. Carl Ludwig Willdenow,

Ritter des rothen Adler-Ordens, Professor der Botanik, Vorsteher
des botanischen Gartens, der Academie der Wissenschaften zu Ber-
lin, Stockholm und München-Mitgliede, u. s. w.

Nach dessen Tode
neu herausgegeben mit Zusätzen

von
D. H. F. Link,

Geheimen Medicinal-Rathe, Ritter des rothen Adler-Ordens, ordent-
lichem Professor der Arzneikunde, und Director des botanischen
Gartens, Mitgliede der Academie der Wissenschaften zu Berlin und
anderer Gelehrten-Gesellschaften.

Siebente vermehrte und verbesserte Auflage.

Mit zehn Kupfertafeln und einer Farbentabelle.

Berlin, 1831.

In der Hande und Spenerschen Buchhandlung.

(S. J. Josephy.)

Wenn irgend eine Wissenschaft, die ihren Verehrer auszeichnen soll, den Muth des Enthusiasmus, und das Ertragen von Mühe und Beschwerlichkeiten erfordert, so ist es die Botanik. Der Theolog, der Jurist, der Philosoph, der schöne Geist kann ein grosser Mann auf seinem Studierzimmer werden, der Astronom vom Observatorium die Kreise der Welten beobachten, und sich einen unsterblichen Namen erwerben. Nicht so der Botaniker und Naturforscher. Die Natur mit ihren vielen Merkwürdigkeiten und Geheimnissen will selbst betrachtet sein. Ihr Dienst ist der mühsamste, so wie ihre Kenntniss die reizendste und angenehmste. Auch hat die Göttinger Wissenschaft eifrigere Liebhaber, keine so viele, die die Märtyrer ihrer Ergebenheit und ihres Studiums geworden sind.

Stöber, Leben des Ritters Carl von
Linné, erster Theil p. 50.

Vorrede

zur siebenten Auflage.

Willdenow's Grundriss der Kräuterkunde war viele Jahre hindurch ein allgemein beliebtes und geschätztes Handbuch, und bleibt auch jetzt noch immer von grossem Werthe für die Wissenschaft. Die

Terminologie der Botanik ist darin mit einer Genauigkeit und mit einer Linneischen Schärfe bestimmt, wie man sie in wenigen Handbüchern antrifft. Die Grundsätze der Botanik sind ganz im Linneischen Geiste aufgefasst und dargestellt, und bis jetzt haben wir keine bessere Gesetzgebung erhalten. Die Geschichte der Wissenschaft ist ausführlich vorgetragen, mit grosser Kenntniss der Schriften und ihrer Verfasser. Unge-

achtet der Verfasser in der Physiologie nicht selbst gearbeitet hatte, so waren doch, besonders in der letzten Ausgabe, die wichtigsten Schriften über diesen Gegenstand benutzt, und die Untersuchungen und Entdeckungen in diesem Theile der Wissenschaft sind sich seitdem so rasch nicht gefolgt, als vorher. Es schien mir daher eine neue Ausgabe dieses Grundrisses kein unnützes Unternehmen. Ich habe die Kunstwörter hinzugefügt, womit die Neuern die Wissenschaft bereichert haben; ich habe ferner die Entdeckungen in der Anatomie und Physiologie der Pflanzen nachgetragen; und die Geschichte der Wissenschaft bis auf die neuesten Zeiten fortgeführt. Rücksichten auf das natürliche System, dessen Vernachlässigung man dem Verfasser mit Recht vorwerfen kann, sind überall genommen worden. Auf diese Weise hoffe ich das Buch so nützlich gemacht zu haben, als es früher war.

Der Zweck des Verfassers bei der Herausgabe dieses Werkes war vorzüglich prak-

tisch, den Anfänger zur Erkennung und Bestimmung der Pflanzenarten vorzubereiten. Um dieses zu ergänzen, habe ich einen zweiten und dritten Theil hinzugefügt, welcher eine kurze Beschreibung der bei uns am häufigsten vorkommenden und gebräuchlichsten Gewächsorten, nach dem natürlichen sowohl als künstlichen System enthalten.

Berlin, 1831.

H. F. Link.

Druckfehler.

- Seite 13 Zeile 6 von unten lies *canaliculatus* statt *cunali-*
culatus.
- 16 — 18 von oben lies Feigen statt Fingen.
- 21 — 18 — — — Soboles statt Suboles.
- 41 — 8 — — — Convolvulus statt Convul-
vulus.
- 46 — 11 von unten lies Cannaceae statt Caunaceae.
- 96 — 5 — — — lies flabelliformis statt labelli-
formis.
- 512 — 5 von oben lies Schouw statt Schouer.
- 631 — 14 von unten lies 1820 bis 1826 statt 18..
bis 18..
-

Einleitung.

1. **Ein** flüchtiger Blick, den wir auf diese Welt werfen, zeigt uns, dass alles aus Körpern besteht. Einige sind durch alle menschliche Kunst, nicht weiter chemisch zu zerlegen, und diese nennen wir *Urstoffe*, *Uranfänge* oder *Elemente* (Elementa). Andere zeigen sich als Körper, die zusammengesetzt sind, und aus Elementen bestehen, diese heissen *Naturalien* (Naturalia).

Die Wissenschaft, welche die Eigenschaften der Urstoffe auszuspähen sucht, heisst die *Naturlehre* oder *Physik* (Physica). Diejenige Wissenschaft aber, durch die wir mit der äussern Gestalt und den Eigenschaften der Naturalien bekannt werden, ist die *Naturgeschichte* (Historia naturalis, Scientia naturalis).

(*Natürliche Körper* nennen wir diejenigen, welche den Grund ihrer Bildung in sich haben, und setzen sie also denen entgegen, welche ihre Bildung von aussen haben. Zu den letztern gehören die künstlichen Körper. Da die Bildung der natürlichen Körper von einem Punkte ausgehen oder anfangen, da sie ferner sich wenigstens zuerst nach allen Richtungen erstrecken, da sie endlich begränzt seyn muss; so ist der natürliche Körper entweder selbst ein Einzelwesen (*Individuum*) oder aus sol-

chen Einzelwesen (*Individuum*) zusammengesetzt. Die Naturgeschichte beschäftigt sich nur mit den natürlichen Körpern, so fern sie Einzelwesen darstellt. Die Physik beschäftigt sich mit den allgemeinen Eigenschaften der Körper, und den allgemein verbreiteten Stoffen, wenn man nämlich Wärme, Licht u. s. w. zu den Stoffen rechnen will; die Chemie beschäftigt sich mit den besondern Eigenschaften der Körper, sofern sie nicht auf der Individualität beruhen. Was der Verf. von den Urstoffen sagt, ist darum unrichtig, weil wir solche Urstoffe nicht kennen, denn bei jedem gegebenen Körper bleibt die Aufgabe ihn zu zerlegen, wenn dieses auch noch nicht geschehen sein sollte. Viele Körper, z. B. Wasser, wurden lange für Urstoffe gehalten, bis man sie wirklich zerlegte. Die Geologie, Naturgeschichte des Erdballs betrachtet die Erde als Individuum und die Mineralogie als Krystallehre, ist ein Theil der Naturgeschichte überhaupt, als Lehre von den nicht krystallisirten Mineralien ein Theil der Geologie. Es giebt also auch eine Naturgeschichte des Himmels. L.)

2. Die unzählige Menge von Körpern, womit sich die Naturgeschichte beschäftigt, veranlasste die Naturforscher schon in den frühesten Zeiten verschiedene Hauptabtheilungen zu machen, die man mit dem Namen der Reiche belegte: *Aristoteles* war der erste, (? L.) der die bekannten drei Reiche der Natur festsetzte, nämlich: das *Thiereich* (*Regnum animale*), das *Gewächsreich* oder *Pflanzenreich* (*Regnum vegetabile*) und endlich das *Stein-* oder *Mineralreich* (*Regnum lapideum vel minerale*).

Verschiedene haben noch ein Wasserreich oder Feuerreich dazu zählen wollen. Herr von *Münchhausen* hat ein Mittelreich eingeführt, wohin er die Pilze, Corallen und Polypen bringt. Einige Naturforscher haben nur zwei Reiche angenommen, als das Reich der lebenden und leblosen Geschöpfe; allein diese letzte Eintheilung hat nichts

zum voraus, weil man die lebenden Geschöpfe wieder in Thiere und Pflanzen abtheilen muss; so wie auch die neuen Naturreiche, welche man noch hinzu gethan hat, überflüssig sind.

(Der Unterschied zwischen dem organischen und dem unorganischen Reiche ist so scharf und bestimmt, dass er keine Mittelgeschöpfe zulässt. Was der Verf. dagegen hier erinnert, hat er eigentlich selbst §. 231. wieder aufgehoben. Dort wird umständlicher von dem Unterschiede der organischen und unorganischen Körper die Rede sein; erstere zeichnen sich vorläufig gesagt, durch den Periodismus ihrer Existenz aus. Das organische Reich besteht aus zwei Abtheilungen der Thiere und der Pflanzen; das unorganische Reich ebenfalls, der Mineralien und der chemischen Produkte. Die letztern sich keinesweges zu den künstlichen Körpern zu rechnen, da ihre Bildung nicht durch die Kunst geschieht, sondern diese nur die Bildung veranlasst, eben so wie die Bildung der gebauten Pflanzen nur durch die Kunst veranlasst wird. L.)

3. Das Fortpflanzungsvermögen unterscheidet die drei Reiche der Natur. *Mineralien* haben keine Zeugungstheile, sie bleiben also beständig, oder können nur mancherlei Mischungen machen; aber nie ihres Gleichen hervorbringen. *Gewächse* sind mit einer grossen Menge Zeugungstheile versehen, verlieren sie aber noch vor ihren Tode, und bekommen oft wieder von neuem welche. *Thiere* hingegen behalten ihre Zeugungstheile bis zum Tode.

Man hat verschiedene Kennzeichen aufgesucht, Thiere von Pflanzen bestimmt zu unterscheiden, aber bisher ist man nicht so glücklich gewesen eine zureichende Definition zu finden, weil in der Natur nie scharfe Gränzlinien anzutreffen sind. Die Bewegung von einem Orte zum andern, die willkührliche Bewegung einzelner Theile, und die Oeffnung, wodurch die Speisen aufgenommen, und diejenige, wodurch die Ueberbleibsel der Nahrung ausgeführt werden, sind zwar charakteri-

stische Kennzeichen des Thierreichs, die jedem in die Augen fallen, wenn von grössern Thieren die Rede ist. Gibt es aber nicht Pflanzen, die freiwillige Bewegung äussern, welche, die sich in gewisser Rücksicht von einem Ort zum andern bewegen, und wer zeigt uns bei den Infusionsthieren und damit verwandten Geschöpfen, die den Conferven, Tremellen und andern kleinen Gewächsen ähnlich sind, die Speise- und Unrathsöffnung? Wer die Verwandtschaft beider Reiche näher will kennen lernen, suche ein mehreres in *Smellie's Philosophie der Naturgeschichte* I. p. 3—57.

(Das von dem V. gewählte Kennzeichen hat Hedwig zuerst angegeben. S. Sammlung seiner zerstreut. Abhandl. I. B. Was der V. gegen die von andern gewählten Kennzeichen erinnert, gilt auch gegen dieses: Wer hat die Zeugungstheile vieler Kryptogamen gesehen? Die Gewächse sind in so fern an den Boden (Erde, Wasser, Stein u. s. w.) gefesselt, dass sie aus demselben die Nahrung ziehen müssen, da die Thiere hingegen dieselbe auch anderwärts suchen und von dorthier aufnehmen können. Hierin liegt der wahre Unterschied. L.)

4. Diejenige Wissenschaft, welche uns jedes einzelne Gewächs von allen bekannten des Erdballs unterscheiden lehrt, und dessen Eigenheiten auszuspähen sucht, heisst die *Kräuterkunde, Gewächskunde, Botanik*. (Botanice, Botanica, Scientia botanica, Phytologia, Botanologia.)

Um diese Wissenschaft gehörig zu erlernen, ist es nöthig, sich alle einzelne Theile eines Gewächses bekannt zu machen, und deren Zweck nachzuforschen. Dies hier vorzutragen ist unsere Absicht; ehe wir aber dazu schreiten, müssen wir erst einige Dinge, die das Erlernen dieser Wissenschaft betreffen, und einige allgemeine Bestimmungen, welche die Botaniker festgesetzt haben, voranschicken.

Dieses Studium erhält, wenn man nur besondere

Zweige davon cultivirt, andere Benennungen: z. B. *Dendrologia*, wenn man nur die Bäume und Sträucher, *Agrostologia*, wenn man allein die Gräser, *Cryptogamologia*, wenn man allein die mit unsichtbaren Blüthen versehenen Gewächse zum Gegenstand seines Forschens wählt. Eben so lässt sich die Botanik nach der verschiedenen Benützung in die *ökonomische*, *technologische*, *medizinische* u. s. w. abtheilen.

(Die Definition der Kräuterkunde, welche der Verf. giebt, ist einseitig. Die Kräuterkunde ist die Lehre von den Eigenschaften der Pflanzen, nicht allein solchen, welche einzelnen Arten, sondern auch welche mehreren zusammengekommen und endlich welche allen gemeinschaftlich sind. So theilt sie sich sogleich in die allgemeine und in die besondere Kräuterkunde. Beide sind wiederum: 1) Betrachtung der Pflanzen nach den Theilen und deren innern sowohl als äussern Bildung und Eigenschaften, Phytographie, welche zugleich Anatomie der Pflanzen umfasst; 2) das Leben der Pflanze, Physiologie der Pflanzen; 3) Verhältnisse der Pflanzen zum Ort, wo sie wild wachsen, Geographie der Pflanzen; 4) Verhältnisse der Pflanzen zur Zeit, Veränderung derselben, eigentliche Pflanzengeschichte; 5) Veränderung der Pflanzen durch äussere künstliche Mittel, Cultur der Pflanzen u. s. w. angewandte Botanik. L.)

5. Das erste, was ein angehender Botaniker, dem die Terminologie bekannt ist, thun muss, ist: sich eine genaue Kenntniss aller vorkommenden Pflanzen zu erwerben. Er muss sich einen sogenannten botanischen Blick zu eigen machen, das heisst, er muss seine Augen so gewöhnen, dass sie schnell den Stengel, die Blätter nach ihrer ganzen Bildung, die Art zu blühen und alle auffallende Theile einer Pflanze durchlaufen, damit er gleich nach dem Anschauen bestimmte Charaktere hat, wodurch er von ähnlichen vorkommenden Gewächsen das Gesehene unterscheiden kann. Er lernt auf diese Art die Ge-

wächse nach ihrer *äussern Gestalt* (*Habitus*) kennen. Mit dieser Kenntniss muss er sich aber nicht begnügen, sondern die Theile der Blüthe und Frucht (*Partes fructificationis*) genauer untersuchen, und aus ihnen feste sichere Charaktere zu schöpfen verstehen, dann wird erst seine Kenntniss gründlich sein. Um Nutzen von dem allen zu ziehen, versteht es sich von selbst, dass man das Gesehene dem Gedächtnisse einzuprägen sucht. Da aber bei der Menge von Gewächsen es beinah unmöglich ist, alles dem Gedächtnisse anzuvertrauen, und öfters zu einer Jahreszeit die Gewächse, welche wir mit einander vergleichen wollen, nicht vorhanden sind; so müssen wir dem dadurch abzuhelfen suchen, dass wir uns eine Sammlung von trocknen Gewächsen, eine *Kräutersammlung* (*Herbarium*) machen. Die Regeln, welche man, um eine solche anzulegen, beobachten muss, sind folgende:

1. Man legt die Pflanzen zwischen Löschpapier, breitet die Theile gehörig aus, ändert das Papier öfters, damit sie nicht stokken, oder schwarz werden, und thut dieses an einem mässig warmen Ort, wo die Sonne freien Zutritt hat, und der Luftzug nicht gehemmt ist.

(Das rasche Trocknen in einem starkgeheizten Zimmer, hinter einem Ofen, oder in einem Backofen und dessen Nähe, trägt zur Schönheit der aufgetrockneten Pflanzen viel bei, L.)

2. Müssen beim Trocknen die Theile keine falsche Richtung erhalten, die der Natur zuwider ist; z. B. muss nicht eine hängende Blume in die Höhe gerichtet werden, Blumenstiele, die nach einer Seite hingerecht sind, dürfen nicht ausgebreitet werden, ein krummer oder liegender Stengel muss dieselbe Richtung behalten u. s. w.

3. Müssen die Pflanzen zu einer Zeit gesammelt werden, wo sie alle Kennzeichen, durch die sie von ähnlichen unterschieden sind, haben, der Unterschied mag nun in der Wurzel, im Wurzelblatte oder in den Früchten liegen, so darf doch dieser Theil, da er wesentlich ist, nicht fehlen.

4. Müssen sie nicht bei feuchtem Wetter eingesammelt werden, weil sie alsdann gewöhnlich schwarz trocknen, und ist dieses geschehen, so muss man sie etwas in der Luft abtrocknen lassen.

5. Saftige Pflanzen werden entweder mit einem heissen Steine oder glühenden Eisen getrocknet, oder auch, was noch vorzüglicher ist, man taucht sie in kochendes Wasser und hält sie einige Minuten darin, trocknet sie einigemal mit Löschpapier ab, und legt sie alsdann wie gewöhnlich ein, doch muss das Löschpapier öfters gewechselt werden. Es versteht sich, dass die Blumen nicht nass werden dürfen; diese quetscht man nur sanft.

6. Saftige und zugleich zarte Blumen, z. B. Iris, müssen zwischen weissem Postpapier getrocknet werden, wenn man den Fruchtknoten vorher sanft gequetscht hat. Man darf aber dieses Papier nicht eher öffnen, als bis die ganze Pflanze vollkommen trocken ist.

7. Die Flechten werden wie gewöhnlich aufgetrocknet. Diejenigen, welche ausser dem Wasser auf Steinen, Baumrinde u. s. w. wachsen, werden ohne anderweitige Zubereitungen mit den Körpern, worauf sie sich finden, aufbewahrt. Die Wasserflechten aber werden auf Glasplatten, die man mit feinem Papier überzogen hat, unter Wasser ausgebreitet und nach und nach, indem sie auf dem Papier festsitzen, über das Wasser gehoben und so getrocknet.

(Man darf sie durchaus nicht auf Papier trocknen, sondern auf dünnen Glasplatten oder noch besser Platten von weissem Glimmer. Man breitet sie unter Wasser aus, und trocknet sie auf der Platte langsam, wodurch sie von selbst ankleben. Solche Platten lassen sich sogleich unter das Vergrösserungsglas schieben. L.)

8. Die Moose aber pflückt man sorgfältig auseinander, wirft sie in einen Napf mit Wasser und legt sie zwischen zwei Blätter nassgemachtes Schreibpapier, die man in ein altes Buch legen kann, welches nachher sehr scharf gepresst werden muss. Dergleichen auf die Art getrocknete Moose, ob sie gleich sehr gut aussehen, verlieren doch zum Theil ihre natürliche Gestalt. Man thut daher besser, wenn man sie nicht sehr scharf presst, weil sie sich nachher wieder aufweichen, und untersuchen lassen.

9. Bedient man sich auch der Presse bei Disteln, und steifblättrigen Gewächsen.

10. Die Pilze lassen sich grösstentheils nicht trocknen, nur bei den kleinen und lederartigen ist dieses möglich, auch lassen sich einige von den grössern Arten durch kochendes Wasser zum Aufbewahren geschickt machen,

(Die grossen und fleischigen lassen sich sehr gut aufbewahren, wenn man sie in geschmolzenes Talg taucht, und so mit einem dünnen Ueberzuge von Talg bedeckt. Seit drei Jahren auf diese Weise überzogene, nicht in Schränken verwahrte, sondern den äussern Einflüssen der Luft und des Staubes u. s. w. ausgesetzte Pilze, haben sich völlig unversehrt erhalten. Diese Erfindung hat Herr Lüdersdorf gemacht und in folgender Schrift das Verfahren genauer auseinandergesetzt: Das Auftrocknen der Pflanzen fürs Herbarium, und die Aufbewahrung der Pilze von F. Lüdersdorf, Berlin 1827. 8. Man findet dort auch eine Methode die Pflanzen zum Trocknen fürs Herbarium durch Tränken mit Oel vorzubereiten. L.)

Hat man sich nach dieser Vorschrift eine Sammlung getrockneter Gewächse gemacht, so legt man sie einzeln zwischen weisses Papier, ordnet sie nach jedem beliebigen System, und bringt sie in einen fest verschlossenen Schrank, damit sie nicht von Insekten zerfressen werden. Man kann auch noch in die Fächer eines solchen Schrankes kleine Schwämme mit Rosmarin- oder Cajaputöl angefeuchtet und in Papier gewickelt legen, wodurch diese Gäste verscheucht werden, auch schützt der fleissige Gebrauch der Kräutersammlung davor.

Einige Kräuterkenner, und selbst Linné, rathen das Aufkleben der Pflanzen an. Es hat aber diese Methode ihre grosse Unbequemlichkeit. Man kann nur die eine Fläche des Blattes und die Blume, besonders wenn sie klein ist, gar nicht betrachten. Für einen Botaniker ist es vortheilhafter sie nicht aufzukleben, weil er öfters genöthigt ist, mit Hülfe des warmen Wassers die Blume aufzuweichen, um ihre Gestalt genauer zu beobachten; auch kann er bessere Exemplare an die Stelle der schlechtern legen, und verschwendet nicht so viele Zeit mit dem Aufkleben. Wer ja darauf bestehet, seine Pflanzen auf dem Papier befestigen zu wollen, der kann seinen Zweck durch ein Paar Streifen Papier, die er über den Stengel klebt, oder durch einen Faden erlangen.

(Das Besprützen der getrockneten Pflanzen mit einer Auflösung von Quecksilbersublimat in Weingeist, dient sehr zur Erhaltung und Bewahrung der trocknen Pflanzen vor Insektenlarven. L.)

Für den Botaniker ist aber eine Kräutersammlung allein nicht hinreichend, er muss auch die Saamen der meisten Gewächse, und ihre Früchte, besonders die, welche sich aufbewahren lassen, sammeln, weil

deren Kenntniss für ihn von der grössten Wichtigkeit ist.

6. Die Aussenseite an verschiedenen Theilen der Gewächse ist sehr mannigfaltig gebildet. Man hat folgende Bestimmungen festgesetzt, die auf alle Theile des Gewächses bei Beschreibungen angewendet werden.

1. *glänzend* (*nitidus*), wo die Oberfläche so glatt ist, dass sie die Lichtstrahlen zurückwirft und daher ein leuchtendes oder glänzendes Ansehn hat. *Ilex Aquifolium*.

(Nach der Stärke des Glanzes hat man *starkglänzend* (*lucidum*), *glänzend* (*nitens*), *ziemlich glänzend* (*nitidum*), *schimmernd* (*micans*). L.)

2. *matt* (*opacus*), wenn die Oberfläche die Lichtstrahlen nicht zurückwirft und daher ganz ohne allen Glanz ist.

3. *glatt* (*geglättet*. L.) (*laevis*), ohne Streifen, Furchen oder erhabene Punkte. Es ist der Gegensatz von Nr. 6. 7. 23. 24. 25. 28 und 29.

(3a. *haarig* (*pilosus*), wenn Haare überhaupt vorhanden sind. L.)

4. *unbehaart* (*glatt*. L.) (*glaber*), wo keine Haare, Borsten oder krautartige Stacheln zu sehen sind. Es ist der Gegensatz von No. 8—22. 26 und 27.

5. *punktirt* (*punctatus*), wo kleine feine Punkte nur durchs Gesicht, nicht aber durchs Gefühl zu bemerken sind. *Thymus vulgaris*.

(Sonst brauchen die Entomologen *punctatus* für besetzt mit sehr kleinen runden Höhlen. Die kleinen Glandeln der Pflanzen kann man als solche ansehen und sagen *glanduloso-punctatus*. Z. B. die Blätter von *Hypericum perforatum*; *resinosopunctatus* ist *Thymus vulgaris*. L.)

6. *scharf* (*scaber*), wo sich kleine durchs Gefühl

merkbar hervorragende Punkte zeigen, die aber nicht sichtbar sind. *Carex acuta*.

(Durch ein Vergrösserungsglass sind sie wohl sichtbar; es sind äusserst kurze Haare. L.)

7. *rauh* (*hakrig*. L.) (*asper*), wenn diese Punkte ohne Vergrösserung leicht sichtbar und scharf sind. *Pulmonaria officinalis*.

(Die Haare sind etwas länger, als im vorigen Falle. L.)

8. *hakrig* (*steifrauh*. L.) (*hispidus*), wo sehr kurze steife Haare sich zeigen. *Myosotis arvensis*.

(Vielmehr, wo lange, steife Haare vorhanden sind, *Echium vulgare*, wo Willdenow selbst den Ausdruck *hispidus*, nicht *hirtus* in seinem Spec. pl. gebraucht. L.)

9. *kurzborstig* (*kurzhaarig*. L.) (*hirtus*) wenn die Haare mittelmässig lang, aber sehr steif sind. *Echium vulgare*.

(Vielmehr, wo kurze, nicht sehr steife Haare vorhanden sind. *Myosotis arvensis*. L.)

(9a. *langhaarig* (*hirsutus*), wo lange, nicht steife Haare sich finden. *Hieracium Pilosella*. L.)

10. *haarig* (*pilosus*), wenn lange einzelne Haare, die etwas krumm gebogen sind, sich zeigen. *Hieracium Pilosella*. (8. oben Nr. 3a. L.)

(10a. *haartragend* (*piliger*), wenn einzelne Haare hier und da vorhanden sind. L.)

11. *zottig* (*villosus*), wo die Haare sehr lang, weich und weiss sind. *Stachys germanica*.

(Das Weissse macht nichts aus; *Andryala nigricans* hat schwärzliche Zotten; aber die Haare sind sehr weich und daher hin- und hergebogen. L.)

12. *weichhaarig* (*kurzhaarig*. L.) (*pubescens*), wo sehr kleine feine weisse Haare sind. *Oenothera mollissima*.

13. *seidenartig* (*sericeus*), wenn durch kaum

sichtbare, dicht anliegende Haare, die Fläche glänzend weiss ist. *Potentilla Anserina*.

(Das kaum Sichtbare bezieht sich auf die Dünne, nicht auf die Länge. L.)

14. *wollig* (*lanatus*), wo die Fläche mit dichten weissen, deutlich zu unterscheidenden langen Haaren besetzt ist. *Stachys lanata*.

(Die langen weichen Haare sind umeinander gewickelt, stehen aber aufrecht. L.)

15. *filzig* (*tomentosus*), wenn feine Haare so dicht in einander verwebt sind, dass man die einzelnen Haare nicht unterscheiden kann. Gewöhnlich sieht alsdann die Fläche weiss aus, z. B. *Verbascum*, oder sie ist rostfarben, *Ledum*.

(Die langen weichen Haare sind um und in einander gewickelt, stehen daher nicht aufrecht. L.)

16. *baartig* (*barbatus*), wenn die Haare büschelweise beisammen stehn. *Mesembrianthemum barbatum*.

17. *strieglicht* (*strigosus*), wenn die Fläche mit liegenden, dicht angepressten kleinen Borsten besetzt ist, die nach unten zu dicker sind. *Lithospermum officinale*.

18. *brennend* (*urens*), wo kleine Haare eine brennende schmerzhaftige Empfindung verursachen. *Urtica*.

19. *wimperartig* (*ciliatus*), wo am Rande eines Blatts oder auf der Fläche eines Stengels eine Reihe gleich langer Haare stehn.

20. *warzig* (*papillosus*), wenn kleine fleischige Warzen sich zeigen. *Aloë margaritifera*.

21. *blattrig* (*papulosus*), wo kleine hohle Bläschen sich finden. *Mesembrianthemum hispidum*.

22. *weichstachlig* (*muricatus*), wo kleine kurze krautartige Stacheln sind. *Asperugo procumbens*.

(Lang stachelig (*echinatus*) mit langen, dünnen, spitzen Hervorragungen. Ferner *schagrinirt* (*alutaceus*) mit kleinen runden nur durchs Gefühl zu erkennenden Erhabenheiten; *gekörn*t (*granulatus*) mit kleinen, runden, aber durchs Gesicht zu erkennenden Erhabenheiten; *höckerig* (*tuberculosus*) mit grössern, runden Erhabenheiten; *warzig* (*verrucosus*) mit runden, oben platten Erhabenheiten. L.)

23. *schildrig* (*haarschuppig*. L.) (*lepidotus*), wenn die Fläche mit kleinen dicht stehenden Schuppen bedeckt ist, wodurch ihre Farbe verändert wird. *Elaeagnus angustifolia*.

24. *mehlig* (*farinosus*), wenn die Fläche dicht mit einem weissen Staube bedeckt ist. *Primula farinosa*.

25. *bereift* (*pruinosis*), wenn die Fläche mit sehr feinem weissem zerstreutem Staube überzogen ist, wie die Früchte der Pflaumen. *Prunus domestica*.

26. *klebrig* (*glutinosus*), wo die Fläche mit einer klebrigen Materie bedeckt ist, die sich im Wasser auflösen lässt. *Primula glutinosa*.

27. *schmierig* (*viscidus*), wo die Fläche mit einem klebrigen Saft bedeckt wird, der harzig oder fettig ist. *Cerastium viscosum*.

(Unterscheidet sich von dem vorigen nur durch die Dicke des Ueberzuges. Ein harziger weicher Ueberzug kann *balsameus* heissen. L.)

28. *gestreift* (*striatus*), wenn die Fläche feine Striche hat. *Aira caespitosa*.

29. *gefurcht* (*sulcatus*), wo diese Striche kleine Rinnen bilden. *Umbelliferae*.

(Ferner *rinnenförmig* (*cunaticulatus*) mit einer langen tiefen Vertiefung; *vollgrubig* (*scrobiculatus*) mit dicht stehenden rundlichen Vertiefungen, *bienenzellig* (*favosus*) mit rundlichen Vertiefungen so dicht stehend, dass zwei Vertiefungen eine dünne Zwischenwand haben, *grubig* (*foveolatus*)

mit zerstreuten, rundlichen, ziemlich grossen Vertiefungen, *ausgestochen* (exsculptus) mit länglichen, regelmässig stehenden Vertiefungen, *wurmfrässig* (cariosum) mit länglichen, unregelmässigen nicht tiefen Vertiefungen, *ausgefressen* (exsum) wie vorher, nur tiefer, *durchstochen* (perforatum) mit kleinen, rundlichen, durchgehenden Löchern, *siebartig* (cribrosum) wie vorher nur mit grössern Löchern, *gefenestert* (fenestratus) mit einzelnen, grossen, durchgehenden Löchern, *gestochen* (pertusum) mit Löchern, deren Boden man nicht sehen kann, *rissig* (rimosum) mit Ritzen, deren Boden man nicht sehen kann.

Linirt (lineatus) mit linienförmigen, parallelen, geraden Erhabenheiten; *rippig* (nervatus) mit grössern linienförmigen, parallelen, geraden Erhabenheiten; *geschlungen linirt* (gyrosum s. gyratum) mit linienförmigen, parallelen, gebogenen Erhabenheiten; *runzlig* (rugosum) mit kleinen, häufigen Erhabenheiten von unregelmässiger Gestalt. L.)

30. *gefleckt* (maculatus), wenn die Fläche mit kleinen anders gefärbten Punkten bedeckt ist, z. B. *Orchis latifolia*, *maculata*.

31. *bemahlt* (pictus), wenn sehr grosse anders gefärbte Flecke auf der Fläche sind, z. B. *Arum pictum*.

32. *gleichfarbig* (concolor), wenn die Flächen überall gleich von einer Farbe sind, z. B. *Tilia europaea*.

33. *ungleichfarbig* (discolor), wenn die Flächen in den Farben verschieden ausfallen, z. B. *Tilia alba*.

34. *gefärbt* (coloratus), wenn die Farbe der Fläche anderer Art ist, als sie gewöhnlich angetroffen wird, z. B. wenn die Blätter und der Stengel nicht grün sind, als *Amaranthus*, die Blume nicht weiss ist; denn bei den Blättern und dem Stengel wird das Grün so wie bei der Blume das Weisse als eine ge-

wöhnliche diesen Theilen zukommende Farbe angesehen.

(Sehr viele der in der Folge vorkommenden Kunstwörter gelten allgemein, nicht nur für alle Theile der Pflanzen, sondern auch für alle Naturreiche, z. B. rund, dreieckig u. s. w. Am gründlichsten ist die Terminologie abgehandelt in *J. K. W. Illigers Versuch einer systematischen vollständigen Terminologie für das Thier- und Pflanzenreich*. Helmstädt 1800. 8. Da die Haare der Pflanzen eigene Theile sind, so gehören die Kunstwörter davon nicht hieher. L.)

7. Um die allgemeinen Erscheinungen der Vegetation zu bestimmen, bedienen sich die Botaniker öfters bildlicher Ausdrücke. Die verschiedenen Perioden der Vegetationen sind:

1. *Das Keimen* (Germinatio), wenn der Saame aufschwillt und seine kleinen Blättchen zu entfalten beginnt.

2. *Ausschlagen* (Frondescentia, Vernatio), wenn die aufgeschwollenen Knospen der Bäume, Sträucher und Staudengewächse ihre Blätter entfalten.

3. *Der Schlaf* (Somnus), wenn am Abend oder in der Nacht sich die Blätter verschiedener Pflanzen zusammen legen.

4. *Das Entblüthen* (Defoliatio), wenn im Herbst, oder auch wie bei wenigen andern nördlichen Pflanzen im Frühjahr, die Blätter abfallen.

5. *Die Jungfrauschaft* (Virginitas), nennt man bei den Gewächsen den Zeitpunkt, wenn ihre Blumenknospen noch unentfaltet sind.

(Wenig gebräuchlich. L.)

6. *Das Offensein der Blumen* (Anthesis), ist der Zeitpunkt wo die Blume bei den Gewächsen vollkommen entwickelt ist. Daher sagt man in Beschreibungen

gen, die Blumen hängen vor dem Offensein (*flores ante anthesin nutantes*) oder sie stehen nach dem Offensein aufrecht (*flores post anthesin erecti*).

7. *Die Zeit der Blüthe* (*Aestivatio* s. *Florescentia*) nennt man den Monat, oder die Jahreszeit, wenn die Blume in ihrer Vollkommenheit ist.

(Linné und nach ihm R. Brown nennen *aestivatio* die Art, wie die Blumentheile vor dem Aufblühen zusammengeschlagen sind. L.)

8. *Die Begattungsperiode* (*Fructificatio*), ist der Zeitpunkt bei den Gewächsen, wenn in der Blume der Blumenstaub den benachbarten Theilen mitgetheilt wird.

9. *Die Caprification* (*Caprificatio*), nennt man diejenige Art von Begattung bei den Pflanzen, die nicht unmittelbar durch die Pflanzen geschieht.

(Wird nur von den Fingen gebraucht. L.)

10. *Das Wachen der Blume* (*Vigiliae*), wenn Blumen zu einer bestimmten Zeit des Tages oder der Nacht sich öffnen und schliessen.

11. *Das Fruchtansetzen* (*Grossificatio*), wenn nach der Blüthe die künftige Frucht sich zu vergrößern anfängt.

12. *Die Zeit des Reifwerdens* (*Maturatio*), der Zeitpunkt wo die Früchte reif werden.

13. *Das Ausstreuen des Samens* (*Disseminatio*), die Art wie die Pflanze nach der Reife den Samen austrent.

In der Physiologie wird von verschiedenen dieser Perioden umständlicher gehandelt werden.

Einleitung.

8. Die ungleiche Länge der Gewächse in verschiedenen Theile, hat folgende Bestimmung anlasst.

1. *Ein Haarbrett* (Capillus), der Durchmesser eines Haars, oder der zwölfte Theil einer Linie.

2. *Eine Linie* (Linea), die Länge des Nagels an der Wurzel des Nagels am Mittelfinger, oder der zwölfte Theil des Zolls.

3. *Ein Nagel lang* (Unghis), die Länge des Nagels am Mittelfinger oder einen halben Zoll.

4. *Ein Zoll* (Pollex, Digitus), die Länge des ersten Gliedes am Daum, oder ein gewöhnlicher Zoll, der zwölfte Theil eines Fußes.

5. *Eine Handbreit* (Palmus), der Durchmesser der vier Finger an der Hand, oder vier Zoll.

6. *Eine Spanne* (Dadactylus), so weit als man mit dem Daum und kleinen Finger spannen kann, oder neun Zoll.

7. *Eine kleine Spanne* (Spithama), so viel als man mit dem Daum und Zeigefinger spannen kann, oder sieben Zoll.

8. *Ein Fuss* (Pes), die Länge vom Ellenbogen bis an die Handwurzel, oder zwölf Zoll, eine halbe Elle.

9. *Ein Vorderarm* (Cubitus), vom Ellenbogen bis an die Spitze des Mittelfingers, oder siebzehn Zoll.

10. *Eine Elle* (Ulna, Brachium), die Länge des ganzen Arms, oder vier und zwanzig Zoll.

11. *Eine Klafter* (Orgya) die Länge der beiden Willdenow's Grundriss. I Th.

ausgestreckten Arme von einem Mittelfinger zum andern, oder sechs Fuss.

Diese vorangeschickten Bestimmungen werden in der Folge nicht wiederholt, sondern es wird bei jeder Gelegenheit auf diese Paragraphen zurückgewiesen.

I. Terminologie.

(Was der Verfasser hier Terminologie nennt, ist eigentlich allgemeine Phytographie. L.)

9. Bei der Beschreibung der Gewächse ist es nothwendig jeden Theil derselben, der sich als verschieden zeigt, mit einer beständigen ihm nur allein zukommenden Benennung zu belegen, damit man sich untereinander verstehen kann. Die meisten Gewächse haben zwei auffallend verschiedene Haupttheile, die uns vorzüglich in die Sinne fallen, nemlich den *abwärts steigenden Stock* (Caudex descendens) und den *aufwärts steigenden* (ascendens), bei einigen gesellt sich noch ein dritter Theil dazu, nämlich der *mitlere Stock* (Caudex intermedius).

(Caudex ist also der Theil, welcher alle andern trägt; die Grundlage der Pflanze. L.)

10. Der *abwärts steigende Stock* (Caudex descendens) ist derjenige Theil der Gewächse, welcher nach unten hin seine Richtung nimmt, er geht bei den meisten Gewächsen in die Erde; bei andern sitzt er auf dem Körper, welcher ihm zur Grundlage dient, fest; bei den Flechten und einigen knollenartigen parasitischen Pflanzen; endlich bei wenigen dringt er in die Substanz, welche seine Grundlage ausmacht,

ein, und scheint sich darin zu verlieren, z. B. *Viscum*, *Loranthus* u. s. w.

Der abwärts steigende Stock ist unter dem Namen *der Wurzel* (*Radix*) bekannt. Die Theile, aus denen die Wurzel besteht, sind: *der Wurzelstock* (*Rhizoma*), *die Wurzelfasern* (*Fibrillae*), *Wurzelasern* (*Radiculae*), *der Knolle* (*Tuber*), *die Zwiebel* (*Bulbus*), *die Wurzelsprosse* (*Söboles*).

(S. §. 11 a. L.)

11. *Der Wurzelstock* (*Rhizoma*) ist der mehr oder weniger dicke Theil der zweijährigen oder ausdauernden Wurzel, welche unter verschiedener Gestalt vorkommt. Er ist bei zweijährigen und perennirenden Gewächsen meistens fleischig, bei Sträuchern und Bäumen holzig, und macht bei allen, zwei oder mehrere Jahre, nach Verschiedenheit des Gewächses, einen oder viele Triebe (*Turiones*), z. B. *Daucus Carota*, *Polypodium vulgare*, *Astragalus* u. s. w.

Die Wurzelfasern (*Fibrillae*) sind fadenförmige, bald gerade, bald verschiedentlich gekrümmte, Theile der Wurzel, die an dem Wurzelstock, Knollen oder Zwiebel, zuweilen aber auch am mittlern Stock (§. 13.) festsitzen. Es giebt Wurzeln, die, ohne einen Wurzelstock zu haben, aus blossen Wurzelfasern bestehen; so wie man Wurzelstöcke sieht, denen dieser Theil fehlt.

Die Wurzelasern (*Radiculae*) sind ausserordentlich feine haarförmige Verlängerungen der Wurzel, welche eigentlich nur einsaugende Fasern oder deren Verlängerung sind und das Gewächs ernähren. Sie sind bisweilen so zart, dass man sie kaum mit blossen Augen erkennen kann, und werden bei den

mehrere Jahre dauernden Wurzeln wie die Blätter jährlich erneuert.

Der Knollen (Tuber) ist ein dicker fleischiger verschiedentlich gestalteter Theil der Wurzel, welcher ein oder mehrere ihm gleich gestaltete Körper hervorbringt, alsdann aber abstirbt, und bald auf seiner ganzen Fläche, bald an der Spitze oder Basis, einen oder mehrere Triebe macht, z. B. *Solanum tuberosum*, *Spiraea Filipendula*, *Orchis* u. s. w.

Die Zwiebel (Bulbus) ist ein fleichiger, bald blättricht zusammengesetzter, bald dichter mehr oder weniger runder dicker Theil der Wurzel, der mit einem in Rücksicht seiner Grösse und Gestalt der Wurzelstock fest zusammen gewachsen ist, bald aber auch in der Wurzel sitzt. Sie macht ihren Trieb entweder aus der Spitze oder Basis, welches von der Lage des Wurzelstockes abhängt.

Die Wurzelsprosse (Rhizome) sind eine unter der Erde horizontal fortlaufende Vermäuerung der Wurzel, die meistens fadenförmig ist und neue Gewächse derselben Art erzeugt, z. B. *Triticum repens* u. m. a.

(11a. Zur *Wurzelung* (*radicatio*) gehören alle die Theile, welche sich in dem Boden der Pflanze befinden, oder in denselben hinabsteigen, um daraus die Nahrung zu ziehen. In der Regel geschieht dieses durch feine Wurzelfasern (*fibrillae*), doch saugen auch manche die Nahrung durch den Körper der Wurzel selbst ein. Die verschiedenen hieher gehörigen Theile sind:

1. Die *wahre Wurzel* (*radix vera*, *radix stricta sic dicta*), oder Wurzel in der engeren Bedeutung, ist der niederwärts wachsende, herabsteigende Theil des Stocks (*Caudex*). Sie besteht aus einer Rinde und aus Holz in der Mitte; in der Regel ohne Mark und wenn dieses vorhanden ist, tritt es entweder nur in den obern dickern Theil der Wurzel und keilt sich bald aus, oder es nimmt

doch gegen die Spitze verhältnissmässig sehr ab, da es hingegen im Stamme verhältnissmässig zunimmt. Eine wahre Wurzel fehlt den Moosen, Lichenen, Algen, Pilzen. Die Wurzel bildet entweder einen Stamm, woran die Aeste und Wurzelasern sich befinden, *Pfahlwurzel* (rad. palmaris), oder es kommen mehrere, in der Regel einfache nur mit Zasern versehene Wurzeln (radiculae) aus dem Stamme hervor, *getheilte Wurzel*, oder wenn sie fein sind *Zaserwurzel* (rad. radiculosa oder fibrosa). Alle Monokotylen haben Zaserwurzeln. Die wahre Wurzel entspringt aus der Basis des Stammes, aus den Knoten des kriechenden Stammes, aus dem Strunk (caudex intermedius), dem Rhizom, den Knollen, und der Basis der Zwiebel, auch wohl aus dem Stamme über der Erde, Luftwurzeln (rad. aëreae) welche an einigen Feigenarten (*Ficus religiosa*) sich besonders merkwürdig zeigen. Zu der wahren Wurzel gehören die Kunstausdrücke Nr. 1. 2. 6. 7. 10. 11. 16—23. 25. 28. 29—31.

2. Der *Strunk* oder *Mittelstock* (caudex intermedius auch caudex allein), ist der verdickte untere Theil des Stammes in der Erde, zuweilen ist auch der ganze Stamm in einen solchen unterirdischen Körper verwandelt worden. Beispiele der ersten Form geben *Ranunculus bulbosus*, *Holcus bulbosus*; Beispiele der zweiten alle einheimischen Farrnkräuter. S. §. 13. Die dort angeführte *Brassica oleracea gongylodes* ist eine Monstrosität. Hieher gehören die Kunstausdrücke Nr. 8. 12.

3. Der *Wurzelstock*, das *Rhizom* (rhizoma) ist ein unterirdischer Stamm, welcher aus der Basis des Hauptstammes seitwärts auswächst, und entweder selbst mit dem Ende sich aus dem Boden in die Höhe erhebt, oder Aeste treibt, welche aus dem Boden hervorspriessen. Solche unterirdische Stämme sind mehr oder weniger in ihrer Gestalt verändert worden. Sie treiben nie Blätter und Blüten unter der Erde, wohl aber Scheiden, doch nur von weisser oder brauner Farbe. Beispiele geben *Triticum repens*, *Carex arenaria*, sehr viele Irisarten. Hieher gehören die Kunstausdrücke Nr. 4. 5. 9. 13. 14. 15. 21. 22. 24. 26. 27. 28.

4. Die *Knolle* (Tuber) ist eine nicht ausgebildete

Knospe (*gemma*), oder eine Zusammenhäufung von solchen Knospen mit einem dichten Zellgewebe umgeben. Sie unterscheidet sich von den Zwiebeln dadurch, dass die letztere eine ausgebildete Knospe ist. Die zusammengesetzten Knollen kommen an der Wurzel und auch am Stamme hervor, da, wo er sich unter der Erde befindet, oder die Erde berührt; die Kartoffel (*Solanum tuberosum*) giebt davon Beispiele. Sehr oft sind die Knollen verdickte Wurzelasern, wovon viele Orchideen, besonders unsere einheimischen Arten von *Orchis* Beispiele darbieten. Zuweilen ist nicht das ganze Würzelchen in eine Knolle verwandelt, sondern nur ein Theil derselben, z. B. *Asphodelus ramosus*, *Spiraea Filipendula*. Zuweilen ist die Knolle zwiebelartig und befindet sich an der Basis des Stammes, z. B. *Gladiolus*, *Colchicum*. Hieher gehören die Kunstausrücke Nr. 3. 5. 34—42. 46. 47.

5. Die *Zwiebeln* (*Bulbi*) sind ausgebildete Knospen mit sehr fleischigen Deckschuppen, welche sich nicht anders entwickeln, als indem sie Wurzeln treiben. Dadurch unterscheiden sie sich von den übrigen Knospen. Sie sind von doppelter Art, unter der Erde oder über derselben befindlich. Die ersten kommen unter oder an der Basis des Stammes hervor, aus einem seitwärts wachsenden, flachen, fleischigen Körper, den man zum Rhizom rechnen kann, oder sie entsteht an der Spitze eines ausgewachsenen Rhizoms. Die andern entwickeln sich aus den Blattwinkeln, den Winkeln der Bracteen und sogar zwischen den Blütenstielen, in seltenen Fällen nehmen sie die Stelle der Samen in den Früchten ein. Die über der Erde befindlichen fallen ab, um Wurzeln in der Erde zu schlagen. Hieher gehören die Kunstausrücke Nr. 40—45. 48—53.

6. *Haarförmige Wurzel*. Sie bilden Röhren wie die Haare, nur haben sie niemals Querwände; sie sind ästig oder einfach. Nur an den Moosen kommen sie vor und der Kunstausruck Nr. 32. gehört hieher.

7. *Unüchte Wurzel*. Ist die Wurzel der weniger ausgebildeten Pflanzen und stellt nur Verlängerung des Sprosstheils (*thallus*) dar, wodurch die Pflanze wurzelt, ohne in Bau verschieden zu

sein. So findet sie sich an den Lichenen, Algen, und Pilzen. Die Kunstausdrücke Nr. 56—58. gehören hieher. Es ist oft zweifelhaft, ob diese Pflanzen solche Wurzeln haben oder nicht, da es nur auf die Verlängerung und das Anheften ankommt, ob man sie als Wurzeln unterscheide, daher ist der Ausdruck Nr. 58. auch nicht gewöhnlich, sondern man sieht den flockigen Theil der Pilze für den Thallus an. L.)

12. Nach den meisten der genannten Theile werden die Arten der Wurzeln in Abtheilungen gebracht, die darnach benannt sind, nemlich: *wurzelstockig* (rhizomatoideae), *fädig* (fibrillatae), *knollig* (tuberosae), *zwieblig* (bulbosae) und *falsch* (nothae). Zur letzten Abtheilung rechnet man diejenigen Wurzelarten, die nicht in die Erde gehen, sondern andere Grundlagen haben. Die Arten der Wurzeln sind;

a. *Wurzelstockige* (rhizomatoideae).

1. *holzig* (lignosa), die von fester Substanz und aus dicht stehenden Holzfasern zusammengesetzt ist, z. B. alle Bäume und Sträucher.

2. *fleischig* (carnosa), welche aus einer fleischigen mehr oder weniger harten Substanz besteht, z. B. *Daucus Carota*, *Pastinaca sativa*.

3. *hohl* (cava), die im Mittelpunkte jederzeit von selbst hohl wird, z. B. *Fumaria bulbosa*.

4. *füchrig* (loculosa), eine längliche innerhalb hohle mit Querscheidewänden versehene Wurzel, z. B. *Cicuta virosa*.

5. *ganz* (integra), die innerhalb niemals von selbst hohl wird, also der Gegensatz der beiden vorhergehenden.

6. *walzenförmig* (cylindracea), die der walzen-

förmigen Figur am nächsten kommt und dick ist, z. B. *Dictamnus albus*.

7. *spindelförmig* (*fusiformis*), sie ist oben walzenförmig und läuft nach unten hin allmählig in eine Spitze aus, z. B. *Daucus Carota*, *Pastinaca sativa*.

(Spindelförmig, hat eigentlich die Gestalt zweier Kegel, deren Grundflächen zusammenfallen. Also besser möhrenförmig (*dauciformis*). L.)

8. *abgebissen* (*praemorsa*), wo die Hauptwurzel das Ansehn hat, als wäre sie abgenagt, z. B. *Scabiosa succisa*, *Plantago major*.

9. *wurmförmig* (*vermicularis*), die dick, fast walzenförmig, aber hin und her gekrümmt ist, z. B. *Polygonum Bisorta*.

10. *rübenförmig* (*napiformis*), die oben bauchig, nach unten zu aber in eine lange Spitze verdünnt ist, z. B. *Brassica Rapa*.

11. *rundlich* (*subrotunda*, s. *glabosa*), die der kugelförmigen Gestalt am nächsten kommt, z. B. *Raphanus sativus*, *Bunium Bulbocastanum*.

12. *kuchenförmig* (*placentiformis*), eine dicke runde Wurzel, welche von oben und unten zusammengedrückt ist, dass sie fast tellerförmig ist, z. B. *Cyclamen*.

13. *gelenkig* (*geniculata*), die in Glieder abgetheilt ist, aus denen Wurzelasern hervorkommen, z. B. *Gratiola officinalis*.

14. *schuppig* (*squamosa*), die mit mehr oder weniger fleischigen Schuppen bedeckt ist, z. B. *Lathraea Squamaria*.

15. *gezähnt* (*dentata*), eine fleischige, ästige Wurzel, die zahnförmige Verlängerungen hat, z. B. *Cymbidium Corallorhiza*. Fig. 13.

16. *schopffartig* (comosa), die an ihrer Spitze, durch die Ueberbleibsel der in Fasern getheilten Blattstiele, das Ansehn erhalten hat, als wäre sie mit einem Büschel von Haaren versehn, z. B. Aethusa Meum.

17. *vielköpfig* (multiceps), die oben in mehrere Aeste getheilt ist, aus welchen neue Triebe entstehen, z. B. Astragalus, Geranium macrorhizon.

18. *einfach* (simplex), die keine Aeste hat.

19. *ästig* (ramosa), die in Zweige vertheilt ist, z. B. alle Bäume, Sträucher, und viele Kräuter.

20. *senkrecht* (perpendicularis), die senkrecht in die Erde geht, z. B. Thlaspi Bursa pastoris.

21. *wagerecht* (horizontalis), die eine wagerechte Lage hat.

22. *schief* (obliqua), die schief zwischen der wagerechten und senkrechten Lage in die Erde geht, z. B. Aethusa Meum.

23. *kriechend* (repens), die wagerecht in der Erde liegt und sich überall durch Nebenzweige in derselben Richtung verbreitet, z. B. Rumex Acetosella.

(Der angegebene Fall passt nicht. Senecio sarracenicus hat eine solche kriechende wahre Wurzel. L.)

24. *geringelt* (annulata), die auf ihrer Oberfläche mit ringsherum gehenden, erhabenen und vertieften Strichen bezeichnet ist.

25. *höckerig* (tuberculata), die auf ihrer Oberfläche mit Erhabenheiten versehn ist, z. B. Aethusa Meum, Bunium Bulbocastanum.

(Die angegebenen Fälle passen nicht recht. Die Ipecacuanha ist eine solche ausgezeichnete wahre Wurzel. L.)

26. *genarbt* (cicatrisata), die durch das Absterben der Stengel Vertiefung oder Narben auf der Oberfläche hat, z. B. Dentaria.

27. *spreuartig* (paleacea), die mit häutigen Schuppen bedeckt ist, z. B. einige Gräser.

28. *glatt* (laevis), die auf ihrer Oberfläche weder Erhabenheiten, noch Vertiefungen hat.

b. *fadige* (fibrillatae).

29. *fadenförmig* (filiformis), die aus einem einfachen Faden besteht.

30. *faserig* (fibrosa), die aus mehreren fadenförmigen Wurzeln besteht, z. B. *Poa annua*.

31. *haarfaserig* (capillaris), die aus mehreren sehr feinen Fasern besteht, z. B. *Scirpus acicularis*.

32. *sammetartig* (velutina), die aus sehr zarten, kaum bemerkbaren Fasern zusammengesetzt ist, z. B. Laubmose.

33. *gespalten* (fissa), die sehr kurz und an der Spitze zwei oder dreitheilig ist, z. B. *Peltidea-canina*.

c. *knollige* (tuberosa).

34. *körnig* (granulata), deren Knollen sehr klein wie Körner gestaltet sind, z. B. *Saxifraga granulata*. Fig. 5.

35. *hodenförmig* (testiculata), wenn zwei, seltener drei, längliche oder rundliche Knollen mit der Spitze zusammenhängen, aus der sich dann ein Trieb entfaltet, z. B. *Orchis*. Fig. 18.

36. *handförmig* (palmata), wenn zwei, selten drei, längliche flach gedrückte Knollen, welche an der Spitze getheilt sind, wie die vorhergehenden zusammenhängen, z. B. *Orchis*. Fig. 16.

37. *gefingert* (digitata), wenn ein einzelner Knoll fleischig, breitgedrückt, und an der Spitze fingerförmig zertheilt ist, z. B. *Dioscorea alternifolia*.

38. *büschelartig* (fasciculata), wenn mehrere walzenförmige oder längliche Wurzeln an der Spitze

zusammenhängen, dass sie einen Büschel bilden, z. B. *Ranunculus Ficaria*, *Epipactis Nidus avis*. *Fig. 21.*

39. *geballt* (*conglobata*), wenn mehrere rundliche Knollen aufeinander sitzen, z. B. *Helianthus tuberosus*.

40. *hängend* (*pendula*), wenn mehrere Knollen durch fadenförmige Wurzeln zusammenhängen, z. B. *Solanum tuberosum*, *Spiraea Filipendula*. *Fig. 12.*

41. *gegliedert* (*articulata*), wenn ein Knollen gerade aus dem andern wächst, so dass das Ganze aus aneinander hängenden Gliedern zu bestehen scheint, z. B. *Iris*.

42. *rosenkranzförmig* (*moniliformis*), wenn mehrere Knollen in Reihen durch eine fadenförmige Wurzel, als wären sie aufgereiht, zusammenhängen, z. B. *Pelargonium triste*.

d. *zwiebllich* (*bulbosa*),

43. *blättrig* (*imbricata s. squamosa*), wenn die Zwiebel aus dachziegelartig über einander liegenden Blättern zusammengesetzt ist, z. B. *Lilium bulbiferum*. *Fig. 19.*

44. *häutig* (*tunicata*), wenn die Zwiebel aus concentrisch zusammen liegenden Blättern zusammen gesetzt ist, z. B. *Allium Cepa*. *Fig. 17.*

45. *netzförmig* (*reticulata*), wenn die Zwiebel ganz aus netzförmigen Häuten besteht, z. B. *Allium Victorialis*.

46. *halbnetzförmig* (*semireticulata*), wenn die Zwiebel aus einer festen Masse besteht, ihre äussere Haut aber netzförmig ist, z. B. *Gladiolus communis*.

47. *fest* (*solida*), wenn die Zwiebel aus einer festen gleichförmigen Masse besteht, z. B. *Colchicum autumnale*.

I. Terminologie.

48. *nistend* (*nidulana*), wenn die Zwiebel innerhalb ihrer Haut kleine Zwiebeln erzeugt und ganz daraus zu bestehen scheint, z. B. *Ornithogalum spathaceum*.

49. *zusammengesetzt* (*composita* s. *aggregata*), wenn mehrere Zwiebeln, die an der Basis einigen Zusammenhang haben, dicht beisammen stehn, z. B. *Allium nigrum*.

50. *gezwiebelt* (*geminata*), wenn zwei Zwiebeln an ihrer Basis zusammenhängen, z. B. *Fritillaria pyrenaica*, *Erythronium Dens canis*.

51. *doppelt* (*duplicata*), wenn zwei Zwiebeln aufeinander stehn, so dass eine aus der andern gewachsen ist, z. B. *Allium sphaerocephalum*.

52. *unterstützt* (*suffulta*), wenn der Wurzelstock an der Basis der Zwiebel weit hervorsteht, so dass er derselben fast an Grösse gleich kommt und deutlich abgesondert ist, z. B. *Ixia punicea, erecta*.

53. *einzel* (*solitaria*), die einzeln vorkommt, ohne dass an der Seite oder Spitze eine andre Zwiebel hervor wächst.

54. *mittelständig* (*centralis*), aus deren Mitte der Trieb kommt, z. B. *Galanthus nivalis*.

55. *seitwärtsstehend* (*lateralis*), bei der der Trieb aus der Seite hervorwächst, z. B. *Ixia virgata*.

c. *falsche* (*nothae*).

56. *getheilt* (*divisa*), die auf Steinen oder andern Körpern ästig getheilt ist, aber nicht in die Erde geht, z. B. *Fucus digitatus*.

57. *schimmelartig* (*byssacea*), die fein wollig zertheilt ist und das Ansehen eines Fadenschimmels (*Byssus*) hat, z. B. bei mehreren Arten des *Agaricus*.

58. *warzig* (papillosa), die aus kurzen warzenförmigen kleinen Punkten besteht, mit denen das Gewächs auf Holz oder Stein befestigt ist, z. B. *Parmeliae*.

59. *schildförmig* (scutiformis), wenn die Basis des aufwärtsgehenden Stocks in eine dünne Platte ausgedehnt ist, womit das Gewächs auf Holz oder Stein befestigt ist, z. B. *Usnea florida*, *Ceramium Filum*, *Lecidea pustulata*, *Gyrophora adnata*.

60. *verschwindend* (evanescens), wenn der abwärts steigende Stock in Holz eindringt und darin sich allmählig verliert, z. B. *Viscum album*.

Bei der genauern Beschreibung der Wurzel wird die Form und die Verschiedenheit der Oberfläche bei der knolligen und zwieblichen Wurzel angegeben, so wie die Stelle bestimmt wird, wo die Zäsen festsitzen.

Der Forstmann unterscheidet an dem ästigen abwärts steigenden Stock der Bäume und Sträucher folgende Theile: die *Pfahlwurzel* (caudex perpendicularis radices), der mittlere senkrecht in die Erde dringende Theil. Die *Thauwurzel* (ramus horizontalis radices), die wagerecht liegende Aeste der Wurzel, die dicht unter der Erde fortgehn und die *Wurzelzäsen* (Radicalae).

13. Der *mittlere Stock* (Caudex intermedius), ist derjenige Theil der Gewächse, welcher seiner eigenthümlichen Gestalt wegen weder zum abwärtssteigenden, noch aufwärtssteigenden Stock gehören kann. Er ist nur einigen Gewächsen eigen, und hat bald das Ansehn einer Wurzel, bald des Stengels. Man nennt ihn daher:

1. *wurzelartig* (radiciformis), wenn er das Ansehn einer knolligen Wurzel hat, sich aber über der Erde, oder halb über, halb unter derselben befindet. Nach seiner Form heisst er:

a) *rübenartig* (napiformis), wenn er einer rü-

benartigen Wurzel ähnlich ist, (§. 12. n. 10.) sich aber über der Erde zeigt, z. B. *Brassica oleracea gongylodes*.

- b) *zwiebelartig* (*bulbosus*), der wie eine feste Zwiebel (§. 12. n. 47.) aussieht, aber halb über, halb unter der Erde steht, z. B. *Ranunculus bulbosus*, *Holcus bulbosus*.

2. *stengelartig* (*cauliformis*), der unter der Erde sich findet, das Ansehn des Stocks hat und sich in diesen verliert; nach seiner Fläche nennt man ihn:

- a) *glatt* (*laevis*), der auf seiner Fläche weder Erhabenheiten, noch Vertiefungen hat, z. B. *Lilium bulbiferum*.
 b) *narbig* (*cicatriscatus*), der von den Ueberbleibseln der Blattstiele Erhabenheiten auf seiner Fläche hat, z. B. *Cyclamen europaeum*.

(§. 11 a. L.)

14. Der *aufwärts steigende Stock* (*Caudex ascendens*) ist die Verlängerung der Gewächse über der Erde oder über der Substanz, welche zu ihrer Grundlage dient. Die Gewächse zeigen gerade in Rücksicht des aufwärtssteigenden Stocks die grösste Mannigfaltigkeit; so dass die meisten Unterscheidungsmerkmale bloss von dessen Theilen und deren abweichenden Form genommen werden. Man unterscheidet folgende Theile desselben: den *Stiel* (*Cormus*), den *Blüthenstand* (*Inflorescentia*), die *Blätter* (*Folia*), den *Wedel* (*Frons*), das *Laub* (*Tallus*), die *Stützen* (*Fulcra*), die *Blumen* (*Flores*), die *Früchte* (*Fructus*) und den *Befruchtungsboden* (*Basis*).

(14a. Der *Stamm* (*caulis*), ist der aufwärts wachsende Theil des Stockes (*caudex*). Er be-

steht aus einer äussern Lage von Zellgewebe, welche man Rinde nennt, aus Holz, (Faser- und Spiralgefässen) in einzelnen Bündeln oder in Ringen und aus Zellgewebe in der Mitte, dem Marke. Das Mark ist in den jüngern Stämmen und gegen das Ende der Stämme in verhältnissmässig grösserer Menge vorhanden. Durch dieses Mark unterscheidet er sich von der Wurzel. Seine Theile sind Aeste (rami), welche aber nicht wie die Aeste der Wurzel geradezu entspringen, sondern sich aus einer Knospe (gemma) entwickeln. Ein Ast welcher nur Blüthen und keine vollkommenen Blätter trägt, heisst Blüthenstiel (pedunculus). Es giebt nur drei verschiedene Arten von Stämmen:

1. Der *wahre Stamm* (caulis stricte sic dictus), dessen Aeste aus Knospen und diese aus Blattwinkeln entspringen.
2. Der *Baumstamm* (truncus), dessen Aeste und Zweige wenn sie vorhanden sind, zwar aus Knospen, diese aber nicht aus den Winkeln der Blätter entstehen.
3. Der *Palmstamm* (cormus), der aus den vereinigten und verwachsenen Blattstielen besteht. Er kommt nur an den Palmen und den Farnkräutern vor; er wird im Wachsen nicht dicker und verästelt sich nie.

Der *unächte Stamm* (thallus), der Algen Lichenen und Pilze ist ein caudex, der sich nicht in Stamm und Wurzel trennt oder ein Stamm, der nicht von der Wurzel verschieden ist. Er treibt keine wahren Aeste aus Knospen, auch trägt er keine wahren Blätter, sondern bildet die gleichförmige Grundlage der Pflanzen, worauf Früchte hervorkommen.

15. Der *Stiel* (Cormus), ist derjenige Theil der Gewächse, welcher zur Unterstützung des Ganzen dient, und den Blüthenstand, die Blätter, die Wedel, die Stützen, Blumen und Früchte trägt. Aus ihm entfalten sich in den meisten Fällen alle diese Theile, aber bei der grossen Mannigfaltigkeit des Gewächreichs ist es nicht zu verwundern, dass er nach Massgabe seiner Bestimmungen eine ganz verschiedene

Form hat, daher unterscheidet man folgende vierzehn Arten desselben, nämlich: *der Stock* (Caudex), *der Stamm* (Truncus), *der Stengel* (Caulis), *der Halm* (Culmus), *der Schaft* (Scapus), *der Strunk* (Stipes), *die Spindel* (Rachis), *das Gestell* (Podetium), *der Schössling* (Sarmentum), *die Sprosse* (Stolo), *der Blattstiel* (Petiolus), *der Blumenstiel* (Pedunculus), *die Borste* (Seta), *die Saite* (Hypa).

(Der Ausdruck *cornus* ist wenig gebräuchlich. Man kann ihn daher bequem auf den Palmstamm einschränken. L.)

16. *Der Stock* (Caudex), ist ein mehrere Jahre dauernder, an der Spitze belaubter Stiel, welcher sich nur bei den Palmen und Farnkräutern findet und der keine Rinde hat, sondern von den Ueberbleibseln des Strunks bekleidet wird. (Ist oben §. 14a. *cornus* genannt. L.) Es giebt folgende Arten:

1. *geringelt* (annulatus), wenn die Ueberbleibsel des Wedels in regelmässiger Entfernung ringartige Narben bilden, z. B. *Corypha rotundifolia*.

2. *schuppig* (squamosus), wenn die Ueberbleibsel des Wedels den Stock ohne bestimmte Ordnung umgeben, z. B. *Phoenix dactylifera*, *Chamaecrops humilis*.

3. *gewürfelt* (tessellatus), wenn der Wedel oder die Basis des Strunks (§. 21.) nicht zurück bleibt, sondern eine Narbe hinterlässt, wodurch der Stock ein würfelförmiges Ansehn erhält, z. B. *Cyathea arborea*.

4. *stachelig* (aculeatus), wenn die Ueberbleibsel des Wedels Stacheln am Stock zurücklassen, z. B. *Cocos aculeata*, *Cyathea aspera*.

5. *unbewaffnet* (inermis), der Gegensatz des von Willdenow's Grundriss. I Th.

rigen, wenn die Ueberbleibsel des Wedels ohne Stacheln sind, z. B. *Phoenix dactylifera*, *Cyathea arborea*.

6. *baumartig* (*arboreus*), der aufrecht stehend ist und das Ansehn eines Baums dem ganzen Gewächse giebt, z. B. Palmen und baumartige Farrnkräuter.

7. *kletternd* (*scandens*), der an Bäumen in die Höhe steigt und hier und da mit Aesten versehn ist, z. B. mehrere tropische Farrnkräuter.

8. *wagerecht* (*horizontalis*), der wagerecht auf der Erde liegt oder sich unter der Erde befindet, B. *Polypodium vulgare*. Fig. 15.

9. *schief* (*obliquus*), der in der Erde eine schiefe Richtung hat, z. B. mehrere Farrnkräuter.

10. *kriechend* (*repens*), der unter der Erde fortläuft, z. B. *Pteris aquilina*.

11. *wurzelnd* (*radicans*), der an den Stämmen der Bäume kriecht und durch kleine Wurzeln daran fesselt, z. B. *Polypodium phymatodes*.

12. *spreuartig* (*paleaceus*), der mit häutigen Schuppen bedeckt ist, z. B. *Aspidium spinulosum*, *Filix mas*.

13. *hautig* (*pilosus*), der mit Haaren besetzt ist, öfter sind diese Haare die Spitzen kleiner Schuppen, z. B. verschiedene Farrnkräuter.

14. *kurzborstig* (*hirtus*), der mit kurzen steifen Haaren bedeckt wird, z. B. verschiedene ausländische kleine Farrnkräuter.

15. *borstig* (*setosus*), dessen Fläche mit steifen Borsten besetzt ist, z. B. wenige ausländische Farrnkräuter.

(Es ist wohl kaum ein Grund vorhanden, warum man allein den Palmen und Farrnkräutern einen *caudex* zuschreiben soll. Der Stamm der Bäume, welcher nicht, wie die Aeste, Knospen, sondern nur Schösslinge treibt, verdient diesen Namen auch. Manche Beispiele des V., z. B. 12–15, beziehen sich auf den Blattstiel, *petiolus*. L.)

17. Der *Stamm* (*Truncus*), ist den Bäumen und Sträuchern eigen und dauert mehrere Jahre. Der Hauptstiel führt bei diesen Gewächsen die angeführte Benennung, dessen Zertheilungen werden *Zweige* oder *Aeste* (*Rami*), und deren weitere Zertheilung *Zweiglein* (*Ramuli*) genannt. Der Stamm ist entweder

1. *baumartig* (*arboreus*), dieser ist einfach und bildet oben einen *Wipfel* oder *Krone* (*caecumen*) von Aesten. Er ist nur den Bäumen eigen, oder

2. *strauchartig* (*fruticosus*), der von unten gleich in mehrere Aeste sich theilt, wie bei allen Sträuchern.

(Man sagt von den Stämmen der Bäume und Sträucher gewöhnlich *caulis*; ja man findet nie in Willdenow's Beschreibungen der Sträucher den Ausdruck *truncus fruticosus*. Daher ist es besser, das Wort *truncus* so zu bestimmen, wie oben §. 14a. geschehen ist. L.)

18. Der *Stengel* (*Caulis*), ist krautartig, selten holzig, und dauert nur ein oder wenige Jahre, daher er nur den Kräutern zugeeignet wird; jedoch pflegt man auch zuweilen diesen Ausdruck bei Bäumen oder Sträuchern zu gebrauchen. Die fernern Vertheilungen desselben werden auch *Zweige* oder *Aeste* (*Rami*) genannt. (§. den vorhergehenden §. Anmerk. und §. 14a.) Die Arten sind:

a. *Nach der Zertheilung.*

1. *sehr einfach* (*simplicissimus*), der gar keine

Aeste hat und dessen Blumenstiele auch nicht getheilt sind, mithin kann er nur eine Blume, Aehre oder in den Winkeln der Blätter sitzende Blumen haben.

2. *einfach* (*simplex*), der keine Aeste hat, dessen Blumenstiele aber zertheilt sein können.

3. *etwas ästig* (*subramosus*), der bald ohne Aeste, bald aber auch mit einem oder ein Paar Aesten angetroffen wird.

4. *ästig* (*ramosus*), der immer mit Aesten versehen ist.

5. *sehr ästig* (*ramosissimus*), wo alle Aeste wieder in Nebenäste getheilt sind, die öfters wieder Aeste haben.

6. *verschwindend* (*deliquescens*), der ästig ist, sich aber so zertheilt, dass der Hauptstamm selbst nicht mehr zu bemerken ist, sondern in Aeste sich verliert.

(Besser zerstört. L.)

7. *ganz* (*integer*), der ästig ist, bei dem man aber den Hauptstamm bis zur Spitze verfolgen kann.

(Wird selten gebraucht. Nach Linné ist *integer, simplicissimus, ramis vix ullis* Phil. Bot. §. 82. Der Ausdruck *auslaufend* (*excurrans*) wäre für den hier gegebenen Begriff passend. L.)

8. *quirelförmig* (*verticillatus*), wenn an der Spitze eine Menge Aeste treiben, aus deren Mitte der Hauptstamm fortwächst, so dass die Aeste den Stengel in einer gewissen Entfernung kreisförmig umgeben, z. B. *Pinus sylvestris*.

9. *sprossend* (*prolifer*), wo der Stengel in mehrere Aeste sich theilt, diese sich auch wieder so theilen, aber in der Mitte der Hauptstamm nicht fortgesetzt wird, z. B. *Ledum palustre*.

(Nach Linné ist *prolifer, ex apicis centro emittens*

tantum ramos: Pinus, dem allgemeinen Gebrauche von prolifer gemäss. Also ein Stamm, der nicht aus den Blattwinkeln, sondern an der Spitze Aeste treibt. L.)

10. *gabelförmig* (dichotomus), wenn der Stengel bis auf die kleinsten Aeste zweimal getheilt ist, z. B. Viscum album, Fedra olitoria.

b. *Nach den Aesten.*

11. *abwechselnde Aeste* (ramis alternis). Die Aeste haben solche Stellung, dass zwischen zwei Aesten auf der entgegengesetzten Seite nur einer steht.

12. *gegenüberstehende Aeste* (ramis oppositis), wenn ein Ast dem andern gegenüber steht, so dass beide Aeste mit ihrer Basis an den entgegengesetzten Seiten des Stammes zusammentreffen.

13. *zweireihig* (distichus), wenn die Aeste gegeneinander über in einer Fläche stehn.

(Besser ramis distichis, sparsis, confertis. L.)

14. *zerstreut* (sparsus), wo die Aeste ohne Ordnung zerstreut stehn.

15. *dicht* (confertus), wenn die Aeste ohne Ordnung den Stamm dicht besetzen, dass wenig Zwischenraum bleibt.

16. *armförmig* (brachiatus, s. decussatus), wenn gegenüber stehende Aeste sich rechtwinklich durchkreuzen.

17. *ruthenförmig* (virgatus), wenn ein langer Stengel nur kurze Aeste hat.

(Gewöhnlich braucht man virgatus, wenn ein Stamm lange, dünne und wenig getheilte Zweige hat. *Verwirrt* (diffusus), ist der Stamm, wenn ihn die Menge von Aesten aus seiner Richtung bringt. L.)

18. *rispenförmig* (paniculatus), wenn ein Stengel in mehrere wieder ästige, Blätter und Blumen tra-

gende, Aeste an seiner Spitze zertheilt ist, z. B. *Rumex Acetosella*.

19. *gleich hoch* (*fastigiatus*), wo alle Aeste von unten auf mehr oder weniger verlängert sind, so dass sie fast gleiche Höhe haben.

20. *gedrängt* (*coarctatus*), die Spitzen der Aeste sind nach dem Stamme zu einwärts gebogen, z. B. *Populus dilatata*.

(In diesen und allen Fällen bis Nr. 27. sagt man besser *ramis coarctatis, patentibus etc.* L.)

21. *abstehend* (*patens*), wo die Aeste einen spitzen, beinah rechten Winkel bilden.

22. *ausgebreitet* (*divaricatus*), wo die Aeste einen rechten Winkel bilden.

23. *ausgesperrt* (*divergens*), wo die Aeste solche Lage haben, dass sie oben einen stumpfen, unten aber einen spitzen Winkel bilden.

(Ist dem Sprachgebrauche von *divergens* nicht gemäss. Besser *reversus* oder *recutitus* herabgesperrt. L.)

24. *herabgebogen* (*deflexus*), wenn die Aeste in einem Bogen herab hängen.

25. *herabhängend* (*reflexus*), wo die Aeste so herunterhängen, dass sie fast mit dem Stamm gleich laufen.

26. *hin und her gebogen* (*retroflexus*), wo die Aeste nach allen Seiten hingebogen sind.

(Man nennt einen zuerst aufwärts, dann niederwärts, dann wieder aufwärts gebogenen Ast *retroflexus*, z. B. *Amaranthus retroflexus*. L.)

c. Nach der Festigkeit.

27. *steif* (*rigidus*), der ganz steif ist und ohne einzuknicken sich nicht beugen lässt.

28. *zerbrechlich* (*fragilis*), der bei der geringsten Beugung gleich bricht.

29. *biegsam* (*flexilis*), der sich ohne zu zerbrechen hin und her beugen lässt.

30. *zähe* (*tenax*), den man ohne dass er zerbricht beugen und fast gar nicht zerreißen kann.

31. *schlaff* (*laxus*), der steif steht, aber durch den geringsten Hauch des Windes hin und her bewegt wird.

(Also nicht recht steif. L.)

d. Nach der Lage.

32. *schmarotzend* (*parasiticus*), der mit seiner Wurzel auf Holz oder Wurzeln anderer Gewächse festsetzt, z. B. *Viscum*, *Monotropa* u. s. w.

33. *aufrecht* (*erectus*), wenn der Stengel ziemlich senkrecht steht.

34. *gerade* (*strictus*), wenn der Stengel vollkommen und sehr gerade senkrecht steht.

35. *schwach* (*debilis*), wenn der Stengel zu dünn ist, um sich vollkommen aufrecht erhalten zu können.

36. *aufwärts steigend* (*adscendens*), wenn der Stengel an der Erde liegt, mit dem obern Theile aber senkrecht in die Höhe geht.

37. *niedergebogen* (*declinatus*), wenn der Stengel sich so zur Erde bengt, dass der Bogen nach oben steht.

38. *gestützt* (*fulcratus*), der von oben Wurzel bis in die Erde schlägt, die sich nachher in wirklich Stämme verwandeln, z. B. *Rhizophora*.

(Sie bekommen oft eine grosse Dicke, werden aber nie wahre Stämme, sondern behalten immer den Bau der Wurzeln. Man findet sie auch an *Pandanus*, *Ficus* und vielen andern. L.)

39. *geneigt* (*cernuus*), wenn die Spitze bei einem aufrechten Stengel eine horizontale Richtung hat.

40. *überhängend* (nutans), wenn die Spitze der Erde zu gekrümmt ist.

41. *hängend* (pendulus), wenn ein auf Zweigen der Bäume parasitisch (Nr. 32.) stehender Stengel mit seiner Basis dem Zenith und mit der Spitze der Erde zu gekehrt ist.

42. *gestreckt* (procumbens, prostratus, humifusus), wenn der Stengel ganz flach an der Erde liegt.

43. *niederliegend* (decumbens), wenn der Stengel anfangs in die Höhe geht, sich aber dann gleich wieder zur Erde beugt und der grössere Theil desselben gestreckt ist.

44. *kriechend* (repens), wenn der Stengel niederliegt, und unten mit Wurzeln besetzt ist.

45. *rankig* (sarmentosus), wenn der Stengel niederliegt, aber nur in gewissen Zwischenräumen Wurzeln hat. *Fig. 20.*

(Besser wurzelrankig. L.)

46. *wurzelnd* (radicans), wenn der Stamm aufrecht steht, klimmend ist, und überall kleine Wurzeln treibt, womit er sich festhält, z. B. *Hedera Helix*.

47. *schwimmend* (natans), der auf der Fläche des Wassers liegt, z. B. *Polygonum amphibium*.

48. *untergetaucht* (demersum), der unter der Wasserfläche sich findet, z. B. *Ceratophyllum demersum*. *Utricularia*. *Fig. 288.*

49. *gekniert* (flexuosus), wenn der aufrechte Stengel sich nach entgegengesetzten Richtungen beugt, dass er eine Menge stumpfer Winkel bildet. *Fig. 14.*

50. *klimmend* (scandens), ein schwacher Stengel, der sich an andern (durch mancherlei Mittel, Gabeln,

gewundene Blattstiele u. s. w. L.) festhält und in die Höhe steigt, z. B. *Passiflora coerulea*.

51. *windend* (*volubilis*), ein schwacher Stengel, der sich schneckenförmig um andere Pflanzen dreht und zwar in zweierlei Richtung:

a) *rechts* (*dextrorsum*), wenn der Stengel von der Rechten zur Linken sich abwärts um einen Gegenstand dreht, z. B. *Convolvulus*. Fig. 25.

b) *links* (*sinistrorsum*), wenn der Stengel von der Linken zur Rechten abwärts um einen Gegenstand sich windet, z. B. *Humulus Lupulus*. Fig. 32.

e. *Nach der Bekleidung.*

52. *nackt* (*nudus*), der gar keine Blätter, Schuppen oder dergleichen hat.

53. *blättilos* (*aphyllus*), dem bloss die Blätter fehlen.

54. *schuppig* (*squamosus*), mit Schuppen bedeckt.

55. *ausschlagsschuppig* (*ramentaceus*), der mit zerstreuten, häutigen, trockenen Schuppen (§. 50.) bedeckt ist, z. B. *Erica ramentacea*.

56. *afterblättrig* (*stipulatus*), der in den Winkeln der Blätter (nicht in den Winkeln der Blätter, sondern neben der Basis derselben. L.) mit Afterblättern (§. 49.) versehen ist, z. B. *Vicia sativa*.

57. *afterblättilos* (*exstipulatus*), der keine Afterblätter hat.

58. *scheidig* (*vaginatus*), der keine Blätter hat und mit kurzen Scheiden statt dieser in bestimmten Zwischenräumen besetzt ist, z. B. *Equisetum*, *Casuarina*, *Ephedra*, *Colletia*, *Salicornia*.

59. *blättrig* (*foliosus*), der Blätter hat.

60. *durchwachsen* (*perfoliatus*), wo der Stengel mitten durch ein Blatt geht, z. B. *Bupleurum*. Fig. 38.

61. *geflügelt* (alatus), wenn sich eine blattförmige Haut längs dem Stengel erstreckt. *Fig.* 265.

62. *zwiebeltragend* (bulbifer), wenn in den Winkeln der Blätter sich kleine Zwiebeln oder Knollen finden, z. B. *Lilium bulbiferum*, *Dentaria bulbifera*.

63. *stachelig* (aculeatus), wenn spitzige sich mit der Haut ablösende Verlängerungen am Stengel sind (§. 74).

64. *dornig* (spinosus), wenn spitzige, sich nicht mit der Haut ablösende Verlängerungen am Stengel sind (§. 73).

65. *wehrlos* (inermis), der weder Dornen, noch Stacheln hat.

66. *unfruchtbar* (sterilis), der keine Blumen trägt.

67. *fruchtbar* (fructificans), der Blumen oder Früchte trägt.

f. *Nach der Figur.*

68. *rund* (teres), der ganz cylindrisch ist. *Fig.* 25. 27. 32.

(Eigentlich, der runde Querschnitt hat. Denn ein kegelförmiger Stamm ist auch rund (teres). L.)

69. *halbrund* (semiteres), der auf der einen Seite rund, auf der andern flach ist. *Fig.* 235.

70. *zusammengedrückt* (compressus), wenn der Stengel auf beiden Seiten flach ist, aber stumpfe Ecken hat.

71. *zweischneidig* (anceps) wenn ein zusammengedrückter Stengel an beiden Ecken scharf ist.

72. *eckig* (angulatus), wenn ein Stengel mehrere Ecken hat, die Flächen aber vertieft sind. Es giebt mehrere Arten, als:

a) *stumpfeckig* (obtuse angulatus).

b) *scharfeckig* (acute angulatus).

c) *dreieckig* (triangularis).

d) *viereckig* (quadrangularis), u. s. w. *Fig.* 237.

e) *vieleckig* (multangularis).

73. *dreikantig* (triquetrus), wenn er drei scharfe Ecken hat und die Flächen ganz eben sich zeigen. *Fig.* 236.

74. *dreiseitig* (trigonus), wenn er drei runde oder stumpfe Ecken hat, und die Flächen eben erscheinen.

Es giebt noch folgende Arten davon:

a) *vierseitig* (tetragonus). *Fig.* 29.

b) *fünfsseitig* (pentagonus).

c) *sechssseitig* (hexagonus) u. s. w.

d) *vielseitig* (polygonus).

75. *häutig* (membranaceus), wenn der Stengel zusammengedrückt, und dünn wie ein Blatt ist, z. B. *Cactus Phyllanthus*.

76. *knotig* (nodosus), wenn der Stengel durch hervorstehende Glieder eingetheilt ist.

77. *gleich* (enodis), der weder Knoten, noch Glieder hat.

78. *gegliedert* (articulatus), wenn der Stengel regelmässige Glieder hat, die an den Gelenken eingezogen sind, z. B. *Cactus*. *Fig.* 233.

79. *gelenkig* (geniculatus), wenn der Stengel regelmässige Glieder hat, woran weder die Gelenke hervorragend, noch eingezogen sind.

g. *Nach der Substanz.*

80. *holzig* (lignosus), der aus festem Holze besteht.

81. *faserig* (fibrosus), der aus holzigen Fasern, die sich ohne Mühe trennen lassen, besteht.

82. *krautartig* (herbaceus), der weich ist und sich leicht schneiden lässt.

83. *fleischig* (carnosus), der fleischig und unge-

fähr so saftig und weich wie das Fleisch eines Apfels ist.

84. *fest* (*solidus*), der innerhalb dicht ist.

85. *locker* oder *markig* (*inanis*), der innerhalb mit einem lockern Marke angefüllt ist.

86. *hohl* (*fistulosus*), der innerhalb ohne Mark und ganz hohl ist.

87. *füchrich* (*loculosus* s. *septis transversis interstinctus*), wo entweder das Mark oder der hohle Raum durch dünne Häute in die Queere abgetheilt ist.

88. *korkartig* (*suberosus*), wenn die äussere Rinde weich und schwammig ist, z. B. *Ulmus suberosa*.

89. *rissig* (*rimosus*), wenn in der Rinde dünne Risse oder Spalten sind.

90. *narbig* (*cicatriscatus*) der durch das Abfallen der Blätter Vertiefungen erhält.

Die Oberfläche des Stengels hat noch sehr viele Verschiedenheiten, siehe §. 6. Wenn eine Art des Stengels sich aber bei den Pflanzen findet, die nicht genau zu der gegebenen Definition passt, so bedient man sich hier des Wörtchens *sub*, wie bei den Blättern §. 44. und bei andern Pflanzentheilen, daher sagt man *caulis subaphyllus*, *subteres*, d. h. ein fast blattloser, ein fast runder Stengel u. s. w.

Die meisten Gewächse sind mit einem Stengel versehen, und nur wenige haben keinen. Daher kann man sie in solche, welche einen haben, *stengeltragende* (*plantae caulescentes*), oder solche, denen er fehlt, *stengellose* (*acaules*), theilen. Z. B. *Viola odorata* u. s. w. Bei den letztern pflegen dann die übrigen Theile aus der Wurzel oder dem mittleren Stock zu kommen. Gewächse aber, deren Blätter und Blumen unmittelbar aus der Wurzel kommen, müssen *stiellose* (*plantae acormosae*) heissen, z. B. *Colchium autumnale* u. s. w.

(Der letztere Ausdruck ist nicht aufgenommen; in dem erwähnten Falle kommen Blätter und Blüten aus einer Knolle oder Zwiebel. Gerade zu aus der Wurzel ohne vermittelnden caudex entspringen nie Blätter und Blüten. L.)

Bei den Moosen und den Bärlapp-Arten hat Linné nicht den Ausdruck *Caulis*, sondern *Surculus* gebraucht. Es ist aber der Stiel dieser Gewächse durchaus vom Stengel gar nicht verschieden, daher muss dieser Ausdruck, wenn man die Benennung der Theile nach richtigen Prinzipien aufstellen will, gänzlich wegfallen, und statt dessen *caulis* gebraucht werden. Ausser den bereits abgehandelten Arten unterscheidet man bei diesen Gewächsen noch folgende:

1. *erneuernd* (*innovans*), der sehr einfach ist, an dem man aber die Jahrwüchse unterscheiden kann, z. B. *Polytrichum commune*.

(Eigentlich ein Stamm, der nur aus der Spitze Aeste treibt. Der Gegensatz ist *caulis ramosus*, welcher aus den Blattwinkeln Aeste treibt. L.)

2. *zerstreut* (*vagus*), dessen Aeste ohne Ordnung schlaff ausgebreitet und von einander abstehend sind.

(Besser *ramis vagis*, entgegengesetzt dem *caulis pinnatus*. Die Begriffe von schlaff und abstehend gehören nicht hieher, man sagt dafür *ramis laxis patentibus*. L.)

3. *verwebt* (*intricatus*), der sehr zahlreiche an einander gedrängte kurze unter einander verwickelte Aeste hat, so dass der Hauptstamm wegen der vielen Aeste gar nicht aufzufinden ist, z. B. *Hypnum intricatum*.

4. *büschlicht* (*fasciculatus*), dessen kurze Aeste kleine Bündel bilden.

5. *gefiedert* (*pinnatus*), der einfache zweizeilig stehende Aeste hat.

6. *doppelt gefiedert* (bipinnatus), dessen gefiederte Aeste zweizeilig gestellt sind.

7. *dreifach gefiedert* (triplicato-pinnatus s. tripinnatus), dessen doppelt gefiederte Aeste gefiedert stehn.

8. *doppelt getheilt* (bis bifidus), wenn ein zweitheiliger Stengel an den Spitzen wieder zweitheilig ist. Er unterscheidet sich vom gabelförmigen (Nr. 10.) dadurch, dass er nur zweimal getheilt ist, z. B. *Lycopodium* einige Arten.

9. *mit niederhängenden Aesten* (ramis deflexis), wenn einfache kurze Aeste abwärts gebogen sind, z. B. *Sphagnum*.

19. Der *Halm* (Culmus), ist nur den Gräsern und grasähnlichen Gewächsen eigen. Man bestimmt die Arten desselben wie die des Stengels.

(Es ist allerdings botanischer Sprachgebrauch, den Stamm der Grasarten und Cyperoiden Halm zu nennen. Aber es ist kein Grund dafür, so wenig als für den Ausdruck surculus bei den Moosen. Der Bau des Halms ist allerdings verschieden von dem Baue des Stammes an vielen andern Pflanzen, aber nicht verschieden von dem Baue des Stammes der Comaceae u. a. L.)

Nur folgende verdienen hier angemerkt zu werden:

1. *knotig* (nodosus), der mit hervorstehenden Gliedern versehen ist, z. B. die meisten Gräser.

2. *knotenlos* (enodis), der ohne Glieder und hervorstehende Knoten zu haben, angetroffen wird, z. B. *Juncus*, *Carex*, *Scirpus*.

3. *einfach* (simplex), der keine Aeste hat.

4. *ästig* (ramosus), welcher mit Aesten versehen ist.

5. *belaubt* (frondosus), der ausserordentlich ästig

und überall mit kleinen Blättchen besetzt ist, z. B. *Restio*.

(Ein überflüssiges Kunstwort, c. *ramosissimus* ist bestimmter. L.)

6. *scheidig* (*vaginatus*), der mit Blattscheiden bedeckt ist.

7. *nackt* (*nudus*), der keine Blattscheiden und auch keine Blätter hat.

8. *aufrecht* (*erectus*), der gerade in die Höhe steht.

9. *knieförmig* (*geniculatus* s. *infractus*), dessen unteres Gelenk flach niederliegt, und der übrigens gerade in die Höhe geht; so dass durch diese Beugung des Halms fast ein rechter Winkel entsteht, z. B. *Alopecurus geniculatus*.

10. *schief* (*obliquus*), der eine solche Richtung hat, die zwischen der senkrechten und horizontalen fällt, z. B. *Poa annua*.

20. Der *Schaft* (*Scapus*), ist ein krautartiger Stiel, der nur Blumen, aber nicht Blätter trägt und aus dem abwärtssteigenden oder auch aus dem mittlern Stock, niemals aber aus dem aufwärtssteigenden entspringt. Er ist den Lilien eigen, bei den übrigen Gewächsen wird er zwar auch gefunden, aber man verlangt bei diesen, dass er mehr als eine Blume trägt, Fig. 44. hat er nur eine Blume, so wird er *wurzelstöckiger Blumenstiel* (*Pedunculus radicalis* §. 26.) genannt, nur dann wenn diese einzelne Blume durch einen Blumenstiel auf dem aus der Erde kommenden Stiel fest sitzt, heisst er Schaft.

Bei den zusammengesetzten Blumen heisst der mit blossen Blumen aus der Erde kommende Stiel, beständig Schaft.

(Da der Stamm in solchen Fällen zwar kurz ist,

aber nie ganz fehlt, so lässt sich wohl unterscheiden, ob der nur Blüten tragende Stiel aus der Mitte entspringt und Schaft ist, oder aus den Winkeln der Wurzelblätter und Wurzelblütenstiel (*pedunculus radicalis*) heissen muss. L.)

21. Der *Strunk* (*Stipes*), ist der Stiel des Wedels der Palmen, der krautartigen Farrnkräuter, der Tange und der Stiel der Pilze.

(Für die Palmen bedient man sich besser des Ausdrucks *petiolus*. Auch wäre dieses für die Farrnkräuter zu empfehlen. Der *stipes* der Tange und Pilze, kommt mit dem *podetium* der Lichenen überein. Sonst ist *stipes* der allgemeine Ausdruck. L.)

Die Arten davon sind:

a. Bei den Farrnkräutern und Tangen.

1. *spreuartig* (*paleaceus*), wenn er mit trocknen häutigen Schuppen bedeckt ist.

2. *schuppig* (*squamosus*), wenn er mit krautigen Schuppen belegt ist. Fig. 9.

3. *nackt* (*nudus*), der ohne alle Bedeckung ist.

4. *stachlicht* (*aculeatus*), welcher Stacheln hat.

5. *kurzstachlicht* (*muricatus*), der mit kurzen wenig hervorragenden Stacheln besetzt ist.

6. *wehrlos* (*inermis*), welcher keine Stacheln hat.

b. Bei den Pilzen.

7. *fleischig* (*carnosus*), der von fleischiger Substanz ist.

8. *lederartig* (*coriaceus*), der aus einer zähen lederartigen Substanz besteht, z. B. *Boletus perennis*.

9. *fest* (*solidus*), der innerhalb aus einer festen Masse besteht.

10. *hohl* (*fistulosus*), der innerhalb eine fortlaufende Röhre bildet.

11. *grubig* (lacunosus), der ausserhalb Vertiefungen hat, z. B. *Helvella Mitra*.

12. *schuppig* (squamosus), der mit fest anliegenden Schuppen bedeckt ist.

13. *sparrig* (squarrosus), der mit Schuppen bedeckt ist, welche an ihrer Spitze zurückgebogen sind.

14. *gestieft* (peronatus), der von unten bis zur Mitte dicht mit einer wollenartigen Masse, die mit einemale aufhört, überzogen ist.

15. *bauchig* (ventricosus), der in der Mitte dicker, als an beiden Enden ist.

16. *zwiebelartig* (bulbosus), der dicht über der Wurzel dick ist.

17. *scheitelstielig* (centralis), der in der Mitte des Huts festsitzt.

18. *außerscheitelstielig* (excentralis), der ausser dem Mittelpunkt des Huts festsitzt.

19. *seitenständiger* (lateralis), der an der Seite des Huts seine Befestigung hat.

20. *walzenförmig* (cylindricus), der ziemlich stark und oben so dick als unten ist.

21. *pfriemförmig* (subulatus), der nach oben hin allmählig verdünnt ist.

22. *borstenartig* (setaceus), der sehr dünne und überall gleich dick ist.

22. Die *Spindel* (Rachis), ist bei den Gewächsen eine fadenförmige Verlängerung, die in der Mitte einer Aehre (§. 33.) eines Kätzchens (§. 42.) durchgeht und als der Befestigungspunkt des Ganzen angesehen werden kann. Auch ist der in der Mitte der Blätter befindliche Hauptbündel von Fasern, den man passender *Mittelrippe* (Costa media) nennt, sonst wohl mit diesem Namen belegt worden. Bei den

Farnkräntern wird die Mittelrippe des Wedels (§. 46.) öfter auch so genannt, besonders wenn dieser einfach ist, so bald aber der Wedel gefiedert erscheint, so wird der Hauptstiel, woran die Blättchen sitzen, beständig mit diesem Namen belegt. Bei doppelgefiederten Wedeln heisst der erste Hauptstiel zwischen dem Blättchen (*rachis universalis seu primaria*), der zweite (*rachis partialis seu secundaria*). Zuweilen ist die Spindel an der Spitze des Wedels sehr verlängert, ganz nackt und treibt an dem äussersten Ende Wurzel, dann heisst sie eine *wurzelnde* (*rachis radicans*).

(Die Spindel ist ein Stiel ohne die Seitentheile gedacht, welche er trägt. L.)

23. Das *Gestell* (*Podetium*), ist eine im frischen Zustande zähe, im trocknen zerbrechliche Art des Stiels, die auf dem Laube der Lichenen entspringt und die fruchttragende Theile trägt.

(Man kann so die Stiele der Fruchthälter nicht allein an den Lichenen, sondern auch an den Algen und Pilzen nennen. L.)

Arten davon sind:

1. *einfach* (*simplex*), das ungetheilt ist.
2. *hornförmig* (*cornutum*), das nach oben verdünnt und zugespitzt ist.
3. *walzenförmig* (*cylindricum*), das der walzenförmigen Gestalt am nächsten kommt.
4. *pfriemförmig* (*subulatum*), das schlank und von der Basis an allmählig verdünnt ist.
5. *stumpf* (*obtusum*), das an der Spitze sich abrundet.
6. *bauchig* (*ventricosum*), das in der Mitte erweitert ist.
7. *becherförmig* (*scyphiforme*), das einfach und

kurz ist, nach oben zu sich aber in Gestalt eines Bechers erweitert.

8. *schnallenförmig* (fibulaeforme), das dünne rund an der äussersten Spitze aber knollig erweitert ist.

9. *wirtelförmig* (verticillatum), das becherförmig ist und ohne sich in Aeste zu theilen aus der Mitte einen Becher über dem andern hat.

10. *sprossend* (proliferum), das becherförmig ist und am Rande des Bechers mehrere Becher trägt. Fig. 304.

11. *ästig* (ramosum), das in Aeste sich theilt.

12. *sehr ästig* (ramosissimum), dessen Aeste wieder ästig sind, z. B. *Baeomyces rangiferinus*.

13. *durchlöchert* (perforatum), das ästig oder sehr ästig ist, aber in den Winkeln der Aeste ein Loch hat, z. B. *Baeomyces rangiferinus*.

14. *bechertragend* (scyphiferum), das ästig ist, dessen Aeste sich in Becher endigen.

15. *aufrecht* (erectum), das eine senkrechte Stellung hat.

16. *liegend* (decumbens), das anfangs in die Höhe geht, nachher liegt.

17. *röhrenförmig* (fistulosum), das innerhalb hohl ist, z. B. alle Arten *Baeomyces*.

18. *markig* (farctum), das in der Mitte feste ist, z. B. alle Arten *Stereocaulon*.

24. Der *Schössling* (Sarmentum), ist ein fadenförmiger, aus der Wurzel entspringender Stiel, der an der Spitze austreibt, Wurzeln schlägt und eine neue Pflanze derselben Art hervorbringt, z. B. *Saxifraga sarmentosa*. *Fragaria*.

Die *Sprosse* (Stolo), ist ein blattrreicher kriechender aus der Wurzel entspringender Stiel, der auf sei-

ner Unterfläche mit Würzelchen bedeckt ist, an der Spitze aber eine Menge Blätter treibt, woraus eine neue Pflanze entsteht, z. B. *Ajuga reptans*. *Hieracium pilosella*.

(Nach des Verf. eigener Bestimmung §. 18. und 45. sind Wurzelranken (sarmenta) niederliegende Stämme, welche in gewissen Entfernungen Wurzeln und Blätter treiben; zwischen den Blättern gehen neue aufrechte Stämme hervor. Ausläufer, Wurzelläufer (flagella) sind niederliegende, wurzelnde mit Blättern besetzte Stämme. Wurzelsprossen (stolones) sind wahre Stämme, welche unter der Erde entspringen, durch den Boden nach der Oberfläche zu wachsen, und keine Blätter haben. Oft wachsen sie ziemlich weit unter der Erde fort, unterirdische Stämme (caul. subterranei). Die Beispiele von sarmentum sind richtig, die von stolo gehören zu flagellum; Beispiele von stolo geben *Triticum repens* und *Carex arenaria*. Stolones unter der Erde bilden das Rhizom. S. §. 11a. L.)

25. Der Blattstiel (Petiolus), ist diejenige Art des Stiels, welche an der Basis des Blatts steht. Die Arten heissen:

1. *rund* (teres), der im Durchschnitt sich fast kreisförmig zeigt.
2. *halbround* (semiteres), der auf der einen Seite flach und auf der entgegengesetzten rund ist.
3. *zusammengedrückt* (compressus), der auf beiden Seiten flach ist, z. B. *Populus tremula*.
4. *rinnenförmig* (canaliculatus), der auf der obern Seite eine tiefe Furche hat, z. B. *Tussilago Petasites*.
5. *geflügelt* (alatus), der auf beiden Seiten mit Blattsubstanz umgeben ist, z. B. *Citrus Aurantium*.
6. *aufgeblasen* (inflatus), der in der Mitte dicker als an beiden Enden ist, z. B. *Trapa natans*.

7. *drüsig* (*glandulosus*), auf dem Drüsen sitzen, z. B. *Prunus Padus*, *Salix pentandra*.

8. *drüsenlos* (*eglandulosus*), der keine Drüsen hat.

9. *allgemeine* (*communis*), auf dem mehrere kleine Blätter stehn, wie bei den zusammengesetzten Blättern. (§. 44.)

10. *besondere* (*partialis*, s. *proprius*), der Blattstiel, welcher die Blättchen an einem zusammengesetzten Blatte auf dem allgemeinen Blattstiel trägt.

(Die Betrachtung des Blattstiels gehört eigentlich zur Betrachtung der Blätter, denn der Blattstiel ist völlig einerlei mit den Blattnerven in der Mitte des Blattes und nur eine Verlängerung desselben. L.)

26. Der *Blumenstiel* (*Pedunculus*), ist derjenige Stiel, welcher sich dicht unter der Blume befindet, diese mag auf einem Hauptstengel oder Schaft stehn, wie z. B. Fig. 23. 27. 38. 44.

(Der Blütenstiel (*pedunculus*) trägt ein oder mehrere Blüten, aber keine vollkommene Blätter, sondern nur Bracteen. L.)

Die Arten sind:

1. *einblumig* (*uniflorus*), der eine Blume trägt. Fig. 23. 27.

2. *zwei-dreiblumig* u. s. w. (*bi-triflorus* etc.)

3. *allgemeiner* (*communis*), wenn mehrere Blumenstiele sich in einen vereinigen.

4. *besonderer* (*partialis*), heisst jeder einzelne auf einem allgemeiner stehende Blumenstiel. Man nennt diese Art auch *Blumenstielchen* (*Pediculus* s. *Pedicellus*).

5. *schaftförmig* (*scapiformis*), wenn ein aufrechter, blattloser, mehrblumiger Blumenstiel an der Ba-

sis des Stiels der Pflanze, oder auf einem kriechenden Stiel steht. *Fig. 288.*

(Also ein wahrer Blütenstiel, der aber, weil er an der kriechenden Pflanze aufrecht steht, das Aussehen eines Schafts hat. L.)

6. *wurzelständig* (*radicalis*), wenn ein einzelner Blumenstiel aus der Wurzel kommt, z. B. *Viola odorata*. *Fig. 20.*

(S. oben §. 20.)

7. *auf dem Blattstiel sitzend* (*petiolaris*), wenn er auf dem Blattstiel befestigt ist.

8. *winkelständig* (*axillaris*), wenn er zwischen den Blättern und dem Stamm befestigt ist.

9. *seitenständig* (*lateralis*), wenn der Blumenstiel auf den Zweigen sich findet, wo keine Blätter sind, also an den vorjährigen Trieben, z. B. *Erythroxylon*. *Fig. 308.*

Es sind daher gleichfalls *Flores laterales* und *axillares*, die eben dieses bedeuten, nicht zu verwechseln.

10. *achselständig* (*alaris*), der in den Winkeln der Aeste steht, z. B. *Linum Radiola*, *Hopsea dichotoma*. (Besser *centralis*. L.)

11. *gegenüberstehend* (*oppositiflorus*), wenn die einzelnen Blumenstiele gerade gegenüber stehn.

12. *dem Blatte gegenüber* (*oppositifolius*), wenn er auf der andern Seite gerade dem Blatte über steht. *Fig. 27.*

13. *seitwärts sitzend* (*laterifolius*), wenn er am Stengel zur Seite des Blatts sitzt.

14. *unter dem Blatte sitzend* (*extrafoliaceus*), wenn er am Stengel unter dem Blatte festsitzt.

(Dieses ist genau genommen, nie der Fall, sondern das Blatt, welches in der Regel unter dem Blüten-

stiel sitzt, erscheint verschoben und seitwärts gestellt. *Solanum nigrum* und viele *Solanaceae*. L.)

15. *zwischen den Blättern sitzend* (*intrafoliaceus*), wenn er in der Mitte zwischen den Blättern am Stengel sitzt.

(Gehört zum vorigen Falle. L.)

16. *auf den Blättern sitzend* (*foliaris*), der auf der Fläche des Blatts befestigt ist, z. B. *Ruscus Hypophyllum* und *Hypoglossum*.

17. *auf dem Blattrande sitzend* (*marginalis*), der am Rande der Blätter steht, z. B. *Phyllanthus Epiphyllanthus* u. s. w.

(In diesem Falle ist das Blatt eigentlich ein veränderter Blütenstiel. L.)

Nach der Figur und Oberfläche wird er wie der Stengel beschrieben. Die regelmässige Vertheilung des Blumenstiels macht den Blütenstand aus. (s. 29.)

Bei den Cryptogamen sieht man nur in der Ordnung Hydropterides, so wie bei der Gattung *Staurophora* und *Marchantia* einen Blumenstiel.

27. Die *Borste* (*Seta*), ist diejenige Art des Stiels, welche die Früchte der Laubmoose und Jungermannien trägt. Sie unterscheidet sich vom Blumenstiel, dass sie beständig einfach ist und zwischen der Frucht und dem Kelch steht, daher ist der Stiel, welcher die Früchte der Gattung *Marchantia* trägt, ein wahrer Blumenstiel.

(Der Name *seta* ist unpassend, da er auch die Borsten der Bedeckung bedeutet. Besser *carpophorum*. L.)

Die Arten der Borsten sind:

1. *einzel*n (*solitaria*), wenn nur eine Borste vorhanden ist. Fig. 138. 139.

2. *gehäuft* (*aggregata*), wenn mehrere dicht beisammen stehen.

3. *gipfelständig* (*terminalis*), wenn sie an der äussersten Spitze des Moosstengels steht. *Fig. 138. 139.*

4. *winkelständig* (*axillaris*), wenn sie an der Basis der Blätter am Stengel entspringt.

5. *scharf* (*exasperata*), wenn ihre Oberfläche mit kleinen erhabenen Punkten besetzt ist.

6. *glatt* (*laevis*), die dergleichen Punkte nicht hat.

7. *bauchig* (*ventricosa*), die an irgend einer Stelle etwas erweitert ist.

28. Die *Saite* (*Hypha*), ist ein mehr oder weniger fadenförmiger, fleischiger, wässriger oder fasriger Stiel, der verschiedentlich gebogen und geformt ist, er zeigt sich nur bei den Schimmelarten, z. B. *Rhizomorpha*, *Monilia*, *Dematium*, *Erineum* u. s. w.

(Der Ausdruck *Hypha* ist nicht in Gebrauch gekommen; was der Verf. so nennt, habe ich *thallus* genannt und die einzelnen Fasern desselben, *Flocken* (*flocci*). Sind diese etwas stärker und dicker, so nennt sie Nees von Esenbeck *Fibrae*. Was die Fruchthälter oder *Sporidien* trägt, und nicht *thallus* ist, heisst *Träger* (*stroma*) und wenn unter diesem noch ein Unterträger befindlich ist, wird derselbe *hypostroma* genannt. In den Fällen, wo der Träger erhaben und länglich ist, welches dem Worte *stroma* widerspricht, ist das Wort *sporidochium* bequem: im Deutschen kann Träger bleiben. L.)

29. Der *Blütenstand* (*Inflorescentia*), ist die Art wie die Blumenstiele zertheilt, angehäuft oder gestellt sind. Er ist bei vielen Gewächsen ein charakteristisches Kennzeichen derselben, und man unterscheidet davon folgende Arten: den *Quirl* (*Verticillus*), den *Kopf* (*Capitulum*), das *Grasährchen* (*Spicula*), die *Ahre* (*Spica*), die *Traube* (*Racemus*), den *Büschel* (*Fasciculus*), die *Dolde* (*Umbella*),

die *Afterdolde* (Cyma), die *Doldentraube* (Corymbus), die *Rispe* (Panicula), den *Strauss* (Thyrus), den *Kolben* (Spadix), das *Kätzchen* (Amenium), und endlich das *Häufchen* (Sorus).

(29a. Der Verf. hat die Blütenstände ohne Ordnung, wie sie ihm vorgekommen sind, aufgeführt. Man kann sie auf folgende Weise ordnen, wobei zuvor zu merken ist, dass Blüten zu einer Verzweigung gehören, welche sich an einem und demselben Aste befinden, doch so dass ihre Stiele nicht wiederum verästelt sind. Die Blütenstände sind also: I. *traubig* (botryodes), wenn mehrere Blüten zu einer und derselben Verzweigung gehören. Arten sind: 1) Der *Quirl* oder *Wirtel* (verticillus), wenn die Blüten an einem Blütenstiele oder Aste in Kreisen sitzen. 2) Die *Aehre* (spica), wenn sie an einem Blütenstiele ungestielt oder kurzgestielt, nicht in Kreisen, sitzen. 3) Die *Traube* (racemus), wenn sie an einem Blütenstiele auf ziemlich gleich langen kürzern Blütenstielchen sitzen. 4) Die *Doldentraube* (corymbus), wenn die untern Blütenstielchen der Traube verlängert sind, so dass die Blüten eine gerade oder krumme Fläche bilden. 5) Die *echte Dolde* (umbella), wenn die Blütenstiele am Ende eines Astes oder andern Blütenstiels dicht gehäuft sitzen und von aussen nach innen blühen. S. §. 43. Anm. 6) Der *Blütenkopf* (capitulum), ist eine Dolde, wo die Blüten ungestielt sind oder sehr kurze Stielchen haben, und von unten nach oben blühen. Die Blütenstände sind ferner; II. *straußig* (thyrsodes), wenn jede Blüte zu einer besondern Verzweigung gehört. Arten sind: 1) Die *Rispe* (panicula); lange Blütenstiele von unregelmässiger Länge. 2) Der *Strauss* (thyrsus); kurze Blütenstiele von unregelmässiger Länge. 3) Der *Büschel* (fasciculus); sehr kurze, oft nicht vorhandene Blütenstiele. 4) Die *Afterdolde* (cyma); regelmässig abnehmende Blütenstiele, so dass die Blüten in einer geraden oder krummen Fläche sich befinden. 5) Die *unechte Dolde* (umbella spuria), wenn die Blütenstiele wie bei der echten Dolde sich verhal-

ten, aber die Blüten von innen nach aussen blühen, 6) Der *unechte Kopf* (*capitulum spurium*), verhält sich wie der echte, nur blühen die Blumen von oben nach unten, oder fangen in der Mitte an zu blühen. Wir haben auch gemischte Blütenstände aus I. und II., nämlich: *splacae*, *racemi*, *corymbi* etc. *paniculati*, wenn die Aehren, Trauben u. s. w. auf rispenartigen, vertheilten Stielen sich befinden, oder aus II. und I. welche wir mit dem allgemeinen Worte *Blüenschweif* (*anthurus*), nennen wollen, wenn Sträusse oder Büschel ähren- oder traubenförmig gestellt sind. Von dem letzten gehen die *Labiatae* Beispiele.

Es giebt aber Blütenstände, welche mehr oder weniger das Ansehen einer einzelnen Blüte haben. Sie sind vor der Entwicklung in eine Hülle eingeschlossen, zuweilen auch pachter, so dass sie sich sogar mit derselben zu gewissen Zeiten öffnen oder schliessen; alle Blüten blühen zugleich oder fallen zugleich ab, oder alle Samen reifen zugleich und fallen zugleich ab. Hieher gehören der Kolben (*spadix*), das Aehrchen der Gräser (*spicula*), der Blütenkopf (*calathidium*), der Syngenesisten, das Kätzchen (*amentum*), der Zapfen (*strobilus*), die Feigenfrucht (*hypanthodium*), der Fruchthaufe (*sorus*). Ich benenne alle diese Formen mit einem gemeinschaftlichen Namen *Anthodium*. L.)

30. Der *Quirl* (*Verticillus*), besteht aus mehreren rund um den Stengel stehenden Blumen, welche an demselben abgemessene Zwischenräume unbedeckt lassen. (S. §. 29a. L.) Es giebt folgende Arten:

1. *sitzend* (*sessilis*), wenn alle Blumen ohne Blumenstiel festsitzen, z. B. *Mentha arvensis*, *Lycopus europaeus*. Fig. 300.

2. *gestielt* (*pedunculatus*), wenn die Blumen mit kurzen Stielen versehen sind.

3. *kopfförmig* (*capitatus*), wenn die Blumen so dicht gedrängt stehn, dass sie die Form einer Halbkugel haben, z. B. *Phlomis tuberosa*.

I. Terminologie.

4. *halb* (*dimidiatus*), wenn die Blum
Hälfte den Stengel umgeben, z. B. *Melissa* c.
 5. *gedrängt* (*confertus*), wenn ein Quirl dicht
über dem andern steht.
 6. *abstehend* (*distant*), wenn die Zwi me
sehr gross sind und mithin die Quirle in g an auf-
fernungen den Stengel umgeben.
 7. *beblättert* (*foliosus*), wenn an der Basis der
Quirle Blätter stehn.
 8. *blattlos* (*aphyllus*), wenn keine Blätter am
Quirl stehn.
 9. *nebenblättrig* (*bracteatus*), wenn Nebenblätter
(s. 51.) an den Quirlen finden.
 10. *unnebenblättrig* (*bracteatus*), wenn keine
Nebenblätter an den Quirlen sind.
 11. *nackt* (*nudus*), — der Blätter, noch Ne-
benblätter am Quirl sind.
 12. *sechs- acht- zehn* (*sex- octo-*
to- decem- s. multi- r Zahl d
Blumen die den Quirl umschl.
- (Die Kunstausdrücke Nr. 1—4, gehören zum Blüten-
schweif (*anthurus*). L.)

31. Der *Kopf* (*Capitulum*), besteht aus einer
Menge dicht auf einem Fleck gedrängter Blumen; so
dass das Ganze eine mehr oder weniger kugelartige
Form hat. Die Blumen sind entweder sitzend oder
von kleinen Stielen unterstützt. Arten des Kopfs sind:

1. *kugelförmig* (*globosum* s. *sphaericum*), wenn
die Gestalt des Kopfs vollkommen kugelförmig ist, z.
B. *Cephalanthus occidentalis*.
2. *rundlich* (*subglobosum*), wenn der Kopf der
kugelförmigen Form am nächsten kommt, aber entwe-

der mehr in die Länge oder in die Breite sich ausdehnt, z. B. *Gomphrena globosa*. Fig. 199.

3. *kegelförmig* (conicum), wenn der Kopf etwas in die Länge gezogen ist, z. B. *Trifolium montanum*.

4. *halbrund* (dimidiatum s. hemisphaericum), wenn der Kopf auf der unteren Seite flach ist.

5. *heblättert* (foliosum), wenn um den Kopf Blätter stehn. Fig. 199.

6. *schoffig* (comosum), der an der Spitze Blätter hat, z. B. *Bromelia Ananas*.

7. *nackt* (nudum), wenn er von keinen Blättern umgeben ist.

8. *gipfelständig* (terminale), der an der Spitze des Stengels steht.

9. *winkelständig* (axillare), der in den Winkeln der Blätter, das heisst am Stengel da, wo die Basis des Blatts oder Blattstiels ist, steht.

10. *achselständig* (alare), der in den Winkeln der Aeste sitzt,

(Besser centrale. L.)

Der *Knaul* (Glomerulus), ist eigentlich ein aus kleinen Blumen bestehender kleiner Kopf. Man unterscheidet zwei Arten, nämlich: den *winkelständigen Knaul* (Glomerulus axillaris), der in den Winkeln der Blätter steht, z. B. *Amaranthus polygonoides*, und den *seitenständigen Knaul* (Glomerulus lateralis), welcher an den Zweigen da sitzt, wo ehemals Blätter gestanden haben, z. B. *Boehmeria ramiflora*. Wenn eine Aehre (§. 33.), Traube (§. 34.) oder Rispe (§. 39.), aus Knaulen zusammengesetzt ist; so sagt man: spica glomerata, racemus glomeratus oder panicula glomerata.

(Der hier gegebene Unterschied von Knaul und Kopf beruht auf Nebendingen; der Sprachgebrauch ist schwankend. Wäre es nicht am bequemsten die kleinen Büschel, woraus ein grösserer besteht, glomeruli zu nennen? L.)

I. Terminologie.

32. Das Grasährchen (*Spicula* s. L. wird entweder die vom Balg (§. 88.) eingeblumte Blume der Gräser genannt, oder man versteht auch die kleinen, auf einem fadenförmigen Stiel gedrängt stehenden Blumen der grasgewächse, z. B. *Cyperus*, *Scirpus sylvaticus*. Sie wird nach der Zahl der Blumen und Gestalt bestimmt. Man unterscheidet folgende:

1. *einblumig* (*uniflora*), das eine Blume enthält, z. B. *Agrostis*.

2. *zweiblumig* (*biflora*), das zwei Blumen hat, z. B. *Aira*.

3. *dreiblumig* (*triflora*), s. w.

4. *vielblumig* (*multiflora*), das mehrere Blumen hat. Fig. 34. 93. 101. 291.

5. *rund* (*teres*), wenn die Blumen in dem Grasährchen so getheilt sind, dass deren wagerechter Durchschnitt (Querendurchschnitt L.) rund ausfällt, z. B. *Festuca fluitans* u. s. w. Fig. 93.

6. *zweizeilig* (*disticha*), wenn die Blumen des Grasährchens in zwei entgegengesetzten Reihen in einer Fläche gestellt sind, z. B. *Cyperus*. Fig. 291.

7. *eiförmig* (*ovata*), wenn der Umfang des Grasährchens von der Art ist, dass er der Figur eines Eies ähnlich ist, z. B. *Bromus secalinus*.

8. *länglich* (*oblonga*), wenn deren Umfang eine mehr oder weniger elliptische Figur beschreibt. Fig. 34. (Dieses sowohl als das vorige ist elliptisch. In oblonga ist der Querdurchmesser länger. L.)

9. *linienförmig* (*linearis*), wenn dasselbe sehr schmal und lang, aber dabei überall gleich breit ist. Fig. 291.

Mehrere Grasährchen können eine Aehre, Traube,

Rispe u. s. w. bilden. Oefter sind aber die Blumen der grasähnlichen Gewächse in eine große Aehre, welche alsdann *Spica* heisst, zusammengestellt, z. B. *Scirpus*, *Eriophorum*, *Carex*, *Typ* u. s. w.

(Das Aehrchen der Gräser stellt gleichsam eine einzige Blüte dar, und ist auch von Linné *flos* genannt worden. S. §. 29a. Es wird fast immer von den Bälgen (*gluma*, *calyx* Linn.) umschlossen. Die *spicula* der Cyperoideae ist aber eine wahre Aehre. Die Kunstausdrücke lassen sich bei beiden anwenden. L.)

33. Die *Aehre* (*Spica*), ist derjenige Blütenstand, wo auf einem fadenförmigen, einfachen Hauptblumenstiel, viele Blumen ohne Stiel sitzen. (S. 29a. L.) Wenn aber die Blumen einen Stiel haben, so muss er sehr viel kleiner als die Blume selbst sein. Die Arten heissen:

1. *geknault* (*glomerata*), wenn die Aehre aus Knäulen (§. 31.) zusammengesetzt ist.

2. *unterbrochen* (*interrupta*), wenn sich zwischen den Blumen Räume zeigen, und der Hauptblumenstiel dadurch sichtbar wird.

3. *quirlförmig* (*verticillata*), wenn die Zwischenräume regelmässig ausfallen, so dass die Blumen Quirle bilden.

4. *dachziegelförmig* (*imbricata*), wenn die Blumen dicht beisammen stehen und eine die andere decken.

5. *zweizeilig* (*disticha*), wenn die Blumen an Hauptblumenstiel in zwei Reihen, welche in einer Fläche fallen, stehen.

6. *einseitig* (*secunda*), wenn die Blumen der Aehre auf einer Seite des Hauptblumenstiels befestigt sind, und die entgegengesetzte von ihnen unbedeckt bleibt.

I. Terminologie.

(Auch, wenn die Blumen sich alle nach wenden. L.)

7. *walzenförmig* (*cylandrica*), wenn oben und unten gleich dick mit Blumen be-

8. *linienförmig* (*linearis*), die sehr gleich dick ist.

9. *eiförmig* (*ovata*), die unten dick und nach oben zu aber allmählig dünner wird.

10. *bauchig* (*ventricosa*), die in der Mitte an beiden Enden dünner ist.

11. *beblättert* (*foliosus*), die zwischen den Blumen Blätter hat.

12. *schopfig* (*comosus*), die an der Spitze Blätter hat, z. B. *Lavandula* S.

13. *haarig* (*ciliata*), die zwischen den Blumen Haare hat.

14. *einfach* (*simplex*), die ohne alle Aeste ist. Fig. 277.

15. *ästig* oder *zusammengesetzt* (*ramosa* s. *composita*), wenn mehrere Ähren auf einem ästig getheilten Hauptstiel beisammen stehn.

16. *gepaart* (*conjugata*), wenn zwei Ähren an der Basis auf der Spitze eines Hauptstiels verbunden sind.

17. *büschelförmig* (*fasciculata*), wenn mehrere Ähren mit ihrer Basis auf der Spitze des Hauptstiels stehn.

18. *gipfelständig* (*terminalis*), die an der Spitze des Stengels oder der Aeste der Pflanze steht.

19. *winkelständig* (*axillaris*), die in dem Winkel der Blätter steht.

20. *seitenständig* (*lateralis*), die an dem vorjährigen Holze, das heisst an den Zweigen steht, wo keine Blätter mehr sind, z. B. *Ceratonia Siliqua*.

34. Die *Traube* (*Racemus*), nennt man den Blütenstand, wo auf einem einfachen, langen, allgemeinen Blumenstiel, der Länge nach, gestielte Blumen gestellt sind. Die Stiele der Blumen müssen aber ziemlich von gleicher Länge sein. Die Arten sind:

1. *einreihig* (*unilateralis*), wenn die eine Seite des Hauptblumenstiels nur mit Blumen besetzt ist.

2. *einseitig* (*secundus*), wenn die Blumen rund um den Hauptblumenstiel stehn, aber doch alle Blumen selbst nach einer Seite hingerichtet sind.

3. *schlaff* (*laxus*), wenn die Traube sehr biegsam ist.

4. *steif* (*strictus*), wenn die Traube nicht leicht zu beugen ist.

5. *einfach* (*simplex*), wenn die Traube einzeln ist. Fig. 278.

6. *zusammengesetzt* (*compositus*), wenn mehrere Trauben auf einem gemeinschaftlichen Blumenstiel stehn.

7. *gepaart* (*conjungatus*), wenn zwei Trauben an der Basis auf der Spitze eines Hauptstiels stehn.

8. *nackt* (*nudus*), ohne Blätter und Nebenblätter.

9. *beblättert* (*foliatus*), wenn zwischen den Blumen Blätter sind.

10. *nebenblüttrig* (*bracteatus*), wenn bei den Blumen Nebenblätter stehn.

11. *unnebenblüttrig* (*ebracteatus*), die keine Nebenblätter hat.

12. *aufrecht* (*erectus*), die gerade in die Höhe steht.

13. *geradestehend* (*rectus*), die gerade aus steht.

14. *übergebogen* (*cernuus*), wenn die Spitze der Traube zur Erde gebogen ist.

15. *überhängend* (nutans), wenn die Hälfte der Traube zur Erde gebogen ist.

16. *hängend* (pendulus), wenn die Traube senkrecht zur Erde herabhängt.

35. Der *Büschel* (Fasciculus), besteht aus sehr kurzen, gewöhnlich einfachen Blumenstielen, die an der Spitze des Stengels nicht aus einem Punkt entspringen, aber in grosser Menge beisammen stehen und gleiche Länge haben, z. B. *Dianthus carthusianorum*. (S. §. 29a. L.)

36. Die *Dolde* (Umbella), besteht aus einer Menge gleich langer Blumenstiele, die aus einem Punkt entspringen. (S. §. 29a. L.)

Man nennt bei der Dolde die Blumenstiele *Strahlen* (Radii). Es giebt folgende Arten:

1. *einfach* (simplex), die aus einzelnen Strahlen besteht, von denen jeder nur eine Blume trägt.

2. *zusammengesetzt* (composita), wenn jeder Strahl der Dolde an seiner Spitze eine einfache Dolde hat. Fig. 36. Die Strahlen, welche die einfachen Dolden tragen, nennt man zusammen *die allgemeine Dolde* (Umbella universalis). Die einfache Dolde, welche sich an den Strahlen der zusammengesetzten findet, heisst *die besondere Dolde* oder *das Döldchen* (Umbella partialis s. Umbellula).

3. *sitzend* (sessilis), wenn die Dolde ohne einen besondern Stiel auf dem Stengel der Pflanze sitzt.

4. *gestielt* (pedunculata), wenn sie durch einen Blumenstiel an dem Stengel der Pflanze befestigt ist.

5. *dicht* (conferta), wenn die Hauptstrahlen der Dolde sehr dicht beisammen stehen, und die besondern Dolden ebenfalls sehr viele Strahlen haben.

6. *abstehend* (rara), wenn die Strahlen sehr einander entfernt sind.

7. *arm* (depauperata), wenn die Dolde nur nige Strahlen hat.

8. *erhaben* (convexa), wenn die mittleren Stielen höher sind und sehr dicht beisammen stehen, von den vielen Blumen die Oberfläche der Dolde halbkuglichte Gestalt hat.

9. *flach* (plana), wenn die Strahlen gleich sind und dicht stehn, dass die Blumen auf der Oberfläche in einer Ebene liegen.

37. Die *Afterdolde* (Cyma), ist derjenige Theilstand, wo das Ganze flüchtig betrachtet, das sehn einer zusammengesetzten Dolde hat, nur nicht die Hauptblumenstiele, und diejenigen, wo die einzelnen Blumen tragen, nicht aus einem Punkt. Die Hauptblumenstiele entspringen dicht über einander und sind in unregelmässige Aeste zertheilt, z. B. *Sambucus nigra*, *Viburnum Opulus*. Fig. 43.

(S. §. 29a. L.)

38. Die *Doldentraube* (Corymbus), ist eigentlich eine aufrecht stehende Traube, deren unteren Blumenstiele, entweder ästig oder einfach, aber alle so stark verlängert sind, dass sie an der äusseren Spitze fast gleiche Höhe haben. Fig. 25. 266.

(S. §. 29a. L.)

39. Die *Rispe* (Panicula), besteht aus einer Menge einfacher Blumenstiele, die auf mehr oder weniger zertheilten Aesten stehn, so dass das Ganze längliche Figur beschreibt. Fig. 34.

(S. §. 29a. L.)

Die Arten heissen:

1. *einfach* (*simplex*), die nur einfache Seitenäste hat.

2. *astig* (*ramosa*), wenn die Aeste wieder in Aeste zertheilt sind.

3. *vielästig* (*ramosissima*), wenn die Aeste der Seitenäste wieder ästig sind.

4. *zertheilt* (*deliquescens*), wenn der Hauptstiel zugleich sich in Aeste verliert, dass man ihn nicht bis zur Spitze verfolgen kann.

(Der Gegensatz wäre vertheilt (*integra*). L.)

5. *abstehend* (*patentissima*), wenn die Aeste weit von einander abstehn und nach allen Seiten ausgedehnt sind.

6. *gedrängt* (*coarctata*), wenn die Aeste dicht an einander stehn und mit den Spitzen aufwärts gehn.

7. *einseitig* (*secunda*), wenn alle Aeste nach einer Seite hingerichtet sind.

40. Der *Strauss* (*Thyrus*), ist eine Rispe, deren Aeste kurz sind und gedrängt beisammen stehn, so dass das Ganze eine fast eiförmige Gestalt hat, z. B. *Ligustrum vulgare*, *Tussilago Petasites*.

41. Die *Kolben* (*Spadix*), ist eine jede Art des Blütenstandes, welche bei den Palmen und bei den mit der Gattung *Arum* verwandten Gewächsen gefunden wird, und von einer Scheide (§. 53.) umgeben ist, er mag nun die Form einer Aehre, Traube oder Rispe haben. Fig. 41. 42. Man theilt ihn daher auf folgende Art ein:

1. *ährenförmig* (*spicatus*), der das Ansehn einer Aehre hat.

2. *traubenartig* (racemosus), der eine Traube bildet.

3. *rispenförmig* (paniculatus), der die Gestalt der Rispe hat.

(Der Kolben (spadix), welcher hier richtig characterisirt ist, gehört zum Anthodium. S. §. 29 a. L.)

42. Das *Kätzchen* (Amentum s. Julus), ist ein langer, fadenförmiger, allezeit einfacher, mit Schuppen (§. 84.) dicht bedeckter Stiel.

(Am Quercus sind die Schuppen klein und bedecken den Stiel nicht. Der wahre Begriff von Kätzchen liegt darin, dass der Stiel, auf welchem die Blüten stehen, mit diesen zugleich abfällt; es gehört daher zum Anthodium. S. §. 29 a. L.)

Unter jeder Schuppe finden sich die Blumen oder deren wesentliche Theile, z. B. Salix, Corylus, Carpinus u. s. w. Fig. 37. Die Arten sind:

1. *gleichdick* (cylindricum), das oben so dick als unten ist.

2. *verdünnt* (attenuatum), das nach der Spitze zu allmählig dünner wird.

3. *dünne* (gracile), das lang aber sparsam mit Schuppen bedeckt ist, und nach Verhältniss seiner Länge sehr dünne ist, z. B. Quercus.

4. *eiförmig* (ovatum), das unten dick und rund, nach oben zu aber verdünnt ist, z. B. Salix cinerea.

5. *früh* (praeco-x), was vor dem Austreiben der Blätter erscheint.

6. *gleichzeitig* (coetaneum), was mit den Blättern zugleich hervorwächst.

7. *spät* (serotinum), was erst nachdem die Blätter sich schon entfaltet haben zum Vorschein kommt.

43. Das *Häufchen* (Sorus), findet sich nur bei den Farrnkräutern, die auf dem Wedel ihre Früchte

tragen. Die kleinen Haufen von Samenkapseln, die man auf deren Wedel findet, erhalten diese Benennung.

(Ist ein *anthodium*, s. f. 29a., da das Häufchen in der Regel vor der Entwicklung von einem besondern Häutchen (*indusium*) überzogen ist. L.)

Die Arten sind:

1. *rundlich* (*subrotundus*), wenn die Samenkapseln einen fast kreisförmigen Haufen ausmachen, z. B. *Polypodium vulgare*. Fig. 15.

2. *mondförmig* (*lunatus*), wenn der Haufen von Samenkapseln einen halben Kreis beschreibt, z. B. *Lonchitis*.

3. *linienförmig* (*linearis*), wenn er eine gerade Linie bildet, z. B. *Asplenium*, *Pteris*, *Blechnum* u. s. w. Fig. 39. 293.

4. *fortlaufend* (*continuus*), wenn ein linienförmiges Häufchen ununterbrochen fortgeht, z. B. *Pteris*, *Blechnum*, *Lindsaea*. Fig. 293.

5. *unterbrochen* (*interruptus*), wenn ein linienförmiges, gerade fortlaufendes Häufchen öfters getrennt ist, z. B. *Woodwardia*.

6. *der Länge nach gehend* (*longitudinalis*), wenn ein linienförmiges Häufchen von der Spitze des Wedels bis zur Basis geht, z. B. *Blechnum*.

7. *dem Rande nach gehend* (*marginalis*), wenn ein solches Häufchen sich längs dem Rande erstreckt, z. B. *Pteris*, *Lindsaea*. Fig. 293.

8. *der Quere nach gehend* (*transversus*), wenn solches vom Rande nach der Mitte zu sich erstreckt, z. B. *Asplenium*, *Meniscium*. Fig. 39.

9. *einzelu* (*solitarius*), wenn zwischen den Queradern des Wedels nur ein Häufchen sich findet. Dieses kann zuweilen so gestellt sein, dass von der

Spitze bis zur Basis des Wedels dadurch eine gerade fortlaufende Linie gebildet wird. *Fig. 15. 298.*

10. *reihenweise* (seriales), wenn zwischen den Queeradern des Wedels mit diesen parallel eine Reihe von Häufchen läuft.

11. *zweireihig* (biserials), wenn zwischen den Queeradern des Wedels mit diesen parallel zwei Reihen von Häufchen laufen.

12. *vieltreihig* (multiserials), wenn zwischen den Queeradern des Wedels mit diesen parallel mehrere Reihen von Häufchen sich befinden.

13. *zerstreut* (sparsi), wenn zwischen den Queeradern des Wedels ein, zwei oder drei Häufchen ohne bestimmte Ordnung stehn.

Bei der Gattung *Angiopteris* ist ein fortlaufendes Häufchen am Rande, was aus doppelten, in der Quere stehenden, kurzen Reihen von Kapseln besteht.

(Eine Rücksicht auf das Verblühen der Pflanze habe ich bereits in meinen Grundlehren der Anatomie und Physiologie der Pflanzen S. 74. angegeben, wodurch dasjenige erläutert wird, was oben S. 29a. von der Verzweigung gesagt wurde. Der Hauptstamm blüht früher als die Aeste, der Hauptast früher als die Nebenäste. Aber an den Aesten selbst ist die Regel, dass die untern Blüthen früher blühen als die obern. In diesem Falle kann man auch sagen, die Blüthen gehören alle zu einer Verzweigung, entspringen eigentlich aus einer Knospe. So gehören die Blüthen einer Rispe, Dolde oder Afterdolde zu einer oder mehreren Verzweigungen, welches ein Hauptmerkmal macht, wodurch natürliche Ordnungen geschieden werden. Uebrigens wachsen Hauptstamm und Hauptast in der Regel an der blühenden Pflanze mehr aus als Aeste und Nebenäste, dann ist ein Achselblüthenstand, inflorescentia axillaris vorhanden. Oder Hauptstamm und Hauptäste endigen sich in einzelne Blüthen, welche früher blühen und über denen die Seitenblüthen hervorragen: Mittel-

blüthenstand, infl. centralis, z. B. an *Stellaria graminea*. Oder Hauptstamm und Hauptast sind seitwärts gedrückt, weil der Nebenaast auswächst und darüber hervorragt: Seitenblüthenstand (infl. extraaxillaris), z. B. an *Chaerophyllum temulum* und andern Doldenpflanzen. L.)

44. Die *Blätter* (*Folia*), sind meistens häufige, seltener fleischige, krautartige, fast immer grün gefärbte Ausdehnungen und Verlängerungen des aufwärts steigenden Stocks, die sich entfalten und nach der Verschiedenheit ihres Baues bald früher, bald später vergehn. Sie werden auf folgende Art bestimmt und unterschieden, ob sie einfach oder zusammengesetzt sind, ferner was für einen Ort sie einnehmen, wie ihre Substanz und Stellung ist, wie sie angeheftet sind, und welche Richtung sie haben. Jedes einfache Blatt muss nach der Spitze, der Basis, dem Umfange, dem Rande, und den beiden Flächen betrachtet werden.

(Es ist äusserst schwer, die Blätter im Allgemeinen zu charakterisiren, da die Mannichfaltigkeit der Gestalt sehr gross ist. Die Stellung derselben unter den Aesten bezeichnet sie noch am besten. L.)

A. *Einfach*.

a. *in Rücksicht der Spitze*.

1. *spitzig* (*acutum*), wenn das Aeusserste eines Blattes sich in einer Ecke endigt. Fig. 38.

2. *lang zugespitzt* (*acuminatum*), wenn die Ecke lang vorgezogen ist. Fig. 200.

(Wird nur gebraucht, wenn die Spitze sich plötzlich verschmälert. Geschieht es nach und nach, so würde ich das Blatt *acutatum*, *gespitzt* nennen. L.)

3. *feingespitzt* (*cuspidatum*), wenn eine vorgezogene Spitze sich in eine kleine Borste endigt. Fig. 198.

4. *stumpf* (obtusum), wenn die Spitze des Blattes sich rund endigt. Fig. 25.

5. *stechend* (mucronatum), wenn an einer runden Spitze ein horstförmiger, krautartiger Stachel ist, z. B. *Amaranthus Blitum*.

6. *abgebissen* (praemorsum), wenn das Blatt an der Spitze durch eine bogige Linie abgestutzt ist, z. B. *Pavonia praemorsa*.

7. *abgestutzt* (truncatum), wenn die Spitze des Blatts in einer vollkommen geraden Linie abgeschnitten ist, z. B. *Liriodendron Tulipifera*.

8. *keilförmig* (cuneiforme), wenn ein abgestutztes Blatt nach der Basis auf beiden Seiten spitzig zuläuft.

9. *verworren* (daedaleum), wenn die Spitze einen grössern Umfang hat, dabei aber eingeschnitten und kräus ist. Fig. 39.

10. *ausgerandet* (emarginatum), wenn ein stumpfes Blatt an der Spitze eingekerbt ist. Fig. 31.

11. *eingedrückt* (retusum), wenn ein stumpfes Blatt an der Spitze etwas eingedrückt ist. Dies Blatt unterscheidet sich vom vorhergehenden durch den geringen Grad des Ausschnitts an der Spitze.

12. *gespalten* (fissum), wenn von der Spitze bis über die Hälfte des Blattes ein Einschnitt hineingeht. Wenn ein Blatt an der Spitze einmal gespalten ist, so nennt man es ein *zweispaltiges* (folium bifidum), ist es in drei von einander abstehende Einschnitte gespalten, ein *dreispaltiges* (trifidum). Fig. 23. Sind mehrere Einschnitte, so bestimmt man die Zahl, quadrifidum, quinquefidum etc. multifidum.

(Ueber Nr. 10–12. s. d. Anmerk. zu d). L.)

13. *fächerförmig* (flabelliforme), wenn ein an

der Spitze abgestutztes, keilförmiges Blatt ein oder mehrmalen gespalten ist.

(Besser flabellare, um von flabelliforme {. 46. n. I. zu unterscheiden. L.)

14. *dreizahnig* (tridentatum), wenn die Spitze abgestutzt ist und drei Zähne hat.

(So auch bidentatum u. s. w. L.)

b. in Rücksicht der Basis.

15. *herzförmig* (cordatum), wenn die Basis in zwei runde Lappen getheilt, der übrige Theil des Blattes aber eiförmig ist. Fig. 20. 27. 203.

16. *nierenförmig* (reniforme), wenn die Basis in zwei runde weit abstehende Lappen getheilt und das Blatt oben rund ist.

17. *mondförmig* (lunatum), wenn die beiden Lappen an der Basis in einer geraden, etwas ausgebogenen Linie stehen und spitzig zulaufen, das Blatt aber oben rund ist.

18. *ungleich* (inaequale), wenn die eine Seite des Blattes an der Basis mehr verlängert ist, Fig. 218.

19. *pfeilförmig* (sagittatum), wenn die Basis in zwei gerade ausstehende spitzige Lappen getheilt ist, und das Blatt nach oben zu spitzig wird. Fig. 44.

(Ueber Nr. 15—17. u. 19. s. die Anm. zu d). L.)

20. *spießförmig* (hastatum), wenn die beiden spitzigen Lappen der Basis nach aussen gebogen sind.

21. *ohrförmig* (auriculatum), wenn an der Basis zwei kleine, runde, nach aussen gebogene Lappen sich finden. Es ist fast die vorhergehende Art, nur dass die Lappen ungleich kleiner und rund sind. Fig. 292.

c. in Rücksicht des Umfanges.

22. *zirkekrund* (orbiculatum), wenn der Durchmesser des Blatts auf allen Seiten gleich lang ist.

23. *rundlich* (subrotundum), weicht von dem vorhergehenden bloss darin ab, dass entweder der Durchmesser von der Basis bis zur Spitze oder in der Queere länger ist.

24. *eiförmig* (ovatum), ein Blatt das länger als breit ist; die Basis aber rund und am breitesten, die Spitze am schmalsten ist.

(S. Nr. 25. L.)

25. *oval und elliptisch* (ovale s. ellipticum), ein Blatt dessen Länge grösser als die Breite ist, Basis und Spitze aber rund zulaufen.

(Dieses ist die Grundform. Sie entsteht wenn zwei elliptische Bogen einander schneiden und zwar für ovale so, dass die Länge grösser, aber noch nicht zweimal so gross ist, als die Breite. Daraus wird oblongum, wenn die Länge mehr als zweimal, doch nicht mehr als dreimal so gross wird als die Breite; lanceolatum, wenn die Länge mehr als dreimal so gross ist als die Breite, und lineare, wenn die Länge gar sehr zunimmt, die Breite hingegen sehr abnimmt. Ist das Blatt an der Basis am breitesten, so ändert sich ovale in ovatum, oblongum in ovate oblongum und lanceolatum in ovate lanceolatum oder auch ex ovato lanceolatum, wenn das Blatt einen Stiel hat, hingegen in lanceatum, lanzenförmig, wenn der Stiel fehlt. Ist das Blatt hingegen nach der Spitze zu breiter, so verwandelt sich ovale in obovatum, oblongum in cuneiforme, lanceolatum in spatulatum. So erhalten diese Kunstausrücke eine scharfe, aber doch naturgemässe Bestimmung. L.)

26. *länglich* (oblongum), wenn die Breite zur Länge des Blatts wie 1 zu 3 sich verhält, oder die Breite noch geringer ist, die Spitze und Basis aber verschiedentlich zulaufen, nemlich bald stumpf bald spitzig sind. (S. Nr. 25. L.)

27. *parabolisch* (parabolicum), so nennt man das Blatt was an seiner Basis rund ist, alsdann mit einem

male durch einen kleinen Bogen abnimmt und nach der Spitze zu immer schmaler wird, Fig. 245.

28. *spatelförmig* (*spathulatum*), wenn ein Blatt oben zirkelförmig ist, und mit einemale ganz schmal wird, z. B. *Cucubalus Quites*, Fig. 238,

(S. Nr. 25. L.)

29. *rautenförmig* (*rhombeum*), wenn die Seiten des Blatts in einen Winkel zulaufen, so dass das Blatt ein verschobenes Viereck vorstellt. Fig. 22.

30. *schief* (*subdimidiatum*), heisst dasjenige Blatt, dessen eine Spitze (Seite L.) breiter als die andere ist. Von diesen Blättern giebt es verschiedene Arten, als:

a) *herzförmig schief* (*subdimidiato-cordatum*), ein herzförmiges Blatt, das zugleich schief ist, z. B. *Begonia nitida*. Fig. 197.

b) *trapezenförmig* (*trapeziforme*), ein raute-förmiges Blatt, dessen eine Seite schmäler als die andere ist, u. s. w.

31. *geigenförmig* (*panduraeforme*), wenn ein längliches Blatt auf beiden Seiten bogenförmig ausgeschnitten ist. Fig. 24.

32. *schwerdtförmig* (*ensiforme*), ein längliches nach der Spitze zu allmählig abnehmendes Blatt, was stark zugespitzt ist, und dessen Rand mehr oder weniger bogenförmig ist, z. B. *Iris*.

33. *lanzettförmig* (*lanceolatum*), ein längliches Blatt, das von unten an bis oben allmählig spitz zulauft. (S. Nr. 25. L.)

34. *linienförmig* (*lineare*), wenn beide Seiten eines Blatts parallel laufen, so, dass es sowohl an der Spitze, als an der Basis, überall gleich breit ist. Fig. 29. (S. Nr. 25. L.)

35. *haarförmig* (capillare), wenn ein Blatt beinahe gar keine Breite hat, und so dünn, wie ein Faden oder Haar ist.

36. *pfriemförmig* (subulatum), ein linienförmiges Blatt, das stark zugespitzt ist (mit einer kegelförmigen Spitze. L.)

37. *Nadelblatt* (acerosum), ein linienförmiges oder pfriemförmiges Blatt, das sehr steif ist und über Winter gewöhnlich ausdauert, z. B. Pinus, Thuja u. s. w.

38. *dreieckig* (triangulare), wenn der Umfang ein Dreieck beschreibt, dessen Spitze die Spitze des Blatts ausmacht, z. B. Betula alba.

39. *vier- oder fünfeckig* (quadrangulare, quinquangulare), wenn der Umfang des Blatts vier oder fünf Ecken beschreibt, z. B. Menispermum canadense.

40. *unausgeschnitten* (integrum s. indivisum), was keine Einschnitte hat. Fig. 203.

41. *lappig* (lobatum), wenn ein Blatt, dessen Umfang rundlich ist, in tiefe bis zur Hälfte reichende Lappen zerschnitten ist. Nach der Zahl der Lappen theilt man sie in *zweilappige* (bilobum), z. B. Ranunculus, *dreilappige* (trilobum), *fünf-lappige* (quinquelobum), z. B. Humulus Lupulus u. s. w. Fig. 32.

42. *handförmig* (palmatum), wenn ein Blatt, dessen Umfang rundlich ist, in fünf, sieben oder neun weit über die Hälfte, fast bis zur Basis gehende Lappen getheilt ist.

(Ueher Nr. 41 und 42. s. d. Anmerk. zn d). L.)

43. *getheilt* (partitum), wenn ein Blatt, dessen Umfang rundlich ist, bis zur Basis in sehr viele linienförmige Einschnitte getheilt ist, z. B. Ranunculus aquatilis.

(Es kommt nicht auf den Umfang, sondern auf die Theilung bis zur Basis an. L.)

44. *gabelförmig* (*dichotomum*), das vorige Blatt, dessen linienförmige Einschnitte zweispaltig oder auch mehrmals zweispaltig getheilt sind.

45. *gerissen* (*laciniatum*), wenn ein längliches Blatt viele tiefe Einschnitte ohne Ordnung hat. Fig. 35.

46. *buchtig* (*sinuatum*), wenn an den Seiten eines länglichen Blatts runde, flache Einschnitte sind, z.

1. *Quercus Robur*. Fig. 289.

47. *halbgefiedert* (*pinnatifidum*), wenn regelmäßige Einschnitte sind, die fast bis auf die Mittelrippe gehn.

(Ueber Nr. 45—47. s. die Anmerk. zu d). L.)

48. *liefenförmig* (*lyratum*), fast das vorhergehende Blatt, dessen äusserster Einschnitt sehr gross und rund ist. Fig. 243.

49. *schrotsügenförmig* (*runcinatum*), wenn die Einschnitte eines halbgefiederten Blatts spitzig sind, und sich bogenförmig abwärts biegen, z. B. *Leontodon Taraxacum*. Fig. 242.

50. *sparrig gerissen* (*squarroso-laciniatum*), wenn das Blatt fast bis auf die Mittelrippe eingeschnitten ist, und die Einschnitte nach allen Richtungen hinstehn, z. B. *Cnicus lanceolatus*. Fig. 265.

(Genauer, wenn die vorspringenden Winkel nicht in der Ebene des Blattes liegen. L.)

Der äussere Umriss der Blätter Nr. 41. bis 44. ist rund. Von Nr. 45. bis 50. ist der äussere Umriss länglich.

d. in Rücksicht des Randes.

51. *ganzrandig* (*integerrimum*), dessen Rand ohne alle Kerbe oder Zähne ist. Fig. 1. 2.

Sehr oft werden Nr. 51. und Nr. 40. verwechselt.

Ein unausgeschnittenes Blatt (*folium integrum*) ist bloss der Gegensatz zwischen Nr. 40. und N 41. bis 49. Es kann aber sehr oft gezähnt oder gesägt sein. Ein ganzrandiges Blatt (*folium integerrimum*), kann wohl wie Nr. 41. b 48. gestaltet sein, aber es darf keine Zähne oder Sägeneinschnitte, wie in folgenden Blättern haben.

52. *knorplich* (*cartilagineum*), wenn der Rand mit einem Knorpel eingefasst ist.

53. *wellenförmig* (*undulatum*), wenn der Rand auf und ab gebogen ist. Fig. 3. 197.

54. *gekerbt* (*crenatum*), wenn der Rand mit Zähnen besetzt ist, die eine vollkommen senkrechte Stellung haben; dass, wenn man von der Spitze des Zahns sich eine bis zur Mittelrippe verlängerte Linie denkt, derselbe in zwei gleiche Theile zerfällt. Fig. 203.

55. *ausgeschweift* (*repandum*), wenn der Rand sehr flache, bogenförmige, gedehnte Zähne hat. Fig. 211.

56. *gezähnt* (*dentatum*), wenn der Rand merklich von einander stehenden Zähnen besetzt ist, die in zwei ungleiche Theile zerfallen, wenn man sich von ihrer Spitze zur Mittelrippe des Blatts eine verlängerte Linie denkt.

57. *doppelt gezähnt* (*duplicato - dentatum*), wenn jeder Zahn des Randes wieder gezähnt ist.

58. *kerbzühnig* (*dentato-crenatum*), wenn jeder Zahn an seiner Basis einen kleinen abgerundeten Zahn hat.

59. *sägeförmig* (*serratum*), wenn die Zähne des Randes so gestellt sind, dass eine von ihrer Spitze bis zur Mittelrippe in Gedanken gezogene Linie den Zahn selbst nicht trifft.

60. *ausgebissen* (*erosum*), wenn der Rand ungleich

geschnitten ist, als wenn er benagt wäre, z. B. *ulvia*.

61. *dornig* (*spinosum*), wenn der Rand mit Stacheln besetzt ist, z. B. *Carduus*.

62. *wimpericht* (*ciliatum*), wenn der Rand mit Haaren, gleich langen, weit von einander abstehenden Haaren besetzt ist.

(Die langen Beschreibungen von Nr. 54, 56, 59, welche doch, besonders bei der letzten, dem Sprachgebrauche nicht ganz gemäss sind, zeigen die Schwierigkeit genauer Bestimmungen. Die Botaniker sind im Sprachgebrauche meistens übereinstimmend, weichen aber in den Bestimmungen fast alle von einander ab. Nach Linné, *Phil. bot.* §. 83, ist fol. *dentatum*, quod acumina horizontalia, folii consistentia, spatio remota habet; fol. *serratum*, quod angulis acutis imbricatis extremitatem respicientibus notatur; fol. *crenatum*, cujus margo angulis neutram extremitatem respicientibus secatur; fol. *repandum*, cujus margo angulis, eisque interjectis sinibus, circuli segmento inscriptis, terminatur. Folgende Bestimmungen, welche ich in der Flore portug. gegeben, scheinen mir genau und leicht zu übersehen. Sowohl die Zacken (anguli) als Einschnitte (Buchten, sinus) lassen sich als Winkel darstellen. Sind die einschliessenden Linien nach aussen convex, so heissen beide gestumpft (*obtusati*), sind sie gerade oder nach aussen concav, so heissen beide gespitzt (*acutati*). Die Ecke an der Spitze der Zacke wie der Bucht kann in beiden Fällen vorhanden und spitz (*acutus*) oder abgerundet und stumpf (*obtusus*) sein. Gesägt (*serratum*) hat gespitzte Zacken und dazwischen gespitzte Einschnitte; gezähnt (*dentatum*) hat gespitzte Zacken und dazwischen gestumpfte Einschnitte; ausgeschweift (*repandum*) hat gestumpfte Zacken und dazwischen gestumpfte Einschnitte; gekerbt (*crenatum*) hat gestumpfte Zacken und dazwischen gespitzte Einschnitte. So auch für die Basis: Herzförmig (*cordatum*), ein gespitzter Einschnitt zwischen zwei gestumpften Zacken; nierenförmig (*renifor-*

me), ein gestumpfter Einschnitt zwischen zwei gestumpften Zacken; mondformig (*lunulatum*), ein gestumpfter Einschnitt zwischen zwei gespitzten Zacken; pfeilformig (*sagittatum*), ein gespitzter Einschnitt zwischen zwei gespitzten Zacken. Ferner die Spitze: Gespalten (*fissum*), ein gespitzter Einschnitt zwischen zwei gespitzten Zacken; ausgerandet (*emarginatum*), ein gespitzter Einschnitt zwischen zwei gestumpften Zacken; eingedrückt (*retusum*), ein gestumpfter Einschnitt zwischen zwei gestumpften Zacken; zweispitzig (*bicuspidatum*), ein gestumpfter Einschnitt zwischen zwei gespitzten Zacken.

Diesen füge ich jetzt noch die Kunstwörter bei, für die Fälle, wo durch tiefere Einschnitte nicht bloss Zacken, sondern Lappen getrennt werden. Wenn mehrere solche Einschnitte gegen den Blattstiel gerichtet sind, haben wir: Lappig (*lobatum*), gespitzte Einschnitte zwischen gestumpften Lappen; handformig (*palmatum*), gestumpfte Einschnitte zwischen gespitzten Lappen; buchtig gelappt (*sinuato-lobatum*), gestumpfte Einschnitte zwischen gestumpften Lappen und zerschnitten oder gerissen (*lacerum*) gespitzte Einschnitte zwischen gespitzten Lappen. Endlich, wenn die tiefen Einschnitte gegen die Mittelrippe gekehrt sind: Fiederformig (*pinnatifidum*), gestumpfte Einschnitte zwischen gespitzten Lappen; gekerbt-fiederformig (*crenato-pinnatifidum*), gespitzte Einschnitte zwischen gestumpften Lappen; buchtig (*sinuatum*), gestumpfte Einschnitte zwischen gestumpften Lappen und kammförmig (*pectinatum*), gespitzte Einschnitte zwischen gespitzten Lappen. L.)

e. in Rücksicht der Flächen.

63. *stachelig* (*aculeatum*), wenn die Oberfläche mit Stacheln besetzt ist.

64. *hohl* (*concavum*), wenn die Mitte des Blatts vertieft ist.

65. *rinnenförmig* (*canaliculatum*), wenn die Mittelrippe eines schmalen langen Blatts vertieft ist.

66. *runzlig* (*rugosum*), wenn es zwischen den

Adern auf der Oberfläche erhaben ist, und dadurch Runzeln bildet, z. B. *Salvia*.

67. *blasig* (*bullatum*), wenn die Erhabenheiten zwischen den Adern auf der Oberfläche Blasen bilden.

68. *vertieft* (*lacunosum*), wenn die Erhabenheiten zwischen den Adern auf der Unterfläche sind, so dass die Oberfläche Vertiefungen hat.

69. *kraus* (*crispum*), wenn das Blatt am Rande weiter ist, als in der Mitte, so dass es sich in unregelmässige Falten legen muss. Fig. 35.

70. *gefalten* (*plicatum*), wenn das Blatt von der Basis an in regelmässige gerade Falten gelegt ist.

71. *geadert* (*venosum*), wenn die Gefässbündel auf dem Blatte ihren Ursprung aus der Mittelrippe nehmen (und verästelt sind. L.). Dieses findet man bei den meisten Gewächsen. Fig. 2. 14. 25. 27. 243. 248. 289. u. s. w.

72. *netzformig-geadert* (*reticulato-venosum*), wenn die aus der Mittelrippe entspringende Adern wieder in Nebensätze zertheilt sind, die sich netzartig verbinden.

73. *gereift* (*costatum*), wenn aus der Mittelrippe Adern entstehen, die in einer geraden Linie nach dem Rande sich erstrecken, und die in grosser Anzahl ganz dicht beisammen stehn, z. B. *Calophyllum Inophyllum*, *Canna*, *Musa* u. s. w.

(Man nennt so vielmehr den Fall, wo die Adern oder Nerven auf der untern Seite sehr stark hervorstehen. L.)

74. *gerippt* (*nervosum*), wenn die Gefässbündel aus dem Blattstiel gleich an der Basis ihren Ursprung haben und nach der Spitze zu fortlaufen (ohne sich zu verästeln. L.) Fig. 200. 203.

75. *dreirippig* (*trinervium*), wenn drei Gefäss-

Willdenow's Grundriss, I Th.

6

bündel aus der Basis entstehen (und unverästelt nach der Spitze zulaufen. L.) Fig. 200.; so zählt man weiter, als: quinquenervium, septemnervium. Fig. 203. u. s. w.

76. *dreifachgerippt* (triplinervium), wenn über der Basis der Mittelrippe auf jeder Seite ein nach der Spitze zu auslaufender Gefässbündel entspringt, z. B. *Laurus Cinnamomum*, *Camphora*. Fig. 290.

77. *fünffach gerippt* (quintaplinervium), wenn über der Basis der Mittelrippe zwei nach der Spitze auslaufende Gefässbündel auf jeder Seite entspringen. Fig. 201.

78. *siebenfach gerippt* (septuplinervium), wenn über der Basis der Mittelrippe auf jeder Seite drei Gefässbündel nach der Spitze zu auslaufen. Fig. 202.

79. *aderrippig* (venoso-nervosum), wenn bei einem nervigten Blatte die Gefässbündel in Aeste wie an einem adrigen Blatte zertheilt sind, z. B. *Tropaeolum majus*, *Begonia nitida*. Fig. 197. 198.

80. *bedeckt gerippt* (obtectovenosum), wenn über ein adriges Blatt noch drei Nerven, die aus der Basis kommen, laufen, die gleichsam darauf gelegt zu sein scheinen, z. B. *Erythroxylon Coca*. Fig. 308.

81. *gestrichelt* (lineatum), wenn das ganze Blatt mit platten (ist überflüssig. L.), parallel-laufenden Gefässbündeln, die von der Basis nach der Spitze gehn, dicht durchzogen ist.

Linné nennt öfters ein folium lineatum, was adrigt (venosum) ist, wo die Adern aber ziemlich geradlinigt und stark hervorstehend sind, z. B. *Zizyphus volubilis*.

Bei einigen ausländischen Gewächsen ist die Oberfläche der Blätter ganz anders als die untere in Rücksicht der Vertheilung der Gefässbündel beschaffen, und da ist es nöthig beide Flächen zu beschreiben.

82. *rippenlos* (enervium), wenn keine aus der Basis entspringende (ausgezeichnete L.) Gefässbündel sind.

83. *aderlos* (avenium), wo gar keine Ader ist.

84. *punctirt* (punctatum), wenn statt der Rippen oder Adern Punkte sind, z. B. *Vaccinium Vitis Idaea*. (Es kommt auf die Rippen oder Adern nichts an. L.)

85. *kappenförmig* (cucullatum), wenn bei einem herzförmigen Blatte die beiden Lappen krumm gegen einander gebogen sind, dass sie eine Tute zu bilden scheinen.

(Nicht immer ist das Blatt herzförmig. L.)

86. *gewölbt* (convexum), wenn die Mitte des Blattes grösser als der Rand ist, und sich auf der Oberfläche rund, auf der untern hohl beugt.

87. *kielförmig* (carinatum), wenn bei einem linien-lanzettenförmigen, oder länglichen Blatt auf der Unterfläche die Gegend der Mittelrippe wie der Kiel eines Schiffes hervorsteht.

88. *vierfach kielförmig* (quadrincarınatum), wenn die Mittelrippe bei einem schmalen Blatte oben und unten weit hervorsteht und der Rand verdickt ist, so dass beim horizontalen Durchschneiden die Form eines Kreuzes herauskommt, z. B. *Ixia cruciata*.

Uebrigens gilt bei den Blättern in Rücksicht der Fläche was §. 6. gesagt ist.

B. Zusammengesetzte Blätter.

89. *zusammengesetzt* (compositum), wenn mehrere Blätter an einem Blattstiel befestigt sind. Dahin gehören No. 90. 94. 97. 98. 100. 101. Wenn aber das Blatt zwar nach dieser Bestimmung zutrifft, sich jedoch nicht zu folgenden Arten bringen lässt; so wird es schlechtweg *zusammengesetzt* (compositum) genannt.

90. *gefinger* (*digitatum*), wenn mehrere Blätter mit ihrer Basis zusammen auf der Spitze eines Blattstiels stehn, z. B. *Aesculus Hippocastanum*.

91. *gezweit* (*binatum*), wenn zwei Blätter mit ihrer Basis zusammen auf der Spitze eines Blattstiels stehn. Sind die beiden Blättchen eines gezweigten Blatts abwärts in horizontaler Richtung gebogen, so nennt man dies ein *verbundenes Blatt* (*folium conjugatum*).

92. *doppelt gezweit* (*bigeminatum* s. *bigeminum*), wenn ein getheilter Blattstiel an jeder Spitze zwei Blätter hat, z. B. bei einigen Inga Arten. Fig. 217.

93. *dreimal gezweit* (*trigeminatum* s. *tergeminum*), wenn ein getheilter Blattstiel an jeder Spitze zwei Blätter hat, und am Hauptstiel, wo derselbe getheilt ist, auf jeder Seite sich ein Blatt befindet, z. B. *Inga tergemina*. Fig. 234.

94. *dreizählig* (*ternatum*), wenn drei Blätter an der Spitze eines Blattstiels befestigt sind, z. B. *Trifolium pratense*. *Fragaria vesca*.

95. *doppelt dreizählig* (*biterdatum* s. *duplicato-ternatum*), wenn ein dreimal zertheilter Blattstiel an jeder Spitze drei Blätter hat.

96. *dreifach dreizählig* (*triternatum* s. *triplicato-ternatum*), wenn ein dreimal zertheilter Blattstiel wieder an jeder Spitze dreimal getheilt ist, und an allen neun Spitzen drei Blätter hat. Fig. 207.

97. *vierzählig* (*quadrinatum*), wenn vier Blätter an der Spitze eines Blattstiels stehn, z. B. *Hedysarum tetraphyllum*.

98. *fünzfählig* (*quinatum*), wenn fünf Blätter an der Spitze eines Blattstiels befestigt sind. Dieses hat zwar mit Nr. 90. Aehnlichkeit, aber weicht durch

die Zahl fünf ab, da bei jenem gewöhnlich mehrere Blätter sind.

99. *doldenartig* (*umbellatum*), wenn an der Spitze eines Blattstiels eine sehr grosse Zahl von Blättern sind, die sich übereinander legen müssen und nach Art eines Sonnenschirms kreisförmig ausbreiten, z. B. *Aralia Sciodaphyllum*, *Panax chrysophyllum*.

100. *gefasst* (*pedatum* s. *ramosum*), wenn ein Blattstiel getheilt ist, und in der Mitte wo er sich theilt ein Blättchen, an den beiden Enden wieder eins, und auf jeder Seite zwischen dem in der Mitte und dem am Ende befindlichen entweder ein, oder zwei oder auch drei Blätter hat. Es besteht daher ein solches Blatt nur aus 5, 7 oder 9 Blättchen, die alle an einer Seite befestigt sind, z. B. *Helleborus viridis*, *foetidus* und *niger*. Fig. 246.

101. *gefiedert* (*pinnatum*), wenn an einem ungetheilten Blattstiel auf jeder Seite Blätter in einer Fläche stehn. Davon sind folgende Arten:

a) *abgebrochen gefiedert* (*paripinnatum* s. *abrupte pinnatum*), wenn an der Spitze des gefiederten Blatts kein einzelnes steht. Fig. 30.

b) *ungepaart gefiedert* (*imparipinnatum* s. *pinnatum cum impari*), wenn an der Spitze des gefiederten Blatts sich ein einzelnes befindet.

c) *gegenüberstehend gefiedert* (*opposite pinnatum*), wenn bei einem gefiederten Blatte die Blättchen gegenüber stehn.

d) *abwechselnd gefiedert* (*alternatim pinnatum*), wenn bei einem gefiederten Blatte die Blättchen abwechselnd stehn. Fig. 30.

e) *ungleich gefiedert* (*interrupte pinnatum*),

wenn bei einem gefiederten Blatte zwischen den Blättchen abwechselnd kleinere sind. Fig. 8.

f) *gelenkweise gefiedert* (articulate pinnatum), wenn zwischen jedem Paare gegenüberstehender Blättchen der Stiel mit einem blättrigen hervorstehenden Rand versehen ist. Fig. 239.

g) *herablaufend gefiedert* (decursive pinnatum), wenn von jedem einzelnen Blättchen ein blättriger Fortsatz bis zu dem folgenden geht. Fig. 240.]

h) *abnehmend gefiedert* (pinnatum foliolis decrescentibus), wenn die Blättchen eines gefiederten Blatts allmählig bis zur Spitze kleiner werden, z. B. *Vicia sepium*.

102. *verbunden gefiedert* (conjugato-pinnatum), wenn ein Blattstiel sich theilt und jeder Theil ein gefiedertes Blatt ausmacht. Fig. 222.

103. *gedreht gefiedert* (ternato-pinnatum), wenn an der Spitze eines Hauptblattstiels drei gefiederte Blätter stehn, z. B. *Hoffmanseggia*.

104. *gefingerd gefiedert* (digitato-pinnatum), wenn mehrere etwa 4 bis 5 einfache gefiederte Blätter an der Spitze eines Blattstiels befestigt sind, z. B. *Mimosa pudica*. Fig. 235.

105. *doppelt gefiedert* (bipinnatum, duplicato-pinnatum), wenn ein Blattstiel in einer Fläche auf beiden Seiten eine Menge Blattstiele hervorbringt, wovon jeder ein gefiedertes Blatt trägt. Fig. 249.

106. *dreifach gefiedert* (tripinnatum, s. triplacato-pinnatum), wenn mehrere doppelt gefiederte Blätter auf den Seiten eines einfachen Stiels in einer Fläche angeheftet sind. Fig. 247.

107. *doppelt zusammengesetzt* (decompositum), wenn ein getheilter Blattstiel mehrere Blätter verbind-

det; von der Art sind Nr. 92. 93. 95. 102. 103. 104. 105. Man braucht aber den Ausdruck *decompositum* nur da, wo die Zertheilung des Blattstiels und der Blättchen unregelmässig ist. Fig. 241.

108. *vielfach zusammengesetzt* (*supradecompositum*), wenn ein vielfach zertheilter Blattstiel mehrere Blätter enthält; dahin gehören Nr. 96. 106. Dann aber nur, wenn die Vertheilung der Blättchen entweder noch häufiger, oder nicht so regelmässig ist, wird der Ausdruck *supradecompositum* gebraucht.

C. In Rücksicht des Orts.

109. *Wurzelblatt* (*radicale*), wenn ein Blatt aus der Wurzel entspringt, z. B. *Viola odorata*; *Sagittaria sagittifolia*. Fig. 44.

110. *Samenblatt* (*seminale*), wenn ein Blatt aus den Theilen des Samens entstanden ist, z. B. beim Hanf kommen zwei weisse Körper, sobald'er aufgeht, zum Vorschein, dies sind die beiden Hälften des Samens, die sich in Blätter verwandeln.

111. *Stengelblatt* (*caulinum*), was am Hauptstengel befestigt ist. Oeffters sind die Wurzelblätter und Stengelblätter an einer Pflanze sehr verschieden.

112. *astständig* (*rameum*), was an den Aesten sitzt.

113. *winkelständig* (*axillare* s. *subalare*), was am Ursprunge des Astes steht.

114. *blüthenständig* (*florale*), was bei der Blume steht. Fig. 33.

D. In Rücksicht der Substanz,

115. *küutig* (*membranaceum*), wenn die beiden Häute des Blatts ohne merkliches Fleisch dicht auf

einander liegen, z. B. fast die meisten Blätter der Bäume und Pflanzen.

(Wird nur von sehr dünnen und biegsamen Blättern gebraucht. L.)

116. *fleischig* (carnosum), wenn zwischen beiden Häuten viel markige und saftige Substanz ist, z. B. *Sempervivum tectorum*.

117. *hohl* (tubulosum), wenn ein etwas fleischiges langes Blatt innerhalb hohl ist, z. B. *Allium Cepa*.

118. *zweifüchrig* (biloculare), wenn ein linienförmiges innerhalb hohles Blatt, in seiner Höhlung durch eine Scheidewand der Länge nach in zwei Fächer getheilt ist, z. B. *Lobelia Dortmanna*,

119. *füchrig* (articulatum s. loculosum), wenn ein walzenförmiges innerhalb hohles Blatt in seiner Höhlung durch horizontale Scheidewände abgetheilt ist, z. B. *Juncus articulatus*.

120. *walzenförmig* (teres), wenn ein Blatt cylinderförmig gestaltet ist,

(S. §. 18. Nr. 68. L.)

121. *zusammengedrückt* (compressum), wenn ein dickes Blatt auf beiden Seiten zusammengedrückt ist.

122. *zweischneidig* (anceps), wenn eines zusammengedrückten Blatts entgegengesetzte Seiten schneidend sind.

123. *niedergedrückt* (depressum), wenn die Oberfläche eines fleischigen Blatts eingedrückt oder ausgehöhlt ist.

124. *flach* (planum), wenn die Oberfläche eines dicken (nicht immer. L.) Blatts eine ebene Fläche hat.

125. *höckrig* (gibbosum s. gibbum), wenn beide Flächen convex sind.

126. *äufelförmig* (acinaciforme), ein dickes

rweischneidiges Blatt, das an einer Seite scharf und bogenförmig, an der andern gerade und breit ist. Fig. 232.

127. *hobelförmig* (dolabriforme), wenn ein fleischiges Blatt zusammengeedrückt, oben zirkelrund, an der einen Seite convex, an der andern schneidig, und an der Basis cylindrisch ist. Fig. 244.

128. *zungenförmig* (linguiforme), wenn ein langes zusammengeedrücktes (plattgedrücktes L.) Blatt an der Spitze sich rund endigt.

129. *dreiseitig* (triquetrum), wenn das Blatt in drei sehr schmale Flächen eingeschlossen und dabei lang ist.

130. *deltaförmig* (deltoides), wenn ein dickes Blatt in drei breite Flächen eingeschlossen und dabei kurz ist. Fig. 231.

131. *vierkantig* (tetragonum), wenn nach Verhältniss ein langes Blatt in vier schmale Flächen eingeschlossen ist, z. B. *Pinus nigra*.

132. *warzenförmig* (verrucosum), wenn kurze fleischige Blätter abgestutzt sind, und in dichten Haufen stehn, z. B. einige afrikanische Euphorbien. Fig. 228.

133. *hakenförmig* (uncinatum), wenn ein fleischiges Blatt oben platt, an den Seiten zusammengeedrückt, und mit der Spitze abwärts gebogen ist. Fig. 230.

Alle diese Blätter von Nr. 120. bis 133. sind dick und fleischig, nur werden Nr. 117. 118. 119. 129, 131. bei einigen Gewächsen häutig angetroffen.

E. In Rücksicht der Stellung.

134. *gegenüberstehende Blätter* (folia opposita).
§. 18. Nr. 12. Fig. 32.

135. *falschpaarig* (disparia), wenn von gegenüberstehenden Blättern das eine von dem andern ganz verschieden ist, z. B. einige Melastoma Arten.

136. *wechselweise stehende* (alterna). §. 18. Nr. 11. Fig. 23.

137. *zerstreute* (sparsa), wenn die Blätter ohne Ordnung am Stengel sitzen.

138. *gehäuft* (conferta s. approximata), wenn die Blätter dicht zusammen stehn, dass man den Stengel nicht sehn kann.

139. *entfernte* (remota), wenn die Blätter am Stengel in weiten Zwischenräumen entfernt sind.

140. *dreifache* (terna), wenn drei Blätter um den Stengel stehn. Man zählt gewöhnlich weiter: quaterna, quina, sena, septena, octona u. s. w.

141. *sternförmige* (stellata s. verticillata), wenn mehrere Blätter rund um den Stengel in gewissen Zwischenräumen stehn, z. B. Galium, Fig. 29.

142. *büschelweise stehende* (fasciculata), wenn an einem Punkt eine Menge Blätter stehn, z. B. Pinus Larix; Celastrus buxifolius. Fig. 14.

143. *zweizeilige* (disticha), wenn zwei entgegengesetzte Reihen von Blättern so am Stengel befestigt sind, dass sie in einer Fläche liegen, z. B. Pinus picea; Lonicera Symphoricarpos.

144. *kreuzweise stehende* (decussata), wenn der Stengel der Länge nach mit vier Reihen Blätter besetzt ist; dass an jedem Aste, wenn er in einer senkrechten Stellung von oben betrachtet wird, die Blätter ein Kreuz zu bilden scheinen, z. B. Veronica decussata.

145. *dachziegelförmige* (imbricata), wenn ein Blatt auf dem andern liegt, wie die Ziegel auf einem

Dache. Fig. 229. Es giebt folgende Arten:

a) *zweireihig dachziegelförmig* (*bifariam imbricata*), wenn die Blätter so über einander liegen, dass sie nur zwei gerade Reihen längs dem Stengel ausmachen. So zählt man nun weiter

b) *trifariam imbricata*.

c) *quadrifariam imbricata* u. s. w.

F. In Rücksicht der Anheftung.

146. *gestielt* (*petiolatum*), wenn ein Blatt mit einem Stiel versehen ist.

147. *randstielig* (*palaceum*), wenn am Rande der Stiel befestigt ist. Fig. 22.

(Der Ausdruck wird selten gebraucht. Jedes Blatt ist *palaceum*, wenn es nicht *peltatum* genannt wird. L.)

148. *schildförmig* (*peltatum*), wenn der Stiel in der Mitte des Blatts festsetzt. Fig. 1.

149. *sitzend* (*sessile*), wenn das Blatt ohne Stiel am Stengel befestigt ist. Fig. 29.

150. *abgelöset* (*solutum* s. *basi solutum*), ein fleischiges entweder walzenförmiges oder pfriemförmiges sitzendes Blatt, was (an der Basis flach gedrückt ist und mit der Fläche auf dem Stiele liegt. L.) mit dem Stengel, worauf es sitzt, keine Verbindung zu haben scheint und nur locker daran hängt, z. B. *Sedum album*.

151. *reitend* (*equitans*), ein schwerdt- oder li-nienförmiges Blatt, das an seiner Basis eine schneide-artige sehr tiefe Rinne bildet, deren Flächen an ein-ander liegen, und damit den Stengel umfasst, z. B. *Dracaena ensifolia*, *Sisyrinchium striatum* u. s. w.

(*Folia equitantia* sind eigentlich, wenn die Blätter über einander liegen und alle zugleich der Länge nach einmal gefaltet sind. L.)

152. *herablaufend* (*decurrens*), wenn ein sitzendes Blatt mit seiner blättrigen Substanz noch am Stengel fortgeht. Fig. 265.

153. *umfassend* (*amplexicaule*), wenn ein sitzendes Blatt an der Basis herzförmig ist, und mit beiden Lappen den Stengel umfasst.

154. *verbunden* (*connatum*), wenn gegeneinander über sitzende Blätter mit ihrer Basis verbunden sind.

Ein durchwachsenes Blatt (*folium perfoliatum* s. *perforatum*) ist schon §. 18, Nr. 60, beschrieben.

G. In Rücksicht der Lage.

155. *angedrückt* (*adpressum*), wenn das Blatt in die Höhe steht, und mit seiner Oberfläche am Stengel anliegt.

156. *aufrecht* (*erectum* s. *semiverticale*), wenn das Blatt in die Höhe gerichtet ist, und mit dem Stengel einen sehr spitzen Winkel bildet.

157. *scheitelrecht* (*verticale*), was ganz aufrecht steht, dass es mit der Horizontallinie einen rechten Winkel macht.

(Nämlich wenn der eine Rand dem Horizont, der andere dem Zenith zugekehrt ist. L.)

158. *seitwärts gebogen* (*adversum*), wenn der Rand eines scheitelrechten Blatts dem Stengel zugekehrt ist.

159. *abstehend* (*patens*), was in einem spitzigen Winkel absteht.

160. *einwärts gebogen* (*inflexum* s. *incurvum*), wenn ein in die Höhe stehendes Blatt mit seiner Spitze krumm dem Stengel zugebogen ist.

161. *gedreht* (*obliquum*), wenn die Basis des Blatts flach nach oben steht, und die Spitze dem Ho-

I. Terminologie.

izont, der Rand der Spitze aber der Erde zugekehrt ist.

(Eigentlich wenn die Fläche des Blattes mit dem Horizont einen schiefen Winkel macht, der Rand mehr der Erde, der andere mehr dem Himmel zugekehrt ist. Wie der V. dieses Blattes bestimmt, ist der hintere Theil horizontal, der vordere schief. Man könnte es *semiobliquum* nennen. L.)

162. *wagerecht* (horizontale), wenn die Oberfläche des Blatts mit dem Stengel einen rechten Winkel bildet.

163. *niedergebogen* (*reclinatum* s. *reflexum*), wenn das Blatt mit der Spitze nach der Erde zugekrümmt steht.

164. *umgerollt* (*revolutum*), wenn der Rand des Blatts nach aussen umgerollt ist.

165. *herabhängend* (*dependens*), wenn die Basis dem Zenith und die Spitze der Erde zugekehrt ist.

166. *wurzelnd* (*radicans*), wenn das Blatt Wurzeln treibt.

167. *schwimmend* (*natans*), wenn das Blatt auf der Oberfläche des Wassers schwimmt, z. B. *Nymphaea alba*.

168. *untergetaucht* (*demersum* s. *submersum*), wenn die Blätter sich unter dem Wasser befinden.

169. *hervorragend* (*emersum*), wenn das Blatt einer Wasserpflanze sich über dem Wasser erhebt.

45. Die Blätter der Laubmoose sind beständig einfach, niemals zusammengesetzt oder getheilt; sie sind alle sitzend, ausser bei einer Art aus Südamerika, und bei den bekannten immer häutig. Man unterscheidet sie nach ihrem Umfange, und es lassen sich alle nach den gegebenen Bestimmungen erken-

nen. Nur drei eigene Arten müssen hier erwähnt werden, nämlich:

1. *haartragend* (*piliferum*), was an der Spitze ein Haar hat, z. B. *Polytrichum piliferum*.

2. *einnervig* (*uninervium* s. *ductulosum*), das in der Mitte einen durchlaufenden Gefäßbündel oder eine sogenannte Mittelrippe hat.

(Hieher gehört auch *binervium*, zweinervig, welches nur bei Moosen vorkommt. Hedwig nannte nervige Blätter *folia ductulosa* und den Nerven fasciculus ductulorum, eine unnöthige Aenderung. L.)

3. *unnervig* (*enervium*), dem diese Mittelrippe fehlt.

Ueberhaupt ist von allen Blättern zu bemerken, dass man sich, wenn sie nicht ganz zu der gegebenen Bestimmung passen, des Wörtchens *sub* bedient; z. B. *subcordatum*, *subovatum*, *subserratum*, *sub* ein fast herzförmiges, fast eiförmiges, fast gezäheltes Blatt. (Das Wörtchen *sub* kann in derselben Bedeutung zu allen Kunstwörtern gesetzt werden. L.) Eben so braucht man das Wörtchen *ob* um anzudeuten, dass das Blatt an seiner Spitze so beschaffen ist, wie es an der Basis nach der Bestimmung sein sollte. Daher sagt man *folium obcordatum*, *obovatum*. Fig. 14. ein *verkehrt herzförmiges*, *verkehrt eiförmiges* Blatt. (S. Anm. zu Nr. 25. D.)

Die einzelnen Theile eines einfachen oder zusammengesetzten Blatts, sind folgende:

1. *die Lappe* (*Lobus*), der Einschnitt eines Blatts, der nach der Spitze zu rundlich ist, z. B. *Acer*.

2. *der Einschnitt* (*Lacinia*), der Einschnitt eines Blatts, der an der Spitze in eine Ecke zuläuft und ungleich ist.

(*Lobus* ist der vorspringende Theil eines *folium lobatum*.)

batum und eben so braucht man dens, crena, serratura vom fol. dentatum, crenatum und serratum. Lacinia ist der vorspringende Theil eines überhaupt eingeschnittenen Blattes. L.)

3. das *Blättchen* (Folium), heisst bei den foliis pinnatis, digitatis u. s. w. jedes einzelne kleine Blatt (überhaupt jedes einzelne Blatt eines zusammengesetzten Blattes. L.)

4. das *Blatt eines doppelt gefiederten Blatts* (Pinna), heisst jedes einfach gefiederte Blatt eines doppelt gefiederten.

5. das *Blättchen eines gefiederten Blatts* (Pinnula), heisst jedes Blättchen eines gefiederten Blatts.

6. *doppelt gepaart gefiedert* (pinnatum bijugum), wenn das gefiederte Blatt nur zwei Paar gegen einander über stehende Blätter hat. Man zählt gewöhnlich noch: trijugum, quadrijugum, quinquejugum, u. s. w.

7. *Ecke* (Angulus), ist der spitze Zwischenraum eines Einschnitts des Blatts.

(Ist der allgemeine Ausdruck für alle vorspringende Theile des Blattes, so wie man sinus für den allgemeinen Ausdruck aller Einschnitte nehmen kann. L.)

8. *Bucht* (Sinus), ist der runde Zwischenraum eines Einschnitts des Blatts, z. B. Quercus Robur.

Jeder dieser Theile wird bei genauern Beschreibungen wie ein einzelnes Blatt nach den Flächen, Rand, Spitze, Basis u. s. w. besonders noch betrachtet.

Bei einem einfach gefiederten Blatte, wird jedes Blättchen pinnula, oder auch zuweilen foliolum genannt, und nur bei doppelt gefiederten Blättern, braucht man den oben Nr. 4 und 5 angegebenen Unterschied. Linné bedient sich bei den Arten der Gattung Mimosa, welche doppelt gefiederte Blätter haben, des Ausdrucks, dass er jedes einfach gefiederte Blatt des doppelt gefiederten

pinna partialis, und jedes einzelne Blättchen *pinna propria* oder auch schlechtweg *pinna* genannt.

46. Der *Wedel* (*Frons*), ist den Palmen, Farrnkräutern, Lebermoosen und Algen eigen. Die Kennzeichen desselben sind: dass der Stengel und die an ihm befindlichen Blätter innig verbunden sind; so dass sich nicht bestimmt angeben lässt, wo diese anfangen und jener aufhört. Bei einigen Gewächsen fliessen sogar Blätter und Stengel in eines, so dass sich nicht sagen lässt, wohin der vorhandene Theil zu rechnen sei.

(Die Palmen und Farrnkräuter haben wahre Blätter; auch ist bei jenen der Sprachgebrauch nicht ganz für *frons* entschieden und es ist besser *folium* zu sagen. Bei den Farrnkräutern ist er freilich für *frons*, aber es wäre besser eine Neuerung zu machen. Die Blätter der Farrnkräuter tragen Früchte, wie die Blätter von *Ruscus* und *Phyllanthus*. Nur an den meisten Lebermoosen und Algen sind Stämme und Blätter in eins verschmolzen, und dann wäre es besser *thallus* zu gebrauchen, den Ausdruck *frons* aber nur für die Fälle zu behalten, wo man etwas von den Blättern und dem Stamme zugleich andeuten will. L.)

Die Palmen haben einen einfachen Stock (§. 16.), der nur an seiner Spitze mit Wedeln besetzt ist. Im gemeinen Leben nennt man den Wedel der Palme, einen Palmenzweig, aber er ist weder als ein Zweig, noch als ein einzelnes Blatt anzusehn. Die Arten sind:

1. *fächerförmig* (*labelliformis*), wenn an der Spitze des Strunks (§. 21.) entweder mehrere Blätter kreisförmig ausgebreitet stehn oder die Blattsubstanz ein tellerförmiges Ansehn hat und mit vielen regelmässigen gefalteten Einschnitten versehn ist. Zwi-

chen den Einschnitten oder Blättern ist öfters ein Lachen, z. B. *Chamaerops*, *Borassus*.

2. *schildförmig* (*peltata*), wenn an der Spitze des Strunks die tellerförmige Blatts substanz vollkommen geschlossen ist, so dass bis zur Basis nirgend ein Einschnitt reicht, z. B. *Corypha*.

3. *gefiedert* (*pinnata*), ein Wedel von der Gestalt eines gefiederten Blatts (§. 44. Nr. 101.), z. B. *Phoenix*.

4. *doppelt gefiedert* (*bipinnata*), ein Wedel von der Gestalt eines doppelt gefiederten Blatts (§. 44. Nr. 105.), z. B. *Caryota*.

Die Farnkräuter und ähnliche damit verwandte Gewächse haben an ihrem Wedel alle die Gestalten, welche bei den Blättern (§. 44.) unterschieden sind, wir müssen noch folgende dort nicht angeführte Arten hier bemerkt werden:

1. *gefiedert mit zusammenfliessenden Blättern* (*pinnata pinnis confluentibus*), wenn es gefiedert ist, die Blättchen aber nach der Spitze zu an ihrer Basis sich mit einander vereinigen. Fig. 298.

2. *doppelt halbgefiedert* (*bipinnatifida*), wenn an einem gefiederten Laub, die Blättchen halb gefiedert sind. Fig. 305.

3. *vierfach gefiedert* (*quadruplicato-pinnata*), wenn ein gefiederter Strunk an jedem Aste ein dreifach gefiedertes Blatt (§. 44. Nr. 106.) hat.

4. *fünffach gefiedert* (*quintuplicato-pinnata*), wenn ein gefiederter Strunk an jedem Aste ein vierfach gefiedertes Blatt hat.

(Die bisher erklärten Ausdrücke gelten auch für die Blätter und flabelliformis und peltata sind oben §. 41. Nr. 13. und 148. bereits besser erklärt worden. Die letzten vier Kunstwörter werden auch von andern als Farnkrautblättern gebraucht. L.)

5. *unfruchtbar* (*sterilis*), ein Wedel der keine Früchte trägt, z. B. *Blechnum boreale*. Fig. 305.

6. *fruchtbar* (*fructificans*), der Blüthen od Früchte hat, z. B. *Blechnum boreale*. Fig. 305.

Die Lebermoose haben in Rücksicht ihres Wedels nichts ausgezeichnetes, und es lassen sich alle Verschiedenheiten desselben nach Art der Blätter anderer Gewächse unterscheiden. Ausgenommen bei der Gattung *Riccia*, wo der Wedel *sternförmig* (*stellata*) ausgebreitet an der Erde liegt.

Bei den *Fucus* und *Conferven* Arten unterscheidet man die Form des Wedels, wie bei den Blättern, man sind noch folgende Arten zu bemerken:

(Hier ist der sogenannte *frons* ein *thallus*. S. Anz. zu §. 47. L.)

1. *fadenförmig* (*filiformis*), der so dünn als ein Faden und zuweilen einfach ist.

2. *rund* (*teres*), von der vorigen Gestalt, dessen Umfang aber rund ist.

3. *zusammengedrückt* (*compressa*), von derselben Gestalt, nur auf beiden Seiten flach gedrückt.

4. *ästig* (*ramosa*), der in Äeste getheilt ist.

5. *gegliedert* (*geniculata*), der in Gelenke abgetheilt ist. Die *Glieder* (*articuli*) sind von verschiedener Form, der Theil wo sie zusammengezogen sind wird *Gelenk* (*geniculum*) genannt.

47. Das *Laub* (*Thallus*), ist den Lichenen eigen, in seiner Gestalt sehr verschieden, man kann nicht die Blätter vom Stengel daran unterscheiden, die Substanz ist abweichend und von allen anderen Gewächsen verschieden. Arten sind:

1. *blättrig* (*foliaceus*), wenn es aus einer gleichartigen Masse besteht und das Ansehn der Blätter

zung oder zu andern Zwecken dienen. Es giebt folgende Arten: *Afterblatt* (*Stipula*), das *Oehrchen* (*Auricula*), *Ausschlagsschuppe* (*Ramentum*), *Nebenblatt* (*Bractea*), *Blattscheide* (*Vagina*), *Blumenscheide* (*Spatha*), *Tute* (*Ochrea*), *Schlauch* (*Ascidium*), *Blase* (*Ampulla*), *Blatthütchen* (*Ligula*), *Hülle* (*Involucrum*), *Wulst* (*Volva*), *Ring* (*Anulus*), *Hut* (*Pileus*), *Ueberzug* (*Hymenium*), *Becherchen* (*Cypbella*), *Umschlag* (*Peridium*), *Decke* (*Indusium*), *Ranke* (*Cirrhus*), *Knospe* (*Gemma*), *der Becher* (*Cyathus*), *Fortsatz* (*Prossago*), *der Staubfortsatz* (*Propagulum*), *der Staubhaufen* (*Soredium*), *Knoten* (*Gongylus*), *das Kissen* (*Pulvinulus*), *Drüse* (*Glandula*), *Dorn* (*Spina*), *Stachel* (*Aculeus*), *Granne* (*Arista*), *Haar* (*Pilus*).

(Hierunter sind sehr verschiedene Theile zusammengestellt. Zuerst *gemma*, welche mit Zwiebel und Knolle allein steht. Dann veränderte Aeste, *cirritus* und *spina*. Ferner blattartige Theile und veränderte Blätter, *stipula*, *auricula*, *bractea*, *vagina*, *spatha*, *ochrea*, *ascidium*, *ampulla*, *ligula*, *involucrum*. Dann Anhängsel der Pflanze und Bedekung, *Glandula*, *Pilus*, *Aculeus*. Endlich die übrigen zu der Fructification der Kryptophyten gehörigen Theile. L.)

49. *Afterblätter* (*Stipulae*), sind kleine Blätter, die sich am Stengel in der Gegend des Blattstiels zeigen. Sie sind bisweilen von ganz andrer Gestalt, als die am Stengel befindlichen, bisweilen aber auch nichts, als dem Standort und der Grösse von ihnen verschieden.

(Sie sind dadurch sehr unterschieden, dass sie sich vor dem Blatte entwickeln. Der Name *Afterblatt* ist übrigens unbequem und *Nebenblatt* wäre sehr passend gewesen, wenn der V. das Wort nicht auf

13. *weinsteinartig* (tartareus), was aus sehr die aneinander hängenden gleichförmig vertheilten Körnern zusammen gesetzt ist.

14. *rissig* (rimosus), auf dieselbe Art gebildet aber mit kleinen Rissen durchzogen.

15. *netzartig* (areolatus), auf eben die Art geformt, aber mit würfelförmigen Rissen durchzogen. (Mit Rissen durchzogen, welche Felder (areas) bilden. L.)

16. *runzlicht* (rugosus), wie Nr. 13. gestaltet aber erhabenen Runzeln versehen.

17. *körnigt* (granulatus), was aus deutlichen merkbaren aneinander hängenden Körnern besteht.

18. *warzig* (verrucosus), was aus grossen warzenförmigen zusammenhängenden Körnern gebildet.

19. *fadenförmig* (filamentosus), wenn es aus Faden besteht, z. B. die Usnea Arten des Acharius.

20. *hornartig* (corneus), was ästig hart und fleischig ist.

Das fadenförmige Laub hat Acharius *Lorolum* genannt und will es vom Laube unterscheiden, als es lässt sich davon gar nicht trennen.

(Der Ausdruck thallus von Acharius für die Lichenen erfunden, ist sehr passend für alle Theile, welche dadurch, dass sie neue Theile treiben, die Pflanze vergrössern und vermehren. So lässt sich nicht allein auf die Lichenen, sondern auch auf den flockigen Theil der Pilze, welcher zur Vermehrung dient, auf die Algen und Lebermoose anwenden. Die Beschränkung eines Kunstworts auf eine natürliche Ordnung ist nicht gestattet und von dem V. selbst in Rücksicht auf surculus verworfen worden. L.)

48. *Stützen* (Fulcra), unter diesem Namen versteht man die Theile, welche von dem Stengel, den Blättern, der Wurzel und der Blume sich unterscheiden, aber zur Aufrechthaltung, Bedeckung, Vertheilung

oder zu andern Zwecken dienen. Es giebt folgende Arten: *Afterblatt* (*Stipula*), *das Oehrchchen* (*auricula*), *Ausschlagsschuppe* (*Ramentum*), *Blatt* (*Bractea*), *Blattscheide* (*Vagina*), *Blattscheide* (*Spatha*), *Tute* (*Ochrea*), *Schlauch* (*Ascidium*), *Blase* (*Ampulla*), *Blatthütchen* (*Ligula*), (*Involucrum*), *Wulst* (*Volva*), *Ring* (*Anulus*), *Hut* (*Pileus*), *Ueberzug* (*Hymenium*), *Stiel* (*Cyphella*), *Umschlag* (*Peridium*), (*Indusium*), *Ranke* (*Cirrhus*), *Knospe* (*Gemma*), *der Becher* (*Cyathus*), *Fortsatz* (*Prophyll*), *der Staubfortsatz* (*Propagulum*), *der Staubbeutel* (*Soredium*), *Knoten* (*Gongylus*), *das Kissen* (*Calvinulus*), *Drüse* (*Glandula*), *Dorn* (*Spina*), *Stachel* (*Aculeus*), *Granne* (*Arista*), *Haar* (*Hair*).

Unter sind sehr verschiedene Theile zusammengestellt. Zuerst *gemma*, welche mit Zwiebel und Stiel allein steht. Dann veränderte Aeste, *cirrhus* und *spina*. Ferner blattartige Theile und veränderte Blätter, *stipula*, *auricula*, *bractea*, *vagina*, *spatha*, *ochrea*, *ascidium*, *ampulla*, *ligula*, *involucrum*. Dann Anhängsel der Pflanze und Bedeckung, *Glandula*, *Pilus*, *Aculeus*. Endlich die übrigen zu der Fructification der Kryptophyten gehörigen Theile. L.)

1. *Afterblätter* (*Stipulae*), sind kleine Blätter, die sich am Stengel in der Gegend des Blattstiels bilden. Sie sind bisweilen von ganz andrer Gestalt, als am Stengel befindlichen, bisweilen aber auch gleich, als dem Standort und der Grösse von ihnen abhängen.

sind dadurch sehr unterschieden, dass sie sich nicht dem Blatte entwickeln. Der Name *Afterblatt* ist übrigens unbequem und *Nebenblatt* wäre sehr passend gewesen, wenn der V. das Wort nicht auf

Bractea angewendet hätte. Afterblatt (*Hinterblatt*) schickt sich sehr gut für Bractea, so dass es zweckmässig sein würde, die Benennungen zu vertauschen. L.)

Man kann sie füglich so unterscheiden:

1. *gepaarte* (*geminae*), wenn zwei gegenüber sind, die aber allezeit gegenüber stehn.

(Sie stehen zu beiden Seiten des Blattstiels, genommen nie gegenüber, sondern sind later und auch der V. führt dieselben Figuren hier dort an. L.) Fig. 27. 30. 32.

2. *einzelne* (*solitariae*), wenn nur im Winkel des Blattstiels ein Afterblatt steht.

(Im Winkel des Blattes stehen sie nie, sondern einzelne *Stipula* befindet sich nur an einer Seite.

3. *an den Seiten* (*laterales*), wenn sie am Ursprung des Blattstiels stehn. Fig. 27. 30. 32.

4. *unter dem Blattstiel* (*extrafoliaceae*), wenn sie etwas unter dem Ursprunge des Blattstiels stehen.

5. *über dem Blattstiel* (*intrafoliaceae*), wenn sie etwas über dem Ursprunge des Blattstiels stehen.

6. *dem Blattstiel gegenüber* (*oppositifoliae*), wenn bei wechselseitigen Blättern diese Afterblätter zwar in der Gegend des Ursprungs des Blattstiels aber auf der andern Seite des Stengels stehn.

(Der Verf. hat bei Nr. 4—6. keine Beispiele angeführt; die Kunstaussdrücke gehören auch nicht her. L.)

7. *hinfällig* (*caducae*), wenn sie gleich nach ihrer Entwicklung abfallen. *Corylus Avellana*.

8. *abfallend* (*deciduae*), wenn sie kurz vor dem Abfallen oder eine ganze Zeit nach ihrer Entstehung abfallen. *Alnus glutinosa*.

9. *bleibend* (*persistentes*), wenn sie mit den Blättern zugleich, oder nach ihnen abfallen oder wenn in ihrer Gestalt sind die Afterblätter sehr verschieden.

den, und es gilt beinahe alles bei ihnen, was von den einzelnen Blättern in Rücksicht des Umfangs, der Spitze, der Basis, des Randes und der Flächen gesagt ist. Gewöhnlich sind sie *sitzend* (*sessiles*), seltener *zusammengewachsen* (*connatae*), und noch seltener *gestielt* (*petiolatae* s. *pedicellatae*). Oeftern haben sie einen dunkelbraunen Fleck, z. B. *Vicia sativa*, und dann heissen sie *brandige* (*sphaecelatae*.)

Bei verschiedenen *Jungermannia* Arten, die zweizeilige Blätter haben, steht das Afterblatt einzeln in der Mitte des Stengels und zwar auf der unteren Seite. Nach Ehrhart heisst es *Amphigastrium*, z. B. *Jungermannia tamariscifolia*.

Das *Oehrchen* (*Auricula*), findet sich auch bei den *Jungermannien* mit zweizeiligen Blättern. Niemals ist eins vorhanden, sondern immer zwei die gegeneinander überstehen. Es ist ein kleines in den Blättern sich findendes Blättchen.

50. Die *Ausschlagsschuppe* (*Ramentum*), ist ein kleines, öfters sogar borstenförmiges Blättchen, das länglich, dünne, und häutig ist; bald wie die Afterblätter in den Winkeln des Blattstiels, bald aber auch ohne Ordnung am Stengel zerstreut steht. Es zeigt sich fast bei allen Bäumen, wenn sie ausschlagen und fällt sogleich ab. An den Eichen (Fig. 289.) steht es wie die Afterblätter, zerstreut sieht man es bei *Pinus sylvestris*.

Wenn der Stengel einer Pflanze mit feinen trocknen Schuppen bedeckt ist, die das Ansehn der Ausschlagsschuppen haben, so sagt man wohl ein *ausschlagsschuppiger Stengel* (*caulis ramentaceus* §. 18. Nr. 55.)

(*Ramentum*, *Blattanhang*, heisst jeder blattartige Theil, der doch nicht Blatt ist, z. B. *Erica ramentacea*. Aber die Theile, welche der V. bezeichnet, als beim Ausschlagen zugegen und nachher abfallend, heissen besser *tegmina*, *Deckschuppen*, und sind von verschiedener Gestalt, oft rund,

dick und lederartig, Sie umgeben die Knospe vor dem Ausbrechen und fallen ab, früher oder später, wenn die Knospe sich zu entwickeln anfängt oder entwickelt hat. L.)

51. *Nebenblätter* (Bracteae), sind Blätter, die bei oder zwischen den Blumen stehn, und sehr oft eine von den andern Blättern verschiedene Gestalt und Farbe haben. Fig. 33. 34. Sie unterscheiden sich in ihrer Dauer wie die Afterblätter, und zeigen sich häufig, abfallend oder bleibend. Ein schönes Beispiel vom Nebenblatte giebt die Linde, *Tilia europaea*. Zeigen sich aber bei einer Menge von Blumen über demselben mehrere Blätter: so nennt man dies einen *Schopf* (Coma). Beispiele davon sind; *Fritillaria imperialis*, *Bromelia Ananas* u. m. a.

(Der Ausdruck Nebenblatt würde sich besser für stipula, Afterblatt für bractea passen, doch ist der Sprachgebrauch nicht ganz einstimmig. S. §. 49. L.)

52. Die *Blattscheide* (Vagina), ist die Fortsetzung eines Blatts, die sich rund um den Stengel beugt, und dadurch eine Röhre bildet, an deren Oefnung das Blatt befestigt ist, z. B. alle Gräser. Wenn diese Scheide sehr kurz ist und oben nichts Merkwürdiges zeigt, so nennt man sie ein *scheidenartig Blatt* (*folium vaginatum*). Die Blattscheide wird noch besonders nach ihrer Fläche (§. 6.) beschrieben.

(Oft fehlt das Blatt und die vagina ist allein da, z. B. an dem untern Theile des Stammes von *Convallaria* u. s. w. Dies scheint auch der Fall an *Asparagus*, wo die Scheide (*stipula extrafoliacea* nach Linné) die büschelförmig stehenden Blätter umgiebt, welche aber veränderte Blütenstiele scheinen. Die Scheiden um die büschlichten Blätter der Tannen, *Pinus sylvestris*, *Strobus* u. s. w. gehören zu den Deckblättern (*tegmina*). L.)

53. Die *Blumenscheide* (Spatha), ist ein läng-

Äches Blatt, was mit seiner Basis den Stengel umfaßt, und den Blumen, ehe sie sich entwickeln, zur Bedeckung dient, nach der Entwicklung aber bald mehr, bald weniger von ihnen entfernt ist. Sie ist allen Palmen, den meisten Lilien und Arumarten gemein.

(Sie umschliesst die Blüthen in der Jugend, Bracteen bedecken sie bloss. L.)

Es giebt folgende Arten:

1. **einklappig** (univalvis), die nur aus einem Blatte besteht, z. B. *Arum maculatum*. Fig. 41.

2. **zweinklappig** (bivalvis), wenn zwei Blätter gegeneinander über stehn, z. B. *Stratiotes aloides*.

3. **zerstreut** (vaga), wenn sowohl eine grosse allgemeine Scheide, als noch für einzelne Zertheilungen der Blumenstengel und für einzelne Blumen besondere Scheiden sind,

4. **halbbedeckt** (dimidiata), eben das was einklappig ist, wenn nur auf einer Seite die Blumen bedeckt werden.

5. **einblumig**, **zweiblumig** u. s. w. **vielblumig** (uni-, bi-, multiflora), wenn sie nemlich eine oder mehrere Blumen einschliesst.

6. **verwelkend** (marcescens), wenn sie beim Aufblühen oder kurz vor demselben verwelkt.

7. **bleibend** (persistens), wenn sie bis zur Reife der Frucht bleibt,

54. Die **Tute** (Ochrea), ist ein blattförmiger Körper, der die Aeste der Blumenstiele, bei einigen Gräsern, und den Stengel in den Blattwinkeln bei der Gattung *Polygonum*, in Gestalt einer walzenförmigen Scheide umgiebt. Man sieht dieselbe besonders bei

der Gattung *Cyperus*. Fig. 291. Der Rand derselb ist verschieden, und giebt folgende Arten:

1. *abgestutzt* (*truncata*), wenn der Rand glatt ist, als wäre er abgeschnitten.

2. *schief* (*obliqua*), wenn der Rand auf ein Seite etwas verlängert ist.

3. *blütrig* (*foliacea*), wenn die Tute sich in kurzes linien- oder pfriemförmiges Blatt endigt.

Nach der Fläche wird sie bestimmt, s. §. 6.

(Die Tute ist eine Art der Blattscheide, und verschiedener Art. Die Tute der Gräser und Cyroiden ersetzt eigentlich die Deckblätter (tegmina) der Knospen. Die Tute der Polygoneen aber eine Fortsetzung oder ein Anhang der Blattscheide nach oben. L.)

55. Der *Schlauch* (*Ascidium*), ist ein besonderer blattartiger Körper, der cylinderartig und hohl ist, und öfters an seiner Oefnung mit einem vollständigen Deckel versehen ist, der sich von Zeit zu Zeit öffnet. Dergleichen Schlauch enthält gewöhnlich reines Wasser. Entweder ist er *sitzend* (*sessile*), oder *gestielt* (*petiolatum*), und befindet sich an der Spitze eines Blatts. Das letztere zeigt sich bei *Nepenthes destillatoria* Fig. 28., das erstere bei *Sarracenia*.

Bei zwei Pflanzengattungen, nemlich: *Ascium* und *Ruyschia*, finden sich Nebenblätter, die das Ansehen eines Schlauchs haben und daher *schlauchartige Nebenblätter* (*Bracteae ascidiformes*) genannt werden. Fig. 117. 121. Auch bei der Gattung *Marcgravia* finden sich dergleichen Nebenblätter.

(Der Schlauch ist ein anders geformtes Blatt, was man an den Pflanzen, welche einen Schlauch haben, Blatt nennt, ist ein blattartiger ausgedelelter Blattstiel. Eben so sind die Bracteen Schläuche verwandelt. L.)

56. Die *Blase* (*Ampulla*), ist ein runder, hohler, geschlossener Körper, der sich an der Wurzel oder an den Blättern einiger Wassergewächse, z. B. *Utricularia*, *Aldrovanda*, findet. Fig. 258. Bei den Gewächsen des Meeres, z. B. *Fucus*, hat diese Blase zuweilen eine besondere Form, und vormalig glaubte man sogar, dass sie die Frucht derselben sei.

(In dem letztern Falle ist sie nur eine Anschwellung des Laubes, in den erstern Fällen ist sie ein entstelltes Blatt, wie man an einigen ausländischen Arten von *Utricularia* deutlich sieht. Diese Blasen sitzen nur an Blattstielen, die aber oft, weil sie sehr zertheilt sind, das Ansehn von Wurzeln haben. Die Blasen der Tangarten sind sehr verschieden. L.)

57. Das *Blatthäutchen* (*Ligula*), ist ein häutiges kleines durchsichtiges Blättchen, was am Rande der Scheide und an der Basis des Blatts sitzt. Sie ist allein den Gräsern eigen. Fig. 26. Es giebt folgende Arten:

1. *ganz* (*integra*), das keine Einschnitte hat.
2. *gespalten* (*bifida*), das an der Spitze getheilt ist.
3. *zerschlitzt* (*lacerata*), das irregulär am Rande zerrissen ist.
4. *umprig* (*ciliata*), das am Rande mit weit auseinander stehenden kurzen Haaren besetzt ist.
5. *abgestutzt* (*truncata*), das oben abgestutzt ist.
6. *spitzig* (*acuta*), das eine kurze Spitze hat.
7. *langgespitzt* (*acuminata*), das eine lange vorstehende Spitze hat.
8. *sehr kurz* (*decurrens*), das kaum zu sehen ist, und innerhalb der Scheide herunterläuft.

58. Die *Hülle* (*Involucrum*), wenn mehrere Blätter sich durch ihre Gestalt unterscheiden, eine

oder mehrere Blumen umgeben und sie vor der Entwicklung einschliessen. Vorzüglich ist die Hülle den Dolden (§. 36.) eigen.

(Involucrum nennen wir Bracteen, welche in einem Kreise oder Halbkreise um die Blüthen stehen und sich dadurch den Blüthentheilen in der Stellung nähern. L.)

Man hat verschiedene Arten festgesetzt, als:

1. *allgemeins* (universale), die alle Blumenstiele einschliesst. Fig. 36.
2. *besondere* (partiale), die kleine Blumenbüschel enthält. Fig. 36.
3. *halb* (dimidiatum), die nur den Stengel zur Hälfte umgiebt.
4. *abhängend* (dependens), wenn alle Blättchen niederhängen, z. B. *Aethusa Cynapium*.
5. *zwei- drei- vier- oder vielblüttrig* (di- tri- tetra-polyphyllum), die aus einzelnen oder mehreren Blättern besteht.

Die Hülle hat bisweilen das Ansehn eines Kelchs (§. 80.), und dann heisst sie kelchförmig (calyciforme), wie bei *Hepatica triloba*. Der Blumenstiel (§. 26.) ist bei einigen Arten dieser Gattung, z. B. *Anemone pratensis* etc. mit einer Hülle umgeben und heisst dann ein gehüllter Blumenstiel (pedunculus involucratus).

59. Die *Pilze* (Fungi), weichen in ihrer äussern Gestalt so sehr von den übrigen Gewächsen ab, dass man ihre Theile mit nichts vergleichen kann, daher wohl hier der schicklichste Ort sein wird, von ihren Theilen zu sprechen. Die zuerst auffallenden sind: die *Wulst*, der *Ring*, und der *Hut*.

Die *Wulst* (Volva), ist eine dicke meistens fleischige Haut, die den Strunk des Pilzes bei seiner Entstehung umgiebt, und wenn er ausgewachsen ist,

nicht über der Erde bleibt. Man hielt sie sonst für einen Theil der Blume, allein dahin ist sie gar nicht zu zählen. Sie ist entweder bei ihrer Entstehung am Rande des Huts angewachsen oder am Strunke anschliessend. Bei der völligen Entwicklung giebt sie sich von beiden Theilen los und bleibt an der Basis des Strunks. Sie ist entweder:

1. ganz (*integra*), wenn sie beim Entwickeln nicht zerreisst.

(Eine solche giebt es nicht. Man kann eine Scheide (besser als Wulst) so nennen, wenn sie den ganzen Pilz einschliesst, zum Unterschiede von *partialis*, welche nur den Stiel oder dergleichen einschliesst. L.)

2. *geschlitzt* (*lacera*), wenn sie unregelmässig zerfällt.

3. *schimmelartig* (*byssacea*), wenn sie aus feinen zarten Fasern besteht.

4. *gallertartig* (*gelatinosa*), wenn sie mit Gallerte gefüllt ist, z. B. *Phallus impudicus*. Fig. 311.

(Der Ausdruck *volva* scheint ganz entbehrlich, da ein ähnlicher Theil in andern Fällen *peridium externum* genannt wird. L.)

60. Der *Ring* (*Annulus*), ist eine dünne Haut, die am Strunke festhängt und ihn ringförmig umgiebt. Bei dem Entstehn der Pilze hängt diese Haut mit dem Hute zusammen, nachher aber trennt sie sich. Es giebt folgende Arten:

1. *aufrecht* (*erectus*), wenn der Ring unten festgewachsen, oben aber frei ist. Fig. 4.

2. *umgekehrt* (*inversus*), wenn der Ring oben festgewachsen, unten aber frei ist, so dass er glockenförmig herunterhängt, z. B. *Agaricus Mappa*.

3. *sitzend* (*sessilis*), wenn er, wie bei den angezeigten Arten, auf irgend einer Seite fest sitzt.

4. *beweglich* (*mobilis*), wenn sich der Ring auf und nieder schieben lässt, z. B. *Agaricus antiquatus*.

5. *bleibend* (*persistens*), wenn er, so lange die Dauer des Pilzes ist, auch immer bemerkt wird.

6. *verschwindend* (*fugax*), wenn bei der völligen Entwicklung des Pilzes der Ring gänzlich verschwindet.

7. *spinnwebentartig* (*arachnoidens*), wenn der Ring ganz aus dem feinsten weissen Gewebe zusammenge setzt ist. Dergleichen Ringe verschwinden sehr oft.

Der Ring ist eigentlich eine Verlängerung der Haut des Huts, und es gehört weiter nichts dazu, dass diese Haut zum Ringe wird, als dass sie sich regelmässig vom ganzen Rande des Huts trennt. Bei einigen Pilzen aber reissst sie nicht vom Rande des Huts los, sondern trennt sich vom Strunk und bleibt in kurzen oder langen Fetzen nach der Beschaffenheit der Art am Hutrande sitzen, das heisst sie die Manschette (*cortina*). (Vielleicht besser Anhang, Anhängsel. L.)

61. Der *Hut* (*Pileus*), heisst der oberste meistentheils tellerförmige Körper, den gewöhnlich der Strunk des Pilzes trägt. In diesem sind die Werkzeuge der Begattung enthalten.

(Der Hut ist eine Art von *sporidochium* und der letzte Ausdruck kann oft anstatt des ersten genommen werden. L.)

Es giebt folgende Arten:

1. *flach* (*planus*), der ganz flach und gleichförmig ausgebreitet ist. Fig. 223. 224. 225.

2. *rund* (*convexus*), der oben gewölbt ist.

3. *hohl* (*concavus*), der oben vertieft ist. Fig. 6.

4. *nablich* (*umbonatus*), der in der Mitte einen Nabel hat. Fig. 4.

5. *glockenförmig* (*campanulatus*), der oben sehr

gewölbt ist, und auf beiden Seiten weit, glockenartig heruntergeht, z. B. *Agaricus fimetarius*.

6. *klebrig* (*viscidus*), dessen Oberfläche mit einer klebrigen Feuchtigkeit bedeckt ist.

7. *schuppig* (*squamosus*), der oben mit vielen anliegenden Schuppen von anderer Farbe besetzt ist, z. B. *Amanita muscaria*.

8. *sparrig* (*squarrosus*), dessen Schuppen auf der Oberfläche abstehn. Fig. 4.

9. *halber* (*dimidiatus*), wenn er nur halb tellerförmig ist und auf der einen Seite wie abgeschnitten aussieht, z. B. *Hydnum Auriscalpium*.

10. *gestrunkt* (*stipitatus*), wenn er vom Strunk getragen wird. (§. 21.)

11. *sitzend* (*sessilis* s. *acaulis*), der ohne Strunk ist und festsitzt.

12. *eiförmig* (*ovatus*), der sich nicht ausbreitet, sondern eine fast eiförmige Gestalt annimmt, z. B. *Phallus impudicus*. Fig. 311.

13. *keulförmig* (*clavatus*), der eine Masse mit dem Strunke auszumachen scheint, aber die Gestalt einer Keule hat, z. B. *Clavaria*.

14. *durchlöchert* (*perforatus*), der an der Spitze mit einem Loche versehen ist, z. B. *Phallus impudicus*. Fig. 311.

15. *gefalten* (*plicatus*), wenn der Hut eine eiförmige Gestalt hat, seine Oberfläche aber in unregelmässige Falten sich legt, z. B. *Morchella*.

Die oberste Spitze des Huts heisst:

Der *Nabel* (*Umbo*), dieser ist bald mehr, bald weniger vorgezogen, zuweilen sogar vertieft oder auch wohl vertieft und im Mittelpunkt mit einer kleinen Erhabenheit versehen. Die Unterfläche des Huts ent-

hält die Samen in der fleischigen Substanz und mit einer Haut bedeckt, welche der *Ueberzug* (*Hymenium*) genannt wird. (Die Samen befinden sich nicht in der fleischigen Substanz, sondern in länglichen Schläuchen, welche zusammengestellt den Ueberzug (*hymenium*) bilden. L.) Als Theile derselben werden angesehen:

1. Das *Plättchen* (*Lamella*), so nennt man die dünnen blätterartigen Hervorragungen auf der Unterseite des Pilzes. Sie enthalten die Samenkapseln, und sind den *Agaricis* eigen. (Sie sind mit dem *Hymenium* überzogen. L.) Fig. 225. Davon giebt es folgende Arten:

a) *gleichlange* (*aequales*), wenn alle Plättchen vom Strunke bis an den Rand fortgehen.

b) *ungleiche* (*inaequales* s. *interruptae*), wenn einige nur vom Strunke bis zum Rande, andre entweder vom Rande oder vom Strunke nur halb so weit gehen.

Man theilt diese Ungleichheit der Plättchen ab:

a) *zweireihige* (*biseriales*), wenn ein lang und kurzes Plättchen mit einander abwechseln.

b) *dreireihige* (*triseriales*), wenn zwei kurze Plättchen zwischen den langen stehn.

c) *ästige* (*ramosae*), wenn sich mehrere Plättchen in eins vereinigen, z. B. *Merulius*.

d) *herablaufende* (*decurrentes*), wenn die Plättchen am Strunke heruntergehen.

e) *adrig* (*venosae*), wenn die Plättchen so klein sind, dass sie nur erhabene Adern zu sein scheinen z. B. *Merulius Chantarellus*.

f) *verworren* (*daedaleae*), wenn die Plättchen durch Querwände unregelmässig verbunden sind.

2. Die *Löcher* (Pori), wenn auf der Unterfläche des Huts ganz kleine Vertiefungen, wie mit einer Nadel eingestochen, sich finden. Fig. 223. Diese haben allein die Boleti.

(Die Löcher werden durch besondere röhrenförmige, zusammengewachsene Theile gebildet, welche sich oft vom Hute absondern lassen. In ihnen befinden sich die Schläuche mit den Samen. L.)

Arten davon sind:

a) *gleiche* (aequales), die alle von gleicher Grösse sind.

b) *ungleiche* (inaequales), wenn grössere zwischen kleinern gemischt sind.

c) *runde* (rotundi), die eine runde Gestalt haben.

d) *eckige* (angulati), die sich eckig zeigen.

e) *zusammenfliessende* (confluentes), wenn sie in grosse Löcher sich verlaufen.

f) *wabenförmige* (favosi), wenn sie sehr gross sind und das Ansehn einer Honigwabe haben.

g) *unscheinbare* (impalpabiles), wenn sie so klein sind, dass man sie mit blossen Augen kaum bemerken kann.

(Ein nicht passender Ausdruck; besser minuti, minutissimi. L.)

3. Die *Stacheln* (Echini s. Aculei), heissen erhabene hervorragende Spitzen, in diesen sind, wie in den Löchern, die Befruchtungstheile (Samenschläuche L.) enthalten. Sie sind allein dem Hydno eigen. Fig. 224. Es giebt folgende Arten:

a) *pfeifenförmig* (subulatus), der rund ist und sich nach der Spitze zu allmählig verdünnt.

b) *spitz* (acutus), der am Ende in eine Ecke sich verläuft.

c) *stumpf* (obtusus), der am Ende abgerundet ist.

d) *lanzettförmig* (*lanceolatus*), der unten b und allmählig nach oben hin schmaler wird.

e) *zusammengedrückt* (*compressus*), der auf den Seiten platt gedrückt ist.

f) *getheilt* (*divisus*), der mehrmalen gespalten

4. Die *Warzen* (*Papillae*), heissen kleine ru Erhabenheiten, die sich auf der Unterfläche zeig und auch Befruchtungstheile enthalten.

Einige Pilze haben ein ganz verschiedenes sehn, ihnen fehlt der Hut oder sie sind o Strunk von fremdartiger Gestalt. Man muss her ihre Gestalt beschreiben, ob sie *kugelförmig* (*globosus*), Fig. 7., *becherförmig* (*cyathiformis* s. *scyphiformis*), Fig. 284. u. s. w. s Bei den keulenförmigen und ästigen Pilzen ne man die Fläche, worin die Samen stecken, *Hymenium*. Bei andern Pilzen findet sich der Hut weilen kopfförmig, z. B. *Phallus* und *Morchella* alsdann deckt der Ueberzug (*Hymenium*) den ganzen Hut.

Der *Ueberzug* (*Hymenium*), ist die Haut, welche die Früchte der Pilze bedeckt und die denjenigen Theil des Huts überzieht, wo diese liegen. Die Poren, Löcher, Stacheln und Warzen, welche oben gehandelt sind, werden von ihr gebildet. Bei Gattungen *Peziza*, *Clavaria*, *Phallus* und *Morchella* überzieht sie den ganzen Hut. Arten sind:

a) *glatt* (*laeve*), die keine Erhabenheiten oder Runzeln hat, z. B. *Clavaria*, *Peziza*.

b) *gefalten* (*plicatum*), welche Runzeln bilden, z. B. *Morchella*.

c) *netzförmig* (*reticulatum*), die erhabene netzförmige Linien macht, z. B. *Phallus*.

(Eigentlich besteht der Ueberzug aus zusammen gewachsenen cylindrischen Schläuchen, worin die Samen befinden. Diese Schlauchhaut lässt sich abziehen. Sie überzieht nur die lamellen)

mbi, aculei; das Innere dieser Theile besteht aus Zellgewebe. S. Fig. 312. L.)

62. Das *Becherchen* (Cyphella), ist eine schildförmige, mit einem erhabenen Rand umgebene kleine Grube, die auf den Unterseiten einiger Lichenen sich findet, z. B. alle Arten *Sticta* des Acharius.

63. Der *Umschlag* (Peridium), ist die dünne, auf verschiedene Art zerreisende Haut einiger *Bauchpilze* (Gasteromyci) §. 152., unter welcher der Same oder ein samentragender Körper liegt; z. B. *Lycopodon*, *Trichia*, *Stemonites*, *Nidularia* u. s. w. Man unterscheidet folgende Arten:

1. *einfach* (simplex), wenn er aus einer einfachen Haut besteht, z. B. *Physarum*, *Nidularia* u. s. w.

2. *doppelt* (duplex), wenn er aus zwei übereinander liegenden Häuten besteht, z. B. *Diderma*.

3. *nicht zerreisend* (non dehiscens), wenn der Umschlag niemals zerreißt.

4. *zerreisend* (dehiscens), der in Stücken zerplatzt.

5. *unregelmässig zerreisend* (irregulariter dehiscens), der auf verschiedene Art und in ungleichen Stücken zerreißt, z. B. *Nidularia*, *Trichia*.

(*Nidularia* hat ein offenes peridium. L.)

6. *kreisförmig zerreisend* (circumscissum), der rundum zerreißt, so dass der obere Theil wie ein Deckel sich vom untern trennt, z. B. *Arcyria*. Fig. 301. 302.

(Ein besseres Beispiel giebt *Licea circumscissa*. L.)

7. *der Länge nach sich spaltend* (longitudinaliter fissum), der von der Spitze bis zur Basis strichförmig zerreißt, z. B. *Dictydium*.

(Das Beispiel passt nicht, auch ist keines der Art bekannt. L.)

8. *zahnförmig zerreissend* (dentato-dehiscens), wenn der obere Theil zerplatzt und der Rand gesägt erscheint, z. B. *Aecidium*.

(Das Beispiel passt nicht. Ein besseres giebt *peridium internum* von *Geastrum*. L.)

9. *netzförmig* (reticulatum), wenn der Umschlag fein durchlöchert ist und das Ansehen eines Netzes hat, z. B. *Dictydium*.

10. *sternförmig* (stellatum), wenn sie von der Spitze aus bis über die Hälfte zerreisst und nach allen Seiten sternartig ausbreitet, z. B. *Geastrum*. Fig. 7.

(Nämlich das *peridium externum*. L.)

64. Die *Decke* (Indusium), ist eine zarte Haut, welche die Häufchen (§. 43.) der Farnkräuter umgiebt, und bei der Reife der Samenkapseln zerreisst. Die Arten sind:

1. *flach* (planum), wenn die dünne Haut ganz flach die Kapseln bedeckt.

2. *schildförmig* (peltatum), wenn diese dünne Haut zirkelförmig ist, und unten in der Mitte durch einen kleinen Faden an den Kapseln befestigt ist.

3. *sackförmig* (corniculatum), wenn diese dünne Haut ganz cylinderförmig und hohl ist, dass sie innerhalb Blumen und Samen einschliesst, z. B. bei *Equisetum*. Fig. 11. sind dergleichen hornartige oder sackförmige Decken zu sehn.

4. *becherförmig* (urceolatum), die das Ansehen eines fast walzenförmigen Bechers hat, z. B. *Trichomanes*.

5. *zweiklappig* (bivalve), die in zweien Klappen

sich theilt und die Gestalt des vorigen hat, z. B. Hymenophyllum.

6. *schuppenförmig* (squamiforme), die das Aussehen einer Schuppe hat.

7. *fortlaufend* (continuum), die längs einem langen Häufchen ununterbrochen fortgeht, z. B. Pteris, Moenchium. Fig. 293.

8. *oberflächlich* (superficiarium), die von der Oberhaut des Blatts entsteht, z. B. Scolopendrium.

9. *randständig* (marginale), die von der Haut des Randes des Blatts entsteht, z. B. Adiantum. Fig. 293.

10. *von aussen aufspringend* (exterius dehiscens), die nach dem Rande des Blatts hin sich ablösen, z. B. Asplenium.

11. *nach innen aufspringend* (interius dehiscens), die nach der Mittelrippe hin aufspringt, z. B. Adiantum.

12. *einfach* (simplex), eine einzelne Decke, welche die Häufchen bedeckt, z. B. Pteris, Asplenium, Adiantum.

13. *doppelt* (duplex), wenn an jeder Seite des Häufchens eine Decke festsetzt, z. B. Lindsaea, Scolopendrium, Dicksonia. Fig. 39.

14. *verwachsen* (connatum), wenn sie die Früchte ganz dicht umschliesst und sich nicht öffnet, z. B. Onoclea sensibilis.

65. Die *Ranke* (Cirrhus), ist ein fadenförmiger Körper, der zur Befestigung der Pflanze dient. Rankende Gewächse (Vegetabilia scandentia) haben dergleichen. Die Ranken pflegen öfters spiralförmig gedreht zu sein, z. B. Vitis vinifera. Fig. 27. Die Arten derselben sind:

1. *achselsündig* (axillaris), die aus dem Winkel der Blätter entspringen. Fig. 27.

2. *blattständig* (foliaris), die an der Spitze der Blätter entspringen, z. B. *Gloriosa superba*, *Flagellaria indica*.

3. *blattstielständig* (petiolaris), wenn die Ranke an der Spitze eines gemeinschaftlichen Blattstiels oder einem zusammengesetzten Blatte entsteht, z. B. *Vitis*.

4. *blumenstielständig* (peduncularis), wenn an dem Blumenstiel eine Ranke entsteht.

5. *einfach* (simplex), die nicht zertheilt ist.

6. *zwei- drei- mehrästig* (bi- tri- multifidus), wenn die Ranke in zwei oder mehrere Theile zertheilt ist.

7. *umgedreht* (convolutus), wenn die Ranke regelmässig gewunden ist.

8. *zurückgedreht* (revolutus), wenn die Ranke bald auf diese, bald auf jene Seite, also unregelmässig gewunden ist.

Wenn ein einfaches Blatt eine Ranke an der Spitze hat, so heisst es ein *rankiges Blatt* (folium cincinnosum), z. B. *Gloriosa superba*, *Flagellaria indica* Nr. 2. Hat ein gefiedertes Blatt an der Spitze eine Ranke, wie die meisten Wicken, so heisst es ein *gefiedert-rankiges Blatt* (folium pinnatum cirrhosum). Nr. 3.

(Die Ranke ist in manchen Fällen ein verändertes Aar (*Vitis*), oder auch ein verändertes Nebenblatt (*stipula*) einige Cucurbitaceae, oder ein verlängelter und gedrehter Blattstiel, Nr. 2. 3. Anm. oder ein gedrehter Blütenstiel, Nr. 4. L.)

66. Die *Knospe* (Gemma), ist derjenige Theil eines Gewächses, welcher den Entwurf zum weiteren Wachsthum desselben enthält. Nicht alle Gewächse sind damit versehen, nur diejenigen, welche in kalten Himmelsstrichen wachsen, haben dergleichen.

sind 1. *bloss blätterbringend* (foliiferae), 2. *blätter- und blumenbringend in verschiedenen Knospen* (foliiferae et floriferae distinctae), 3. *Blätter und weibliche Blumen tragend* (foliiferae et floriferae femineae), 4. *Blätter und männliche Blumen bringend* (foliiferae et floriferae masculae), 5. *Blätter und Zwitterblumen bringend* (foliiferae et floriferae hermaphroditae), 6. *Blätter und Blumen bringend zugleich* (foliifero-floriferae). Wenn die Knospen austreiben und Blätter bringen, dies nennt man *das Ausschlagen* (Foliatio). Es geschieht bei den Knospen durch das Abfallen der äusseren Hüllen, die aus kleinen übereinander liegenden Schuppen bestehen. Bei den Gewächsen, die keine Knospen haben, geschieht das Ausschlagen gerade aus der Rinde (keinesweges L.) An jeder Pflanze sind die kleinen Blättchen beim Ausschlagen verschieden in einander gelegt. Wenn man dergleichen austreibende Knospen horizontal durchschneidet, zeigen sich folgende Verschiedenheiten:

1. *engerollt* (involuta), wenn die Seiten der Blätter nach innen gewickelt sind, z. B. Humulus Lupulus. Fig. 251. 259. 260.

2. *zurückgerollt* (revoluta), wenn die Seiten der Blätter nach aussen gerollt sind, z. B. Salix. Fig. 262. 272.

3. *zwischenengerollt* (obvoluta), wenn zwei hohl liegende Blätter, ohne aufgerollt zu sein, in einander greifen, z. B. Salvia officinalis. Fig. 256.

(Der Ausdruck ist zwar linnéisch, aber nicht passend. Besser complexantes, umfassend. L.)

4. *tutenförmig* (convoluta), wenn die Blätter ganz schellenförmig gedreht sind, z. B. Prunus domestica, Armeniaca. Fig. 250. 258.

5. *reitend* (equitans), wenn viele parallel (über einander L.) liegende Blätter etwas hohl (einmal zusammengefaltet sind. L.) zusammenliegen, z. B. *Prunella vulgaris*, Fig. 254. 255. 263. 264.

6. *doppeltliegend* (conduplicata), wenn die Blätter einmal zusammenliegen (einmal zusammengefaltet sind. L.) z. B. *Fagus sylvatica*, Fig. 253.

7. *gefaltet* (plicata), wenn die Blätter regelmäßig gefaltet sind, z. B. *Betula alba*, Fig. 257.

8. *niedergebogen* (reclinata), wenn die Spitzen der jungen Blätter herunterhängen, z. B. *Arum*, *Aspidium*.

9. *schneckenförmig* (circinata), wenn der junge Wedel von der Spitze nach der Basis zu aufgerollt ist, so dass die äussere Seite innerhalb, und die innere aussenher kommt, z. B. alle Farrnkräuter, Fig. 258.

Wenn die Blätter gegenüber stehn, so ist öfters die Figur doppelt, z. B. Fig. 258. 259. 260. 262.

In Rücksicht der Form ist die Knospe noch sehr verschieden, doch lassen sich die Arten derselben sehr leicht unterscheiden, nur folgende Arten verdienen noch bemerkt zu werden:

1. *einfach* (simplex), wenn die Knospe einzeln steht, z. B. die meisten Bäume und Sträucher.

2. *angehängt* (aggregata), wenn mehrere auf einem Fleck beisammen gestellt sind, z. B. *Zanthoxylon fraxineum*.

3. *sitzend* (sessilis), wenn sie dicht auf dem Zweige oder Stengel befestigt ist, z. B. die meisten Sträucher und Bäume.

4. *gestielt* (pedicellata), wenn sie von einem kurzen Stiel unterstützt ist, z. B. *Alnus*.

(Die Bestimmung des V. ist für das, was er meint, zu weit, Wohl aber mag sie bleiben, nur muss

man den besondern Knospen, wovon der V. redet, einen besondern Namen geben, etwa Augenknospen (*gemmae*), die Knospen überhaupt *gemmulae*. Die Augenknospen unterscheiden sich durch die Deckschuppen und dadurch, dass sie schon in dem Jahre vor dem Ausschlagen erscheinen. Sie sind frei (*liberae*) wie gewöhnlich, oder vom Blattstiel eingeschlossen (*inclusae*), z. B. an *Ptelea trifoliata*. L.)

67. Der *Becher* (*Cyathus*), ist eine becherförmig gestaltete Haut, die sich auf dem Wedel der Gattung *Marchantia* findet und in welcher sich Fortsätze (§. 68.) erzeugen. (S. d. folg. §. L.)

68. Der *Fortsatz* (*Propago*), ist ein runder oder länglicher Körper, der von der Mutterpflanze abfällt und zu einer neuen Pflanze wird. Dergleichen haben die Moose. Linné hielt dies für Samen. Bei den Lebermoosen ist dieser Fortsatz kugelförmig.

Bei der Gattung *Lycopodium* hat er das Ansehn von Samenkörnern, und zeigt sich in den Winkeln der Blätter von Blättchen eigener Art umgeben.

(Man gebraucht beide Ausdrücke, sowohl den deutschen, als lateinischen, in dieser Bedeutung nicht mehr, auch gehören die Theile, von welchen der Verf. zu reden scheint, zu den Fruchtheilen. Nur die angeführten Gemmen der Lebermoose verdienen hier eine Stelle und zu ihnen gehört der Becher (*cyathus*). L.)

Der *Staubfortsatz* (*Propagulum*), ist ein kleiner kugelförmiger Körper, der zerstreut oder angelhäuft auf dem Laube der Lichenen vorkommt, und das Ansehn eines mehrlartigen Staubes hat. Wahrscheinlich ist es eine Art des Fortsatzes bei diesen Gewächsen,

(Der Ausdruck (*propagulum*) ist nicht gewöhnlich. Im Deutschen hat man diesen Staub sehr gut Keimpulver genannt. Da der folgende Ausdruck die Anhäufung eines solchen Staubes bedeutet, und

der Fruchtboden, wovon dort geredet wird, ein zufälliger äusserer Theil ist, so mag man diesen Keimpulver (*soredium*) nennen. L.)

Der *Staubhaufen* (*Soredium*), ist ein Haufen des Staubfortsatzes, der gleichsam einen eigenen Fruchtboden hat, worauf er liegt; so dass man, wenn er fortgenommen wird, die Stelle sehr gut erkennen kann, wo er lag. Er findet sich auch bei den Lichenen.

70. Der *Knoten* (*Gongylus*), ist ein runder harter Körper, der nach dem Tode der Mutterpflanze abfällt, und eine neue Pflanze wird. Dergleichen sieht man an den Seeflechten.

(Es ist schwer zu bestimmen, was der V. meint. L.)

71. Das *Kissen* (*Pulvinulus*), besteht aus einem Haufen warzenförmiger, zuweilen einfacher, zuweilen aber auch ästiger Warzen, die sich auf dem Laube einiger Lichenen finden, z. B. *Lecidea pustulata*.

(Die Warzen an *Gyrophora pustulata* sind Erhöhungen des Thallus, denen auf der entgegengesetzten Seite eine Vertiefung entspricht. Sie gehören nicht hieher. Die §§. 68 — 71. sind ganz zu streichen. L.)

72. Die *Drüse* (*Glandula*), ist ein runder Körper, der zur Ausdünstung und Absonderung dient.

(Dass die Drüse zur Ausdünstung diene, kann man nicht sagen. Sie besteht aus Zellen, welche einen besondern Saft absondern und sich dadurch kenntlich machen. Aber nicht immer setzen sie diesen Saft auf der Oberfläche ab, und sehr selten in besondern Höhlen. Theile welche keinen Saft absondern, sollte man Warzen (*verrucae*) nennen. L.)

Die Drüsen sind gewöhnlich auf den Blättern oder Stengeln. Sie sind:

1. *stump* (sessilis), wenn sie flach auf dem Blatte sitzt, z. B. *Cassia marilandica*.

2. *gestielt* (petiolata), wenn die Drüse durch einen kleinen Stiel unterstützt wird, z. B. *Drosera*.

Ihrer besondern Form nach liessen sich noch viele Arten unterscheiden. Hieüber hat Hr. Schrank in seiner Schrift, über die Nebenzufüsse der Pflanzen und deren Nutzen viele treffliche Bemerkungen gemacht.

73. Der *Dorn* (Spina), ist eine stechende Hervorragung, die aus dem Innern der Pflanze entspringt, und sich also nicht mit der Rinde abziehen lässt, z. B. *Prunus spinosa*. Die Arten sind:

1. *am Ende* (terminalis), wenn er an der Spitze eines Zweiges ist.

2. *an der Seite* (axillaria), wenn er an der Seite eines Zweiges ist.

3. *einfach* (simplex), der in eine Spitze ausläuft.

4. *getheilt* (divisa), dessen Spitze getheilt ist.

5. *ästig* (ramosa), der in viele Aeste zertheilt ist.

Die Entstehung des Dorns und des Stachels wird in der Physiologie näher bestimmt.

Der Dorn ist oft nur ein gewöhnlicher Ast, welcher in eine Spitze ausläuft, z. B. *Prunus spinosa*, und dann trägt er Blätter und Blüthen; oft ein besonderer Theil, der an der Seite des Astes entspringt, und in der Jugend zuweilen unentwickelte Blätter zeigt, dass er zum Aste bestimmt war, z. B. *Crataegus Crus Galli*; oder er steht an der Stelle des Blattes und ersetzt dieses, z. B. *Grossularia*, *Berberis*; oder an der Stelle der Nebenblätter (stipula), z. B. *Robinia Pseud-Acacia*. Die Blattstiele und Blüthenstiele gehen zuweilen in Dornen über, z. B. *Tragacantha* und *Bupleurum spinescens* und die Blattnerven laufen am Rande in Dornen aus (fol. spinosum, s. §. 44. Nr. 61.) oder erzeugen auf der Oberfläche Dornen, dorntragend (fol. spinigerum), z. B. mehrere *Solana*, L.)

74. Der *Stachel* (*Aculeus*), ist eine stechende Hervorragung, die aus der Rinde entspringt, und sich mit derselben abziehen lässt, z. B. *Rosa centifolia*. Arten davon sind:

1. *gerade* (*rectus*), wenn er geradeaus steht.
2. *aufwärtsgebogen* (*incurvus*), wenn er nach oben gekrümmt ist.
3. *abwärtsgebogen* (*recurvus*), wenn er nach der Erde zu gekrümmt ist.
4. *aufgerollt* (*circinatus*), wenn er mit seiner Spitze nach innen aufgerollt ist.
5. *einzel* (*solitarius*), wenn er einzeln steht.
6. *doppelt* (*geminatus*), wenn zwei beisammen stehn.
7. *handförmig* (*palmatus*), wenn er bis zur Basis getheilt ist, dass er aus mehreren zusammengesetzt zu sein scheint, z. B. *Berberis vulgaris*.

(Nur an *Rosa* sind mir Stacheln bekannt. Ein Holz-
bündel läuft auch hier in den Stachel, nur breitet
sich dieser an der Basis weit aus und ist dieses
breiten grösstentheils aufgewachsenen Fusses we-
gen leicht zu lösen, auch sind die Spiralgefässe
in ihm verkümmert. Der Unterschied zwischen
Dorn und Stachel scheint mir von keiner Erheb-
lichkeit. L.)

75. Die *Granne* (*Arista*), ist eine fadenförmige Spitze, die an der Blume der Gräser sitzt. Die Arten sind:

1. *nackt* (*nuda*), die ohne Haare ist. Fig. 101. 103.
2. *fedrig* (*plumosa*), die mit feinen weissen Härchen besetzt ist, z. B. *Stipa pennata*.
3. *gerade* (*recta*), die ganz gerade ist. Fig. 101. 103.
4. *gegliedert* (*geniculata*), die in der Mitte ein Gelenke hat, wodurch sie gebogen ist, z. B. *Avena sativa*.

1. *gekrümmt* (*recurvata*), die in einen Bogen nach oben gekrümmt ist.

2. *gebogen* (*tortilis*), die spiral- oder schneckenförmig seitwärts gedreht ist.

3. *spitzenständig* (*terminalis*), die an der Spitze des Balges (§. 82.) befestigt ist.

4. *rückenständig* (*dorsalis*), die unterhalb der Spitze oder in der Mitte des Balges befestigt ist.

Die *Gramma* ist der verlängerte Hauptnerv einer Klappe, welcher aus einem Holzbündel meistens mit verkümmerten Spiralgefäßen und einer Rinde aus Zellgewebe besteht. L.)

76. Das *Haar* (*Pilus*), ist ein feiner fadenförmiger, bald kurzer, bald langer Körper, der zur Auskleidung und Bedeckung der Gewächse dienet. (Das Haar ist ein fadenförmiger, häutiger, hohler Theil einer Pflanze, mit Queerrändern, oder ohne dieselben.

Die verschiedenen Vertheilungen der Haare sind in §. 6. bestimmt worden, aber der Bau oder die Gestalt des einzelnen Haares verdient noch eine genauere Auseinandersetzung. Es sind folgende Arten bekannt:

1. *einfach* (*simplex*), das gar nicht zertheilt ist, und eine gleiche fadenförmige Gestalt hat.

2. *pfriemförmig* (*subulatus*), das kurz, stark und nach unten zu etwas dicker ist, z. B. *Botago officinalis*.

3. *nadelförmig* (*acicularis*), die vorige Art, nur sehr spitz, und dass über der Basis eine Erweiterung ist, z. B. *Urtica*.

4. *zwiebförmig* (*bulbosus*), das sich an der Basis in eine rundliche Masse endigt, z. B. *Centaurea Jacea*.

5. *hakenförmig* (*uncinatus*), das hakenförmig gekrümmt ist, z. B. *Scabiosa Succisa* und verschiedene Gräser.

6. *knotig* (nodosus), das in regelmässigen Zwischenräumen hervorstehende Knoten hat.

7. *gegliedert* (articulatus), das in regelmässige etwas eingezogene Glieder getheilt ist, so dass es fast das Ansehn der Fühlhörner einiger Insekten hat, z. B. *Veronica aphylla*, *Lamium purpureum*, *Sonchus oleraceus*.

8. *gezähnt* (denticulatus), das auf einer Seite wie mit kleinen Zähnen besetzt ist, z. B. *Siegesbeckia orientalis*.

9. *behaart* (pubescens), das mit feinen Härchen besetzt ist, z. B. *Hieracium pilosella*.

10. *fedrig* (plumosus), das mit längern Härchen stark besetzt ist, dass es das Ansehn einer Feder hat, z. B. *Hieracium undulatum*.

11. *gabelförmig* (furcatus), das an der Spitze gabelförmig gespalten ist, z. B. *Apargia hispida*.

(Sie sind auch drei- und viergabelt, tri-quadri-furcati. L.)

12. *ästig* (ramosus), das in unregelmässige Aeste sich theilt, z. B. *Ribes Grossularia*.

13. *sternförmige* (stellati), wenn mehrere Haare aus einem Punkt kommen, sich fest andrücken und das Ansehn eines Sterns der Mahler annehmen, z. B. *Alyssum montanum* und einige Arten *Solanum*.

(Dieser Stern geht zuweilen, wenn die Strahlen verwachsen, in eine Schuppe über, z. B. an *Cistus squamatus*. L.)

Das Haar wird nach seiner Stärke und der Spitze nach noch eingetheilt in:

a) *Haar* (Pilus), was einige Steifigkeit hat, und geradeaus steht.

b) *Wolle* (Lana), was krumm und weich ist.

c) *feines Haar* (Villus), was sehr fein und weich ist.

d) *Borste* (Striga), das sehr steif ist und anliegt.

e) *Haken* (Hamus), was steif ist und eine krumme Spitze hat.

f) *Wiederhaken* (Glochis), was steif ist und eine gespaltene auf beiden Seiten zurückgebogene Spitze hat.

(Auch heissen so die zurückgebognen Aeste an der Spitze des Haars. L.)

Die verschiedene hier angegebene Gestalt der Haare ist allen Pflanzentheilen eigen und lässt sich nur durch eine starke Vergrösserung bemerken.

77. Die *Blume* (Flos), ist derjenige Theil der Gewächse, welcher vor der Frucht erscheint und in den meisten Fällen, mit mehreren fast immer farbigen Blättchen, die zur Begattung wesentlichen Organe einschliesst. Wenn aber die Organe der Zeugung bei den Gewächsen nicht von solchen Blättchen umgeben sind; so werden diese selbst die Blume genannt. Die Theile der Blume sind: *der Kelch* (Calyx), *die Blumenkrone* (Corolla), *das Honiggefäss* (Nectarium), *die Staubgefässe* (Stamina), und *der Stempel* (Pistillum).

(Wir haben im deutschen zwei Wörter, welche man hier gut anwenden könnte, Blume (corolla) und Blüthe (flos.) Blüthe nennen wir die Geschlechtstheile der Pflanzen mit ihren Hüllen in so fern sie aus einer Knospe hervorgehen. L.)

78. Die Blume ist entweder *einfach* (Flos simplex), oder es sind ihrer mehrere auf einen kleinen Fleck dicht zusammengedrängt, dass sie nur eine einzige auszumachen scheinen, und diese nennt man eine *zusammengesetzte Blume*, auch wohl *allgemeine* oder *zusammengesetzte Blumenkrone* (Flos compositus u. Corolla communis vel composita).

(Der einfachen Blüthe entgegengesetzt ist der *Blüthenkopf* oder *Blüthenhaufen* (anthodium), nämlich in Rücksicht auf das Öffnen und Verschließen, oder auf das Abfallen und Ausbrechen, und auf die Form. Hieher gehört die besondere Dolde der Umbellenpflanzen, weil die Blumen von Aussen nach Innen in der Dolde abnehmen, wie die Theile einer einzelnen Blüthe; das Aehrchen (spicula) der Gräser, der Blüthenkopf (calathidium), der Syngenesisten, das Kätzchen (amentum), der Zapfen (strobilus) und die Frucht der Feigen (hypanthodium).

Von der einfachen Blume unterscheidet man mehrere Arten, nämlich:

1. *nackt* (nudus), welche keinen Kelch (§. 80.) und Blumenkrone (§. 87.) hat.

2. *blumenblatlos* (apetalus), die keine Blumenkrone (§. 87.) hat.

3. *kelchlos* (corollaceus s. aphyllus), die keinen Kelch §. 80.) hat.

(Flos corollaceus ist dem apetalus entgegengesetzt
Flos aphyllus ist ungebräuchlich. L.)

4. *zwitterblüthig* (hermaphroditus), die Staubgefässe (§. 97.) und Stempel (§. 101.) hat.

5. *weiblich* (foemineus), welcher die Staubgefässe (§. 97.) fehlen.

6. *männlich* (masculus), welcher der Stempel (§. 101.) fehlt.

7. *geschlechtslos* (neuter), die weder Staubgefässe (§. 97.) noch Stempel (§. 101.) hat.

Die zusammengesetzte Blume hat folgende Arten:

1. *geschweift* (semiflosculosus), wenn sie nur aus handförmigen Blumenkronen (§. 88. Nr. 10.) zusammengesetzt ist. Fig. 85. 270.

2. *scheibenartig* (discoides s. flosculosus), wenn sie nur allein aus röhrenförmigen Blumenkronen (§. 88. Nr. 1.) besteht.

3. *strahlig* (radiatus), wenn sie in der Mitte aus röhrenförmigen (§. 88. Nr. 1.), und am Rande aus bandförmigen (§. 88. Nr. 10.) Blumenkronen zusammengesetzt ist. Fig. 75.

Der aus röhrenförmigen Blumenkronen bestehende Theil solcher Blume heisst: *die Scheibe* (Discus), und der aus bandförmigen Blumenkronen zusammengesetzte Rand wird *der Strahl* (Radius) genannt.

4. *halbgestrahlt* (semiradiatus), wenn die eine Seite des Randes einer aus röhrenförmigen Blumenkronen zusammengesetzten Blume nur bandförmige Blumenkronen hat.

79. Bei den Moosen sind die Blumen nur durch ein Vergrößerungsglas (deutlich L.) sichtbar.

Ihre verschiedene von der gewöhnlichen abweichende Gestalt hat folgende Benennungen veranlasst:

1. *knospenförmig* (gemmaformis), die zwischen den Blättern sitzt und das Ansehn einer aufgeschwollenen Knospe hat.

2. *kopfförmig* (capituliformis), die kugelförmig und gestielt ist. Fig. 138.

3. *sternförmig* (disciformis), die an der Spitze des Stengels steht, und mit Blättern, welche sich flach ausbreiten, umgeben ist, z. B. Polytrichum. Fig. 142.

Die Blumen der Farnkräuter sind noch nicht genau erforscht, und die der übrigen Kryptogamen möchten wegen ihrer überaus grossen Feinheit schwerlich entdeckt werden.

(Die Feinheit macht kein grosses Hinderniss, aber da die Theile von denen der andern Pflanzen sehr abweichen, so ist es schwer ihre Function zu errathen. Vielen fehlt wohl die Blüthe ganz. L.)

80. Der *Kelch* (Calyx), ist der allgemeine Name aller der Blätterchen oder Hüllen, welche ge-

wöhnlich grün gefärbt oder lederartig sind, und ausserhalb die Blume umgeben. Die Arten desselben sind: *die Blüthendecke* (Perianthium), *der Balg* (Gluma), *die allgemeine Blumendecke* (Anthodium), *die Schuppe* (Squama), *das Federchen* (Pappus), und *der Mooskelch* (Perichaetium).

(Ueber den Unterschied von Kelch und Blumenkron s. auch §. 165. In zweifelhaften Fällen nennt man den Theil perigonium, Blumendecke. Auch ist es schwer Kelch von der Bractee zu unterscheiden. Jener gehört mit den übrigen Blüthentheilen zu einer Knospe, diese nicht. Die angegebenen Arten des Kelches sind bis auf die Blüthendecke und das Federchen keine Arten des Kelches, sondern ganz andere Theile, und der Name Kelch (calyx) fällt also mit Blüthendecke (perianthium) zusammen. L.)

81. Die Blüthendecke (Perianthium), heisst die Art des Kelchs, welche unmittelbar eine Blume in sich schliesst.

(Der Kelch (calyx), ist die äussere Hülle der Blüthe, dessen Abtheilungen in der Regel mit den Abtheilungen der Blüthe wechseln, und den Staubfäden in der äussersten Reihe gegenüber stehen. Er hat auch in der Regel eine grüne Farbe, stärker hervortretende und weniger verzweigte Nerven. Doch ist er oft schwer von den Blumen zu unterscheiden, besonders wenn nur einer von beiden Theilen vorhanden ist. In einem solchen Falle kann man den zweifelhaften Theil perigonium nennen. L.)

Es sind folgende Arten davon:

1. *bleibend* (persistens), die auch nach dem Blühen noch bleibt, z. B. Hyoscyamus niger.
2. *abfallend* (deciduum), die gleich nach dem Blühen abfällt, z. B. Tilia europaea.
3. *welkend* (marcescens), die nach dem Blühen

verwelkt, noch eine Zeitlang bleibt, endlich aber abfällt, z. B. *Prunus Armeniaca*.

4. *hinfällig* (*caducum*), die noch vor dem Blühen abfällt, z. B. *Papaver somniferum*.

5. *einfach* (*simplex*).

6. *doppelt* (*duplex*), wenn zwei Blüthendecken die Blume einschließen, z. B. *Fragaria vesca*, *Malva rotundifolia*. Fig. 23. 57.

7. *eiblättrig* (*monophyllum*), wenn die Blüthendecke aus einem Blatte besteht; das heisst, die Blüthendecke kann in verschiedene gleiche oder ungleiche Theile zertheilt sein, aber an der Basis hängt sie zusammen. Fig. 49. 50. 53. 72. 73. 110.

8. *zwei-, drei-, vier-, fünf- u. s. w. vielblättrig* (*di-, tri-, tetra-, penta- etc. polyphyllum*), wenn die Blüthendecke aus zwei oder mehreren Blättern besteht. Fig. 148.

9. *gezähnt* (*dentatum*), wenn der Rand kurze Zähne oder Einschnitte hat, die aber nie tiefer gehen dürfen als höchstens bis auf den vierten Theil der ganzen Blüthendecke. Nach der Zahl dieser Zähne ist sie *zwei-, drei-, vier-, fünf- u. s. w. mehrzählig* (*bi-, tri-, quadri-, quinque- etc. multi-dentatum*).

10. *gespalten* (*fissum*), wenn die Blüthendecke in Einschnitte getheilt ist, die aber höchstens nur bis auf die Mitte reichen dürfen. Man zählt gewöhnlich *zwei-, drei-, vier- u. s. w. vielspaltig* (*bi-, tri-, quadri- etc. multifidum*).

11. *getheilt* (*partitum*), wenn die Blüthendecke bis auf die Basis getheilt ist. Diese Einschnitte werden auch nach der Zahl bestimmt, als: *zwei-, drei-,*

vier- u. s. w. *vielt heilig* (*bi-*, *tri-*, *quadri-* etc *multipartitum*).

12. *lippig* (*labiatum* s. *bilabiatum*), wenn die Blüthendecke tief zweispaltig ist, und jede dieser Abtheilungen (gewöhnlich. L.) Zähne hat, z. B. *Salvia officinalis*. Fig. 73. 74.

13. *ungetheilt* (*integrum*), wenn eine einblättrige Blüthendecke keine Zähne, Einschnitte oder dergleichen hat. Fig. 118.

14. *becherförmig* (*urceolatum*), wenn eine einblättrige Blüthendecke kurz, nach der Basis zu rund und am Rande ohne alle Zähne und Einschnitte ist.

15. *geschlossen* (*clausum*), wenn sich eine mehrblättrige oder getheilte Blüthendecke rund und dicht an die Blumenkrone anschliesst.

16. *röhrig* (*tubulosum*), wenn eine getheilte, gespaltene, oder gezähnte Blüthendecke, wo sie zusammenhängt, cylindrisch ist, und also eine Röhre bildet.

17. *ausgebreitet* (*patens*), wenn bei einer ein- oder vielblättrigen Blüthendecke die Blätter oder Einschnitte ganz flach stehn.

(Vielmehr, wenn sie einen schiefen Winkel mit dem Boden Theile worauf sie stehen. L.)

18. *zurückgebogen* (*reflexum*), wenn entweder die Zähne, oder Einschnitte bei einblättrigen Blüthendecken, oder die Blättchen bei vielblättrigen zurückgeschlagen sind.

19. *aufgeblasen* (*inflatum*), wenn die Blüthendecke weit und hohl ist.

20. *abgekürzt* (*abbreviatum*), wenn der Kelch um vieles kürzer als die Blumenkrone ist.

21. *gefärbt* (*coloratum*), wenn die Blüthendecke eine andere als die grüne Farbe hat.

Bei der einblättrigen Blüthendecke werden die Ein-

theilungen entweder *Einschnitte* (laciniae), oder *Zähne* (dentes) genannt, und dann werden diese bestimmt, ob sie *stumpf* (obtusus), *spitzig* (acutus), *langzugespitzt* (acuminatus), *stachelicht* (spinosus) u. s. w. sind. Bei den mehrblättrigen Blüthendecken werden die einzelnen Blätter, *Blättchen* (foliola) genannt, und ihrer Gestalt nach beschrieben. (De Candolle nennt die Blättchen des Kelches sepala und sagt auch calyx tri- multisepalus statt tri- polyphyllus. Aber statt dieses unlateinischen Wortes ist es besser das bekannte aus dem Griechischen genommene phyllum zu gebrauchen, wenn man, wie es allerdings besser ist, foliolum in dieser Bedeutung verwirft. L.) Man bestimmt auch noch die Figur der Blumendecke und ihrer Fläche. §. 6.

82. Der *Balg* (Gluma), ist der den Gräsern allein eigene Kelch. Er enthält gewöhnlich mehrere Blumen. Die Blätter, woraus er besteht, heißen *Spelzen* (Valvulae). Arten davon sind:

1. *einspelzig* (univalvis), der aus einer Spelze besteht, z. B. *Lolium perenne*.

2. *zweispelzig* (bivalvis), der zwei Spelzen hat, wie die meisten Gräser. Fig. 96. 97. 102. 104.

3. *dreispelzig* (trivalvis), wenn drei Spelzen sind.

4. *vielspelzig* (multivalvis), der aus mehreren zusammengesetzt ist.

5. *gefärbt* (colorata), der eine andere als die grüne Farbe hat.

Die Blumenkrone der Gräser, welche von dem Balge eingeschlossen wird, nennt man auch *Balg* (Gluma), weil sie in ihrer Gestalt fast gar nicht vom Kelche verschieden ist, und eigentlich nur einen innern Kelch vorstellt. Bei genauen Beschreibungen wird allemal bei Gluma das Wort Calyx oder Corolla vorangesetzt. Der Balg der Blumenkrone ist etwas feiner und die innere *Spelze* (Valvula) ist *häutig* (membranacea), die

äussere aber grün. Diese grüne Spelze ist entweder *grannenlos* (*mutica*), oder *gegrannt* (*aristata*). Die Granne (§. 75.) sitzt nur auf der Blumenkrone der Gräser. Fig. 103.

(Linné setzte *gluma* zu *calyx* und *corolla*, um die grasartige Natur der Blume oder des Kelches zu bezeichnen. Da wirklich diese Theile Aehnlichkeit mit den Bracteen haben, und ursprünglich nur solche sind, so ist dieser Zusatz nicht überflüssig. Den Kelch nennt Palissot de Beauvois *tegmen* und die *valvae* desselben, *glumae*, dem Sprachgebrauche zuwider; die *corolla* nennt er *stragulum* und die *valvae*, *paleae*. Es ist gewiss am zweckmässigsten, den Kelch mit Desv. *gluma*, die *corolla*, *glumella* zu nennen und dann wird man auch bequem die Klappen des Kelches *valvae*, der Blume *valvulae* nennen. L.)

83. Die *allgemeine Blumendecke* (*Anthodium*) nennt man den Kelch der zusammengesetzten Blume (§. 78.) welche eine grosse Menge von kleinen Blumen einschliesst, die zusammen das Ansehn haben als wären sie nur eine, z. B. *Leontodon Taraxacum*, *Centaurea Cyanus*, *Helianthus annuus* u. m. a.

(Ursprünglich nannte Ehrhart die zusammengesetzte Blüthe, weil *flos compositus* ihm auffiel, ein *anthodium*; der V. bestimmte den Ausdruck für den Kelch. Es ist aber besser bei der ersten Bedeutung des Wortes *anthodium*, welches geradezu eine Anhäufung von Blüthen bedeutet, zu bleiben und die Umhüllung eines solchen Blüthenhaufens den Hauptkelch oder Blüthenhülle (*peranthodium*) zu nennen, wenn man nicht *involucrum* mit *Cassini* sagen will. L.)

Die Arten dieses Kelches sind:

1. *einblättrig* (*monophyllum*), die aus einer Blatte besteht, an der Basis zusammenhängt, aber eingeschnitten ist, z. B. *Tagetes*.

2. *vielblättrig* (*polyphyllum*), die aus vielen Blättern zusammengesetzt ist.

3. *einfach* (*simplex*), wenn eine einfache Reihe Blätter die Blumen umgibt. Fig. 221.

4. *gleich* (*aequale*), wenn bei einer einfachen Blumendecke die Blätter gleich lang sind.

5. *schuppig* oder *dachziegelförmig* (*squamosum*, s. *imbricatum*), wenn die allgemeine Blumendecke aus dicht übereinander liegenden kleinen Blättern besteht. Fig. 59, 76.

6. *sparrig* (*squarrosum*), wenn die kleinen Blättchen mit ihren Spitzen abwärts gebogen sind.

7. *trocken* (*scariosum*), wenn die Blättchen dürr und trocken sind, z. B. *Centaurea glastifolia*.

8. *winperich* (*ciliatum*), wenn die Ränder der Blättchen mit kurzen gleichlangen Borsten besetzt sind.

9. *stachelicht* (*muricatum*), wenn die Ränder der Blättchen mit kurzen steifen Stacheln besetzt sind.

10. *dornig* (*spinosum*), wenn jedes Blättchen mit einem Dorn versehen ist. Sie sind entweder *einfache Dornen* (*Spinae simplices*), oder *ästige* (*ramosae*). Fig. 152.

11. *kreiselförmig* (*turbinatum*), wenn die Blüthendecke ganz die Figur eines Kreisels hat. Fig. 59.

12. *kugelrund* (*globosum*), die vollkommen eine kugelförmige Gestalt hat. Fig. 152.

13. *halbkugelrund* (*hemisphaericum*), wenn die Blumendecke unten rund, oben aber flach ist. Fig. 76.

14. *walzenförmig* (*cylindricum*), wenn die Blumendecke lang und rund, dabei aber oben so dick als unten ist.

15. *flach* (*planum*), wenn die Blättchen der Blumendecke ganz flach ausgebreitet sind.

16. *gekelcht* oder *vermehrt* (*calyculatum* s. au-

etum), wenn an der Basis der allgemeinen Blumendecke noch eine Reihe von Blättchen ist, die wieder einen kleinen Kelch zu bilden scheinen, z. B. *Leontodon Taraxacum*. Fig. 143. 270.

Die Blätter der allgemeinen Blumendecke heißen *Blättchen* (*Foliola* s. *Squamae*), und werden bei genauerer Beschreibung nach ihrem ganzen Umfange betrachtet.

Die allgemeine Blumendecke (*Anthodium*) nennt Linné gewöhnlich den allgemeinen Kelch (*Calyx communis*).

(Der Ausdruck *Foliolum* ist nicht passend; besser scheint *Phyllum*. L.)

84. Die kleinen Blättchen, welche das Kätzchen (§. 42.) bedecken, dienen statt des Kelchs, und hinter jedem stehn die wesentlichen Theile der Blume. Diese Blättchen werden *Schuppen* (*Squamae*) genannt. Fig. 37.

(Sie gehören fast immer zu den Bracteen. L.)

Man belegt zwar die Blättchen der allgemeinen Blumendecke, des Kätzchens, des Zapfens und anderer Theile mehr mit dem Namen der Schuppe, aber der Zusammenhang zeigt allezeit deutlich, von welchem Theile die Rede ist.

85. Das *Federchen* (*Pappus*), ist ein aus Haaren oder einer dünnen durchsichtigen Haut bestehender Kelch, den man nur an den einzelnen Blumen, die in einer allgemeinen Blumendecke (*Anthodium*) eingeschlossen sind, bemerkt. Es bleibt dies Federchen beständig bis zur Reife des Samens sitzen, beim Samen (§. 124.) wird davon weitläufiger gehandelt. Fig. 84. 86. 87.

86. Die Moose haben noch einen besondern, von allen andern Gewächsen verschieden gebildeten Kelch,

den man den *Mooskelch* (*Perichaetium*) nennt. Die Blüthen dieser Gewächse sind so klein, dass man sie nur durch eine sehr starke Vergrösserung bemerken kann. Gewöhnlich sind die Blumen von getrenntem Geschlechte, das heisst: einige sind bloss männliche, andere hingegen weibliche. Der Kelch der weiblichen Blume bleibt bis zur Reife der Frucht sitzen, und zeigt sich an der Basis der Borste. Die männliche Blume ist nur durch starke Vergrösserung sichtbar, (oft durch sehr geringe, L.) und verschwindet nach der Befruchtung.

Bei den männlichen Blumen besteht dieser Kelch aus einer Menge von Blättern, die sich von den andern durch eine feinere Struktur und abweichende Gestalt unterscheiden. Der Kelch der weiblichen Blume lässt sich am besten bei der reifen Frucht betrachten, er sitzt alsdann an der Basis der Borste (§. 27.) Fig. 140., und besteht aus einer Menge dachziegelförmig übereinander liegender Blätter, die von den Blättern des Mooses sich durch ihre Länge oder Breite auszeichnen. Diese Blätter liegen dicht übereinander, und das Ganze hat eine kegelförmige Gestalt.

(Das *perichaetium* gehört deutlich zu den Hüllen (*involucra*), da die Blättchen desselben den wahren Blättern oft ganz ähnlich sind. L.)

87. Die *Blumenkrone* (*Corolla*), nennt man die Blättchen, welche auf den Kelch folgen, die innern Theile der Blume umgeben, von zarterem Bau als der Kelch sind, und gewöhnlich eine andere als die grüne Farbe haben. (Die Blume (*corolla*) ist die innere Hülle der Blüthe, deren Abtheilungen in der Regel mit den Abtheilungen des Kelches und so auch mit den Staubfäden in den äussersten Reihen wechseln.

Die Farbe ist wenigstens nicht grün, die Nerven sind viel feiner und mehr verästelt als im Kelche von dem sie doch oft schwer zu unterscheiden ist. Im zweifelhaften Falle und wenn einer der beiden Theile fehlt, kann man den zweifelhaften perigonium nennen. L.) Sie besteht entweder aus einem Blatte oder aus mehreren; die erstere nennt man *einblüttrige Blumenkrone* (*Corolla monopetala*), die letztere *vielblüttrige* (*polypetala*). Das Blatt einer Blumenkrone nennt man ein *Kronen-* oder *Blumenblatt* (*Petalum*).

88. Die *einblüttrige Blumenkrone* (*Corolla monopetala*), heisst diejenige, welche nur aus einem Blatte besteht, das zwar Einschnitte haben kann, aber doch an der Basis noch einigen Zusammenhang zeigen muss. Die Arten derselben sind:

1. *röhrig* (*tubulosa*), die aus einem gleich dicken hohlen Kronenblatte besteht. Man nennt die *kleinen Kronen*, welche sich in einer allgemeinen Blumendecke finden, auch *röhrig*, ob sie gleich bisweilen etwas von dieser Gestalt abweichen. Fig. 60. 86. 275.

2. *keulenförmig* (*clavata*), welche eine nach oben zu allmählig weiter werdende Röhre bilden, die sich an der Oeffnung verengt. Fig. 276.

3. *kugelförmig* (*globosa*), welche nach oben und unten sich zusammenzieht, in der Mitte aber weit ist. Fig. 268.

4. *glockenförmig* (*campanulata*), die sich von unten an gleich bauchig erweitert, so dass sie ungefähr die Gestalt einer Glocke hat. Fig. 62.

5. *becherförmig* (*cyathiformis*), wenn unten eine walzenförmige Röhre sich allmählig nach oben

erweitert, der Rand aber gerade aufrecht nicht zurückgebogen oder zusammengezogen ist. Fig. 273. 82.

6. *tellerförmig* (*urceolata*), wenn eine kurze walzenförmige Röhre sich mit einemmal in eine weite Fläche ausdehnt, deren Rand in die Höhe steht. Fig. 24.

7. *trichterförmig* (*infundibuliformis*), wenn die Röhre der Krone nach oben zu allmählig weiter wird, das heisst, umgekehrt kegelförmig ist, der Rand aber ziemlich flach sich ausbreitet. Fig. 269.

8. *präsentirtellerförmig* (*hypocrateriformis*), wenn die Röhre der Krone vollkommen walzenförmig, aber sehr lang ist, und der Rand sich ganz flach ausbreitet. Fig. 267. z. B. *Phlox*.

9. *radförmig* (*rotata*), wenn eine walzenförmige Röhre sehr kurz, beinahe kürzer als der Kelch, bisweilen kaum merkbar ist, und der Rand ganz flach liegt. Es ist fast die vorige Art, nur dass die Röhre sehr kurz seyn muss, z. B. *Verbascum*.

10. *bandförmig* (*ligulata*), wenn die Röhre nicht lang ist, mit einemmale aufhört, und sich in ein längliches Blatt endigt, z. B. *Aristolochia Clematitis*, Fig. 21, und bei einigen Blumen, die sich in einer allgemeinen Blumendecke zeigen. Fig. 84.

11. *ungestaltet* (*difformis*), wenn die Röhre oben sich allmählig erweitert, und in ungleiche Lappen zertheilt ist, wie bei einigen Blumenkronen, die in einer allgemeinen Blumendecke eingeschlossen sind, z. B. *Centaurea Cyanus*. Fig. 61.

12. *rachenförmig* (*ringens*), wenn der Rand einer unten röhrenförmigen Krone in zwei Theile getheilt ist, wovon der obere Einschnitt gewölbt, der untere länglich ist, und ungefähr mit dem aufge-

sperrten Rachen eines Thiers Aehnlichkeit hat. *Fig. 72.*
via officinalis.

13. *maskirt* (*personata*), wenn die beiden Einschnitte der vorhergehenden Blume dicht zusammen schliessen, z. B. *Antirrhinum majus.* *Fig. 49.*

14. *zweilippig* (*bilabiata*), wenn die Blumenkrone zwei Einschnitte hat, die gegeneinander überstehen und die öfters wieder Zähne oder Einschnitte haben. *Fig. 272.*

15. *einelippig* (*unilabiata*), wenn bei der rachenförmigen oder der vorhergehenden Blumenkrone der obere oder untere Einschnitt fehlt, z. B. *Teucrium* *Fig. 50. 51.*

(*Cor. labiata*, lippige Bl. ist Gattung, *bilabiata* der *unilabiata* entgegengesetzt. Eine cor. ringförmig erweitert sich von der Basis an, um sich in zwei Lippen zu trennen. Eine Blume, welche nur eine Rande die lippige Form zeigt, gehört zur allgemeinen Abtheilung der cor. labiata. In der letzteren Bedeutung setzt man in der Gattung *Justicia* die cor. labiata der cor. ringförmig entgegen und des V. Figur 272. von cor. bilabiata bezieht sich auf eine *Justicia*. L.)

89. Die Arten der *vielblättrigen Blumenkrone* (*Corolla polypetala*) sind:

1. *rosenartig* (*rosacea*), wenn fünf Blumenblätter die ziemlich rund sind, und an ihrer Basis keine Verlängerung haben, eine Blumenkrone bilden. *Fig. 11. 198.*

2. *malvenartig* (*malvacea*), wenn fünf Blätter, die an der Basis ziemlich verlängert sind, ganz unten etwas zusammenhängen, dass sie einblättrig zu erscheinen. *Fig. 56.*

(Die innere Fläche der Blumenblätter hängt zusammen und ist mit der Staubfadenröhre verwachsen. L.)

3. *kreuzförmig* (*cruciata*), wenn vier Blumenblätter an ihrer Basis sehr stark verlängert sind, und gegeneinander überstehn, z. B. *Sinapis*, *Brassica* u. s. w. Fig. 145.

(Vier Blumenblätter stehen von einander entfernt und bilden daher ein Kreuz. Die verlängerte Basis fehlt an manchen Arten von *Arabis* u. s. w. L.)

4. *nelkenartig* (*caryophyllacea*), wenn fünf Blumenblätter an ihrer Basis sehr stark verlängert sind, und in einem einblättrigen Kelche stehen, z. B. *Dianthus* u. a. m. Fig. 110.

(Nur der merkwürdige Umstand, dass die Staubfäden wechselnd an die Blumenblätter angewachsen sind, kann diese Blumen bezeichnen. L.)

5. *lilienförmig* (*liliacea*), besteht gewöhnlich aus sechs, seltener aus drei Blumenblättern, und ist niemals von einem Kelche umgeben. Bei einigen Gewächsen ist sie einblättrig und sechsmal getheilt. Daher unterscheidet man die *einblättrige lilienförmige* (*monopetala liliacea*), und die *vielblättrige lilienförmige Blumenkrone* (*polypetala liliacea*). Sie ist nur den Lilien (§. 132.) eigen. Fig. 66. 71. 146.

(Der Ausdruck kommt zur Unterscheidung selten vor und ist nicht genau bestimmt. L.)

6. *zwei-, drei-, vier-, fünf- u. s. w. vielblättrig* (*di-, tri-, tetra-, penta- etc. polypetala*), nach der Zahl der vorhandenen Blumenblätter.

7. *schnetterlingsartig* (*papilionacea*), wenn vier Blumenblätter von verschiedener Gestalt in einander liegen, z. B. *Pisum*, *Vicia* u. s. w. Fig. 105. 30.

(Diese Form findet sich auch bei den einblättrigen, z. B. *Trifolium*. L.)

Die einzelnen Blumenblätter derselben hat man mit folgenden Namen belegt:

a) die *Fahne* (*Vexillum*) heisst das oberste Blumenblatt, welches gewöhnlich das grösste ist. Fig. 10

b) die *beiden Flügel* (*Alae*) nennt man die beiden Blättchen, welche unter der Fahne, und zwar an jeder Seite gegeneinander über liegen. Fig. 107.

c) der *Schnabel* oder das *Schiffchen* (*Carina*), heisst das ganz untere, der Fahne gegenüber stehend hohle Blatt, das die Zeugungstheile in sich fast. Es ist gewöhnlich ganz, zuweilen an der verlängerten Spitze zweitheilig, seltener aus zwei besondern Blättern bestehend. Fig. 108.

8. *orchisähnlich* (*orchidea*), besteht gewöhnlich aus fünf Blumenblättern, von denen drei oben und zwei zur Seite gestellt sind, und aus der Honiglippe (*Labellum*) (§. 95.) Fig. 33.

(Der Ausdruck ist ganz unbestimmt und daher zur Unterscheidung nicht zu gebrauchen. L.)

9. *unregelmässig* (*irregularis*), die aus vier oder mehreren Blumenblättern besteht, welche von verschiedener Länge und Beugung sind, dass sie sich nicht unter die andern Arten bringen lässt. Fig. 134.

(Wichtige Begriffe, sowohl für einblättrige als vielblättrige Blumen, sind die einer *cor. regularis* und *aequalis*. Die Alten stritten viel darüber. *Cor. regularis* ist, wenn sich die Spitzen der Blumenblätter und Abtheilungen mit einer zusammenhängenden krummen Linie umschreiben lassen, *cor. aequalis* wenn Blumenblätter oder Abtheilungen gleiche Länge haben. Die Gegensätze sind *cor. irregularis* und *inaequalis*. L.)

90. Das einzelne Blatt der Blume wird wie gesagt (§. 87.) *Kronen-* oder *Blumenblatt* (*Petalum*) genannt. Ist dieses flach, so heisst der obere flache Theil die *Platte* (*Lamina*), und der spitzige Theil nach unten der *Nagel* (*Unguis*). Bei den einblät-

trigen Blumenkronen (§. 88.) benennt man die einzelnen Theile derselben auf folgende Art:

1. die *Röhre* (Tubus), heisst bei den einblättrigen Kronen der untere Theil, welcher hohl und meistens gleich dick ist. Alle einblättrige haben eine Röhre, nur die glockenförmige und zuweilen die radförmige Krone nicht.

2. der *Rand* (Limbus), ist die Oeffnung der Krone, besonders wenn sie zurückgebogen ist. (§. 88. Nr. 1–11.). Der Rand ist nun öfters gezähnt, oder tiefer eingeschnitten, die Theile des Randes sind:

3. die *Einschnitte* (Laciniae s. Lobi), sind die Abtheilungen des Randes der Blumenkrone. Man bestimmt sie alsdann nach ihrer Gestalt, Zahl und Lage.

4. der *Helm* (Galea), ist der obere gewölbte (nicht immer L.) Einschnitt (Abtheilung L.) einer rachenförmigen oder maskirten Krone, der nach seiner Lage, Figur und Einschnitten oder Zähnen weiter bestimmt wird.

5. der *Rachen* (Rictus), ist bei rachenförmigen Kronen der Raum zwischen den beiden äussersten Enden des Helms und des untern Einschnitts.

6. der *Schlund* (Faux), heisst bei einblättrigen und auch rachenförmigen Kronen die Oeffnung der Röhre.

7. der *Gaum* (Palatum), heisst bei maskirten Kronen die dicht am Schlund hervorstehende Wölbung des untern Einschnitts.

8. der *Bart* (Barba s. Labellum), ist der untere Einschnitt bei rachenförmigen und maskirten Kronen. Er steht dem Helm gerade gegenüber.

(S. Nr. 9. L.)

9. die *Lippen* (Labia), heissen bei den zweilip-

pigen oder einlippigen die beiden Einschnitte. Man unterscheidet die *obere Lippe* (Labium superius) und die *untere* (Labium inferius). Auch werden von einigen Botanikern der Helm und der Bart zuweilen Lippen genannt.

(Der Ausdruck barba ist jetzt wenig gebräuchlich und mit Recht, da er eine Anhäufung von Haaren bezeichnet. Labium mit dem Zusatze superius oder inferius gebraucht man für Ober- und Unterlippe. Oft sagt man der Abkürzung wegen galea für Oberlippe und labium dann ohne Zusatz für Unterlippe. Labellum sollte nur gebraucht werden da wo keine Oberlippe vorhanden ist, z. B. bei den Orchideen.

Die Blumenblätter oder Theile der Blumen hängen vor dem Aufbrechen auf eine verschiedene Art in Knospen zusammengeschlagen (aestivanthia, Zusammenfaltung). Sie ist dachziegelförmig (imbricata), wenn die Ränder der Abtheilungen über einander liegen; klappig (volvata), wenn die eine Abtheilung die andere umfasst; gekrümmt oder eingewickelt (incurvata, involuta), wenn einige Abtheilungen eingekrümmt oder eingewickelt sind.

Das Abblühen (peranthia) ist ebenfalls verschieden und oft nach den natürlichen Ordnungen. Es ist zusammenschrumpfend (corrugata) vor dem Abfallen, oder trocknend (marcescens) oder ausgebreitet (expansa), wenn sich die Blumen vor dem Abfallen wenig ändern. L.)

91. Die Krone der Moose weicht in der äusseren Gestalt von allen andern ab. Sie hat das Sonderbare, dass sie nach dem Verblühen bis zur Reife der Frucht noch bleibt, aber alsdann in einer ganz andern Gestalt erscheint. Die weibliche Blume nur allein ist mit einer Krone versehen. Sie besteht aus einer sehr zarten Haut, die den Stempel dicht einschliesst. Unten und an der Spitze ist sie festgewachsen; daher nach dem Verblühen die Krone platzen muss, und alsdann

mit verschiedenen Namen von den **Kristorkennern** belegt wird. Der untere Theil sieht **vollkommen wie** eine Scheide an den Halmen der Gräser **aus, und wird** vom *Mooskelche* (*Perichaetium*) **eingeschlossen,** man nennt ihn *Scheidchen* (*Vaginula*). Der obere Theil bleibt an der Spitze der Frucht **sitzen, und** heisst die *Mütze* (*Calyptra*). Die **Verschiedenheit** der Mützen lässt sich nur an der reifen Frucht **angeben, daher diese erst bei derselben** (§. 120.) **genauer bestimmt wird.**

(Da die den Staubgefässen analogen **Theile an der** Moosblüthe ausserhalb des Mützens **sich befinden,** so kann man dieses wohl nicht **zu den Blumen** (*corollae*) rechnen. Diese **und ähnliche** Theile nenne ich Fruchthülle (*perigynium*), s. §. 95. Anm. L.)

92. Ein anderer wichtiger Theil der Blume ist das *Honiggefäss* (*Nectarium*). Linné versteht darunter alle die Theile der Blumen, welche von den übrigen bereits abgehandelten, so wie von den Befruchtungsorganen verschieden gebildet sind. Diese Theile aber sondern nicht alle Honig ab, und verdienen daher nicht den ihnen gegebenen Namen. Da indessen für alle diese Organe der Name *Honiggefäss* (*Nectarium*) angenommen ist, so wollen wir ihn auch beibehalten. Die unter dieser Benennung bekannten Theile lassen sich in drei Abtheilungen bringen: 1) solche, welche wirklich Honig absondern; 2) die, welche zur Aufbewahrung desselben dienen, und 3) solche, welche die Honig absondernden Theile, oder auch die Staubgefässe beschützen und zur Beförderung der Begattung beizutragen scheinen. (S. §. 95.

Anm. L.)

93. Honiggefäße, die wirklich Honig absondern und ausschwitzen, sind *Drüsen* (*Glandulae*), *honigschuppen* (*Squamae nectariferae*) und *Honiglöcher* (*Pori nectariferi*).

(Honigsaft wird von diesen Drüsen sehr selb- vielleicht nie abgesondert, sondern diese Abs- derung geschieht am häufigsten an der Basis Blumenröhre. Gewöhnlich sondern die wah- Drüsen einen harzigen Saft ab, und dieser ist durchsichtig, so dass man die Glandeln an hellen Farbe erkennt, z. B. an den Myrthace Hypericum u. s. w. Ausgeschieden wird aber ei- ser Saft sehr selten, sondern die Ausscheidung i- cher Säfte geschieht auf der Oberfläche. Die F- nectariferi sind zuweilen mit Drüsen verbunden, v- an Ruta, zuweilen und am öftersten nicht. Der f- den diese Löcher absondern, ist sehr verschied- In vielen Fällen sondern die sogenannten Drü- gar keinen besondern Saft ab, z. B. in den B- men der Cruciferae. S. §. 95. Anm. L.)

Von den *Drüsen* giebt es folgende Arten:

1. *sitzend* (*sessilis*), die keinen Stiel hat, z. Sinapis, Brassica u. s. w. Fig. 148.
2. *gestielt* (*pedicellata*), die mit einem Stiel v- sehen ist.
3. *kugelrund* (*globosa*).
4. *zusammengedrückt* (*compressa*), die auf b- den Seiten flach ist.
5. *flach* (*plana*), die kaum merklich erhaben i- z. B. Fritillaria imperialis.
6. *länglich* (*oblonga*), die mehr eine lange For- hat.
7. *becherförmig* (*cyathiformis*), die in Gest- eines Bechers den Fruchtknoten des Stempels umfas- Beim reifgewordenen Samen hat sie sich in einen gr- nen harten Körper verwandelt, z. B. Didynamia Gyn- nospermia, Asperifoliae u. a. Fig. 74.

Die Drüse sitzt an allen Theilen der Blume fest im Kelche, in der Krone, an den Staubgefässen und dem Stempel. Nur allein Drüsen schwitzen Honig aus.

Die *Honigschuppen* (*Squamae nectariferae*), sind kleine schuppenförmige Körper, die Honig aus-schwitzen, der aus kleinen Löchern zum Vorschein kommt, z. B. *Ranunculus*. Oefsters schwitzen diese Körper keinen Honig aus, und dann werden sie schlechtweg *Schuppen* (*Squamae*) genannt.

(Diese Schuppen sondern den Saft nicht ab; er wird in dem Loche abgeschieden, denn die Schuppe fehlt zuweilen, z. B. an *Ranunculus aquatilis*. L.)

Die *Honiglöcher* (*Pori nectariferi*), sind kleine Löcher oder Gruben, aus denen Honig schwitzt, und die sich an verschiedenen Theilen der Blume zeigen. (S. oben).

94. Von den sogenannten Honiggefässen, welche zur Aufnahme des Honigs bestimmt sind, giebt es nachstehende Arten, nämlich: *die Kappe* (*Cucullus*), *das Röhrlein* (*Tubulus*), *die Grube* (*Fovea*), *die Falz* (*Plica*), *den Sporn* (*Calcar*).

Die Kappe (*Cucullus*), ist ein hohler sackförmiger Körper, der ganz frei von allen übrigen Theilen der Blume abgesondert ist, und zuweilen einen kurzen Stiel hat, z. B. *Helleborus*, *Isopyrum*, *Aconitum*. Fig. 135. 196. Bei einigen Blumen sind dergleichen Kappen, worin kein Honig enthalten ist, als bei *Asclepias Vincetoxicum*. Fig. 89.

(Sind sehr verschiedene Theile. In *Helleborus*, *Isopyrum* sind sie parastamina, s. Anm. zu §. 5. In *Asclepias* bilden sie eine Nebenblume (*paracorolla*). In *Aquilegia* sind sie gespornte Blumenblätter und in *Aconitum* sind diese Blumenblätter umgekehrt und nur zwei derselben geblieben. L.)

Das Röhrlein (Tubulus) (besser cuniculus. L.), ist eine walzenförmige Vertiefung, welche sich im Grunde der Blume längs dem Blumenstiel findet, z. B. Pelargonium. Fig. 306. 307.

Die Grube (Fovea), wenn im Kelche, in der Blumenkrone, oder in sonst einem Theile der Blume sich eine kleine Vertiefung zur Aufbewahrung des Honigs zeigt.

Die Falte (Plica), zuweilen ist die Blumenkrone einwärts gebogen, und bildet dadurch eine längliche Grube oder Falte.

Der Sporn (Calcar), ist eine sackförmige Verlängerung der Blumenkrone, in der sich Honig findet. Bisweilen ist in dem spitzen Theil des Sporns eine Drüse, (ich sehe nur einen verdickten Boden L.) die Honig absondert, bisweilen aber wird er an einem andern Orte abgesondert, und fliesst nachher in den Sporn, z. B. Viola, Delphinium, Aquilegia, Tro-paeolum u. d. m. Fig. 49. 112. 113.

95. Alle vorhergehende Theile der Blume können mit Recht Honiggefässe heissen; allein die wir jetzt im allgemeinen mit eben dem Namen belegen, sind sehr davon verschieden. Gewiss verdienen die Theile, welche zur Beschützung des Honigsafts oder des Blumenstaubs, oder zur Beförderung der Begattung gebildet sind, am wenigsten den Namen Honigbehältniss. Hieher gehören: *die Klappe* (Fornix), *der Bart* (Barba), *der Faden* (Filum), *die Walze* (Cylindrus), *der Kranz* (Corona), *die Honiglippe* (Labellum).

Die Klappen (Fornices), sind kleine Verlängerungen der Blumenkrone, die durch einen Eindruck von aussen nach innen entstehn. Sie bedecken ge-

wöhnlich die Staubgefässe, oder sitzen an der Oeffnung der Blumenkrone. Ihre Gestalt ist sehr verschieden, z. B. *Symphytum*, *Borago*, *Myosotis* u. m. a. Fig. 81.

Der Bart (*Barba*), besteht aus einer Menge kurzer Haare oder weicher krautartiger Borsten, die an der Oeffnung des Kelchs, der Krone, auf den Blumenblättern, oder im Grunde der Blume sind, z. B. *Thymus*, *Iris*, *Periploca* u. s. w. Fig. 71. 90. 92. 114.

Der Faden (*Filum*), ist ein langer dicker Körper, der ganz krautartig ist, und den Grund der Blume in grosser Menge verschliesst. Die Arten sind:

1. *gerade* (*rectum*), der eine gerade Richtung hat, z. B. *Passiflora*. Fig. 27.

2. *hornförmig* (*corniculatum*), der kurz und zugleich nach Art eines Horns gebogen ist, z. B. *Periploca*. Fig. 83. 91.

Die Walze (*Cylindrus*), ist eine röhrenförmige dünne Verlängerung, welche den Stempel (§. 101.) umgiebt, und die Staubgefässe am Rande oder am obern Theile der innern Fläche trägt, z. B. *Swietenia*, *Melia*. Fig. 309. 310.

Der Kranz (*Corona*), ist ein sehr veränderlicher Körper, der unter mancherlei Gestalten zum Vorschein kommt, und in seiner Gestalt ziemlich der Blumenkrone (*Corolla*) ähnlich ist. Es giebt verschiedene Arten:

1. *einblättrig* (*monophylla*), z. B. *Narcissen*. Fig. 146.

2. *zwei-, drei-, vier- u. s. w. vielblättrig* (*di-, tri-, tetra- etc. polyphylla*), der aus mehreren Blättern besteht, die nach der Zahl verschieden sind, z. B. *Silene*, *Stapelia* u. a. m. Fig. 66. 98. 100. 110. 111. 153. 154.

3. *kappenförmig* (cucullata), diese Art zeigt sich bei *Asclepias*, sie bedeckt den ganzen Stempel von oben her wie eine Kappe. Fig. 88.

(Gehört nicht hieher. L.)

4. *staubfadenförmig* (staminiformis), welche die Gestalt eines Staubgefäßes hat, z. B. *Stratiotes*. (Sind *parastamina*. L.)

Die *Honiglippe* (Labellum), ist ein blumenblattförmiger Körper, der bei den Orchideengewächsen vorkommt. Er ist von mannigfaltiger Gestalt, ganz einfach, drei- oder fünftheilig, horizontal liegend, herabhängend, aufwärtssteigend, zuweilen bauchig und hohl, wie bei der Gattung *Cypripedium*, zwischen der Blume und den Staubfäden.

Unter diese Abtheilungen lassen sich alle Honiggefäße des Linnéfüglich einschalten, und sehr genau bestimmen. Bei einigen Blumen, besonders bei *Asclepias*, zeigen sich kleine knorpelartige Körper, die man *Tubercula* zu nennen pflegt und eigentlich unvollkommene oder vertrocknete Drüsen zu sein scheinen.

Die Honiggefäße der Gräser sehn den Balg (§. 82.) sehr ähnlich, unterscheiden sich aber durch ihre außerordentliche Feinheit. Sie sind ganz durchsichtig und sehr zart.

Die Gewächse, welche Kätzchen (Amenta) tragen, haben bisweilen auch Honiggefäße, die man gewöhnlich Schuppen (Squamae) nennt. Sie dienen bisweilen zur Aufbewahrung des Honigs, bisweilen zu andern Zwecken. (Diese Schuppen sind Bracteen. L.)

(Die Unbequemlichkeiten der bloss negativen Bedeutungen von *nectarium* hat man schon lange eingesehen. Es ist besser, diese Theile nach ihrer Natur einzutheilen und zu benennen. Sie sind 1) wahre ausschwitzende Glandeln, z. B. an *Ruta* 2) glandeartige Theile, welche keinen Saft ausschitzen, Fleischgewächse (*sarcomata*) oder wenn man keinen andern Namen will, ebenfalls *glandulae*, z. B. *Sinapis* etc.; 3) Anhängsel de

Blume oder des Kelchs, als Sporn, Bart, Klappe u. s. w.; 4) der Blume ähnliche Theile, Afterblumen, paracorollae, z. B. an *Asclepias*; 5) den Staubfäden oder Staubwegen ähnliche Theile, jene zwischen Staubfäden und Blumen, diese zwischen Staubfäden und Fruchtknoten, Afterfäden, Aftergriffel (parastamina, parastyli), z. B. an *Parnassia*, *Aconitum*. Diese und die vorigen sind Uebergänge von der Expansion der Blumen zur Contraction der Staubfäden (Nectarien nach Goethe); 6) dem Fruchtknoten ähnliche Theile, Afterfrucht (paracarpium), z. B. an *Urtica*; 7) der Fruchträger (gynophorum) wird oft seiner Anhängsel wegen zu den Nectarien gerechnet. Er bildet einen Stiel, der länger (*Helicteres*) oder kürzer (*Silene*) ist, zuweilen breitet er sich in eine flache, fleischige Unterlage aus, die man *discus* genannt hat (*Acer*), oder in eine gewölbte, fleischige und abfallende (*Fragaria*). Oft ist er im Umfange mit einer Frucht- oder Stempelhülle (perigynium) besetzt, und diese besteht zuerst aus einem Kreise von Drüsen (*Ruta*), oder aus einem fleischigen Ringe (*Gratiola officinalis*), der zuweilen lappig ist (*Cobaea scandens*), oder aus Schuppen (*Sedum*), oder aus blumenblattartigen Theilen (*Commersonia*) oder aus kapselartiger Hülle (*Carex*). Auch die Calyptra der Moose gehört hieher. Die Honigsammlung (nectarium) ist eine besondere Vertiefung bald des Blumenblatts, bald der Glandeln, bald der Kelchröhre (cuniculus, nicht tubulus an *Pelargonium*), bald der Afterfäden u. s. w. Die Nectarien der Gräser sind eine Nebenblume (paracorolla), welche an der Stelle der wahren Blume steht, aber doch in Structur verschieden ist und nicht dem Blatte, sondern der Blattscheide entspricht. L.)

96. Der *Saftfaden* (*Paraphysis* seu *Filum succulentum*), ist ein gegliederter zarter der fadenförmigen Gestalt sehr nahe kommender Körper, der sich um die Befruchtungsorgane der Moose in Menge gestellt findet. Er ist nur unter starker Vergrößerung bemerkbar. Er ist

1. *fadenförmig* (filiiformis), der gleich dick überall erscheint. Fig. 127. 131. 133.

2. *zugespitzt* (acuminata), der an der Spitze stark verlängert und dünne ist.

3. *stumpf* (obtusa), der am Ende rund zu läuft.

4. *keulförmig* (clavata), der nach oben hin verdickt ist.

5. *netzartig-keulförmig* (reticulato-clavata), von der vorigen Gestalt, aber netzartig bezeichnet.

6. *kuglich-keulförmig* (globoso-clavata), der aus kuglichen Gliedern besteht, von denen die oberen am grössten sind. Fig. 130.

7. *stachelspitzig* (mucronata), der stumpf ist, aber sich mit einer kurzen Borste endigt.

8. *veränderlich* (polymorpha), dessen Gestalt in einer Blume verschieden ist.

(Sie sind Afterfäden parastamina, wovon die Aftergriffel (parastyli) in den Blüthen der Moose auffallend und deutlich verschieden sind. L.)

97. Die *Staubgefässe* (Stamina), gehören zu den wesentlichen Theilen der Blume, und sind längliche Körper, die (gewöhnlich. L.) eine Menge Staub tragen, der zur Befruchtung wesentlich ist.

Die Theile des Staubgefässes sind: *der Staubfaden* (Filamentum), *der Staubbeutel* (Anthera), und *der Blumenstaub* (Pollen).

98. Der *Staubfaden* (Filamentum), ist ein länglicher Körper, der zur Aufrechthaltung des Staubbeutels bestimmt ist. In seiner Gestalt ist er sehr verschieden:

1. *haarförmig* (capillare), der gleich dick und so fein als ein Haar ist.

2. *fadenförmig* (filiforme), der vorhergehende, nur dicker. Fig. 68.
3. *pfriemförmig* (subulatum), der unten dicker als oben ist. Fig. 67.
4. *ausgebreitet* (dilatatum), der auf beiden Seiten zusammengedrückt ist, dass er ganz breit und blattförmig aussieht. Fig. 69. 47.
5. *herzförmig* (cordatum), die vorhergehende Art, nur oben ausgerandet und nach unten spitz zulaufend, z. B. Mahernia. Fig. 48.
6. *keilförmig* (cuneiforme), ein ausgebreiteter Staubfaden, der nach unten spitz zuläuft, oben aber in einer geraden Linie abgeschnitten ist, z. B. Lotus Tetragonolobus.
7. *frei* (liberum), der nicht mit andern zusammenhängt.
8. *zusammengewachsene* (connata), wenn mehrere in einen Cylinder oder Bündel zusammengewachsen sind, z. B. Malva, Hypericum. Fig. 23. 27. 56.
9. *zweispaltig* (bifidum), wenn ein Staubfaden in zwei Theile gespalten ist.
10. *vielspaltig* oder *ästig* (multifidum s. ramum), wenn er in viele Aeste zertheilt ist, z. B. Carolina princeps. Fig. 58.
11. *gegliedert* (articulatum), wenn der Staubfaden ein bewegliches Glied hat, z. B. Salvia officinalis. Fig. 80.
(Linné sagt in diesem Falle besser filamenta transverse pedicello affixa. L.)
12. *gegeneinandergebogen* (conniventia), wenn mehrere mit ihren Spitzen einander zugebogen sind.
13. *gekrümmt* (incurvum), der eine gebogene Gestalt hat. Fig. 45.
14. *abwärtsgebogen* (declinata), wenn mehrere

nicht aufrecht stehn, sondern allmählig, ohne einen starken Bogen zu beschreiben, sich nach dem oberen oder untern Theil der Blume beugen, z. B. *Pyrola*.

(Wenn sich die Staubfäden in einem Bogen nach unten beugen, so heissen sie *declinata*, wenn sie aber in einem Bogen nach oben beugen, so heissen sie *adscendentia*. L.)

15. *haarig* (*pilosum*), der mit Haaren besetzt.

16. *gleichlange* (*aequalia*), die von gleicher Länge sind.

17. *ungleiche* (*inaequalia*), wenn einige länger, andere kürzer sind. Fig. 50. 51.

Die Staubfäden sitzen auf verschiedenen Theilen der Blumen fest, die man bei genauerer Beschreibung bestimmen muss. (Sie sitzen nämlich auf dem Blütenboden (*stamina hypogyna*) oder auf dem Kelch und der Blumenkrone (*stam. perigyna*), oder auf dem Fruchtknoten (*stam. epigyna*). L.)

(Der Theil des Staubfadens, welcher die beiden Theile der Anthere mit einander verbindet, heisst der *Bindfaden* (*connecticulum*) und zwar, wie gewöhnlich, fadenartig ist. Zuweilen aber wird er blumenblattartig oder dick und fleischig und man kann ihn in beiden Fällen *antherenträger* (*antherophorum*, *antherium*) nennen. Im ersten Falle ist er oft über dem Staubbeutel *erweitert* (*ampliatum*) und zwar zweitheilig, vietheilig, kammförmig, auch mit häutigen Anhängseln versehen, wovon die *Scitamineae* Beispiele geben. L.)

99. Der *Staubbeutel* (*Anthera*), ist ein hohler zelliger (die Häute bestehen aus Zellen, nicht aus Höhlung. L.) Körper, der eine Menge Blumenstaub enthält. Die Arten desselben sind:

1. *länglich* (*oblonga*), der lang und an beiden Enden spitz zulaufend ist.

2. *linienförmig* (*linearis*), der lang und flach, ab überall gleich breit ist.

- kugelförmig** (globosa),
niereförmig (reniformis), der kugelförmig auf einer Seite, aber tief eingebogen ist, z. B. *Glechoma hederacea*, *Digitalis purpurea* u. a. m. Fig. 68.
gedoppelt (didyma), wenn zwei zusammen hängen zu sein scheinen. Fig. 45.
pfeilförmig (sagittata), der lang zugespitzt und an der Basis in zwei Theile gespalten ist. Fig. 67.
zweispaltig (bifida), der linienförmig, aber oben und unten getheilt ist, z. B. bei den Gräsern. Fig. 94.
schildförmig (peltata), der zirkelförmig, auf der Seiten flach und in der Mitte am Staubfaden befestigt ist, z. B. *Taxus baccata*. Fig. 64.
gezähnt (dentata), der am Rande mit Zähnen besetzt ist, z. B. *Taxus baccata*. Fig. 64.
haarig (pilosa), der mit Haaren besetzt ist, z. B. *Thymium album*. Fig. 65.
zweiförmig (bicornis), welcher an der Spitze zwei pfriemförmige Verlängerungen hat, z. B. *Pyrola rotunda*, *Erica* u. a. m. Fig. 63.
gegrannt (aristata), der an der Basis zwei stachelartige Ansätze hat, z. B. *Erica*.
kammförmig (cristata), wenn zwei knorpelartige gezähnte Spitzen an der Seite oder auch an der Basis sitzen, z. B. einige *Ericae*.
wehrlos (mutica), wenn er weder gegrannt, noch kammförmig ist. Also der Gegensatz der beiden vorhergehenden.
eckig (angulata), der mehrere sehr tiefe Furchen hat, dass dadurch vier oder mehrere Ecken entstehen.
zweifächrig (bilocularis), wenn der Staubbeutel innerhalb durch eine Scheidewand in zwei

Theile oder Fächer getheilt ist. (In der Regel die Staubbeutel zweifächrig, s. Anm. L.)

17. *getrennt* (*loculis disjunctis*), wenn die Fächer des Staubbeutels weit von einander trennt sind, z. B. *Orchis*, *Asclepias*. (Beispiele passen nicht. Die *Scitamineae* gehören her. L.)

18. *einfächrig* (*unilocularis*), wenn nur Höhlung im Staubbeutel ist.

(18a. *viereckig* (*quadrilocularis*), wenn Fach durch eine Querwand in zwei Fächer theilt ist (*quadrivalvis*).

18b. *ungleichklappig* (*inaequivalvis*), wenn Klappen, womit die Anthere aufspringt, ungleich sind, *Berberis*.

18c. *ungleichfächrig* (*inaequilocularis*), die beiden Fächer der Anthere von einander verschieden sind. L.)

19. *an der Seite aufspringend* (*latere dehiscens*).

20. *an der Spitze aufspringend* (*apice dehiscens*).

21. *hautlos* (*decorticata*), wenn die Masse des Blumenstaubs ohne von einer Haut bedeckt zu sein länglicher Gestalt zusammenhängt, z. B. *Orchis*, *Asclepias*. (Ist kein genau bezeichnender Ausdruck).

22. *frei* (*libera*), der nicht mit andern verwachsen ist.

23. *verwachsene* (*connatae*), wenn mehrere oder Röhre zusammengewachsen sind. Fig. 84. 8

24. *aufrecht* (*erecta*), der mit seiner Basis gerade auf der Spitze des Staubfadens steht. Fig. 67.

25. *auflegend* (*incumbens*), der wagerecht oder auch schief auf dem Staubfaden befestigt ist. Fig. 126.

26. *seitwärts befestigt* (*lateralis*), der mit der

1. Seite auf der Spitze des Staubfadens festsetzt.
: 68.

7. *beweglich* (*versatilis*), wenn die beiden vorgehenden Arten ganz leicht mit dem Staubfaden zusammenhängen, dass durch die mindeste Berührung der Staubbeutel hin und her bewegt wird.

8. *angewachsen* (*adnata*), wenn der Staubbeutel an beiden Seiten der Spitze des Staubfadens dicht angewachsen ist. Fig. 69.

9. *sitzend* (*sessilis*), der keinen Staubfaden hat.

Der innere Bau des Staubbeutels ist in der Physiologie genauer beschrieben.

Die Staubbeutel bestehn fast bei allen Gewächsen aus einer zelligen Haut, welche Blumenstaub einschliesst, nur bei den Orchisarten (§. 153. Nr. 7.) und bei einigen mit *Asclepias* verwandten Gewächsen sind sie ohne Haut; (ist nicht ganz richtig. L.) der Blumenstaub ist bei diesen Gewächsen schmierig und hängt in der Form eines Staubbeutels zusammen.

(In den *Asklepiadeen* findet sich in einem Beutel eine gelbe nicht körnige Masse statt des Staubes, in den *Orchideen* ist der Staub körnig oder wachsartig, s. unten. L.)

Die Blüthen der *Moose* enthalten nur einzelne Körner Blumenstaub, welche durch kleine gegliederte kaum bemerkbare Fäden oder auch ohne diese in der Blume festsitzen. Diese Körner Blumenstaub öffnen sich an der Spitze. Fig. 127.

Bei den *Farnkräutern* und bei den *Pilzen* (auch *Lichenen* und *Wasseralg.* L.) sind wahrscheinlich keine Staubbeutel und Staubfäden vorhanden, sondern vielleicht nur kleine Körner Blumenstaub. (?) L.)

Der *Schachtelhalm* hat spatelförmig erweiterte Staubfäden, welche mit einzelnen Körnern Blumenstaub bestreut sind. Fig. 10.

(Es ist sehr zweifelhaft, sogar sehr unwahrscheinlich, dass diese Fäden Staubfäden sind. Die Körner darauf haben viele Botaniker nicht gefunden. L.)

(Der Staubbeutel in seiner vollkommensten Gestalt besteht aus zwei neben einander liegenden Loculi (loculi), wovon jedes wiederum zuweilen in zwei Abtheilungen (loculamenta) getheilt wird, dadurch, dass die Ränder nach innen gerollt sind. Meistens öffnen sich die Fächer durch eine längliche Spalte, so dass der ganze Staubbeutel zwei Spalten hat, zuweilen durch zwei Löcher an der Spitze, welche durch eine feine Haut wieder in zwei Oeffnungen getheilt sind. Die beiden Fächer liegen neben einander (appositi) oder gehen an einem Ende von einander ab, *abstehen* (divergentes), oder an beiden Enden *kreuzförmig* (cruciformes), z. B. *Glechoma hederaceum*, wo eines liegt nach oben, das andere nach unten entgegengesetzt (oppositi) z. B. *Digitalis*, wo sie sind von einander gesondert (separati) z. B. *Scitamineae*.

Zuweilen winden sich die Staubbeutel um eine fleischige Unterlage, z. B. *Cucurbitaceae*.

An den Asklepiaden werden die beiden Griffel von einem erweiterten fleischigen Körper bedeckt. Viele halten diesen Körper für eine fleischig erweiterte Narbe (stigma). Aber die Untersuchung der Theophrasta, einer den Asklepiadeen nahe stehenden Pflanzengattung, zeigt, dass dieser Körper eine fleischige Erweiterung der Staubbeutel oder vielmehr das antherium ist mit den Griffeln und Antheren verwachsen. Ich nenne diesen Theil *Stieldeckel* (stylostegium). In diesem Stieldeckel befinden sich zwei gestielte Beutel von gelber Farbe mit einem gleichförmigen gelben Stoffe gefüllt. Diese beiden Beutel hält Jacquin für die Antheren, R. Brown für die Fächer der Antheren. Man kann sie Pollenmassen (pollinaria) nennen. Sie verbinden sich mit einem drüsenartigen Körper, welcher die Gestalt eines zusammengesetzten sehr kurzen braunen Fadens hat u. von R. Brown eine Glandel genannt wird. Er scheint eine verkümmerte Anthere. R. Brown sah dass im Anfang die gelben Körper von der Drüse getrennt sind, aber dieses scheint wohl nur so, weil die Verbindung in früherer Zeit und zwar wegen Mangel der Färbung noch nicht sichtbar ist.

In den Orchideen sind Staubfäden und Staubbeutel in einen Theil in der Mitte der Blume ein

verwachsen, welchen man die Säule, Stempelsäule (*columna*) zu nennen pflegt. Richard hat ihm den Namen *gynostemium* gegeben (Stempelsäule). An der Spitze derselben ist eine Aushöhlung (*clinandrium* Rich.), worin die Anthere liegt. Gewöhnlich ist nur eine vorhanden, mit zwei Fächern, und zwar ist sie häutig oder fleischig. Sie steht entweder gerade, die Höhlung der Fächer nach vorn gekehrt, (*Orchis*) oder sie ist vorwärts gebogen, die Spitze nach vorn, die Höhlung nach unten gekehrt (*Goodyera*), oder sie ist ganz umgekehrt, die Höhlung nach hinten so, dass sie die Staubmassen, wie ein Deckel, bedeckt. Sie ist entweder mit der Stempelsäule fest verwachsen, oder löst sich sehr leicht davon ab. Der Blütenstaub liegt entweder lose in den Fächern der Anthere, oder er befindet sich auf einem Stiel (*caulicula* Richard.) und bildet eine Staubmasse (*massa pollinis, pollinarium*) und zwar nur eine ungetheilte in jedem Fache oder eine zweifach und vierfach getheilte in jedem Fache. Im erstern Falle ist der Staublose körnig und pulverig, im letztern besteht er aus eckigen, in eine Fläche zusammengestellten Körnern. Die häutigen Auhängsel der Stempelsäule nennt R. *staminodia* (Trägerblättchen). Unter dem Staubbeutel und zwischen den Fächern desselben befinden sich an der Stempelsäule hervortretende Theile, welche die Verrichtung der Narbe haben. Eine mit Schleim besetzte Fläche, nennt R. *gynizus* (Narbenfläche). Gewöhnlich tritt über derselben eine Verlängerung, ein Schnabel hervor, worin sich eine Drüse (*proscolla* R.) befindet, an deren klebrigem Saft der Blütenstaub hängen bleibt. Zuweilen haben auch die Stiele der Pollenmassen an ihrem untern Theile eine Drüse (*retinaculum* R.) mit einem klebrigen Saft, welche nicht selten in einer Vertiefung (*bursicula*) sich befindet. Die Pollenmassen mit ihren Stielen fallen oft heraus, und bleiben mit ihren Drüsen auf andern Theilen der Blüthe und sogar der Bracteen und Blätter kleben.

100. Der *Blumenstaub* (Pollen), ist ein feiner Körper, der (meistens L.) in Gestalt des zartesten aubes sichtbar ist. Unter einer starken Vergrösse-

zung hat er mancherlei Formen, und zeigt sich | mit einer befruchtenden Feuchtigkeit angefüllt, v | über mehr in der Physiologie gesagt wird.

101. Der *Stempel* (*Pistillum*), ist der zw | wesentliche Theil der Blume. Er steht beständi | der Mitte derselben und besteht aus drei Thei | nemlich aus dem *Fruchtknoten* (*Germen*), dem *G | fel* (*Stylus*), und der *Narbe* (*Stigma*).

Der Stempel und die Staubgefäße sind die Be | tungsorgane der Pflanzen, wie in der Physiok | gezeigt wird.

102. Der *Fruchtknoten* (*Germen*), macht | untersten Theil des Stempels aus, und ist der I | wurf der künftigen Frucht. Die Zahl der Fruchtk | ten ist sehr verschieden, und man bestimmt diese | sechs oder acht, alsdann sagt man mehrere oder vi | Die Figur ist auch sehr abweichend. Die vorzü | chen Arten sind:

1. *sitzend* (*sessile*), der keinen Stiel hat. Fig.

2. *gestielt* (*pedicellatum*), der mit einem S | versehen ist. Fig. 27. 144.

3. *oberhalb befindlich* (*superum*), wenn | Fruchtknoten vom Kelch, oder wenn dieser fehlt, v | den übrigen Theilen der Blume umgeben ist. F | 115. 122.

4. *unterhalb befindlich* (*inferum*), wenn | Fruchtknoten unter dem Kelch, oder, wenn die | fehlt, unter der Blumenkrone steht. Fig. 118. 153.

Wenn von der Lage des Fruchtknotens die Rede i | so bestimmt man diese nach dem Kelche, denn | kann der Fruchtknoten vom Kelche umgeben se | und doch unter der Blumenkrone stehn. Nur da | wenn der Kelch fehlt, richtet man sich bei A | gabe der Lage desselben nach den andern Th

I. Terminologie.

len. *Germen inferum* wird auch wol durch *Flos epicarpus* oder *Flos* und *Germen superum*, durch *Flocculus* oder *Flos inferus* ausgedr. (§. 98. Anm. L.)

103. Der *Griffel* (*Stylus*), ist auf dem Fruchtknoten befestigt, und hat das Aussehen einer kleinen Säule oder eines Stiels. Die Arten sind:

1. *haarförmig* (*capillaris*), der sehr dünne und gleich dick ist.

2. *borstenartig* (*setaceus*), eben so dünne wie die vorige Art, nur an der Basis etwas stärker.

3. *fadenförmig* (*filiformis*), der lang und rund ist.

4. *pfriemförmig* (*subulatus*), unten dick, nach oben zugespitzt.

5. *dick* (*crassus*), der gleich dick und kurz ist.

6. *keulförmig* (*clavatus*), der oben dicker als unten ist.

7. *zwei-, drei-, vier- u. s. w. mehrtheilig* (*bifidus, trifidus, quadri- etc. multifidus*), der nach einer bestimmten Zahl gespalten ist.

8. *gabelförmig* (*dichotomus*), der in zwei Theile gespalten ist, und dessen Spitzen wieder zweispaltig sind.

9. *gipfelständig* (*terminalis*), der an der Spitze des Fruchtknotens steht.

10. *seitwärts* (*lateralis*), der an der Seite des Fruchtknotens fest sitzt.

11. *aufrecht* (*rectus*), der gerade in die Höhe steht.

12. *abwärts geneigt* (*declinatus*), der nach der Seite zu hinliegt.

S. §. 98. Nr. 14. L.)

13. *bleibend* (persistens), der nicht abfällt.

14. *welkend* (marcessens), der verwelkt und nachher abfällt.

15. *abfallend* (diciuus), der gleich nach der Befruchtung abfällt.

Die Zahl der Griffel wird auch genau bestimmt, denn öfters sind mehr als ein Griffel auf einem Fruchtknoten, und dies muss genau angezeigt werden. Die Länge des Griffels wird nach den Staubgefäßen festgesetzt, ob er länger oder kürzer als diese ist.

104. Die *Narbe* (Stigma), findet sich in der Nähe der Spitze des Griffels, und unterscheidet sich häufig durch ihre Farbe oder durch ihre Bildung vom Griffel; aber öfters, besonders wenn sie an der Spitze desselben steht, ist sie nur durch Vergrößerung sichtbar. Die Arten davon sind:

1. *spitzig* (acutum), wenn sie eine feine Spitze hat.

2. *stumpf* (obtusum), die eine stumpfe Spitze hat.

3. *länglich* (oblongum), die dick und länglicht ist.

4. *keulförmig* (clavatum), die eine kleine Keule vorstellt.

5. *kugelförmig* (globosum), die eine vollkommen runde Kugel macht.

6. *kopfförmig* (capitatum), die eine unten flach gedrückte Kugel vorstellt.

7. *ausgerandet* (emarginatum), wenn die vorhergehende Art oben einen Ausschnitt hat.

8. *schildförmig* (peltatum), die vollkommen tellerförmig ist.

9. *hakenförmig* (uncinatum), wenn eine spitze Narbe umgebogen ist.

10. *eckig* (angulosum), wenn sie dick und m

tiefe Furchen, die hervorstehende Ecken bilden, versehen ist.

11. *dreilappig* (trilobum), die aus drei runden, etwas flach gedrückten Köpfen besteht. Fig. 153.

12. *gezähnt* (dentatum), wenn sie feine Zähne hat.

13. *kreuzförmig* (cruciforme), wenn die Narbe in vier Theile gespalten ist, von denen immer zwei und zwei gegeneinander über stehn.

14. *pinselförmig* (penicilliforme), die aus einer Menge kurzer dicht gedrängter fleischiger Fasern, in Gestalt eines Pinsels, besteht.

15. *hohl* (concavum), wenn sie eine kugelförmige oder längliche Gestalt hat, aber ganz ausgehöhlt ist, z. B. Viola.

16. *kronenartig* (petaloideum), wenn sie wie ein Blumenblatt gestaltet ist, z. B. Iris. Fig. 70.
(Eigentlich ein Anhang der Narbe. L.)

17. *zwei-, drei- u. s. w. vieltheilig* (bi-, tri- etc. multifidum). Fig. 84.

18. *zurückgebogen* (revolutum), wenn die Spitzen einer zwei- oder mehrmal getheilten Narbe nach aussen zurückgerollt sind. Fig. 84.

19. *einwärts gebogen* (convolutum), wenn die Spitzen einer getheilten Narbe nach innen gerollt sind.

20. *spiralförmig* (spirale), wenn eine mehrmal getheilte Narbe wie eine Uhrfeder aufgerollt ist.

21. *federartig* (plumosum), wenn die Narbe auf beiden Seiten gleichförmig feinbehaart ist, dass sie die Gestalt einer Feder hat, z. B. Gräser. Fig. 94. 95.

22. *haarig* (pubescens), die mit kurzen weissen Haaren besetzt ist.

23. *seitwärts sitzend* (laterale), die an der Seite des Griffels oder des Fruchtknotens ansitzt.

24. *sitzend* (*sessile*), wenn der Griffel fehlt, u sie auf dem Fruchtknoten sitzt.

Eigentlich besteht die Narbe aus einer gross Menge einsaugender Wäzchen, die nicht immer ob Vergrösserung sichtbar sind. Bei *Mirabilis Jals* kann man sie am deutlichsten sehn.

(Nicht immer ist eine grosse Menge da. Diese Wi zen schwitzen eine klebrige Feuchtigkeit a welche den Blumenstaub aufnimmt.

Ueber die sonderbare Gestalt der Narbe an d Asklepiaden, s. §. 99. An den Orchideen si Griffel und Narbe. mit dem Staubbeutel verwa sen, s. §. 99. L.)

105. Der Stempel der Moose ist mit ein Fruchtknoten, Griffel und Narbe versehn, und wek nicht von den übrigen Gewächsen ab. Nur sind l den Moosen mehrere Stempel, von denen nur ein zur vollkommenen Frucht gebildet wird, die ande vergehn. Diese nicht zur Vollkommenheit kommen Stempel, werden *Zuführer* (*Prospyphes s. addu tores*) genannt. Der Schachtelhaln (*Equisetum*) hat keinen Griffel, eben so auch die andern Farrnkrä ter (*Lichenen*, *Wasseralgen*. L.) und Pilze. Bei d Farrnkräutern hat der Stempel die Gestalt eines Kör chens; bei den Pilzen ebenfalls, nur dass diese in 6 stalt eines kleinen Netzes zusammengedrängt sind.

(Sowohl an den Farrnkräutern, als den Pilzen keine Narbe zu sehen. L.)

An allen genannten Gewächsen kann man n durch starke Vergrösserungen denselben gewahr we den.

106. Wenn die Gewächse verblüht sind, so en steht aus dem Fruchtknoten (*Germen* §. 102.) *die Fruc* (*Fructus*). Diese ist entweder freiliegender *Sam*

I. Terminologie.

(Semen) oder eine Haut, harte Schale oder auch andere Substanz, die den Samen einschliesst, welche die *Fruchthülle* (*Pericarpium* §. 107.) genannt wird. Es lassen sich daher alle Gewächse in zwei grosse Abtheilungen bringen, nemlich in solche: welche *frei samentragend* sich zeigen (*vegetabilia gymnospermia*), das heisst, bei denen Fruchtknoten sich in ein oder mehrere Samen verwandelt; oder die *verschlossenen samen* (*vegetabilia angiospermia*), das ist, deren Fruchtknoten in eine Fruchthülle auswächst. Von der ersten Art, nemlich von den *frei samentragenden*, sind bis jetzo nur vier Verschiedenheiten bemerkt worden, nemlich:

1. *einsamige* (*vegetabilia monosperma*), wo der einzelne Fruchtknoten in einen Samen wird.

2. *zweisamige* (*disperma*), wenn aus zweien oder einem gespaltenen Fruchtknoten einer Blume zwei freie Samen entstehen, z. B. *Umbellae*.

3. *viersamige* (*tetrasperma*), wenn vier oder ein vierfach gespaltenen Fruchtknoten in einer Blume sich in vier freie Samen verwandelt, z. B. *Didynamia*, *Asperifoliae*.

4. *vielsamige* (*polysperma*), wenn aus mehreren in einer Blume sich zeigenden Fruchtknoten mehrere Samen entstehen, z. B. *Potentilla*, *Geum*.

Die Fruchthülle und der Same zeigen in ihren Theilen eine grosse Verschiedenheit, die in den folgenden Paragraphen näher bestimmt wird.

(Es giebt keine nackte Samen, sondern immer ist eine Fruchthülle ausser den eigenthümlichen Hüllen des Samens vorhanden. In allen von dem Verf. angeführten Fällen erkennt man die Fruchthülle deutlich. In den Gräsern wird sie gegen die Reife des Samens und bei derselben sehr zart, dicht mit

der Samenhülle verbunden und daher kaum zu erkennen, im frühern Zustande des Samens lang vor der Reife erkennt man sie aber sehr wohl. Ich nenne Samenhülle (*amphispermium*) wenn die Fruchthülle die Gestalt des Samens ganz ungar hat, so dass die Stelle der Anheftung für Samen und Hülle eine und dieselbe ist. Diese Samenhülle könnte man *seminium* nennen, wenn sie mit dem Samen so verwächst, dass sie sich nicht als eine dünne Oberhaut des Samens zeigt, z. B. an den Gräsern. Richard nennt sie *caryopsis*, wenn sie mit dem Samen innig verwächst, und man darf hinzusetzen, so dass sie dichter und fester wird, die äussere Schale des Samens aber, ihr eine dünne innere Haut angewachsen ist, z. B. an den Labiaten. Richard nennt ferner *akena*, *baccachaenium*, eine solche Fruchthülle, welche zwar mit der äussern Schale des Stammes verbunden ist, doch so, dass sie leicht davon kann gesondert werden, z. B. an den Borragineis. Hat aber die Fruchthülle eine andere Gestalt als des Stammes oder auch nur eine andere Lage, oder sind mehrere Samen vorhanden, so ist sie eine Fruchthülle in engerer Bedeutung (*pericarpium*). S. den folgenden §. L.)

107. Die *Fruchthülle* (*Pericarpium*), heisst die Bedeckung, welche den Samen einschliesst. (S. §. 104. Anm. L.) Die Arten derselben sind: die *Hautfrucht* (*Utriculus*), die *Flügel Frucht* (*Samara*), die *Ballkapsel* (*Folliculus*), die *Kapsel* (*Capsula*), die *Nuss* (*Nux*), die *Steinfrucht* (*Drupa*), die *Baie* (*Bacca*), der *Apfel* (*Pomum*), die *Kürbisfrucht* (*Pepo*), die *Schoote* (*Siliqua*), die *Hülse* (*Legumen*), die *Gliederhülse* (*Lomentum*), die *Büchse* (*Theca*), die *Sackfrucht* (*Sporangium*), die *Kugelfrucht* (*Sphaerula*).

(Die Fruchthülle scheidet sich in allen Früchten selb deutlich in drei Theile, von welchen Richard die äussersten *Aussendecke* (*epicarpium*), den mittleren *Mitteldecke* (*mesocarpium*), den innern *Innendecke*

(endocarpium) nennt. Die Dicke dieser drei Theile ist gar sehr verschieden, und oft der eine oder andere eine zarte Haut, indem die übrigen fleischig oder holzig sind. L.)

108. Die *Hautfrucht* (Utriculus), besteht aus einer dünnen Haut, welche ein einziges Samenkorn einschliesst. Arten derselben sind:

1. *schlaff* (laxus), die ganz locker den Samen einschliesst, z. B. Adonis, Thalictrum. Fig. 165. 166.

2. *straff* (strictus), die ganz dichte den Samen umgiebt, z. B. Galium.

3. *rundum aufspringend* (circumscissus), die in der Mitte rundum einen Riss bekommt, und so aufspringt, z. B. Amaranthus.

Von der äussern Haut des Samens unterscheidet sich die Hautfrucht dadurch, dass zwischen dem Samenkorn und der äussern Haut ein geringer Zwischenraum ist, und dass das Samenkorn durch die Nabelschnur mit derselben zusammenhängt. Von der Nuss ist die Hautfrucht durch die geringe Härte und Nachgiebigkeit der Haut verschieden.

(Der Name ist unbequem, da er anatomisch gebraucht wird. Im ersten und zweiten Falle ist die Frucht ein achaenium membranaceum, im dritten eine capsula membranacea. L.)

109. Die *Flügelfrucht* (Samara), heisst eine häutige Fruchthülle, die einen, höchstens zwei Samen einschliesst, und mit einer dünnen durchsichtigen Haut entweder in ihrem ganzen Umfange, oder an der Spitze, oder auch an der Seite eingefasst ist (und nicht aufspringt. L.), z. B. Ulmus. Fig. 162. 163.

Acer, Fraxinus, Betula u. m. a. Die Arten werden nach der Zahl der Samen, ob einer oder zwei in der Frucht enthalten sind, oder auch nach dem Orte, wo

die dünne Haut, die man *Flügel* (Ala) nennt, festsetzt, bestimmt.

(Da Samara eine Pflanzengattung bezeichnet, so müsste man hier Namen ändern, aber man kann die Flügel Frucht zur Kapsel rechnen und capsula alata oder foliacea nennen. L.)

110. Der *Bergkapsel* (Folliculus), heisst eine längliche Fruchthülle, die, nach innen, der Länge nach in einer Ritze aufspringt, und dicht mit Samen angefüllt ist.

Die Balgkapsel steht selten einzeln; es pflegen immer zwei beisammen zu sein. Die Arten der Balgkapseln werden nach der Befestigung der Samen bestimmt, wenn nemlich in der Mitte eine Scheidewand ist, an der die Samen hängen, oder sie an den beiden Rändern, wo diese Frucht aufspringt, befestigt sind, z. B. *Asclepias*, *Vinca*, *Nerium* u. a. m. Fig. 170.

(Der Ausdruck folliculus wird in der Anatomie der Pflanzen gebraucht, und kann nicht doppelt angewendet werden. Es ist am besten, den ganzen Ausdruck hier zu verwerfen, und die Kapsel zu beschreiben, zumal da sie nur in einer natürlichen Ordnung vorkommt. L.)

111. Die *Kapsel* (Capsula), heisst eine Fruchthülle, die aus einer festen Haut besteht, mehrere Samen enthält, öfters in Fächer abgetheilt ist, und auf verschiedene Art aufspringt.

(Die Kapsel ist eine Fruchthülle, an welcher Nähte oder Spuren von Näthen sichtbar sind, wodurch die Klappen vereinigt werden, und welche bei der Reife weder hart oder vielmehr unbiegsam noch fleischig oder saftig wird. L.)

Die Theile der Kapsel sind folgende:

a) die *Scheidewand* (Dissepimentum), ist eine

I. Terminologie.

feste Haut, die den innern Raum der Kapsel durchschneidet und abtheilt.

(Sie bestehen gewöhnlich aus einer Duplicatur der innern Wandhaut der Fruchthülle, und gehen von der Mitte der Klappen aus, mittelklappige (*ventralia*), oder vom Rande, randklappige (*marginalia*), oder sie liegen zwischen den Klappen, zwischenklappige (*intervalvia*). Gehen sie vom Umfange bis zur Mitte, so heissen sie vollständig (*completa*), hören sie gegen die Mitte auf, unvollständig (*incompleta*), z. B. Mohn (*Papaver tonnicum*). L.)

b) die *Fächer* (*Loculamenta*), sind die Räume zwischen der Scheidewand und der Klappe.

c) das *Säulchen* (*Columella*), ist ein fadenförmiger (säulenförmiger. L.) Körper, der (durch die Axe. L.) mitten durch die Kapsel geht und durch den die Scheidewände (oft. L.) befestigt sind. (Zuweilen fehlt es und die innern Ränder der Scheidewände treten zusammen und bilden die Axe. L.) Fig. 169.

d) die *Klappen* (*Valvulae*), sind die auswendige Haut der Kapsel, die in verschiedene Theile der Länge nach zersprungen ist.

e) die *Naht* (*Sutura*), ist eine tiefe Furche, welche sich ausserhalb der Haut zeigt.

(Ist eine Furche oder erhabene Linie, woran man die Zusammenfügung zweier Theile erkennt. L.)

Die Arten der Kapsel werden nach der Figur, ob sie rund, länglich u. s. w. sind, bestimmt; ferner setzt man noch folgende Arten fest:

1. *einfächerig* (*unilocularis*), wenn sie keine Abtheilungen hat.

2. *zwei-, drei-, vier-* u. s. w. *vielfächerig* (*bi-, tri-, quadri-* etc. *multilocularis*), nach der Zahl der Fächer. Fig. 155.

3. *zwei-, drei-* u. s. w. *vielklappig* (*bi-, tri-* etc.

multivalvis), nach der Zahl der Klappen, die beim Aufspringen der Frucht zeigen. Fig. 156.

(*Capsula evalvis* oder *non dehiscens*, eine Kapsel, welche nicht aufspringt. In diesem Falle kann man die Zahl der Klappen, welche durch zu erkennen sind, auf folgende Weise bezeichnen: zwei- vielnähig (*bi- multivalvacea*). L.)

4. **zwei-, drei- u. s. w. mehrsamig** (*bi-, tri- polysperma*), nach der Zahl der Samen.

5. **dreifache** (*trilocca*), wenn eine dreifächerige Kapsel wie drei zusammengewachsene aussieht, *Thea*, *Euphorbia*, *Ricinus*, *Croton* u. s. w.

6. **beerenartig** (*baccata*), wenn die Haut fleischig und weich ist.

7. **rindenartig** (*corticata*), wenn die äussere hart und die innere weich ist, oder wenn die äussere schwammig, die innere häutig ist, z. B. *Magnolia officinalis*.

8. **holzartig** (*lignosa*), wenn die Rinde sehr hart ist, aber doch in Klappen aufspringt.

Nach der Art, wie die Kapsel sich öffnet, hat verschiedene Benennungen, z. B. an der Spitze aufspringend (*apice dehiscens*), an der Basis aufspringend (*basi dehiscens*), rundum in der Rinde aufspringend (*circumscissa*), mit einem Deckel sich öffnend (*operculata*) u. d. m.

(Folgende Bestimmungen nach Richard sind wichtig: Geschieht das Aufspringen durch die Mitte der Fächer, so heisst es *deh. loculicida*, Fächer reissend; geschieht es an der Stelle der Fächerwände und theilt diese in zwei Blätter, so heisst es *d. septicida*, Wandzerreissend. Wenn das Abreissen geschieht central (*centralis*) der Mittelsäule, oder am Rande (*parietalis*) der innern Wand der Klappen. L.)

Die Frucht der Lebermoose (*Musci hepatici*), auch eine Kapsel genannt. Sie haben über der

sei eine dünne sehr leicht abfallende Haut, die man *Mütze* (Calyptra) nennt. Die Kapsel springt in vier oder zwei Klappen auf (quadri- vel bivalvis) Fig. 227., oder sie öffnet sich durch mehrere Zähne an der Spitze, z. B. Marchantia.

Die Farrnkräuter zeigen folgende Verschiedenheiten an ihrer Kapsel.

1. *zwei- oder dreiklappig* (bi- s. trivalvis), wenn dieselbe in zwei oder drei Klappen sich öffnet und ganz glatt ist. Fig. 294.

2. *geringelt* (gyrata), wenn sie rundum mit einem gegliederten *Ring* oder *Saum* (gyrus, fimbria s. annulus) umgeben sind. Dieser macht dass sie der Quere nach unregelmässig aufreißt. Fig. 295. 296.

3. *falsch geringelt* (pseudo-gyrata), die an der Spitze mit strahlenförmigen Streifen versehen ist, als hätte sich ein Ring bilden wollen.

4. *durch eine Ritze aufspringend* (rima dehiscens), wenn sie oben durch eine kleine Spalte sich öffnet.

5. *durch ein Loch aufspringend* (poro dehiscens), die an der Spitze durch ein kleines Loch sich öffnet.

6. *vielfächerig* (multilocularis), die in viele Fächer getheilt ist. Diese ist zweierlei Art:

a) *der Länge nach aufspringend* (longitudinaliter dehiscens), die der Länge nach aufreißt und dann Querfächer hat, z. B. Marattia.

b) *mit Löchern aufspringend* (poris dehiscens), bei der jedes Fach sich mit einem Loche öffnet, z. B. Danaea Fig. 303.

Bei den Pilzen zeigen sich Kapseln, welche fast immer acht Samen enthalten und dieselben mit Elasticität aus der Spitze herausstossen. Fig. 287. Zuweilen werden bei feuchtem Wetter an den Pe-

ziza-Arten die ganzen Kapseln herausgetrie
Die Lichenen haben dieselbe Art von Kapseln
acht Samen. Man sieht aber auch Pilze, wo
vier Samen in der Kapsel zu sein scheinen, g
betrachtet stecken aber immer zwei Samen i
ner Haut, seltener sieht man sechzehn Sai
von denen zwei und zwei in einer Haut i
Fig. 283. (Ueber die Pilze s. unten §. 121. 1

112. *Nuss* (*Nux*), nennt man den Samen,
mit einer harten Schale bekleidet ist, die nicht
springt, z. B. *Corylus Avellana*, *Quercus Robur*,
nabis sativa. Fig. 205.

(Der Ausdruck ist eigentlich zu vieldeutig, abe
sehr angenommen, um ihn sogleich abzusch
Sie ist entweder eine caryopsis oder ein acha
um oder in dem häufigsten Falle eine Kapsel,
dadurch unterschieden von ähnlichen Theilen,
die äussere Schale bei der Reife hart gewo
ist. Es wäre vielleicht besser einer caryopsis
einem achaeium das Wort durum oder nucac
beizufügen, und nux allein auf die Kapsel ei
schränken, ja nur auf diejenige Kapsel, deren
the durch den harten Ueberzug verschwu
sind (s. unten Beere. Jede andere möchte cap
nucacea heissen.) L.)

Die Schale nennt man *die Nusschale* (*Pi
men*), und bestimmt alsdann, ob sie *hart* (*duru
oder zerbrechlich* (*fragile*) ist. Der Same den
Nuss enthält, heisst *der Kern* (*Nucleus*). Man
stimmt ferner, ob die Nuss *zwei-* oder *dreisamig*
vel trisperma) ist; ferner ob sie Fächer hat, r
lich *zwei-*, *drei-* oder *mehrfüchrig* (*bi-*, *tri-*,
multilocularis) ist.

113. *Die Steinfrucht* (*Drupa*), ist eine N
die mit einer dicken fleischigen, saftigen oder led
tigen Haut oder Masse bedeckt ist. Arten der S
frucht sind:

I. Terminologie.

1. *saftig* (*baccata*), wenn sie mit einer saftigen Rinde umgeben ist, z. B. *Prunus Cerasus*, *Armeniaca*, *domestica*, *Amygdalus Persica*, u. d. m.

2. *faserig* (*fibrosa*), wenn sie statt der fleischigen Rinde eine fasrige hat, z. B. *Cocos nucifera*.

3. *trockene* (*exsucca*), wenn sie statt der fleischigen Rinde mit einer schwammigen, häutigen oder lederartigen Masse bedeckt ist, z. B. *Juglans regia*, *Amygdalus communis*, *Tetragonia expansa*, *Sparganium*.

4. *geflügelt* (*alata*), wenn die Steinfrucht einen häutigen Rand, den man Flügel nennt, hat, z. B. *Balesia*.

5. *aufspringend* (*dehiscens*), deren äussere lederartige oder dicke Haut bei der vollkommenen Reife aufreisst, z. B. *Juglans regia*. Gewöhnlich ist dieses Aufspringen unregelmässig und nur bei der Gattung *Myristica* theilt sie sich in zwei reguläre Klappen. Fig. 204.

6. *ein-, zwei-, drei-, vierkernig* u. s. w. (*mono-, di-, tri-, tetrapyrena* etc.), die ein, zwei, drei, vier oder mehrere Nüsse enthält. Ist die harte Schale der Nuss aber mit dem Kerne verwachsen, so nennt man es eine kernige Beere.

Man muss bei genaueren Beschreibungen sowohl auf die Gestalt der Nuss, als auf ihre Fächer sehn.

Die Nuss der Steinfrucht hat zuweilen zwei, drei, oder mehrere Fächer. Fig. 171. 172. 173.

114. Die *Beere* (*Bacca*), ist eine saftige Frucht, die (meistens L.) mehrere Samen enthält, und nie aufspringt. Sie enthält die Samen bisweilen ganz ohne Ordnung, oder ist durch eine dünne Haut in Fächer abgetheilt.

(Die eigentliche Beere (*bacca*), ist eine Kapsel, de-

ren Nätze durch angewachsenes Fleisch (Zellgewebe) verschwunden sind. Dass Nätze vorhanden sein sollten, erkennt man theils aus den Fächern oder den Spuren derselben, oder auch an der Innendecke (endocarpium). Eine fleischige Caryopsis oder ein fleischiges Achaenium sollte man nur baccatum nennen. L.)

Es giebt folgende Arten:

1. *saftig* (*succosa*), die aus einer sehr weichen saftigen Substanz besteht, z. B. Solanum, Ribes u. m.

2. *rindig* (*corticiosa*), die mit einer harten Rinde bedeckt ist, so dass man sie nicht zerdrücken kann. Man sollte sie für eine Kapsel halten, aber sie springt nie auf, ist mit einer saftigen Masse angefüllt, und hat die Samen darin liegen, z. B. Garcinia Mangostana.

3. *trocken* (*exsucca*), die statt des Fleisches aus einer dicken lederartigen oder gefärbten Haut bedeckt ist, z. B. Hederæ Helix, Tilia.

4. *ein-, zwei-, drei-, vielsamig* u. s. w. (*mono-, di-, tri-, polysperma* etc.), nach der Zahl der Samen, die eine Beere enthält.

5. *ein-, zwei-, drei-, vielfächerig* (*uni-, bi-, tri-, multilocularis*), nach der Zahl der Fächer, worin die Beere eingetheilt ist.

6. *zwei-, drei- u. s. w. körnig* (*di-, tripyrenis* etc.), wenn die einzelnen Samen eine so harte Schale wie bei der Nuss haben, nur mit dem Unterschied, dass die harte Rinde mit der Haut des Samens untrennlich verbunden ist, wie §. 113. Nr. 6. schon gesagt ist. Auch bei den Apfelarten ist dies bisweilen der Fall.

(Es sind die einzelnen Fächer der Frucht hart geworden. L.)

Von der Beere ist noch zu merken, dass wenn in einer Blume viele Griffel beisammen stehen, und jeder der Fruchtknoten eine Beere trägt, man die

kleinen Beeren *Acini* nennt. Diese kleinen Beeren verwachsen in eine ganze Frucht und werden dann eine ***zusammengesetzte Beere*** (*Bacca composita*) genannt, z. B. *Rubus Idaeus* u. d. m.

Auch bei den Steinfrüchten ist dies bisweilen der Fall, z. B. *Artocarpus*.

Auf die Figur der Beere wird bei Beschreibungen genau gesehen.

115. Der *Apfel* (*Pomum*), ist eine fleischige Frucht, die innerhalb eine Samenkapsel enthält. Von der fleischigen Beere unterscheidet sich der Apfel durch die vollkommene innerhalb befindliche Kapsel.

Der Apfel ist eine Art der Beere, welcher sich dadurch auszeichnet, dass das Fleisch nicht in die Fächer zwischen die Samen gedrungen ist. L.)

Man betrachtet den Apfel nach seiner Substanz und Form, ob er fleischartig oder lederartig, rund, länglich u. s. w. ist. Beispiele von Äpfeln sind: *Pyrus Malus communis*, *Cydonia* u. a. m.

116. Die *Kürbisfrucht* (*Pepo*), ist eine gewöhnlich saftige Frucht, die ihren Samen an der inneren Fläche der Rinde befestigt hat, z. B. *Cucurbita Pepo*, *Cucumis sativus*, *Cucumis Melo*, *Passiflora*, *Stramonium Aloidis*, u. m. A. Arten der Kürbisfrucht sind: 1. *ein-*, *zwei-*, *drei-* u. s. w. *vielfächerig* (*uni-*, *bi-*, *tri-* etc. *multilocularis*), nach der Zahl der Fächer. Fig. 210. 212.

2. *halbfächerig* (*semilocularis*), wenn die Scheidewand nicht bis auf den Mittelpunkt reicht.

3. *fleischig* (*carnosus*), die mit einem festen weichen Fleische angefüllt ist.

4. *saftig* (*baccatus*), die mit einer sehr weichen Masse angefüllt ist.

5. *trocken* (*exsuccus*), die ohne Fleisch oder Saft sind.

6. *rindig* (corticosis), die eine sehr feste harte Rinde hat.

Die äussere Gestalt der Kürbisfrucht weicht noch sehr ab, und kommt in runder, keulförmiger Figur vor.

(Es scheint überflüssig die Kürbisfrucht durch einen besondern Kunstaussdruck zu unterscheiden. Da die Samen an den Wänden befestigt sind, scheint dies zweifelhaft und ist schwer zu sehen. Man kann sie also mit der Beere verbinden. L.)

117. Die *Schote* (Siliqua), ist eine trocken längliche Frucht, die aus zwei Hälften oder Klappen besteht, und ausserhalb, wo diese zusammenhängen, eine obere und untere Naht bildet. Innerhalb der Frucht auf beiden Seiten der Nähte, sowohl an der obern als an der untern, sind die Samen am Grunde der Scheidewand befestigt, z. B. Sinapis, Brassica s. w. Fig. 190. 191. Sind die Schoten eben so lang als sie breit sind, so nennt man sie *Schötchen* (Sili culae). Fig. 187. 188., z. B. Lepidium, Thlaspi s. w. Man unterscheidet die Schötchen nach der Art, wie die *Scheidewand* (Dissepimentum) steht. Wenn die beiden Klappen dieser Frucht flach sind und die Scheidewand, welche von einer Naht zur andern reicht, eben die Breite hat, sagt man: *mit einer Scheidewand gleichlaufend* (valvulis dissepimento parallelis). Sind aber beide Klappen der Frucht erhaben und hohl, so dass die beiden Nähte in der Mitte der Frucht zu stehn kommen, und die Scheidewand viel schmaler als die grössere Breite der Frucht wird, so sagt man: *mit einer Querwand* (valvulis dissepimento contrariis). Der Gestalt nach lassen sich noch viele Arten anführen:

Unter den Schötchen giebt es einige, welche eine

doppelte Rinde haben, eine äussere weiche oder schwammige und eine innere härtere, die den Samen in Fächern eingeschlossen enthält. Dergleichen Schötchen nennt man *steinfruchtartige* (*Sili culae drupaceae*). Die Arten der Schötchen aber, welche niemals aufspringen, nennt man *beerartige* (*baccatae*). Von der ersten Art kann Bunias, und von der zweiten Crambe zum Be weise dienen.

(Die Samen sitzen an einem gewöhnlich fadenförmigen Samenträger, welcher zwischen den Klappen in der Naht derselben auf beiden Seiten der Schote liegt. Die Nähte sind nicht selten mehr oder weniger mit einander verwachsen, wobei auch zuweilen die Innendecke hart wird. Zuweilen zieht sich die Schote hinter jedem Samen zusammen (*sil. torulosa*) und sondert sich daselbst in mehrere Stücke (*sil. articulata*). Uebrigens ist die Schote eine Art der Kapsel. L.)

118. Die Hülse (Legumen), ist eine trockene fleischige Frucht, die aus zwei Hälften oder Klappen besteht, die ausserhalb zwei Nähte bilden. Die Samen hängen innerhalb nur an den beiden Rändern der inneren Naht. Die Arten der Hülse sind:

1. *häutig* (*membranaceum*), wenn die beiden Klappen aus einer durchsichtigen Haut bestehen.

2. *lederartig* (*coriaceum*), wenn die beiden Klappen von dicker und zäher Substanz sind.

3. *fleischig* (*carnosum*), wenn die beiden Klappen aus einer festen oder weichen fleischigen Haut bestehen. Fig. 174. 175.

4. *holzig* (*lignosum*), wenn die beiden Klappen so hart wie eine Nusschale sind, und nicht aufspringen.

5. *mehlig* (*farinosum*), wenn die Kerne rundum mit einer mehligten Substanz umgeben sind, z. B. *Hybanus Curbaril*.

6. *angeschwollen* (*torulosum*), wenn die in der Hülse befindliche Samen so auf die äussere Haut drücken, dass dadurch bemerkbare Höcker ausserhalb entstehen, z. B. *Erythrina*.

7. *aufgeblasen* (*ventricosum*), deren Klappen innerhalb von der Luft aufgetrieben sind, z. B. *Colutea*.

8. *zusammengedrückt* (*compressum*), die auf beiden Seiten flach ist.

9. *rinnenförmig* (*canaliculatum*), wenn die obere Naht sehr tief ausgehöhlt ist, z. B. *Lathyrus sativus*.

10. *ein-, zwei- oder mehrsamig* (*mono-, di- vel polyspermum*), nach der Zahl der Samen.

11. *schneckenförmig* (*cochleatum*), wenn sie wie ein Schneckengehäuse zusammengedreht ist, z. B. *Medicago*.

Es giebt noch mehrere Arten, die nach der Figur und ob die Oberfläche mit Haaren, Borsten, Flügeln, Spitzen oder Stacheln besetzt ist, bestimmt werden.

(Uebrigens ist sie auch eine blosse Art der Kapsel L.)

119. Die Gliederhülle (*Lomentum*), ist eine längliche, zwar aus zwei Klappen, die ausserhalb Nähte bilden, bestehende Frucht, die aber niemals, wie die Hülse, aufspringt. Innerhalb ist sie durch kleine Querwände in Fächer abgetheilt, die nur ein Samenkorn an der untern Naht befestigt, enthalten. Sie springt nie der Länge nach, wie die beiden vorhergehenden Früchte, auf, sondern wenn sie ja zerspringt, lösen sich die Querwände in kleine Glieder. Die Arten dieser Frucht sind:

1. *rindig* (*corticosum*), wenn die äussere Rinde sehr hart und holzig ist, der innere Raum der Fächer

aber mit einer weichen Masse angefüllt ist, z. B. *Cassia Fistula*. Fig. 192. 194.

2. *gegliedert* (*articulatum*), wenn die Queerabtheilungen ausserhalb deutlich zu sehen sind, und sich nicht in Glieder theilen lassen, z. B. *Hedysarum*.

3. *mit Verengerungen* (*isthmis interceptum*), wenn die Queerabtheilungen deutlich zu sehen sind, sich auch nicht lösen, aber die Zwischenräume weit schmaler als die Glieder sind, z. B. *Hippocrepis*.

Die Querscheidewände unterscheiden nicht die Hülse von der Gliedhülse; das Hauptkennzeichen der Gliedhülse besteht darin, dass sie sich nicht in zwei Hälften der Länge nach theilt, sondern entweder sich gar nicht öffnet, oder in Glieder löset.

Das Hauptkennzeichen besteht doch in den Querswänden, denn es giebt viele wahre Hülsen, welche sich nie in zwei Hälften theilen, z. B. *Melilotus*. Man kann die Gliederhülse ein *legumen septatum* oder *articulatum* nennen, denn *lomentum* bedeutet Mehl von Hülsenfrüchten, eine doch gar zu sehr von der hier gewählten verschiedene Bedeutung. L.)

120. Die *Büchse* (*Theca*), heisst die Frucht der Laubmoose. Sie ist eine trockene Frucht, die an der Spitze sich mit einem Deckel öffnet, und noch mit besondern Theilen versehen ist. Die Theile der Frucht sind:

A. Die *Mütze* (*Calyptra*), ist eine zarte Haut, die locker in kappenförmiger Gestalt die Spitze der Büchse bedeckt. Sie entsteht aus der in der Mitte zerplatzten Blumenkrone (§. 91.). Die Arten derselben sind:

1. *ganz* (*integra*), die rundum die Spitze der Büchse deckt, und am Rand ganz ist.

2. *halb* (*dimidiata*), die nur zur Hälfte die Spitze der Büchse deckt, z. B. die meisten Moose. Fig. 133.

3. *glockenförmig* (*campanulata*), die weit über die Büchse reicht und eine glockenförmige Gestalt hat, z. B. *Encalypta vulgaris*.

4. *haarig* (*villosa*), die aus Haaren zusammengesetzt ist, z. B. *Polytrichum*. Fig. 136.

5. *etwas haarig* (*subpilosa* s. *paraphysiphora*), die mit wenigen Haaren versehen ist.

6. *glatt* (*glabra* s. *laevis*), die keine Haare hat.

7. *gezähnt* (*dentata*), wenn der Rand Zähne hat, z. B. *Encalypta ciliata*.

B. Der *Deckel* (*Operculum*), ist ein runder Körper, der die Oeffnung der Büchse verschliesst, und wenn der Same reif geworden, von selbst abspringt. Er ist:

1. *rund* (*convexum*), der eine etwas erhabene oder gewölbte Fläche hat.

2. *kegelförmig* (*conicum*), der unten weit, nach oben aber in eine runde Spitze zugeht.

3. *spitzig* (*acutum*), der unten weit, nach oben zu allmählig scharf zulaufend ist. Fig. 138.

4. *lang zugespitzt* (*acuminatum*), wenn der obere Theil in eine sehr lange Spitze vorgezogen ist. Fig. 137.

5. *schnabelförmig* (*rostratum*), der mit einer langen krumm gebogenen Spitze versehen ist.

6. *flach* (*planum*), wenn der Deckel ganz flach ist.

7. *gestachelt* (*mucronatum*), wenn der Deckel ganz platt ist, oben in der Mitte aber eine borstenartige Spitze hat.

8. *dornig* (*apiculatum*), der eine sehr lange Borste oben in der Mitte des Deckels hat.

9. *angewachsen* (adnatum), der mit der Oeffnung der Büchse verwachsen ist, und daher gar nicht abfällt, z. B. Phascum.

(Warzenförmig (papillatum, mamillatum), wenn die Spitze eine kleine Warze bildet. L.)

Bei der Gattung *Andraea* ist der Deckel sehr klein, so dass er die Zähne des Mauls nicht bedecken kann, sondern nur zwischen denselben an der Spitze sitzt. Ehrhart nennt ihn *Conjunctorium*.

C. Die *Franze* (Fimbria s. Annulus), ist ein schmaler Streifen Haut, der mit kleinen häutigen Zähnen besetzt ist, und im Deckel liegt. Dieser Körper hat viel Schnellkraft, und dient dazu, den Deckel der Büchse abzuwerfen. Fig. 261.

D. Das *Maul* (Peristoma s. Peristomium), heisst der häutige Rand, der die Mündung der Büchse umgibt. Das Maul ist zweierlei Art:

1. *nackt* (nudum), das ganz ist, ohne irgend einen Zahn oder Erhabenheit. Fig. 178.

2. *gezähnt* (figuratum), das mit häutigen Zähnen besetzt ist.

a) *einfache Reihe* (ordine simplici dentatum), wenn eine einzige Reihe Zähne um die Oeffnung steht. Diese werden nach der Zahl oder Lage u. s. w. bestimmt, als:

α) *vier-, acht-, sechzehn-, zwei und dreissig* oder *64 mal gezähnt* (quadri-, octo-, sedecim-, 32- vel 64- dentatum), mehrere Abwechselungen hat man in den Zähnen noch nicht entdeckt. Fig. 176. 177. 179. 180.

β) *gezweigte Zähne* (dentes geminati), wenn die Zähne so gestellt sind, dass immer zwei und zwei beisammen stehn.

γ) *gespaltene Zähne* (dentes bifidi), wenn die Spitze der Zähne getheilt ist. Fig. 182. 183.

δ) gedrehte Zähne (*dentes contorti*), wenn die Zähne ganz in einer Walze zusammengedreht sind. Fig. 184.

h) doppelte Reihe (*ordine duplici dentatum*), wenn hinter einer Reihe von Zähnen noch eine zweite befindlich ist. Fig. 181.

a) nicht zusammenhängend (*non cohaerentes*), wenn die innere Reihe nicht zusammenhängt, sondern ganz frei ist.

β) an der Spitze zusammenhängend (*apice cohaerentes*), wenn die innere Reihe mit den Spitzen zusammenhängt.

γ) netzförmig (*reticulatum*), wenn die Zähne durch Querräste wie ein Netz verbunden sind.

δ) borstig gezähnt (*ciliato-dentatum*), wenn die innere Reihe mit Zähnen und Borsten abwechselt.

ε) häutig gezähnt (*membranaceo-dentatum*), wenn die Zähne der innern Reihe durch eine Haut unten zusammenhängen.

E. Das Zwergfell (*Epiphragma*), nennt man eine dünne Haut, welche über die Mündung der Büchse gespannt ist, es findet sich nur bei der Gattung *Polychaeta*. Fig. 76.

F. Das Samensäulchen (*Sporangidium* s. *Columnula*), heisst ein dünner fadenförmiger Körper, der mitten durch die Büchse geht, und an dem der Same befestigt ist. Es ist eben der Körper, den man bei der Kapsel das Säulchen nennt.

G. Der Ansatz (*Apophysis*), ist eine Erweiterung, die sich an der Basis der Büchse zeigt. Bisweilen ist er sehr klein und verliert sich fast, bisweilen aber grösser, als die Büchse selbst.

Arten davon sind:

a) *dicklicht* (*scrophulosa*), der eine Verlängerung der Büchse ausmacht, die mit Samen angefüllt ist, und an einer Seite hervorragt, z. B. *Dicranum strumiferum*.

ß) *kropfförmig* (*cerviculata*), der eine Verlängerung der Büchse ausmacht, die mit Samen angefüllt ist, bald sich in Gestalt eines kurzen Cylinders, bald aber auch fast kugelförmig zeigt, z. B. *Dicranum cervicalatum*, *Hypnum tomentosum*.

γ) *walzenförmig* (*cylindrica*), der von der Büchse getrennt, ohne Samen, und fast walzenförmig ist.

δ) *kegelförmig* (*conica*), der von der Büchse getrennt, ohne Samen, walzenförmig, an der Basis aber verdünnt ist.

ε) *verkeert eiförmig* (*obovata*), der von der Büchse getrennt, ohne Samen, rund, an der Basis aber verdünnt ist.

ζ) *kugelförmig* (*globosa*), der von der Büchse getrennt, ohne Samen, ganz kugelförmig ist, z. B. *Splachnum sphaericum*.

η) *hirnförmig* (*pyriformis*), der von der Büchse getrennt, ohne Samen, erweitert kugelförmig und nach der Basis hin stark verdünnt ist, z. B. *Splachnum ampullaceum*. Fig. 179.

θ) *plattgedrückt* (*depressa*), der von der Büchse getrennt, ohne Samen, von oben und unten flach gedrückt ist, z. B. *Polytrichum commune*. Fig. 176.

ι) *schirmförmig* (*umbraculiformis*), der von der Büchse getrennt, ohne Samen, häutig, kreisförmig ausbreitet und flach ist, z. B. *Splachnum luteum*.

κ) *glockenförmig* (*campanulata*), der von der Büchse getrennt, ohne Samen, häutig, kreisförmig,

mit dem Rande abwärts in Gestalt einer Glocke gebogen ist, z. B. *Splachnum rubrum*.

Die Büchse selbst wird nach ihrer verschiedenen Gestalt bei jeder Art des Moores noch genauer beschrieben.

Bei einer Moosgattung, die man *Bartmoos* (*Phascum*) nennt, geht niemals der Deckel von der Büchse los, sondern sobald der Same reif ist, fällt die ganze Büchse ab. Weil man nun bei diesem Moos die Oeffnung gar nicht sehen kann, sagt man, es sei keine vorhanden (*Peristomium nulum*.)

Anthoceros, eine zu den Lebermoosen gehörige Gattung, trägt zwar wie alle Lebermoose eine Kapsel (*capsula*), die aber zweiklappig ist und in der Mitte ein Samensäulchen (*Sporangidium*) hat. (Es ist gar sonderbar, dass man der Frucht der Lebermoose den Namen *capsula* giebt, der Frucht der Laubmoose hingegen den Namen *theca*. Weber und Mohr sagten *sporangium*, welches als allgemeiner Name der Fruchtbehälter aller Kryptogamen viel besser ist. Aber der Ausdruck *capsula* für die Moose ist unbedenklich anzuwenden. Uebrigens sind die hier angegebenen Kunstwörter zweckmässig und genau bestimmt. L.)

121. Die *Sackfrucht* (*Sporangium*), heisst eine Fruchthülle der Cryptogamen, welche aus einer dünnen mit Samen angefüllten Haut besteht, die niemals sich von selbst öffnet oder aufspringt, und deren Samen nur erst, wenn die äussere Haut durch die Witterung zerstört ist, keimen können. Sie findet sich nur bei der Ordnung *Homallophyllae* (§. 152.)

Arten davon sind:

1. *geschlossen* (*clausum*), die immer verschlossen erscheint, und zuweilen mit einem kurzen borstenartigen Stachel an der Spitze versehen ist, z. B. *Riccia*.

2. *offen* (*apertum*), die von ihrer Entstehung an, an der Spitze mit einer Oeffnung erscheint. z. B. *Blasia*.

Die *Kugelfrucht* (*Sphaerula*), heisst eine Fruchtkugel der Cryptogamen, die kugelförmig, an der Spitze ihrer Reife mit einem kleinen Loche versehen und mit schleimigen Samen angefüllt ist, die zur Keimung herauskommen, z. B. *Sphaeria*.

Die Frucht von *Riccia* und *Blasia* mag man mit dem allgemeinen Namen *pericarpium* nennen.

An den Pilzen, vielen Wasseralgen und Lichenen bemerkt man Körper, welche erst nach der Entwicklung der Pflanze erscheinen, zuweilen die Farbe ändern und in einigen Fällen gekeimt haben. Man könnte sie füglich Samen nennen, aber da man keine Spur von männlichen Blüthen an diesen Pflanzen entdeckt, so mag man den Ausdruck *spora* oder *sporidium* behalten. Liegen die Körner frei, und enthalten keine andere Körner, sondern etwa eine grummige Masse, so nennt man sie *sporidia*. Sind sie aber zerstreut oder zusammengehäuft in einem Fruchthälter, so heissen sie *spora*. Der Fruchthälter selbst ist das *sporangium*. Sind in dem Fruchthälter kleinere eingeschlossen, so heissen diese *sporangiola*. Eine besondere Art von *sporangium* oder *sporangium* ist der Samenschlauch Fig. 312. (*theca*), eine häutige Röhre, worin die Samen in Reihen liegen. Die Früchte liegen entweder auf dem Thallus, oder haben einen besondern Fruchthalter (*sporidochium*), der zuweilen auf einer flachen Grundlage (*stroma*) steht. Oft macht das *sporangium* den ganzen Pilz. So ist das abzuändern was der Verf. sagt. L.)

122. Nach der gegebenen Erklärung (§. 106.) ist die Frucht derjenige Theil, welcher aus dem Fruchtknoten gebildet wird, es mag dieser nun sich in reife Samen oder in eine Fruchthülle verwandeln. Der Botaniker kann nie ein richtiges Urtheil über irgend eine Frucht fällen, wenn ihm deren Entstehungsart unbekannt ist. Der Kelch, die Blumenkrone, die Nagefäss, der Fruchtboden können nach dem Verhaken den Fruchtknoten einhüllen, mit ihm verwach-

sen und so eine eigene Art von Frucht bilden, die Ansehn einer Fruchthülle hat und es doch nicht dergleichen Frucht nennt man eine *falsche* (fructus spurius).

(Die wahre Frucht lässt sich leicht von der fal unterscheiden. Jene entsteht aus dem Fruch ten, trägt also den Staubweg und zeigt davon Ueberbleibsel, diese nicht. L.)

Einige derselben hat man der Aehnlichkeit v mit dem Namen derjenigen Fruchthüllen belegt, mit sie ohne genaue Untersuchung leicht zu verwechseln sind. Die Arten der falschen Früchte sind folgende:

1. *Zapfen* (Strobilus), nennt man ein Kätzchen (§. 42.), dessen Schuppen holzartig geworden und nach Beschaffenheit der Pflanzen ein oder freie Samen oder auch Nüsse unter jeder Schuppe halten. Das Ganze hat das Ansehn einer eigentlichen Fruchtart.

(Der Zapfen (strobilus) ist ein anthodium von vielen Blüthen, deren Bracteen an der Frucht wachsen. L.)

Die Arten des Zapfens sind:

a) *walzenförmig* (cylindricus). Fig. 193.

b) *kegelförmig* (conicus).

c) *eiförmig* (ovatus).

d) *kugelförmig* (globosus) u. s. w.

2. *falsche Kapsel* (Capsula spuria), die *Eiche* (*Fagus sylvatica*) hat dergleichen. Die eigentliche Frucht dieses Baums sind zwei dreieckige Nüsse, die dicht beisammen stehn, und vom lederartigen Kelch umgeben werden, der das Ansehn einer einfächrigen vierklappigen Kapsel angenommen hat. Der *Ampfer* (*Rumex*) trägt nur ein einziges Samenkorn, der stehengebliebene Kelch um-

aber wie eine Kapsel. *Die Segge* (*Carex*) trägt ein Samenkorn, was von der Blumenkrone eingeschlossen wird, und dadurch ein kapselartiges Ansehen erhält.

Die falsche Kapsel der Buche ist ursprünglich ein involucrum und mag cupula, wie bei der Eiche, heißen. Die falsche Kapsel der Segge (*Carex*) ist ein perigynium. L.)

Die falsche Nuss (*Nux spuria*), die *Wassernuss* (*Trapa natans*) hat ein Samenkorn, was mit dem Kelch verwächst und dessen vier Blättchen in eine vierdornige Nusschale verwandelt werden. Die *Blutkrone* (*Coix Lachryma Jobi*) hat ein Samenkorn, der Kelch und die Blumenkrone (Balg und Scheide. L.) verschliessen es aber, und werden hart und glänzend wie ein Stein. *Die Jalappe* (*Mirabilis jalappa*) behält den untern Theil der Röhre der Blumenkrone, welcher mit dem Samen zusammenwächst und eine Nuss bildet.

Die falsche Steinfrucht (*Drupa spuria*), der *Taxus* (*Taxus baccata*) trägt eine Nuss, die zur Hälfte mit dem fleischigen Fruchtboden verwächst, vielmehr Hülle involucrum, nach den verwandten Pflanzen zu urtheilen, L.) und dadurch einer Steinfrucht ähnlich wird. Dieses ist ebenfalls mit *Anacardium* und *Semecarpus* der Fall (§. 126.)

5. falsche Beere (*bacca spuria*), der *Wachholder* (*Juniperus communis*) blüht in einem Kätzchen (§. 42.) und müsste nach der Regel einen Zapfen tragen, aber die Schuppen wachsen zusammen, werden fleischig und nehmen die Gestalt einer Beere an. *Die Erdbeere* (*Fragaria vesca*) trägt freie Samen auf ihrem fleischigen Fruchtboden und sieht wie eine Beere aus (§. 126.), die *Basello* (*Basella*) schliesst

ihre Samen in den fleischig werdenden Kelch und Blumenkrone ein und hat das Ansehn einer vollständigen Beere.

Mehrere Beispiele der Art lernt man aus der Beobachtung der Natur kennen, bei deren Aufzählung wir nicht verweilen wollen.

Vom Zapfen ist noch anzumerken, dass man schuppenweise übereinander liegenden Samen *Tulpenbaums* (*Liriodendron Tulipifera*) die übereinander liegenden Kapseln der *Magnolia* Fig. 159. fälschlich öfters einen Zapfen nennt. Der Zapfen entsteht aber nur allein aus einem Kätzchen.

123. Der *Same* (Semen), ist derjenige Theil der Gewächse, der zum ferneren Fortkommen der Pflanze bestimmt ist. Er besteht aus zwei Hälften, die sich beim Keimen in Blättchen verwandeln, man nennt sie *Mutterkuchen*, *Samenlappen* oder *Samenblättchen* (Cotyledones). Zwischen diesen liegt auf einer Seite der *Keim* (Corculum), dieser besteht aus zwei Körpern, einem spitzigen, der beim Keimen gleich in die Erde geht und zur Wurzel wird, man nennt ihn das *Schnübelchen* (Rostellum), und einem andern, der wie kleine Blättchen aussieht, den *Steugel* nebst den Blättern hervorbringt, er heisst das *Blattfederchen* (Plumula). Ausserhalb ist der Same mit doppelten Häuten bedeckt, von denen die äussere dick und fest, die innere aber durchsichtig und zart ist. Die äussere nennt man die *Samenhaut* (Tunica externa), die innere das *Samenhäutchen* (Membrana interna). Die Gegend, wo der Keim im Samen liegt, kann man schon von aussen sehen, weil sich dort ein tiefer Eindruck findet, den man die *Nabel* (Hilum) nennt. Der Same ist, so lange er noch nicht die vollkommene Reife erlangt hat, der

dem kleinen Faden befestigt, dieser Faden heisst die *Nabelschnur* (Funiculus umbilicalis).

Man hat nach den verschiedenen Arten, wie der Same keimt, die Pflanzen eintheilen wollen: die, welche keine Samenblättchen hätten (acotyledones), die ein, zwei oder mehrere hervorbringen (monocot- und polycotyledones) genannt. Eine genauere Beobachtung der Natur zeigt aber, dass obige Eintheilung nicht Statt findet. Wie eigentlich die Samen keimen, ist in der Physiologie genauer auseinander gesetzt.

Die Gestalt des Samens ist sehr verschieden, doch lässt sich diese sehr leicht bestimmen. Durch die Nabelschnur sind sie in den Fruchthüllen bald am Grunde, bald auf dem Fruchtboden, der inneren Fläche, den Klappen oder irgendwo deutlich befestigt; wenn sie aber in einer Beere auf einem Haufen beisammen findet, dass ihre Anheftung nicht sogleich sichtbar ist, so nennt man sie *nistende Samen* (Semina nidulantia). Sind die Samen länglich und sehr klein, dass sie fast das Ansehn von Staub haben, so nennt man sie *feilstaubartige* (semina scobiculata); dergleichen Samen sind gewöhnlich, wenn man sie mikroskopisch untersucht, durch eine häutige oder netzförmige Samendecke (§. 124.) eingeschlossen. Die Substanz der Samen ist feste, und man hat nur wenige Beispiele von weichen Samen. Linné führt bisweilen *zweifährige Samen* (Semina bilocularia) an, aber dergleichen kann es so wenig im natürlichen Zustand geben, als zweifährige Hühnereier; was Linné nennt, sind fast immer zweifährige Nüsse.

Im Thierreich hat man zwar einen Blutigel (Hirudo octoculata) entdeckt, der ein Ei legt, aus dem 8—10 und mehrere Jungen kommen sollen.

Es fragt sich aber, ob es nur ein wirkliches sei, und ob nicht mehrere durch einen Schlauch zusammenhängen? Bei den Gewächsen ist kein Beispiel der Art bekannt.

(Der Theil, welcher die Samen überhaupt trägt, heisst Samenträger (sporophorum, trophospermium Rich. placenta). Die einzelnen Theile derselben, welche die einzelnen Samen halten, bilden die Samensterne (podospermium). Sie sind hart und fadenförmig und machen eine Nabelschnur (funiculus umbilicalis), oder kurz und dick, oder nur Knoten oder Warzen. Die Gefässbündel gehen durch den Samenträger zum Samen. Das, was sich das Bündel in den Samen einsenkt, ist durch Farbe, auch zuweilen Rauigkeit und Erhabenheiten bezeichnete Stelle, welche man den Nabel (umbilicus, hilum) nennt. Wo der Nabel sich befindet, ist die Basis des Samens, gegen die Spitze. Ist der Nabel der Basis der Frucht zugekehrt, so heisst der Same aufrecht (erectum), ist er der Spitze der Frucht zugekehrt, umgekehrt (inversum); sitzt der Nabel an der Mittelsäule, Centralsame (centrale), sitzt er an den Wänden und der innern Haut der Fruchthülle Wandsame (parietale).

Der Same selbst zerfällt in die Hüllen (epispermium Rich.) und den Kern (nucleus). Die äussere Hülle ist gefärbt (nicht weiss), wird beim Keimen vom Kern abgeworfen, verfault und heisst Samenschale (testa Gaertneri, tunica externa). Sie ist gewöhnlich nur beim Nabel am Kern angewachsen, sonst frei. Die innere Haut (membrana l. tunica interna) ist fast immer weiss, wird ebenfalls beim Keimen abgeworfen, hängt nur beim Nabel am Kern an, und fehlt nicht selten.

Zuweilen ist die innere Haut gegen den Nabel verdickt, und auch anders gefärbt. Gärtner nennt diese Stelle chalaza (Hagel). Sie besteht oft aus lauter Spinalgefässen. Auch nennt man die Ausbreitung der Nabelgefässe überhaupt so.

Der Kern besteht vorzüglich aus dem Keim (embryo), als der künftigen Pflanze. Er nimmt entweder den ganzen Kern ein, ausfüllend (holospermicus, epispermicus Rich.), oder es befindet sich ausser ihm eine Masse von Zellgewebe mit Satzmehl gefüllt im Kerne, nicht ausfüllend (heterospermicus).

lend (*endospermicus* Rich.). Diese Masse ist von verschiedener Gestalt und Lage, zerfliesst beim Keimen und dient zur Ernährung des Keimes. Sie heisst daher Eiweiss (*albumen* Gaertn. *perispermium* Juss. *endospermium* Rich.). Zuweilen ist sie sehr dünn, und bildet nur eine den Keim umgebende Haut, und kann leicht mit der innern Haut verwechselt werden. Der Keim liegt in der Mitte des Eiweisses, *centrisch* (*centralis*), und zwar der Länge nach (*longitudinalis*) oder gegen die Spitze des Samens (*prope apicem*), z. B. *Umbelliferae*, oder gegen die Basis (*prope basin*), z. B. *Ranunculaceae*. Er liegt ausser der Mitte des Eiweisses seitwärts (*eccentricus*), am Rande des Eiweisses (*marginalis*), oder er umgibt das Eiweiss, *umschliessend* (*periphericus*), z. B. *Caryophyllaeae*, oder er liegt neben dem Eiweisse an der Seite (*lateralis*), z. B. Gräser. In der Regel ist der Keim von dem Eiweisse leicht zu trennen, nur in einigen (z. B. *Potamogeton*, *Ruppia* u. s. w.) ist er innig damit verwachsen. Gärtner nannte das Eiweiss in solchen Fällen Dotter (*vitellus*).

Der Keim selbst besteht aus dem Wurzelende (*extremitas radicalis*, *radicula*, *rostellum*), wo die Wurzel in der Folge erscheint, und dem Cotyledonarende (*extr. cotyledonaris*). Er ist gerade (*rectus*) oder auf mancherlei Weise gekrümmt. Liegt das Wurzelende gegen den Nabel gerichtet, das andere gegen die Spitze des Samens, so heisst er aufrecht (*erectus*), liegt aber das Wurzelende gegen die Spitze des Samens, das andere gegen den Nabel, so heisst er umgekehrt (*inversus*), liegen aber beide Enden in einer andern Richtung, so heisst er abgekehrt (*devius*). Er ist in diesen Fällen gerade oder mit dem Samen gleichgebogen (*homotropus*). Sind beide Enden gegen den Nabel gekehrt, so heisst er zugekehrt (*amphitropus*) wie der peripherische Keim. Liegt das eine Ende gegen Nabel oder Spitze, das andere nach einer andern Richtung, so heisst er abgebogen (*heterotropus*).

Der Keim verhält sich auf eine dreifache Weise:

1) In einigen Pflanzen, welche Exorhizen (*exorhizae*, *exogeneae* Candoll.) heissen, wird das Wurzelende geradezu zur Wurzel; an dem Coty-

ledonarende finden sich zwei Samenblätter deutlich angegeben, sogar mit Spaltöffnungen versehen, welche beim Keimen zu Blättern auswachsen, aber vor der völligen Entwicklung der Pflanze wiederum absterben. Nur in einigen wenigen Fällen wachsen sie zwar an, entwickeln sich aber nicht völlig und treten auch nicht an der Erde hervor. Sie heissen Cotyledonen Samenlappen (cotyledones) und liegen auf eine verschiedene Weise im Samen zusammengeschlagen. Man nennt diese Pflanzen auch Dicotyledonen, zweilappige (dicotyledones), weil sie mit zwei Blättern keimen. Unsere Bäume, Hülsenfrüchte und viele andere mehr gehören dazu.

In einigen wenigen Fällen sind gar keine Samenlappen vorhanden, *Cuscuta*, *Mamillaria*, oder es ist nur einer vorhanden, *Bumium Bulbosastantum*, *Corydalis*, oder es sind mehr als zwei vorhanden, *Pinus*. Die letzten heissen Polycotyledones. Richard nannte sie Synorhizae und sagte von ihnen, dass die Würzelchen aus dem Innern wie bei den Endorhizom hervorkämen. Aber dieses ist wirklich bei allen Exorhizen der Fall, wie ich schon lange (Grundlehren der Anat. u. Phys. der Pflanzen S. 236.) gezeigt habe.

2) In den Endorhizen (endorhizae, endogeneae Cand.) treibt das Wurzelende die wahren Wurzeln erst beim Keimen hervor, auch am Cotyledonarende bricht das Knöspchen erst aus einer fleischigen oder häutigen Hülle heraus. Diese Hülle nennt Richard den Samenlappen (cotyledon). Sie wächst zwar an beim Wachsen, verwandelt sich aber nicht in ein Blatt, zeigt auch die Blattsubstanz im Keimen nicht. Da diese Pflanzen fast immer wechselnde Blätter haben, keimen sie mit einem Blatte und heissen daher Monocotyledonen, einlappige (monocotyledones), z. B. Palmen, Lilien, Gräser u. s. w.

In den Gräsern liegt diese Hülle offen als ein Schildchen unter dem Keim, und wurde von Gaertner zum Dotter (vitellus) gerechnet. Richard hält sie für einen Auswuchs des Wurzelendes, andere halten sie für den Cotyledon und dieses ist richtig, wenn man die Hülle der Endogeenen Cotyledon nennt.

3) In *Nymphaea alba* und *lutea* Linn. ist ein Ei

weiss vorhanden und der Embryo befindet sich in einer besonderen Hülle (Cotyledon nach Rich.) hat zwei Lappen (Cotyledonen nach Poiteau, Mirbel, Candolle, und zwischen ihnen das Federchen. Das Würzelchen ist sehr klein und entwickelt sich nicht. Im *Nymphaea Nelumbium* Linn. fehlt das Eiweiss und an dessen Statt liegen im Samen zwei Lappen (Cotyledonen nach Poiteau, Mirbel und Candolle) und innerhalb eine zarte Haut (Cotyledon nach Richard) welche das Federchen einschliesst. Auch hier ist das Würzelchen klein und wächst nicht aus.

4) In allen Samen der Cryptogamen ist der Keim nicht zu unterscheiden; man nennt sie daher Akotyledonen (acotyledoneae). Viele Farrnkräuter treiben zuerst grosse, fleischige Blätter, welche gar oft das Ansehn einer *Marchantia* haben, und den folgenden Blättern gar nicht ähnlich sind. Sie entstehen auch oft nach einander, so wie sie verwelken, welches bei Samenblättern nicht der Fall ist. Auf eine ganz ähnliche Art verhalten sich die confervenartigen Blätter der Laubmoose. Die Samen der Cryptophyten (Algen, Lichenen, Pilze), so viel man sie beobachtet hat, keimen bloss durch Verlängerung an beiden Seiten. L.)

124. Am Samen und an den Fruchthüllen finden sich noch besondere Theile, die zur genaueren Bestimmung der Gewächse viel beitragen. Diese Theile sind: die *Samendecke* (Arillus), das *Federchen* (Pappus), die *Wolle* (Desma), der *Schwanz* (Cauda), der *Schnabel* (Rostrum), der *Flügel* (Ala), der *Kamm* (Crista), die *Ribbe* (Costa), die *Warze* (Verruca), der *Reif* (Pruina), der *Schneller* (Elater), das *Haarnetz* (Capillitium), die *Grundborste* (Trichidium).

1. Die *Samendecke* (Arillus), ist eine lockere, über den Samen ausgebreitete Haut. Sie ist:

a) *säftig* (succulentus, baccatus s. carnosus), die dicke und fleischigt ist, z. B. *Evonymus europaeus*.

Willdenow's Grundriss. I Th.

b) *pergamentartig* (cartilagineus), die steif und dicke ist.

c) *häutig* (membranaceus), die aus einer dünnen durchsichtigen Haut besteht.

d) *halb* (dimidiatus), wenn nur die Hälfte der Samens eine Bedeckung hat.

e) *zerschlitzt* (lacerus), wenn die Samendecke unregelmässig eingeschlitzt ist. Fig. 206.

f) *mützenartig* (calyptratus), wenn sie die Spitze des Samens, so wie das Mützchen die Büchse umgiebt (§. 120.), bedeckt.

g) *netzförmig* (reticulatus), die wie ein feingespinnenes Netz den Samen dicht einschliesst. Diese Art zeigt sich bei den Orchisarten und überhaupt bei allen sehr feinen Samen. Der Same ist bei diesen Gewächsen wie in einem Sacke eingeschlossen.

Die Samendecke umgiebt nicht allein den Samen, ja bisweilen auch die Fruchthülle, z. B. Muskatennuss (*Myristica Moschata*); die sogenannten Muskatenblumen dieser Frucht umgeben die Nuss, und diese sogenannten Blumen sind eine Samendecke (arillus). Fig. 206.

(Samendecke (arillus) ist eine Erweiterung des Samenstrangs (funiculus umbilicalis), welche oft nur eine Warze bildet, oft den Samen mehr oder weniger umgiebt. Umgiebt die sogenannte Muskatenblüte die Fruchthülle, so würde sie kein arillus sein, aber sie umgiebt den Samen. Nicht alle von dem Verf. angegebenen Samendecken gehören hieher; der sogenannte arillus der Orchideen ist die äussere Samendecke (testa). L.)

2. *Das Federchen* (Pappus), heisst der Kelch jeder besondern Blume, die in einer allgemeinen Blumendecke eingeschlossen ist (§. 83.). Während der Blüte ist aber das Federchen bei den meisten Gewächsen so ausserordentlich klein, dass man nicht gut

erscheidungszeichen finden kann (§. 85.), beim Samen findet es sich aber vollkommen ausge-
n, und zeigt verschiedene Arten, als:

sessil (*sessilis*), wenn das Federchen ohne
f der Spitze des Samens sitzt. Fig. 189.

stipit (*stipitatus*), wenn es durch einen
stützt ist. Fig. 185. 186.

persistens (*persistens*), wenn es so dicht mit
nen verwachsen ist, dass es nicht abfällt.

caducus (*caducus* s. *fugax*), wenn es gleich
r Reife des Samens abfällt.

calyculatus (*calyculatus* s. *marginatus*),
n häutiger Rand über dem Samen hervorragt.
st entweder:

integer (*integer*), wenn der Rand nicht einge-
ist, und rund um die Spitze des Samens
B. *Tanacetum*, *Dipsacus*.

dimidiatus (*dimidiatus*), wenn der Rand nur zur
ie Spitze des Samens umgiebt.

paleaceus (*paleaceus*), wenn kleine schup-
e Blättchen um die Spitze des Samens stehn,
Helianthus annuus, u. m. a. Dieses spreuartige
m ist *zwei-*, *drei-*, *fünf-* oder *mehrblättrig*
tri-, *penta-* vel *polyphyllus*), die Blätt-
d lanzenförmig, stumpf oder borstenartig zu-

aristatus (*aristatus*), wenn eine, zwei
h drei, aber nie mehrere geradeaus stehende
an der Spitze des Samens stehn, z. B. *Bidens*

h) *sternförmig* (*stellatus*), wenn fünf lange zu gespitzte Borsten wie ein Stern ausgebreitet auf der Spitze des Samens stehn.

i) *haarförmig* (*capillaris* s. *pilosus*), wenn sehr viele sehr feine einfache Haare an der Spitze des Samens sind. Fig. 186.

k) *borstenartig* (*setaceus*), wenn sehr viele steife Borsten, die ganz glatt sind, die Spitze der Samen umgeben. Fig. 189.

l) *wimperartig* (*ciliatus*), wenn steife breite drückte Borsten mit sehr kurzen kaum merklichen Haaren besetzt sind. Diese Art hält das Mittel zwischen der vorhergehenden und folgenden.

m) *gefiedert* (*plumosus*), wenn das Federchen aus feinen Haaren oder Borsten zusammengesetzt ist, die aber wieder mit feinen Haaren auf den Seiten besetzt sind. Fig. 185.

n) *gleichförmig* (*uniformis*), wenn alle Federchen in einer allgemeinen Blumendecke von gleicher Gestalt sind.

o) *ungleichförmig* (*difformis* s. *dissimilis*), wenn in derselben Blumendecke die Federchen von verschiedener Gestalt bemerkt werden.

p) *doppelt* (*geminatus*), wenn ein Federchen aus zwei Arten zusammengesetzt ist, z. B. wenn das Federchen ausserhalb kelchartig, innerhalb haarförmig ist, oder ausserhalb kelchartig, und innerhalb gefiedert gefunden wird.

Man muss sich hüten, nicht die Haare, welche bisweilen den Samen bedecken, mit dem Federchen zu verwechseln. Bei dem Wollgrase (*Eriophorum*) ist auch kein wahres Federchen, sondern

bloße Haare, die den Samen umgeben, diese nennt man *Lana pappiformis*.

(Das Federchen ist allerdings ein wahrer Kelch, und die einzelnen Borsten desselben keinesweges Haare, welche aus einer einfachen, höchstens durch Querwände getheilten Röhre bestehen, sondern es liegen hier mehrere Reihen von Zellen neben einander, und sind gebildet wie der Pappus. Die Borsten an *Eriophorum* vertreten auch die Stelle des Kelches. L.)

3. *Die Wolle* (*Desma* s. *Coma*), ist ein Körper, der wie ein haarförmiges Federchen aussieht, und überhaupt durch nichts, als seine Entstehung von ihm unterscheiden ist. Die Wolle ist immer an dem Samen befestigt, der in einer Fruchthülle steckt, und hat nie die Stelle eines Kelchs vertreten, z. B. *Asclepias*, *Epilobium* u. d. m. Fig. 168. 169.

(Es sind wahre Haare, und unter einem zusammengesetzten Mikroskop leicht vom Kelch zu unterscheiden. L.)

4. *Der Schwanz* (*Cauda*), ist ein langer fadenförmiger Körper, der sich an der Spitze des Samens oder der Hautfrucht zeigt, und (oft L.) mit feinen Haaren besetzt ist, z. B. *Pulsatilla vulgaris*, *Clematis* u. m. a. Fig. 164. (Ist ein stehen gebliebener und verhärteter Griffel. L.)

Bei der *Typha latifolia* scheinen die Samen ein Federchen zu haben, aber es ist an der Spitze desselben ein glatter gerader Schwanz, und unten am Samen ist ein langer Stiel, der wie ein Federchen mit Haaren besetzt ist.

(Die Haare an *Typha* sind ein Kelch wie an *Eriophorum*. L.)

5. *Der Schnabel* (*Rostrum*), ist ein gebliebener Griffel am Samen oder an der Fruchthülle, der ausgewachsen und breit gedrückt ist, z. B. *Scandix*, *Sinapis*, u. m. a. Wenn der Schnabel krumm gebogen ist,

nennt man ihn *ein Horn* (Cornu), z. B. an den Kapseln der *Nigella damascena* u. m. a.

(Ist ein steifer langer, zugespitzter Anhang der Frucht. Der Schnabel an der von *Scandix* ist keinesweges Ueberbleibsel des Griffels, auch an *Sinapis* wird er von den verlängerten Klappen mit gebildet. L.)

6. *Der Flügel* (Ala), heisst eine pergamentartige, dünne, durchsichtige, verlängerte Haut, die an der Spitze, auf dem Rücken, oder am Rande des Samens oder der Fruchthülle sich befindet. Die Samen werden nach der Zahl und Art ihrer Flügel bestimmt, als:

a) *einflügelig* (monopterygia), wenn nur ein Flügel zu sehn ist.

b) *zweiflügelig* (dipterygia s. bialata), wenn ihrer zwei sind. Fig. 161.

c) *dreiflügelig* (tripterygia s. trialata).

d) *vierflügelig* (tetraptera s. quadrialata).

e) *fünf- oder vielflügelig* (pentaptera vel pelyptera s. quinquealata vel multialata.) Diese Art zeigt sich bei verschiedenen Kapseln, und bei dem Samen einiger Doldengewächse. Man nennt auch die Samen der Doldengewächse, die viele Flügel haben, *windmühlenflügelartige* (Semina molendinacea).

Hierher gehört auch noch der häutige durchsichtige Rand (Margo membranaceus), welcher einige Fruchthüllen und Samen umgiebt.

7. *Der Kamm* (Crista), ist ein dicker lederartiger oder korkartiger gezählter oder tief eingeschlitzter Flügel, der an der Spitze oder am Rande einiger Fruchthüllen sich zeigt, z. B. *Hedysarum Crista galli*.

8. *Die Rippe* (Costa s. Jugum), sind sehr erhabene Striche, die auf den Fruchthüllen einiger Gewächse und auf den Samen der Doldengewächse sich zeigen.

9. *Die Warze* (Verruca), ist eine kleine stumpf-runde Erhabenheit, die sich auf verschiedenen Samen zeigt.

10. *Der Reif* (Pruina), ist ein feiner weisser Staub, der den Samen und die Fruchthülle öfters bedeckt, z. B. *Prunus domestica*, u. d. m.

11. *Der Schneller* (Elater), ist ein fadenförmiger elastischer Körper, der sich an den Samen der Lebermoose, z. B. *Marchantia*, *Jungermannia*, findet, und diese weit fortschleudert. Er hat meistens, unter einem Vergrösserungsglase betrachtet, das Ansehn einer kleinen Kette, daher er auch bisweilen *Ketten* (Catenula) genannt wird.

12. *Das Haarnetz* (Capillitium), sind netzförmig verwebte Haare, welche zur Befestigung der Samen bei den Bauchpilzen, z. B. *Trichia*, *Stemonites* u. s. w. dienen. Fig. 301.

13. *Die Grundborste* (Trichidium s. Pecten), sind sehr zarte einfache, zuweilen auch mit wenigen Aesten versehene Haare, welche die Samen bei einigen Bauchpilzen, z. B. *Lycoperdon*, *Gastrum*, tragen.

(Ist nicht gebräuchlich; der Ausdruck pecten könnte von den Lappen des aufgesprungenen Fruchthalters (sporangium) gebraucht werden. L.)

In Rücksicht der Flächen und deren Bekleidung, die der Fruchthülle und dem Samen eigen sind, gelten die (§. 6.) gegebene Bestimmungen.

Der Same ist auch in Rücksicht seiner Substanz von der Härte eines Knochens bis zur Weiche eines dicken Breies anzutreffen.

125. Der *Befruchtungsboden* (*Basia*), ist der Ort worauf die ganze Blume, und wenn diese vergangen ist, die Frucht fest sitzt. Es giebt zwei besondere Arten des Befruchtungsbodens, nemlich: *den Fruchtboden* (*Receptaculum*) und *das Fruchtlager* (*Thalamus*).

Der *Fruchtboden* (*Receptaculum*), ist ein mehr oder weniger ausgedehnter Körper, der auf seiner Fläche die Blumen und nachher die Frucht sitzen hat. Er ist zweierlei Art, nemlich: *einfach* (*proprium*) oder nur eine Blume; *allgemein* (*commune*), welcher mehrere Blumen trägt.

(Der Ausdruck *thalamus*, wie der Verfasser ihn gebraucht, ist ungewöhnlich; viele nennen aber *receptaculum proprium thalamus*, hingegen *commune* allein *receptaculum*). L.)

126. Der *einfache Fruchtboden* (*Receptaculum proprium*), zeichnet sich eben nicht sehr aus; er hat gewöhnlich keinen grössern Umfang als die Rundung des Blumenstiels beträgt. Doch machen mehrere Pflanzen hiervon eine Ausnahme, besonders die, welche viele Griffel haben. Es kann bei dergleichen Gewächsen nicht anders sein; die Menge von Griffeln verlangt einen grossen Platz, und daher ist der Fruchtboden bald *flach* (*planum*), bald *gewölbt* (*convexum*), bald endlich *kugelförmig* (*globosum*). Die merkwürdigsten Arten sind aber der *trockne* (*siccum*), der von ganz gewöhnlicher Substanz, nemlich hart ist, und der *fleischige* (*carnosum*), der weich und saftig ist, z. B. *Fragaria vesca*. Fig. 213. Diese sogenannte Frucht gehört nicht zu der

beeren, sondern ist ein fleischiger Fruchtboden mit freien Samen.

(Ist kein Fruchtboden, sondern ein Fruchttträger (gynophorum). S. §. 95. Anm. Es fällt nämlich bloss der Theil ab, worauf sich die Samen befinden, nicht das ganze receptaculum, worauf Kelch, Blume und Staubfäden stehen. L.)

Bei einigen wenigen Pflanzen, die nur einen Griffel tragen, ist der Fruchtboden ungewöhnlich stark und fleischig, z. B. *Anacardium occidentale*. Fig. 214. Die Frucht dieser Pflanze ist eine Nuss, die auf einem birnenförmigen fleischigen Fruchtboden steht, eben so ist es mit *Semecarpus Anacardium*. Fig. 216. Ein ähnlicher Fall zeigt sich bei *Gomphia Japota-pita*. Fig. 215. Am allermerkwürdigsten ist ein japanischer Baum, der kleine Samenkapseln trägt, und dessen Blumenstiele so ausserordentlich dick und fleischig werden, dass sie das Ansehen eines fleischigen Fruchtbodens haben. Dieser Baum heisst *Hovenia dulcis*. Fig. 208.

Noch eine Art des Fruchtbodens zeigt sich bei einfächerigen Kapseln; er befindet sich in der Mitte derselben, ist pyramidenförmig, und von lederartiger Substanz, man nennt ihn einen *schwammigen Fruchtboden* (*Receptaculum spongiosum*).

(Gehört zum Säulchen oder Samenträger (*sporophorum*, *trophospermium*. L.)

127. Der *allgemeine Fruchtboden* (*Receptaculum commune*), ist den zusammengesetzten Blumen und wenigen andern Gewächsen eigen. Er enthält mehrere Blumen und nachher Samen auf seiner Oberfläche. Man findet ihn auch bei einer Gattung

von Lebermoosen, nemlich: *Marchantia*, nur dass bei dieser auf der Unterflüche die Samenkapseln aufsitzen. Es giebt folgende Arten:

1. *flach* (*planum*), der ganz eben ist. Figur 218.
2. *gewölbt* (*convexum*), der in der Mitte etwas erhaben ist.

3. *kegelförmig* (*conicum*), der sich in der Mitte in eine runde hohe Spitze erhebt. Fig. 271.

4. *keulförmig* (*clavatum*), der sich lang ausdehnt und das Ansehn einer Keule hat, z. B. *Arum*. Fig. 4.

5. *geschlossen* (*clausum*), der eine kugel- oder birnförmige Gestalt hat, innerhalb hohl ist und an der innern Fläche mit Blumen besetzt ist, z. B. *Ficus*. Fig. 219. 220.

6. *viertheilig* (*quadrifidum*), der anfangs geschlossen ist und sich wie die vorige Art verhält, nachher aber wenn die Blüthen, welche auf der innern Fläche stehn, vollkommen ausgebildet sind, an seiner Spitze mit vier Einschnitten sich öffnet, z. B. *Mithridatea quadrifida*.

7. *kuchenförmig* (*placentiforme*), wenn ein flach ausgedehnter Fruchtboden ohne Kelch ist, z. B. *Dorstenia*. Fig. 123.

8. *glatt* (*glabrum*), der ohne alle Haare oder Spitzen ist.

9. *haarig* (*pilosum*), der mit kurzen steifen Haaren besetzt ist.

10. *wollig* (*villosum*), der lange weiche Haare hat.

11. *borstig* (*setaceum*), der mit steifen borstenartigen Haaren bedeckt ist.

I. Terminologie.

12. *stachlich* (apiculatum), wenn er
gen stechenden kurzen erhabenen Spitzen

13. *warzig* (tuberculatum), wenn er
abgerundeten Erhabenheiten bedeckt ist, z.
misia vulgaris.

14. *punktirt* (punctatum), wenn feine
Punktchen die Fläche bedecken. Fig. 218.

15. *grubig* (scorbiculatum), wenn
Gruben darauf sind. Fig. 221. runde

16. *zellig* (favosum), wenn grosse
die wie Bienenzellen aussehen, die Fläche
z. B. *Onopordon*.

17. *verschieden* (vari) wenn der allgemeine
Fruchtboden am Rande, und in der Mitte haarig,
oder umgekehrt die Mitte glatt, der Rand spreuttra-
gend, haarig oder stachlich.

18. *spreutragend* (paleatum), der mit mehr oder
weniger länglichen, dünnen Blättern besetzt ist; diese
Blättchen heisst man *Spreu* (Paleae).

Bei den cryptogamischen Gewächsen, haben nur ei-
nige Farrnkräuter, z. B. *Cyathea*, *Hymenophyl-
lum* und *Trichomanes*; so wie einige Lebermoose,
z. B. *Marchantia*, *Staurophora* und endlich auch
die Gattung *Equisetum* dergleichen.

128. Das *Fruchtlager* (Thalamus), ist ein
mehr oder weniger ausgedehnter Körper, der in sei-
ner Substanz die Früchte einschliesst, so dass ohne
Zertheilen desselben nichts davon zu sehn ist. Theilt
man ihn aber in dünne senkrechte Scheiben, so kann
man unter einem Mikroskop die in demselben befind-

liche Samenbehältnisse bemerken. Die Samenbehält-

204 I. Terminologie.

nisse öffnen sich fast immer auf der Oberfläche Fruchtlagers, und der Same wird aus den feinen Öffnungen, auf eine dem unbewaffneten Auge unsbare Weise herausgetrieben. Herr Acharius n das Fruchtlager *Apothecium*. Man unterscheidet gende Arten des Fruchtlagers:

1. *das Schild* (Pelta), ist ein dünnes bald rundes, bald längliches Fruchtlager: was man besonders bei der Gattung *Peltidea* findet. Fig. 226. Es findet sich gewöhnlich am Rande des Laubes bei den Gewächsen und ist von einer zarten sich lösenden Haut bedeckt.

2. *das Schüsselchen* (Scutella), ist ein tellerartiges bald flaches, bald convexes, bald aber concaves, mit einem verschieden gebildeten Rand, aus der Substanz des Laubes entsteht, versch das Fruchtlager, welches den Gattungen *Parmelia*, *Urelaria* und *Sticta* eigen ist. Fig. 3.

3. *das Nüpfchen* (Patellula), ist ein kreisförmiges sitzendes Fruchtlager, was mit einem eigenthümlich vom Laube entspringenden Rande umgeben und innerhalb die Samen frei, nicht aber wie bei vorerwähnten in Kapseln eingeschlossen enthält. B. *Lecidea*.

(*Lecidea* hat Samenschläuche, wie *Parmelia*. L

4. *der Knopf* (Tuberculum), ist ein convexes Fruchtlager, was ohne hervorstehenden Rand ist, gewöhnlich mit dem Rande sich nach aussen beugend, übrigens aber bald rund, bald länglich, bald aber regelmässig gestaltet ist. Innerhalb ist es mit einem Haufen feiner Samen angefüllt, die durch eine Öffnung herausgetrieben werden, z. B. *Verrucaria*.

(Auch *Verrucaria* hat Samenschläuche, welche inwendig liegen. L.)

5. *das Kreisschüsselchen* (*Trica* s. *Gyroma*), es ist das Ansehn des Schüsselchens, nur ist es durch eine concentrisch oder unregelmässig in einander verlaufene erhabene Linie, die sich auf der Oberfläche befindet, davon verschieden. Es ist der Gattung *Gyrophora* eigen.

6. *das Strichlein* (*Lirella*), ist ein linienförmiges, in der Mitte mit einer Furche versehenes Fruchtlager. Man findet es bei der Gattung *Opegrapha*.

7. *die Kugel* (*Globulus*), ein kugelförmiges, vom Laube gebildetes Fruchtlager, was nachdem es abgefallen ist, ein Loch im Laube zurücklässt, z. B. *Laietum*.

8. *das Hütlein* (*Pilidium*), ein kreisförmiges, halbkugeliges Fruchtlager, dessen äussere Haut sich in kleinen Stücken auflöst. Man sieht es fast immer gestielt, z. B. *Calicium*.

(*Calicium* enthält Samen ohne Schläuche in seinem Innern. L.)

9. *das Blüschchen* (*Cistula*), ist ein kugelförmiges Fruchtlager, dessen äussere Haut zerreisst und innerlich mit einer staubartigen, durch feine Fäden zusammenhängenden Substanz angefüllt ist. Sobald dieser Staub verschwunden ist, zeigt es sich hohl, z. B. *Sphaerophorus*.

(In der Jugend sind Schläuche vorhanden, später zerfällt Alles zu Körnern. L.)

10. *das Tellerchen* (*Orbiculus*), ist ein rundes auf beiden Seiten flaches Fruchtlager in dem Körper der Bauchpilze, z. B. *Nidularia*.

11. *das Polster* (*Stroma*), ist ein unregelmässiges, aus einer feinen faserigen Substanz bestehendes Frucht-

lager, worin die Kugelfrüchte (§. 121.) eingesenkt sind, z. B. Sphaeria.

(S. oben §. 121. L.)

(Die Ueberfüllung mit Kunstwörtern, welche der Verf. in diesem §. nach Acharius aufgenommen hat, ist ohne Nutzen. Wenn man dem Fruchthälter überhaupt den Namen sporangium giebt und den fleischigen Unterlagen der Samenfläche und Samen den besondern Namen hypothecium, ferner der Masse von Schläuchen und Samen den Namen apothecium, so hat man genug Kunstwörter für die Lichenen. Die Kunstwörter für die Pilze, wozu Nr. 10. und 11. gehören sollen, sind Anm. §. angegeben. L.)

II. Systemkunde.

129. **D**er menschliche Verstand ist nicht im Stande, die verschiedenen Bildungen im Gewächsreich mit einmal zu übersehen; er muss dazu besondere Hilfsmittel wählen, um sich mit leichterer Mühe Kenntnisse zu erwerben, und seine Wissbegierde zu befriedigen. Am besten erlangt er seine Absicht, wenn er sich ein System macht: *Das System ist ein Register von allen entdeckten Gewächsen, die man nach gewissen Kennzeichen und dessen Abweichungen geordnet hat.* Hat er sich einmal daran gewöhnt, so werden seine Fortschritte sich verdoppeln, und er wird richtiger die Gewächse beurtheilen, als vorher. (Kenntniss des Einzelnen ist noch keine Wissenschaft, sondern diese besteht in der Verknüpfung der Einzelnen. Daher ist keine Wissenschaft ohne System möglich oder das System ist selbst die Wissenschaft. Schon in dem Begriff von Art liegt ein Systematisiren, da sie der Zusammenhang des Beständigen in den einzelnen vergänglichen Individuen ist. L.)

130. Es hat Männer von entschiedenem Werth gegeben, die der Natur durchaus ein System zueignen wollten: so wie im Gegentheile andere grosse Männer die Wahrheit dieses Satzes geleugnet haben, und

gar keine systematische Ordnung, nicht einmal ein Spur davon, zugeben wollten. Andere und zwar die meisten, glauben kein wirkliches System der Natur aber doch eine Kette der Wesen.

Die Natur verbindet die mannigfaltigsten Körper durch ihre Gestalt, Grösse, Farbe und Eigenschaften. Jeder einzelne Körper, jedes Gewächs hat mit mehreren Verwandschaft, und dies geht ins Unendliche. Wer ist da vermögend, die Ordnung der Natur anzugeben? Alle Verwandschaften, natürliche Ordnungen sind nur scheinbare Spuren eines natürlichen Systems. Bei genauerer Nachforschung finden wir jene gewisse Verwandschaften nicht so gross, und die natürlichen Ordnungen nicht so einleuchtend. Wir suchen bei unsern systematischen Eintheilungen die Körper in gerade Linien zusammenzustellen; aber die Natur bildet im Ganzen ein verwickeltes, nach allen Seiten ausgebreitetes Netz, was wir auszuspähen zu kurz sichtig und zu ergründen zu schwach sind. Vielleicht wird man nach Jahrhunderten, wenn alle Winkel des Erdballs durchsucht sind, und mehrere Erfahrungen das Wahre vom Falschen gesondert haben, richtiges darüber urtheilen.

131. Ob nun gleich ein wirklich natürliches System nicht vorhanden ist, so kann man doch nicht leugnen, dass einige Gewächse durch eine grosse Aehnlichkeit verwandt sind, so dass man sie für natürliche Klassen halten könnte; aber die Verwandschaft erstreckt sich nur auf wenige Pflanzen, und es fehlen viele, die den Uebergang zu andern natürlichen Familien machen sollten. Indessen hat dies doch Gelegenheit gegeben, dass die Kräuterkenner die Gewächse nach äussern übereinstimmenden Kennzeichen

ordnet haben, und dergleichen System nennt man *natürliches* (*Systema naturale*).

Andere Botaniker haben bloss auf Zahl, Regelmässigkeit und Uebereinstimmung kleiner nicht leicht in Augen fallender Theile ihr System gebauet, und dergleichen System nennt man *künstlich* (*artificiale*).

Noch andere wählten die Geschlechtstheile zum Unterschiede: nemlich wie vielfach das Geschlecht bei den Gewächsen verschieden sei, und ein solches System heisst ein *Geschlechtssystem* (*Systema sexuale*).

Wenn ein System aus allen dreien zusammengesetzt ist, so nennt man ein solches ein *gemischtes* (*Systema mixtum*).

(Der Verf. hat in diesen beiden §§. sehr viel Unwichtiges und den Gegenstand gar nicht Treffendes gesagt. Es giebt eigentlich nur ein System, nemlich das natürliche; ein System nach der Uebereinstimmung der Eigenschaften überhaupt, besonders der Gestalt. Ob ein solches System der Natur angehöre, kann gar nicht die Frage sein; es drückt die Natur aus. Nur von einem gewissen, vorliegenden Systeme kann die Frage sein, ob es die Natur gehörig ausdrücke. Das künstliche System, welches nach einem, oder einigen wenigen Theilen die Klassen, Ordnungen und Gattungen bestimmt, eigentlich nur ein Register, würde nur dann einen wissenschaftlichen Werth haben, wenn ein Theil durch seine Verschiedenheiten die Verschiedenheiten aller übrigen darstellte, oder gleichsam repräsentirte. Aber schon ein flüchtiger Blick zeigt, dass dieses der Fall nicht ist. Wir müssen also ausser jenem Register noch ein System haben, worauf das Register verweist. Es ist richtig, was der Verf. sagt, dass ein Naturkörper mit mehreren Aehnlichkeit hat, aber es ist unrichtig, dass dieses ins Unendliche gehe, da die Zahl der bekannten Arten noch lange nicht unendlich gross ist, und viele Aehnlichkeiten nicht auf die Arten, sondern auf ganze Fami-

lie gehen. Auch ist die Zahl der Theile sehr beschränkt und die Verschiedenheit der Gestalt im Allgemeinen im Pflanzenreiche gar nicht gross. Die Arten bilden allerdings keine Leiter oder eine einfache Stufenfolge von der weniger entwickelten oder unvollkommenen Bildung zur mehr entwickelten oder vollkommenen, wohl aber bilden die einzelnen Theile eine solche Stufenfolge. Es giebt also zweierlei natürliche Ordnungen, solche wo alle Theile auf derselben oder beinahe auf derselben Stufe der Entwicklung stehen, z. B. Gräser und andere, wo ein Theil eine bestimmte ausgezeichnete Stufe erreicht, und die andern Theile ihre Reihe der Entwicklung durchlaufen, z. B. die Leguminosen. (S. Abhandl. der Berlin. Akad. der Wissens. für 1820. und 1821.)

Die Zusammenstellung der Pflanzen in natürlichen Ordnungen, macht uns nun die Gesetze der Gestaltung bekannt, und zwar zuerst: dass, indem ein Theil auf derselben Stufe der Entwicklung bleibt, alle andern verschiedene Reihen der Entwicklung durchlaufen, dann zweitens: dass in Fällen, wo alle Theile auf derselben Stufe der Entwicklung stehen die zahlreichsten in der Natur sind, oder dass die natürlichen Ordnungen, wo dies der Fall ist, die zahlreichsten an Arten sind, und drittens: dass, wenn Theile auf sehr verschiedenen Theilen der Entwicklung in einem Individuum verbunden vorkommen, einer auf den andern gleichsam einwirkt und ihn erhebt oder herabzieht. So hat das gefiederte Blatt der Palmen noch immer eine Scheide, wie das Blatt der Lilaceen, deren Blüthe der Palmenblüthe völlig gleich. Mittlere Bildungen wird es allerdings geben, aber es ist für den Zusammenhang wichtig, diese mittleren Bildungen kennen zu lernen. Alle künstlichen Systeme, selbst als Register betrachtet, haben grosse Unbequemlichkeiten. Viele lassen Mittelgestalten zu, wie dieses zum Beispiel in Tourneforts System der Fall ist, andere gründen sich auf einen veränderlichen Theil, wie z. B. das Linnische System, welches die sehr veränderliche Zahl der Staubfäden zum Grunde legt. Da in dem künstlichen Systeme immer nur ein Theil in Betracht kommt, so sind Irrthümer nicht leicht zu verbessern, welches im natürlichen Systeme

leichter geschehen kann, wo man auf mehr Theile Rücksicht nimmt. L.)

132. Einige dieser natürlich scheinenden Familien, die der Anfänger sehr genau unterscheiden muss, sind folgende:

1. *Pilze* (Fungi), diese unterscheiden sich von den übrigen Gewächsen durch ihre besondere Gestalt, die gewöhnlich fleischig, lederartig oder holzig ist. Fig. 4. 6. 7. 223. 224. 225.

2. *Flechten* (Algae), kommen in ihrer Gestalt den Pflanzen etwas näher; allein man kann nicht Stengel und Blätter unterscheiden. Ihre Gestalt ist sehr verschieden: bald sind sie wie Mehl oder Fasern, oder sie sehn auch wie das Laubwerk der Bildhauer aus. Fig. 3. 226.

3. *Moose* (Musci), bei diesen ist die äussere Gestalt fast wie bei den Pflanzen, allein ihre Früchte und Blätter unterscheiden sie. Es giebt

a) *Laubmoose* (Musci frondosi), sie haben eine Kapsel, welche mit einem Deckel versehen ist, und die Blätter sind sehr klein. Fig. 138.

b) *Lebermoose* (Musci hepatici), sie haben gewöhnlich keinen Stengel, ihre Blätter sind fast immer grösser und liegen flach. Die Kapsel springt in mehrere Klappen auf. Fig. 227.

4. *Farnkräuter* (Filices), sind Gewächse an denen man die Blätter vom Stiel nicht deutlich unterscheiden kann, sie haben daher einen Wedel (§. 46.) Der Wedel kommt allezeit einzeln aus der Wurzel, und nur einige tropische Arten haben einen Stock (§. 16.), der an der Spitze mit Wedeln besetzt ist. Ihr Wedel ist beim Entwickeln aufgerollt. Sie haben ihre Frucht entweder in einer Aehre (spiciferae), Fig.

9. oder auf dem Rücken des Wedels (*epiphyllouspermae* s. *dorsiflorae*) Fig. 15., oder endlich an der Wurzel in kuglichter oder knolliger Gestalt (*rhizospermae*).

5. *Gräser* (*Gramina*), bei diesen sind die **Blätter** sehr schmal, ihr Stengel, den man **Halm** nennt, ist gewöhnlich gegliedert, und jede Blume trägt nur einen Samen; auch ist die Blume sehr von denen anderer Gewächse verschieden. Fig. 34.

6. *Lilien* (*Lilia*), haben zwieblichte oder knollige Wurzeln, schmale Blätter, prächtige Blumen, ohne Kelch, oder statt desselben gewöhnlich eine Scheide.

7. *Palmen* (*Palmae*), diese haben einen baumartigen Stamm, aber niemals Aeste, und tragen auf der Spitze des Stammes, den man **Stock** nennt, ihre **Wedel**. Ihre Blumen kommen aus einer Scheide.

8. *Pflanzen* (*Plantae*), heissen alle diejenigen, welche nicht unter die obigen Abtheilungen zu bringen sind. Man theilt sie in Kräuter, Staudengewächse, Sträucher und Bäume.

a) *Kräuter* (*Herbae*), nennt man die, welche nur einmal Blumen und Samen hervorbringen, dann aber sterben. Sie thun dieses entweder in einem Jahre, dann heissen sie *Sommergewächse* (*Plantae annuae*), oder sie bringen im ersten Jahre Blätter, im folgenden aber erst Blumen und Samen, sterben aber alsdann, diese nennt man *zweijährige Pflanzen* (*Plantae biennes*).

b) *Staudengewächse* (*Suffrutices*), bei diesen geht der Stengel alle Jahre aus, die Wurzel aber bleibt beständig.

c) *Sträucher* (*Frutices*), deren Stamm mehrere Jahre dauert, und von unten an in Aeste getheilt ist.

II. Systemkunde.

d) *Bäume* (Arbores), deren Stamm bleibt, und an der Spitze in Aeste getheilt ist..

Das Klima und die Kultur verändern hierin viel, so dass Bäume und Sträucher oft ganz unmerklich in einander übergehn.

(Die hier angegebene Eintheilung ist gar nicht natürlich, denn Bäume, Sträucher, Kräuter, u. s. w. machen keine natürliche Ordnungen, sondern bezeichnen nur Eigenschaften einiger Pflanzen. Algen und Pilze stehen sich sehr nahe, wollte man aber beide unterscheiden, so müssten noch die Flechten getrennt werden. Es ist gar kein Grund vorhanden, warum die Lilien hier aufgeführt sind. Folgende Klassen scheinen bestimmter: 1) *Kryptophyten* (cryptophyta). Das Zellgewebe ist noch nicht gehörig entwickelt. Spiralgefäße fehlen. Stamm und Blätter sind in einen Theil den thallus vereinigt und die Wurzeln nur Fortsätze daran. Pilze, Algen und Lichenen machen Ordnungen dieser Klasse, deren Unterschiede schwer anzugeben sind. 2) *Moose* (Musci). Zellgewebe entwickelt, keine Spiralgefäße, Blätter vom Stamme meistens gesondert, Wurzeln nur Haare, männliche und weibliche Geschlechtstheile. 3) *Farn* (Filices). Zellgewebe entwickelt, Spiralgefäße deutlich, Stamm von Blättern unvollkommen getrennt, Wurzeln als besondere Theile aber keine Pfahlwurzel, keine männliche Geschlechtstheile. 4) *Monokotylen* (Monocotyledones Endogeneae). Zellgewebe entwickelt, meistens Spiralgefäße vorhanden, Stamm von Blättern getrennt, doch bilden diese alle oder die untersten, an der Basis eine Scheide welche den Stamm umfasst, Wurzel als besonderer Theil, aber keine Pfahlwurzel, männliche und weibliche Geschlechtstheile, der Embryo im Samen unausgebildet. 5) *Dikotylen* (Dicotyledones, Exogeneae). Zellgewebe entwickelt, meistens Spiralgefäße, Stamm von Blättern ganz gesondert, und die Scheide, wenn sie da ist von dem Blatte gesondert, Wurzel als besonderer Theil, meistens Pfahlwurzel männliche und weibliche Geschlechtstheile, der Embryo im Samen entwickelt. L.)

133. Ehe die verschiedenen Systeme abgehandelt werden, wird es nöthig sein, zu erklären, was Klasse, Ordnung, Gattung, Art und Abart sei.

Ein System theilt sich erstlich in Klassen und nachher in Ordnungen. Bei jedem System wird ein gewisser Theil der Pflanze, z. B. Blume, Frucht u. dgl. zum Grunde gelegt, und daraus Klassen, Ordnungen und Gattungen bestimmt. Wenn ein einziges gesuchtes Kennzeichen vielen Gewächsen zugleich zukommt, so heisst man dies eine *Klasse* (Classis). Haben einige Pflanzen ausser dem einen Kennzeichen der Klasse noch ein besonderes mit einander gemein, so nennt man dies *Ordnung* (Ordo). Wenn aber einige wenige Pflanzen, denen schon zwei Kennzeichen zukommen, noch in mehreren Stücken übereinstimmen, so heisst man dies eine *Gattung* (Genus). Jede eigene Pflanze heisst eine *Art* (Species). Man verlangt von einer Art, dass sie aus Samen immer dieselbe bleiben soll. *Abart* (Varietas), heisst eine Art, die nur in der Farbe, Grösse oder sonst auf eine unbedeutende Weise abweicht. Aus dem Samen der Abart entsteht wieder die gewöhnliche Art. Mehreres hierüber siehe §. 191.

(Die Beständigkeit der Unterschiede bei der Fortpflanzung bestimmt die Art. Bei der ersten Fortpflanzung kehrt oft die Abart noch nicht zur Art zurück, wohl aber nach mehreren, wenn sie anders keine Art ist. Wir halten die Art so lange für solche, bis es erwiesen ist, dass sie nur Abart sei. Die Bestimmung der übrigen Abtheilungen ist willkürlich. Da indessen der Name der Gattung bei der Benennung eines Naturkörpers ausgesprochen wird (nomen sonorum), so sollte man die Gattung natürlich bestimmen. Nur das seltener Veränderliche kann die Gattung bezeichnen, doch muss dieser Begriff näher entwickelt werden. S. unten III. L.)

134. Von einem guten Systeme verlangt man, dass der gewählte Theil, wonach man die Klassen, Ordnungen und Gattungen machen will, leicht und ohne Mühe zu finden sei, und dass dieser Theil allen Gewächsen ohne Ausnahme zukomme, - auch keiner Abänderung unterworfen sei. Ferner darf kein System nach andern Kennzeichen als den einmal gewählten unterschieden werden. Auch darf ein gutes System nicht zu viel Unterabtheilungen haben, und wenn es sein kann, nur aus Klassen und Ordnungen bestehen. Die Ordnungen müssen auch nur von einem Theile hergenommen sein.

135. Für den Anfänger ist es sehr gut, mehrere Systeme zu kennen, vorzüglich wenn man ihn mit den Mängeln eines jeden bekannt macht, damit er nach seiner eigenen Erfahrung sich das für ihn bequemste aussuchen kann. Hier dürfen nur die wichtigsten angeführt werden. Sollten indessen Ausdrücke dabei vorkommen, die in der Terminologie nicht abgehandelt werden konnten, so werden diese beiläufig erklärt.

136. *Cäsalpin* war der erste unter den Botanikern, der ein System entwarf. Er wählte die Frucht und die Lage des Keims zum Unterscheidungsmerkmal. Sein System hat funfzehn Klassen, nemlich: **Arbores** 1) *corculo ex apice seminis*, 2) *corculo e basi seminis*. **Herbae** 3) *solitariis seminibus*, 4) *solitariis baccis*, 5) *solitar. capsulis*, 6) *binis seminibus*, 7) *binis capsulis*, 8) *triplici principio fibrosae*, 9) *triplici principio bulbosae*, 10) *quaternis seminibus*, 11) *pluribus seminibus*, **Anthemides etc.** 12) *Cichoraceae s.*

Acarnaceae, 13) pluribus seminibus flore communi, 14) pluribus folliculis, 15) flore fructuque carentes.

Dieses System ist für unsere Zeiten, wo man eine viel grössere Menge von Gewächsen entdeckt hat, nicht mehr anwendbar. Als erstes System betrachtet, verdient es gewiss alle Aufmerksamkeit. Die Frucht ist ein sehr beständiger Theil, und es würde vorzüglich gut sein, wenn nicht Bäume und Kräuter getrennt wären. In den beiden ersten Klassen sind die Bäume nach der Lage des Keims unterschieden, die übrigen Klassen sind nach der Frucht der Kräuter bestimmt. Die achte und neunte Klasse hat eine dreifächrige Kapsel, und wird nach den Wurzeln, ob sie faserig oder zwiebelartig sind, unterschieden. Die eilfte, zwölfte und dreizehnte Klasse besteht aus zusammengesetzten Blumen. Die eilfte hat Strahlenblumen (V. 78. Nr. 3.); die zwölfte geschweifte Blumen (§. 78. Nr. 1.); die dreizehnte scheibenartige Blumen (§. 78. Nr. 2.). Die vierzehnte Klasse enthält solche Pflanzen, die mehrere Kapseln zugleich tragen, wie z. B. Ranunkeln, Anemonen, Christwurz u. s. w. Die letzte Klasse enthält Moose, Flechten, Pilze und Farrnkräuter. Von diesen glaubten die Alten, dass sie weder Blumen, noch Samen trügen.

137. *Morison* hat sein System nach der Frucht der Blumenkrone und der äusseren Gestalt der Pflanze gemacht. Er hat achtzehn Klassen:

Lignosae: 1) Arbores, 2) Frutices, 3) Suffrutices.
Herbaceae: 4) Scandentes, 5) Leguminosae, 6) Siliquosae, 7) Tricapsulares, 8) a numero capsularum dictae, 9) Corymbiferae, 10) Lactescentes s. Papposae, 11) Culmiferae s. Calamariae, 12) Umbelliferae, 13)

Tricoccae, 14) Galeatae, 15) Multicapsulares, 16) Bacciferae, 17) Capillares, 18) Heteroclitae.

Das Fehlerhafte dieses Systems besteht, wie bei den meisten Systemen der Alten, in dem ungleichen Eintheilungsgrund und in dem Unterschiede zwischen Bäumen und Kräutern. Unter Suffrutices versteht Morison kleine Sträucher, aber nicht nach unserer Erklärung Staudengewächse, öfters wird auch von andern Botanikern ein kleiner Strauch Suffrutex genannt. Die vierte Klasse enthält alle rankende Gewächse, z. B. Kürbis, Winden u. s. w. Die siebente Klasse hat Pflanzen, welche eine dreifächrige Kapsel haben. In der achten Klasse sind Pflanzen, die bald mehr bald weniger Fächer in den Kapseln haben. Die neunte Klasse enthält zusammengesetzte Blumen, die kein Federchen oder wenigstens nur ein häutiges tragen. In der zehnten Klasse sind alle zusammengesetzte Blumen, die ein haarförmiges, wollenes, borstenartiges oder auch gefiedertes Federchen haben. Zur elften Klasse gehören alle Gräser und damit verwandte Gewächse; zur zwölften die doldentragenden; zur dreizehnten diejenigen, die eine dreifächrige Kapsel, welche aus drei besondern Kapseln zu bestehen scheint, haben (§. 111. Nr. 5.). Die vierzehnte Klasse enthält rachenförmige oder lippenförmige Blumen; die siebzehnte Klasse enthält bloss Farnkräuter; zur achtzehnten gehören Moose, Flechten, Pilze und Steinpflanzen. Zu tadeln ist es, dass Morison öfters Pflanzen in Klassen gebracht hat, wo sie nicht hin gehören.

138. *Herrmann* bediente sich der Frucht, der Blume und auch, aber nur an wenigen Stellen, der andern Gestalt.

Herbae gymnospermae. A. monospermae: 1) plices, 2) Compositae; B. dispermae: 3) Stellatae Umbellatae; C. tetraspermae: 5) Asperifoliae, 6) ticillatae; D. polyspermae: 7) Gymno-polyspermae. **Herbae angiospermae:** 8) bulbosae s. Tricapsulae, 9) capsula unica, Univasculares, 10) capsulae binis vasculares, 11) capsulae 3, Trivascul., 12) capsulae Quadrivasc., 13) capsulae 5, Quinquesc., 14) siliculosae, 15) legumen, Leguminosae, 16) Multiloculares, 17) carnosae, Bacciferae, 18) carnosae, Ferae. **Herbae apetalae.** 19) calyculatae, Apetalae, 20) glumosae, Staminae, 21) nudae, Muscosae. **Herbae bacciferae:** 22) incompletae, Juliferae, 23) carnosae, Ulicatae, 24) carnosae, non umbilicatae, 25) non carnosae, Fructu sicco.

Dieses System hat vor allen bisher abgehandelten den Vorzug; nur die Abtheilungen zwischen Bäumen und Kräutern sind fehlerhaft. Wenn man es jetzt anwenden wollte, müsste es noch grosse Veränderungen erleiden. Die vorangeschickten Erklärungen der Klassen machen eine weitere Auseinandersetzung entbehrlich.

139. *Christoph Knaut* hat auch die Frucht in seinem System gewählt, nur mit dem Unterschied, dass er auf die Zahl der Blumenblätter und ihre regelmässigkeit geachtet hat. Die meiste Aehnlichkeit hat sein System mit dem ersten des *Rajus*.

140. *Boerhaave* hat aus dem *Hermannischen* Tournefortischen System, so wie aus dem des *Linne* gewählt, und daraus ein eigenes gemacht. Die Bäume und Kräuter hat er auch abgesondert, die Zahl

II. Systemkunde.

pseln, der Blumenblätter und der Samenscheidendones) benutzt.

141. *Rajus* verbindet Frucht, Blume und Stalk wie seine Vorgänger. Weil sein System unvollkommenes hat, will ich es hier anzeigen.

Herbae: 1) Submarinae, 2) Fungi, 3) Musci, 4) Cactaceae, 5) Apetalae, 6) Planipetalae, 7) Discoideae, 8) Corymbiferae, 9) Capitatae, 10) solitario semine, 11) Umbelliferae, 12) Stellatae, 13) Asperifoliae, 14) Verticillatae, 15) Polyspermae, 16) Pomiferae, 17) Bacciferae, 18) Multisiliquae, 19) Monopetalae, 20) Dicotylipetalae, 21) Siliquosae, 22) Leguminosae, 23) Pentapetalae, 24) Floriferae, 25) Staminae, 26) Anomaliae, 27) Arundinaceae. Arbores: 28) Apetalae, 29) fructu umbilicato, 30) fr. non umbilicato, 31) fr. sicco, 32) fr. siliquoso, 33) Anomaliae.

Das alte System des *Rajus* hat nur 25 Klassen und ist ungleich unvollkommener, als dieses verbesserte. Die alte Abtheilung zwischen Bäumen und Kräutern hat er noch beibehalten. In der ersten Klasse stehn alle Seegewächse, Thier- und Steinpflanzen; in der fünften alle Gewächse, die keine Blumenblätter haben; in der sechsten Klasse geschweifte Blumen (§. 78. Nr. 1.); in der siebenten scheibenartige und Strahlenblumen, die aber zugleich ein haarförmiges Federchen haben; in der achten Klasse sind dieselben Blumen, die aber kein Federchen haben; in der neunten Klasse stehn alle kopfförmige zusammengesetzte Blumen, die ein häutiges Federchen tragen. Die zwölfte Klasse enthält Pflanzen, deren Blätter quirlförmig stehn, die zugleich eine viertheilige Blumenkrone und zwei freie Samen tragen. Und in der dreizehnten Klasse stehen alle scharfblättrige

Pflanzen, die einblättrige röhrenförmige Blumen und vier freie Samen tragen. Zur vierzehnten, die lippen- oder rachenförmigen Blumen. In 24sten Klasse stehn alle Liliengewächse. Zur 25ten werden alle Gräser und zur 26sten diejenigen unter die vorhergehenden nicht gebracht werden, gezählt.

142. *Camelus* hat ein gar sonderbares Sy nach den Klappen der Kapsel und deren Zahl offen. Es ist aber wegen seiner Kürze nicht brauchbar.

1) Pericarpia afora, 2—7) Pericarpia uni-hex

143. *Rivis* wählte allein die Blumenkrone Regelmässigkeit der Blumenblätter und ihre Zahl

Flores regulares: 1—6) Mono-Hexapetali, 7) lypetali. Flores compositi: 8) ex flosculis regularibus, 9) ex flosculis regularibus, et irregularibus ex flosculis irregularibus. Flores irregulares: 16) Mono-Hexapetali, 17) Polypetali. Flores impleti: 18) imperfecti.

Dieses System ist sehr leicht zu verstehen, auch das gewählte Kennzeichen ist ohne viele zu finden. Nur dass die Regelmässigkeit der Blumenkrone, die öfters bei verschiedenen Arten, welcher einer Gattung gehören, abändert, so wie auch Zahl der Blumenblätter, welche nicht selten auch diese Eintheilung sehr erschweren. Die Ordnung zu den Klassen sind nach der Frucht gemacht, diese nemlich frei ist (fructus nudus), oder ein Fruchthalt (Pericarpium) hat, und ist abgetheilt in ein trockenes (Pericarpium cum), oder fleischiges (Pericarpium carnosum).

II. Systemkunde.

144. *Christian Knaut* hat das *Rivinische* unabgeändert nur umgekehrt angenommen. Er macht er nach der Zahl der Blumen die Abtheilungen nach der Regelmässigkeit derselben. Er läugnet aber, dass nackte unblättrige Blumen gäbe, so wie er auch eine blosse Samen züchtet.

145. Des *Tourneforts* System war eine geraume Zeit das Lieblingssystem aller Botaniker, und es verdient vorzüglich angezeigt zu werden.

Herbae et suffrutices: A) floribus monopetalis, 1) campaniformibus, 2) infundibuliformibus et rotatis, 3) anomalis, 4) labiatis; B) floribus polypetalis, 5) cruciformibus, 6) rosaceis, 7) rosaceis umbellatis, 8) caryophyllaceis, 9) liliaceis, 10) papilionaceis, 11) anomalis. Herbae et Suffrut. 12) florib. flosculosis, 13) semiflosculosis, 14) radiatis, 15) apetalis et stamineis, 16) qui floribus carent et semine donantur, 17) quorum flores et fructus conspicui desiderantur. Arbores et Frutices: floribus 18) apetalis, 19) amentaceis, 20) monopetalis, 21) rosaceis, 22) papilionaceis.

Die Gestalt der Blumenkrone, welche *Tournefort* eigentlich nur allein bei seinem Systeme anwendet, scheint es sehr leicht und fasslich zu machen. Sie ist aber so mannigfaltig, dass es noch hie und da an richtigen Ausdrücken fehlt; auch gehn einige Arten der Blumenkrone allmählig in die andern über, dass es bisweilen schwer hält, eine richtig von der andern zu unterscheiden. Dieses sind die Hauptgründe, warum *Tourneforts* System in der neuern Zeit nicht mehr angenommen wird. Die Ordnungen seines Systems hat nach dem Griffel und der Frucht entworfen. Wenn

der Fruchtknoten unter der Blume ist, sagt er, *calyx abit in fructum*, ist derselbe von der Blume eingeschlossen, so nennt er's, *pistillum abit in fructum*. Die Frucht wird auch genauer bestimmt, ob es eine Kapsel, Beere u. s. w. sei.

146. Verschiedene weniger merkwürdige Systeme, die nur blosse Abänderungen der vorhergehenden sind, brauchen hier nicht angezeigt zu werden. Diese Abänderungen beziehen sich bisweilen auf einzelne Dinge, worauf die andern nicht geachtet haben; zum Beispiel mag *Pontedera* dienen; dieser nahm Tournefortsches System, verband es mit dem Benthamschen, und theilt noch ausserdem die Pflanzen in knospentragende, und solche die keine haben, ab. Ein anderes weit merkwürdigeres, aber auch nicht anwendbares System ist das des *Magnol*, der nach dem Kelche seine Klassen eintheilte. Mehr ähnliche Systeme kann man bei *Adanson* finden. Dieser grosse Naturforscher hat über sechszig verschiedene Systeme gemacht, und deutlich gezeigt, dass man noch weit mehrere machen könnte, wenn auch die Wissenschaft dadurch einigen Nutzen erhielte.

147. Die Systeme, welche wir gehabt haben, waren entweder nach der Frucht oder Blume und andern Theilen gemacht; aber nach der Lage der Staubgefässe hat vor *Gleditsch* noch keiner eins entworfen. Die Klassen sind folgende:

- 1) Thalamostemonis.
- 2) Petalostemonis.
- 3) Calycostemonis.
- 4) Stylostemonis.
- 5) Cryptostemonis.

Die Anheftung der Staubgefäße machen die Klassen aus; in der ersten stehn sie auf dem Fruchtboden; in der zweiten auf der Blumenkrone; in der dritten auf dem Kelche; in der vierten auf dem Griffel; in die fünfte Klasse gehören alle Gewächse, bei denen man die Blumen nicht sehen kann, dies sind Farnekräuter, Moose, Flechten und Pilze. Die Ordnungen sind nach der Zahl der Staubbeutel gemacht, ob nemlich einer oder mehrere in einer Blume sind: z. B. Monantherae, Diantherae, Triantherae etc. Weil aber nur so wenig Klassen sind, müssen natürlich die Ordnungen noch viele Unterabtheilungen haben, und dies ist das einzige, was man an diesem, sonst sehr schönen Systeme auszusetzen hat, und was der fernern Brauchbarkeit desselben im Wege steht.

Dasselbe System hat der Herr Hofrath *Mönch* in etwas abgeändert. Seine Klassen heißen:

- 1) Thalamostemon.
- 2) Petalostemon.
- 3) Parapetalostemon, wenn die Staubgefäße auf Blumenblätter ähnlichen Blättern, die sich in der Blumenkrone finden, stehn.
- 4) Calycostemon.
- 5) Allagostemon, wenn die Staubgefäße wechselweise auf dem Kelch und den Blumenblättern stehn.
- 6) Stylostemon, wenn sie auf dem Griffel stehn.
- 7) Stigmatostemon, wenn sie auf der Narbe befestigt sind.
- 8) Cryptostemon.

Die Ordnungen hat er nach der Verschiedenheit der Frucht gemacht, aber da einige Klassen zu stark

wurden, war er genöthigt nach andern Theilen Blumen Unterabtheilungen zu entwerfen.

148. *Haller* suchte auf eine sehr scharfsinnige Art durch die Samenblätter, den Kelch, die Blumenkrone, die Staubgefäße und durch das Geschlecht der Pflanzen ein natürliches System aufzustellen. Er theilte die Klassen, die er nachher in etwas wieder abgeändert hat, sind: 1) Fungi, 2) Musci, 3) Epiphyllaspermi, 4) Apetalae, 5) Gramina, 6) Graminibus affinia, 7) monocotyledones pataloideae, 8) Polystemones, 9) Distystemones, 10) Isostemonones, 11) Mejestemonones, 12) minibus sesquialteris, 13) Staminibus sesquialteris, 14) Staminibus quatuor, Ringentes, 15) Congregati.

Zur dritten Klasse gehören alle Farnkräuter. In der siebenten gehören alle Lilien. In der achten Klasse stehen alle Gewächse, deren Staubfäden die Einschnitte oder Blätter der Blumeneukrone an Zahl drei bis vier mal übertreffen. Zur neunten Klasse gehören die Gewächse, die doppelt so viel Staubfäden haben, als Einschnitte oder Blätter der Blumenkrone sind. In der zehnten diejenigen, die eben so viel Staubfäden haben, als Einschnitte oder Blätter der Blumenkrone sind. In der elften Klasse werden alle diejenigen Gewächse aufgeführt, deren Staubfäden weniger Einschnitte oder Blätter der Blumenkrone sind. In der zwölften Klasse gehören alle kreuzförmige Blumenkronen; zur dreizehnten alle Schmetterlingsblumen und zur vierzehnten die rachen- oder lippenförmigen Blumen mit vier Staubfäden. In die letzte Klasse werden alle zusammengesetzte Blumen gebracht. Die Ordnungen dieses Systems sind nach allen Theilen der Blume und der Frucht entworfen.

Ähnliche Systeme haben *Royen* und *Wac-*

II. Systemkunde.

erf gemacht, worunter das erste den Vorzug ent. Allein alle diese Systeme erschweren sich um durch die so verschiedenen Theile der Pflanze, welche man allezeit vor Augen haben muss, und daher entstehende grosse Anzahl von Unklarheiten.

149. *Linné* hat in seinem Systeme die Staubfäden vorzüglich zur Abtheilung seiner Klassen gewählt:

- | | |
|------------------|-------------------|
| 1) Monandria. | 13) Polyandria. |
| 2) Diandria. | 14) Didynamia. |
| 3) Triandria. | 15) Tetradynamia. |
| 4) Tetrandria. | 16) Monadelphia. |
| 5) Pentandria. | 17) Diadelphia. |
| 6) Hexandria. | 18) Polyadelphia. |
| 7) Heptandria. | 19) Syngenesia. |
| 8) Octandria. | 20) Gynandria. |
| 9) Enneandria. | 21) Monoecia. |
| 10) Décandria. | 22) Dioecia. |
| 11) Dodecandria. | 23) Polygamia. |
| 12) Icosandria. | 24) Cryptogamia. |

Von der ersten bis zur zehnten Klasse werden die Staubgefässe gezählt. Fig. 95. 79. 115. 81. 153. 154. 110. 126. Zur elften Klasse gehören alle Gewächse, die über zehn bis neunzehn Staubgefässe haben; zur zwölften diejenigen, welche viele Staubgefässe auf dem Kelche befestigt haben. Fig. 52. 53. Die dreizehnte Klasse enthält Gewächse, die eine grosse Zahl Staubfäden von 20 bis 1000 in einer Blume enthalten. Fig. 116. Die vierzehnte besteht aus Pflanzen, die vier Staubfäden in einer Blume enthalten, von denen zwei länger als die übrigen sind. Fig. 50. 51. In der fünfzehnten stehn diejenigen, welche sechs Staubfä-

den haben, von welchen zwei kürzer als die andern sind. Fig. 145. 149. Die sechszehnte Klasse enthalten Gewächse, deren Staubfäden (Filamenta) in einem Cylinder zusammengewachsen sind. Fig. 56. 57. der siebzehnten Klasse stehen diejenigen Gewächse, deren Staubfäden in zwei Bündel zusammengewachsen sind. Fig. 108. 109. Zur achtzehnten Klasse gehören die, deren Staubfäden in mehreren Bündeln zusammenhängen. Fig. 150. In der neunzehnten Klasse stehen die, deren Staubbeutel in einem Cylinder verbunden sind. Die zwanzigste Klasse besteht aus solchen, deren Staubgefässe auf dem Griffel stehen. Die einundzwanzigste besteht aus Blumen von getrenntem Geschlechte, nemlich männlichen und weiblichen auf einer Pflanze; die zweiundzwanzigste aus männlichen und weiblichen Blumen, die aber so vertheilt sind, dass eine Pflanze männliche und die andere weibliche Blumen hat; die dreiundzwanzigste Klasse hat Blumen von getrenntem Geschlechte und Zwitterblumen zugleich, nemlich dass die Pflanze entweder männliche oder weibliche und Zwitterblumen trägt. In der letzten Klasse gehören alle Gewächse, deren Blumen dem blossen Auge nicht bemerkbar sind, und die männliche Blumen, unter einer starken Vergrösserung betrachtet, keine Staubbeutel, sondern freien Blüthenstaub haben; dahin gehören Farrnkräuter, Moosflechten und Pilze.

(Die Darstellung des V. ist etwas mangelhaft. 1) Geschlechtstheile der Pflanzen sind kenntlich 1) 23 Kl., oder unkenntlich 24 Kl. Die Blüthen sind 1) Zwitterblüthen (oder die zusammengesetzten Blüthen enthalten solche), und man sieht a) bloss auf die Zahl der freien nicht verwachsenen Staubfäden, 1—11 Kl. mit Ausnahme von Kl. 4 und 16, wo die Staubfäden gleich gross sein müssen

II. Systemkunde.

b) auf Zahl und Einfügung, Kl. 12 und wenn die vielen (mehr als 20) Staubfäden Kelche, diese, wenn die vielen Staubfäden dem Blüthenboden stehen; c) auf Zahl u. Kl. 14 und 15. s. den Text; d) auf die Einigung der Staubfäden unter einander, Kl. in 16 sind alle Staubfäden in einen Haufen sind alle in zwei Haufen, in 18 in vielen Haufen verwachsen; e) auf die Verwachsung des Staubbeutels in eine Röhre, Kl. 19; f) auf die Verwachsung der Staubfäden mit dem Staubbeutel, Kl. 20; g) auf die Verwachsung der Blüthen sind II. nicht bloss Zwitterblüthen, und dann a) männliche und weibliche auf verschiedenen Stämmen, Kl. 21 oder b) männliche auf verschiedenen Stämmen, Kl. 22 c) Zwitterblüthen und männliche oder weibliche in derselben Art, Kl. 23. L.)

150. Die Ordnungen sind bei den meisten Klassen nach dem Griffel, bei einigen nach der Frucht und bei den letzten Klassen nach den Staubfäden gemacht. Von der ersten bis dreizehnten Klasse sind die Ordnungen nach dem Griffel, nemlich *einweibig* (Monogynia), wenn nur ein Griffel (Stylus) in der Blume ist. Fig. 114. 115. 116. 144. 153. u. s. w., *zwei-, drei-, vier- u. s. w. mehrweibig* (Di-, Tri-, Tetra- etc. Polygynia), nach der Zahl derselben, Fig. 135; man zählt gewöhnlich bis sechs, und dann sagt man vielweibig. Wenn auch mehrere Fruchtknoten sind, und es ist nur ein Griffel, so wird doch der Griffel gezählt. Immer zählt man bei Bestimmung der Ordnungen die Griffel; wenn dieser fehlt, wird nach der Zahl der Fruchtknoten gesehn; ist aber nur ein Fruchtknoten mit mehreren sitzenden Narben, so zählt man diese und bestimmt nach ihnen die Ordnung. Die Ordnungen der vierzehnten Klasse werden nach der Art unterschieden, und sind zweierlei, nemlich:

ob die Samen frei sind (*Gymnospermia*), oder einer Fruchthülle eingeschlossen (*Angiosperm*)
 (Im ersten Falle ist die Frucht eine *caryopsis*; kennt aber die erste Ordnung daran, dass als ein Fruchtknoten vorhanden ist, die zw dass nur einer vorhanden ist. L.)

Die Ordnungen der fünfzehnten Klasse wet wie die der vorhergehenden, nach der Frucht stimmt, nur mit dem Unterschiede, dass hier k freie Samen, sondern bloss Schoten sind, und mal Ordnungen nach der Grösse der Schoten *Silicul* und *Siliquosa* nennt.

(Es kommt nicht bloss auf die Grösse, sondern das Verhältniss der Länge zur Breite an. die Schoten kurz und dabei breit, so gehört Pflanze zur *T. Siliculosa*, sind die Schoten und dabei schmal, so gehört sie zur *T. Siliqua* L.)

In der sechzehnten, siebzehnten, achtzehn zwanzigsten, ein und zwanzigsten und zwei zwanzigsten Klasse muss die Zahl der Staubfäden Ordnungen bestimmen; in der sechzehnten fängt mit *Diandria* u. s. w. an, in der zwanzigsten, ein zwanzigsten und zwei und zwanzigsten mit *Mo* *dria* u. s. w.

Die neunzehnte Klasse enthält nur zusammen setzte Blumen, einige wenige ausgenommen. L nennt diese zusammengesetzten Blumen eine Vieh berei, *Polygamia*, und setzt dies Wort vor j Ordnung, in welcher zusammengesetzte Blumen halten sind. Die Ordnungen sind folgende:

Polygamia aequalis, wenn alle Blumen, eine zusammengesetzte Blume enthält, frucht Zwitter und von gleicher Gestalt sind, sie mögen : genförmig oder röhrenförmig geformt sein. Fig. 85.

Polygamia superflua, wenn die zusammen

II. Systemkunde.

etzte Blume eine Strahlenblume ist, der fruchtbare Zwitterblumen, und deren Strahl aus weibliche Blumen enthält.

Polygamia frustranea, wenn die zusammengesetzte Blume eine Strahlenblume ist, der aus fruchtbaren Zwitterblumen, und deren unfruchtbaren weiblichen Blumen besteht.

Polygamia necessaria, wenn die zusammengesetzte Blume eine Strahlenblume ist, und die aus Zwitterblumen besteht, deren Griffel fruchtbar sind, der Strahl aber fruchtbare weibliche Blüthen enthält.

(Die Griffel sind unfruchtbar, weil die Blüthen zusammengelegt bleiben, und sich nicht ausbreiten, wodurch die einsaugenden Papillen selbst bedeckt bleiben. Die Distelblüthen ebenfalls zusammengelegte Narben, die Papillen stehen mehr auswärts, so dass nicht bedeckt bleiben. L.)

Polygamia segregata, wenn in einer zusammengesetzten Blume, ausser der allgemeinen Blumenlocke, noch eine jede Blume wieder in einem eigenen Kelch eingeschlossen ist.

Monogamia heisst die Ordnung, in welcher alle Gewächse enthalten sind, die zu dieser Klasse nach dem gegebenen Kennzeichen gehören, aber keine zusammengesetzte Blumen haben.

Die Pflanzen der ein und zwei und zwanzigsten Klasse werden, wie gesagt, nach der Zahl der Staubgefässe, in Ordnungen abgetheilt. Man sieht aber auch ausserdem auf die Verbindungen der Staubfäden und Staubbeutel, daher heissen die beiden vorletzten Ordnungen der genannten Klassen: *Monadelphia* und *Syngenesia*. Die letzte Ordnung aber beider Klassen heisst: *Gynandria*, nicht deshalb, weil bei den dahin gehörigen Gewächsen die Staubgefässe auf

dem Griffel stehn, sondern weil in den männlichen Blumen eine Griffel ähnliche Verlängerung sich befindet, worauf die Staubgefäße befestigt sind. Diese Verlängerung hielt Linné für eine unvollkommene Art des Stempels.

In der drei und zwanzigsten Klasse werden drei Ordnungen: Monoecia, Dioecia und Triöcia genannt. Die letzte Klasse hat folgende Ordnungen: Filices, Musci, Algae und Fungi (§. 123.).

151. Der Idee eines vollkommenen Systems (§. 134.) entspricht nun das Linnéische nicht, da kein einzelnes Merkmal alle Klassen* bestimmt werden. Es ist vielmehr dieses System ein gemischtes, indem künstliche, natürliche und Geschlechtsstufen mit einander abwechseln. Bis jetzt ist es noch immer das beste und wird es wahrscheinlich noch lange bleiben; da durch die Verbindung mehrerer Merkmale die Klassen auf immer fest stehen und keine Pflanze vorkommen kann, die sich nicht bequemen in die einmal bestimmten Klassen und Ordnungen bringen liesse. Dahingegen kann bei den meisten der oben angeführten Systeme der Fall eintreten, daß durch eine neu entdeckte Pflanze, auch eine neue Klasse oder Ordnung gemacht werden muss. Dennoch ungeachtet dürfen doch die Fehler desselben nicht verschwiegen werden.

Durch das Zählen der Staubfäden, ihre verschiedene Länge und mannigfaltige Verwachsungen glaubt Linné einige sogenannte natürliche Klassen mit den künstlichen verbinden zu können; dadurch sind einige Fehler entstanden, die, wenn Linné die Blumenkronen mit zur Hülfe genommen hätte, nicht eingeschlichen wären. Zum Beispiel sind in der vierzehnten Klasse

alle lippenförmige und rachenförmige Blumen enthalten, weil aber Linné bloss auf vier Staubfäden sah, von denen zwei kürzer sind, so mussten einige in der zweiten und noch andere in der vierten Klasse stehn, da sie doch eigentlich hierher gehören. Eben so stehn alle Schmetterlingsblumen in der siebzehnten Klasse, allein das gegebene Kennzeichen, dass die Staubfäden in zwei Bündel verwachsen sein sollen, trifft nicht bei allen zu; viele, die in der Klasse stehn, haben die Staubfäden in einem Cylinder verbunden; eben so stehn auch in der zehnten Klasse viele Pflanzen mit Schmetterlingsblumen. Diese beiden Fehler sind noch nicht die grössten dieses Systems: wichtiger sind die, dass Linné die Staubfäden in den Klassen zählte, aber nicht auf die Befestigung gemerkt hat, und bei der zwölften Klasse sieht er, ob sie auf dem Kelch, und bei der zwanzigsten, ob die Staubfäden auf dem Griffel stehn. Die neunzehnte Klasse enthält alle zusammengesetzte Blumen und doch bringt er in die letzte Ordnung derselben einige andere, deren Staubbeutel nur bisweilen zusammenhängen. Auch ist zu tadeln, dass Linné bei der 21. 22. und 23ten Klasse auf das Geschlecht achtet, vorher aber niemals darauf gemerkt hat, da doch sehr viele Pflanzen in den andern Klassen sich finden, die eigentlich dahin gehörten.

(Diese Fehler liessen sich durch Vertheilung der Gattungen unter die gehörigen Klassen und Hinweisungen leicht heben. Der grösste Fehler ist die Veränderlichkeit der Zahl, welche das Hauptkennzeichen macht. L.)

152. Diese Fehler und einige andere, von denen man so leicht kein System freisprechen kann, haben verschiedene Botaniker auf den Gedanken gebracht,

das Linné'sche brauchbarer zu machen, und die Fehler wo möglich zu verbessern. Unter allen Verbesserungen, die viele mit dem Linné'schen System vorgenommen haben, ist die des Ritter *Thunberg* die zweckmässigste. Er hat nur 20 Klassen, weil er die Pflanzen der 20. 21. 22. und 23sten Klasse, nach der Zahl oder Verwachsung der Staubgefäße in die andern vertheilt. Die Gründe dazu sind folgende:

Alle Gewächse, die in der zwanzigsten Klasse stehn, sollen die Staubgefäße auf dem Griffel haben, aber die meisten von Linné dahin gebrachten haben dies Kennzeichen nicht, nur allein die Orchisarten (f. 153. Nr. 7.) ausgenommen. Die folgenden drei Klassen sind nicht immer im Geschlechte beständig, verschiedene Himmelsstriche machen öfters aus einem Monöcisten einen Polygamisten u. s. w.

(Es ist wohl richtig, dass manche Pflanzen, welche Linné zur Gynandria rechnete, nicht dahin gehören, aber der sonderbare Bau der Orchideen erfordert im Linné'schen System eine besondere Klasse. Die Gegenwart der Staubfäden und Staubwege überhaupt, ist bei weitem weniger veränderlich, als die Zahl, und die Klassen Monoecia und Dioecia mögen neben den übrigen wohl bleiben. Man kann auch die Klassen Monoecia und Dioecia so bestimmen, dass man nur die Pflanzen dahin rechnet, welche ausser den Geschlechtstheilen auch in der Gestalt der Blüthe sich unterscheiden. Sprengel hat nach diesem Grundsatz die genannten Klassen in seiner Ausgabe von Linné's *Systema Vegetabilium*. Goetting. 1825—1827. bearbeitet. Den Satz selbst habe ich schon in meinem *Prodrom. Philos. botan.* 1798. p. 111. 112. aufgestellt. Die Klasse Polygamia ist aber, ausser Thunberg von Persoon (*Enchiridion botanic.* Paris 1805—1807.) u. Hornemann (*Hort. botan. Hafniens.* Hafn. 1813—1815.) verworfen worden und mit Recht, denn die Zahl der Gattungen, wo die Zweit- oder weiblichen sich unterscheidet, ist gar sehr

gering, und in allen Fällen kann man leicht in Erkennung der Klasse irren, wenn man zufälliger Weise eine Zwitterblüthe trifft, und danach die Klasse bestimmt. Hornemann hat in dem angeführten Werke auch die höchst unbestimmte eilfte Klasse weggelassen, eine wesentliche Verbesserung des Linnéischen Systems. Villars *Histoire des plantes de Dauphiné*. Paris 1786—1789. hat die Pflanzen ganz allein nach der Zahl der Staubfäden geordnet und Brotero ist ihm in der *Flora Lusitanica* 1804. darin gefolgt. Aber dieses bessert nichts, die Veränderlichkeit in der Zahl ist, wie schon mehrere Mal erinnert worden, sehr gross, und einige Klassen, z. B. die Pentandria, nimmt fast die Hälfte des Ganzen ein, welches eine grosse Unbequemlichkeit verursacht. L.)

Liljebald hat mit dem Linnéischen System folgende Veränderung gemacht: Er vereinigt die 7. 8. 9te Klasse mit der 10ten, seine Decandria enthält also die Hepandria, Octandria, Enneandria und Decandria des Linné. Die 11te Klasse vereinigt er mit der 13ten. Die 18te, 21., 22. und 23ste Klasse schaltet er in die anderen ein. Sein System enthält mithin nur 16 Klassen, die er ziemlich wie die Linnéischen folgen lässt, sie heissen:

- | | |
|----------------|-------------------|
| 1) Monandria. | 9) Polyandria. |
| 2) Diandria. | 10) Gynandria. |
| 3) Triandria. | 11) Didynamia. |
| 4) Tetrandria. | 12) Tetradynamia. |
| 5) Pentandria. | 13) Monadelphia. |
| 6) Hexandria. | 14) Diadelphia. |
| 7) Decandria. | 15) Syngenesia. |
| 8) Icosandria. | 16) Cryptogamia. |

Einige andere Botaniker haben die Ordnungen der neunzehnten Klasse geändert, dass sie nur das Wort Polygamia weglassen, und die Pflanzen der Ordnung **Menogamia** in die andern Klassen vertheilt haben.

Diese Ordnung der neunzehnten Klasse muss aber

auch ganz aufgehoben werden, weil die dazu gehörigen Gattungen nichts als die zusammenhängenden Staubbeutel mit den übrigen Syngenesisten gemein haben, die doch anderen Gattungen, namentlich *Solanum* nicht fehlen. Hebt man diese Ordnung auf, so erhält dadurch die ganze Klasse ein natürliches Ansehn.

Der Präsident von *Schreber* hat in der neuesten Ausgabe der Linnéischen Gattungen in der 21sten Klasse die Linnéischen Ordnungen geändert und folgende gemacht:

- 1) *Miscellaneae*.
- 2) *Filices*.
- 3) *Musci*.
- 4) *Hepaticae*.
- 5) *Algae*.
- 6) *Fungi*.

Andere Abänderungen dieses Systems, die weniger wichtig sind, können hier mit Stillschweigen übergangen werden, und nur diejenigen Veränderungen, welche ich damit vorgenommen habe, will ich noch anführen.

Die letzte Ordnung der neunzehnten Klasse *Monogamia* habe ich ausgelassen und die dahin gehörigen Gattungen in die fünfte Klasse gebracht, wo mehrere Gewächse mit zusammenhängenden Staubbeuteln stehn.

(Dann muss aber das Kennzeichen der 19. Klasse seyn, eine solche Verwachsung der Staubbeutel, dass der Blütenstaub in das Innere der dadurch entstandenen Röhre ausgeleert wird. L.)

Die Ordnung *Syngenesia* in der 21. und 22sten Klasse bringe ich zur Ordnung *Monadelphina*, weil die Pflanzen, welche dahin gerechnet wurden, keine zu-

ammengesetzte Blumen, wohl aber etwas zusammenhängende Staubbeutel tragen. Die Ordnung Trioecia in der 23sten Klasse streiche ich auch weg und bringe sie zur vorhergehenden, weil die Pflanzen derselben meistens dieselbe Verschiedenheit des Geschlechts haben. Die Ordnungen der 24ten Klasse habe ich ganz verändert, sie heissen:

- 1) Gonopterides. 2) Stachyopterides. 3) Poropterides.
- 4) Schismatopterides. 5) Filices. 6) Hydropterides.
- 7) Musci. 8) Hepaticae. 9) Homallophyllae. 10) Algae.
- 11) Lichenes. 12) Xylomyci. 13) Fungi. 14) Gasteromyci.
- 15) Byssi.

1) *Gliederfarn* (Gonopterides), haben ihren Stengel beim Entwickeln nicht aufgerollt, er ist durchaus mit Gliedern und Scheiden versehen, die Früchte sind in sackförmige Decken (§. 64. Nr. 3.) verschlossen und stehen in Aehren. Hierher gehört Equisetum.

2) *Aehrenfarn* (Stachyopterides), haben den Stengel beim Entwickeln nicht aufgerollt, und ihre Früchte stehn entweder in einer Aehre oder zwischen den Blättern. Ihr Ansehn ist, wenn sie auch nicht die Früchte in Aehren tragen, doch ährenartig. Ihre Kapseln zerspringen in Klappen.

3) *Löcherfarn* (Poropterides), haben einen Wedel, der beim Entwickeln aufgerollt ist, tragen auf dessen Unterfläche vielfächrige Kapseln, und die Fächer derselben springen durch ein Loch auf.

4) *Spaltfarn* (Schismatopterides), haben einen bei der Entwicklung aufgerollten Wedel, der falsch geringelte Kapseln (§. III.), die durch einen Riss aufspringen, selten auf der Unterfläche trägt, gewöhnlich stehn diese in Aehren oder Rispen.

5) *Farnkräuter* (Filices), haben einen Wedel der

beim Entwickeln aufgerollt ist und ihre Früchte sind Kapseln, die mit einem elastischen Ringe (§. 111.) umgeben sind, und befinden sich auf der Rückseite des Wedels, sehr selten in Rispen.

6) *Wasserfarne* (Hydropterides), haben einen Wedel, der nicht aufgerollt ist, ausgenommen Pilularia, und ihre Früchte stehn an der Wurzel, und sind mit zusammengewachsenen Schuppen bedeckt.

7) *Moose* (Musci), haben einen stark beblätterten Stiel und tragen eine Büchse (§. 120.) die sich mit einem Deckel öffnet.

8) *Lebermoose* (Hepaticae), haben einen flachen Wedel, und ihre Kapsel öffnet sich in Klappen oder Zähne.

9) *Plattmoose* (Homallophyllae), haben eine platten, auf der Erde angedrückten Wedel, eine nicht aufspringende Kapsel, die entweder vom Anfange an eine Oeffnung hat oder immer geschlossen ist.

10) *Tange* (Algae), der Wedel von mannigfaltiger Form, die Früchte unter der Oberfläche zerstreut, die Samen schleimig. Sie leben im Wasser.

11) *Flechten* (Lichenes), haben Laub von mannigfaltiger Form, die Früchte stecken in einem Fruchtlager (§. 128.).

12) *Holzpilze* (Xylomycei), sind Gewächse ohne Laub, von convexer oder flacher Gestalt, die auf Rinde oder Holz wachsen und aus Samen oder Früchten zusammengesetzt sind.

13) *Pilze* (Fungi), sind ohne Laub von verschiedener Gestalt fleischig, lederartig oder holzig, und in ihrer Substanz stecken die Früchte.

14) *Bauchpilze* (Gasteromycei), sind innerhalb

hl und ganz mit Samen, seltener mit Fruchtlagern (28.) (nie. L.) angefüllt.

15) *Schimmel* (Byssi), Gewächse ohne Laub, die als haarförmigen oder borstigen Fäden (§. 28.) bestehen, die mehr oder weniger wässrig sind und wahrscheinlich auf ihrer Oberfläche Samen tragen.

(Die Klasse Cryptogamia wird in drei Unterabtheilungen Filices, Musci und Cryptophyta am besten getheilt, deren Kennzeichen §. 132. Anm. gegeben sind. Die Farrnkräuter hat der Verf. nach ihren Familien Nr. 1—6 sehr gut charakterisirt. Die *Moose* sind 1) *Laubmoose* (M. frondosi), welche Stamm und Blätter gesondert haben und einen Deckel, welcher die Frucht verschliesst; 2) *Lebermoose* (M. hepatici), deren Stamm oft von den Blättern nicht geschieden und deren Früchte keinen Deckel haben. Die *Flechten* (Lichenes), haben einen krustenförmigen oder blattartigen Thallus; die *Tangen* (Algae), einen röhrenförmigen oder stammartigen und die *Pilze* (Fungi) einen flockigen oder gar keinen Thallus. Die Abtheilungen Nr. 12—15 sind zwar als Unterordnungen der Pilze zu behalten, aber anders zu bestimmen. Die *Holzpilze* (Xylomyces oder Xylomycetes), haben die Samen in Schläuchen und diese im Fruchthälter eingeschlossen; die *Fleischpilze* (Sarcomycetes), Nr. 13. haben Samen in Schläuchen und diese bilden einen Überzug aussen auf dem Fruchthälter; die *Bauchpilze* (Gasteromycetes oder Gastromyci), haben Samen ohne Schläuche im Fruchthälter eingeschlossen; die *Schimmelpilze* (Hyphomycetes, Byssi des Verf.) haben Samen ohne Schläuche, auf dem flockigen Thallus befindlich. Hierzu kommen die *Brandpilze* (Caeomycetes, Epiphyti) mit Samen ohne Schläuche, auf einem nicht flockigen Thallus oder einer fremden Unterlage. L.)

153. Ausser der Kenntniss verschiedener Systeme, ist es für den Anfänger sehr unterrichtend, einige Begriffe von verwandten Pflanzen zu haben. Sie

führen den Forscher, bei Untersuchung unbekannter Gewächse, leichter auf die rechte Spur und zeigen den Weg, Gattungen zu bestimmen. Wir sind zwar noch weit zurück, die wahren Verwandtschaften der Gewächse gefunden zu haben, und was wir davon wissen, sind sehr unvollkommene Bruchstücke; aber dies wenige kann uns doch bei Bestimmungen der Gewächse sehr helfen, weil öfters die Botaniker in ihren Beschreibungen sich der Ausdrücke bedienen womit man einzelne Familien, die verwandt zu sein scheinen, belegt. Linné hat folgende natürliche Verwandtschaften:

- 1) Palmae, §. 132. 7. 2) Piperitae, z. B. Piper
- 3) Calamariae, z. B. Carex, Schoenus. 4) Graminae, §. 132. Nr. 5. 5) Tripetaloidae, z. B. Alisma
- 6) Ensatae, z. B. Iris. 7) Orchideae, z. B. Orchis
- 8) Scitamineae, z. B. Amomum, Canna. 9) Spatheae, z. B. Allium, Narcissus. 10) Coronariae, z. B. Tulipa, Ornithogalum. 11) Sarmantaceae, z. B. Smilax, Asparagus. 12) Oleraceae, z. B. Spinacia, Atriplex, Blitum. 13) Succulentae, z. B. Sedum. 14) Gruinales, z. B. Geranium. 15) Inundatae, z. B. Potamogeton. 16) Calyciflorae, z. B. Elaeagnus, Hippophaë. 17) Calycanthemae, z. B. Epilobium, Oenothera. 18) Bicornes, z. B. Erica. 19) Hesperideae, z. B. Myrtus. 20) Rotaceae, z. B. Phlox, Anagallis. 21) Preciae, z. B. Primula, Androsace. 22) Caryophylleae, z. B. Dianthus, Lychnis, Alsine. 23) Trihilatae, z. B. Melia, Banisteria. 24) Corydales, z. B. Epimedium, Pinguicula. 25) Putamineae, z. B. Capparis, Morisonia. 26) Multisiliquae, z. B. Trollius, Caltha. 27) Rhoadeae, z. B. Argemone, Papaver. 28) Luridae, z. B. Solanum.

1) Atropa. 29) Campanaceae, z. B. Campanula, volvulus. 30) Contortae, z. B. Nerium, Ascle-
 31) Vepraculae, z. B. Daphne, Gnidia. 32) pilionaceae, z. B. Vicia, Pisum. 33) Lomen-
 eae, z. B. Mimosa, Cassia. 34) Cucurbitaceae, B. Cucumis, Cucurbita. 35) Senticosae, z. B. a, Rubus. 36) Pomaceae, z. B. Pyrus, Prunus. Columniferae, z. B. Malva, Althaea. 38) Tri-
 cae, z. B. Euphorbia. 39) Siliquosae, z. B. aspi, Raphanus. 40) Personatae, z. B. Antir-
 um. 41) Asperifoliae, z. B. Echium, Anchusa. Verticillatae, z. B. Thymus, Monarda. 43) mosae, z. B. Viburnum, Rhamnus. 44) Sepia-
 e, z. B. Syringa, Ligustrum. 45) Umbellatae, B. Daucus, Conium. 46) Hederaceae, z. B. He-
 a, Vitis, Aralia. 47) Stellatae, z. B. Galium, erula. 48) Aggregatae, z. B. Scabiosa, Dipsa-
 49) Compositae, s. §. 78. 50) Amentaceae, . 42. 51) Coniferae, z. B. Pinus. 52) Scabri-
 e, z. B. Urtica, Cannabis. 53) Miscellaneae. Filices, s. §. 132. Nr. 4. 55) Musci, s. §. 132.
 3. 56) Algae, s. §. 132. Nr. 2. 57) Fungi, s. 32. Nr. 1.

Ich habe nur die Namen mit den Beispielen ange-
 führt, aber die kurze Charakteristik jeder Ordnung
 weggelassen. Sie ist nicht Linnéisch, auch nicht
 von dem Verf. als ganz treffend ausgearbeitet, da
 nach seinem Urtheile, welches er am Ende hinzu-
 gefügt, viele dieser Ordnungen sehr künstlich und
 einige ganz unrichtig sind. Die meisten, sagt er,
 haben indessen in ihrem äussern Ansehen viel Ue-
 bereinstimmendes, das sich nur durch Erfahrung
 fühlen, aber nicht beschreiben lässt.

Adanson hat zuerst die natürlichen Ordnungen
 in 58 Familien nach ihren Kennzeichen für seine
 Zeit sehr ausgeführt. Die Kennzeichen der Gat-

tungen sind tabellarisch aufgestellt. Seine Namenänderungen sind unbequem.

Jussieu's natürliches System mit einem künstlichen Schlüssel könnte man sagen, hat wegen seiner trefflichen Ausarbeitung einen so grossen Beifall erhalten, dass man es nothwendig kennen muss. Es erschien zuerst 1790. in folgender Gestalt:

Classis 1. Acotyledones.

Ord. 1. Fungi. 2. Algae. 3. Hepaticae. 4. Musci
5. Filices. 6. Najades.

Cl. 2. Plantae monocotyledones, Stamina hypogyna
Ord. 1. Aroideae. 2. Typhae. 3. Cyperoideae. 4. Gramineae.

Cl. 3. Plantae monocotyledones. Stamina perigyna
Ord. 1. Palmae. 2. Asparagi. 3. Iunci. 4. Lilia
5. Bromeliae. 6. Asphodeli. 7. Narcissi. 8. Iridae.

Cl. 4. Plantae monocotyledones. Stamina epigyna
Ord. 1. Musae. 2. Cannae. 3. Orchideae.

Cl. 5. Plantae dicotyledones apetalae. Stamina epigyna.

Ord. 1. Aristolochiae.

Cl. 6. Plantae dicotyledones apetalae. Stamina perigyna.

Ord. 1. Elaeagni. 2. Thymelaeae. 3. Proteae. 4. Lauri.
5. Polygoneae. 6. Atriplices.

Cl. 7. Plantae dicotyledones apetalae. Stamina hypogyna.

Ord. 1. Amaranthi. 2. Plantagineae. 3. Nyctagineae.
4. Plumbagineae.

Cl. 8. Plantae dicotyledones monopetalae. Corolla hypogyna.

Ord. 1. Lysimachiae. 2. Pedicularae. 3. Acanthaceae.
4. Iasmineae. 5. Vitices. 6. Labiatae. 7. Scrophulariae.
8. Solaneae. 9. Borragineae. 10. Convolvuli. 11. Polemonia. 12. Bignoniae. 13. Geraniae.
14. Apocynae. 15. Sapotae.

Cl. 9. Plantae dicotyledones monopetalae. Corolla perigyna.

Ord. 1. Guajacanae. 2. Rhododendra. 3. Ericae. 4. Campanulaceae.

Cl. 10. Plantae dicotyledones monopetalae. Corolla epigyna. Antherae connatae.

Ord. 1. Cichoraceae. 2. Cinarocephalae. 3. Corymbiferae.

3. 11. *Plantae dicotyledones monopetalae. Corolla epigyna. Antherae distinctae.*

Ord. 1. Dipsaceae. 2. Rubiaceae. 3. Caprifolia.

Cl. 12. *Plantae dicotyledones polypetalae. Stamina epigyna.*

Ord. 1. Araliae. 2. Umbelliferae.

Cl. 13. *Plantae dicotyledones polypetalae. Stamina hypogyna.*

Ord. 1. Ranunculaceae. 2. Papaveraceae. 3. Cruciferae. 4. Capparides. 5. Sapindi. 6. Acera. 7. Malpighiae. 8. Hyperica. 9. Guttiferae. 10. Aurantia. 11. Meliae. 12. Vites. 13. Gerania. 14. Malvaceae. 15. Magnoliae. 16. Annonae. 17. Menisperma. 18. Berberides. 19. Tiliaceae. 20. Cisti. 21. Rutaceae. 22. Caryophyllae.

Cl. 14. *Plantae dicotyledones polypetalae. Stamina perigyna.*

Ord. 1. Sempervivae. 2. Saxifragae. 3. Cacti. 4. Portulacae. 5. Ficoideae. 6. Onagrae. 7. Myrti. 8. Melastomae. 9. Salicariae. 10. Rosaceae. 11. Leguminosae. 12. Terebinthaceae. 13. Rhamni.

Cl. 15. *Plantae dicotyledones apetalae. Stamina idiogyna.*

Ord. 1. Euphorbiae. 2. Cucurbitaceae. 8. Urticae. 4. Amentaceae. 5. Coniferae.

Plantae incertae sedis.

Stamina oder corolla epigyna sind, wenn diese Theile auf dem Fruchtknoten stehen, hypogyna, wenn sie auf dem Blüthenboden stehen. Stamina perigyna, wenn sie auf dem Kelche oder der Blume stehen, corolla perigyna, wenn sie auf dem Kelche steht. Stamina idiogyna, wenn sie von den Staubwegen gesondert sind. Es lässt sich nicht läugnen, dass diese Stellung oft schwer zu erkennen ist, und künstlich gefasst wird. So ist es sehr unnatürlich, dass Atriplices und Amaranthi zu verschiedenen Klassen gehören.

Eine durch Iussieu selbst, Brown, Correa, Decandolle und andere verbesserte Bestimmung hat Decandolle gegeben:

I. Gewächse mit Gefäßen und Kotyledonen.

1. Exogeneen oder Dicotyledonen.

A. mit doppeltem Perigonium.

a. mit mehreren Blumenblättern.

α. mit Blumenblättern nicht auf dem Kelche stehend. Subcl. 1. Thalamiflorae.

1. Ranunculaceae. 2. Dilleniaceae Decand. 3. Chnaceae Petit Thouars. 4. Magnoliaceae. 5. Anaceae. 6. Malvaceae. 7. Sterculiaceae Venten. 8. Tiliaceae. 9. Elacocarpeae Iuss. 10. Marcgraviaceae Iuss. 11. Ochnaceae Decand. 12. Simarube Dec. 13. Rutaceae. 14. Caryophylleae; a) Diantinae. b) Alsineae. 15. Lineae Dec. 16. Cistinae Dec. 17. Violaceae Venten. (Calcaratae Batsch). 18. Passiflorae Iuss. 20. Hesperideae Correa. 21. Meliceae. 22. Gerania. 23. Sarmantaceae (Vites). 24. Guttiferae. 25. Hypericineae. 26. Hippocrateae Iuss. 27. Malpighiaceae. 28. Acerineae. 29. Sapindaceae. 30. Droseraceae Dec. (Ciliatae Batsch). 31. Resedaceae Dec. 32. Capparideae. 33. Cruciferae. 34. Papaveraceae. a) Fumariae. b) Papaveraceae. 35. Nymphaeaceae Salisb. 36. Menispermaceae. 37. Berberideae.

β. Die Blumenblätter stehen auf dem Kelche
Subcl. 2. Calyciflorae.

38. Frangulaceae (Rhamni). 39. Samydeae Venten. 40. Zanthoxyleae Dec. 41. Juglandae Dec. 42. Terebinthaceae. 43. Polygaleae Iuss. 44. Leguminosae. 45. Rosaceae. a) Drupaceae. b) Prockaeae c) Spiraeae. d) Dryadeae. e) Agrimoneae. f. Rosae. g. Pomaceae. 46. Salicariae. 47. Melastomeae. 48. Myrtineae. 49. Combretaceae Brown. 50. Loaseae Iuss. 51. Onagrariae. 52. Ficoideae. 53. Portulacaceae. 54. Nopaleae Iuss. 55. Grossulariae Dec. 56. Crassulaceae (Semperviva). 57. Saxifrageae. 58. Umbelliferae. 59. Araliaceae.

b. mit einblättriger Blume. Subcl. 3. Corolliflorae
α. mit Blume auf dem Kelche.

60. Caprifolia. 61. Loranthaceae Iuss. 62. Rubiaceae a) Guettardaceae. b) Cinchonaceae. c) Coffeaceae d) Stellatae. 63. Operculariae Iuss. 64. Valerianeae Dec. 65. Dipsaceae. 66. Compositae. a) Corymbiferae. b) Cinarocephalae. c) Labiatiflorae Dec. d) Lagasc. d) Cichoraceae. 67. Campanulaceae. 68. Lobeliaceae Iuss. 69. Cucurbitaceae. 70. Gesneriaceae Rich. et Iuss. 71. Vaccinia Dec. 72. Ericineae. a) Epacrideae Brown. b) Rhodoraceae. 73. Aquifolia ceae.

β. mit Blume nicht auf dem Kelche.

74. Myrsineae Brown. Ophiosperma Venten. Ardisiaceae Iuss. 75. Sapoteae. 76. Ebenaceae Dec. 77. Oleinae Brown. Fl. portug. 78. Iasmineae Brown

79. Pedaliaceae. 80. Strychnaceae Dec. 81. Apocynaceae. a) Rauvolfiaceae Luss. b) Apocynaceae Brown. c) Asclepiadeae Brown. 82. Gentianeae. 83. Bignoniaceae. 84. Polemoniaceae. 85. Convolvulaceae. 86. Boraginaceae. a) Boraginaceae. b) Scrophulariaceae. 87. Solanaceae. 88. Personatae Brown. a) Antirrhineae. b) Rhinanthaceae. 89. Labiatae. 90. Myoporineae Brown. 91. Pyrenaceae (Viticeae). 92. Acanthaceae. 93. Lentibulariae Rich. Brown. Utricularinae. Fl. portug. 94. Primulaceae (Lysimachiae). 95. Globulariae Dec.

B. mit einfachem Perigonium. Subcl. 4. Monochlamydeae.

96. Plumbaginaceae. 97. Plantagineae. 98. Nyctaginaceae. 99. Amaranthaceae. 100. Chenopodeae (Atriplices). 101. Polygoneae. 102. Laurineae. 103. Myristiceae Brown. 104. Proteaceae. 105. Thymeleae. 106. Santalaceae Brown. 107. Elaeagnaceae. 108. Aristolochiae. 109. Euphorbiaceae. 110. Monimineeae. 111. Urticeae. a) Urticeae. b) Piperitae. c) Artocarpeae. 112. Amentaceae. 113. Coniferae.

2. Endogeneen oder Monokotyledonen.

A. Phanerogamae.

114. Cycadeae Pers. Brown. 115. Hydrocharideae. 116. Alismaceae Dec. 117. Pandanae Brown. 118. Aroideae. 119. Orchideae. 120. Drymyrrhizeae (Cannae). 121. Musaceae. 122. Irideae. 123. Haemodoraceae Brown. 124. Amaryllideae Brown. 125. Hemerocallideae Brown. 126. Dioscoreae Brown. 127. Smilacae Brown. 128. Liliaceae. a) Asparagaceae. b) Trilliaceae. c) Asphodelaceae. d) Bromeliaceae. e) Tulipaceae. 129. Colchicaceae Dec. (Melanthaceae Brown.) 130. Commelineae Mirbel. Brown. 131. Palmae. 132. Iuncae. 133. Typhaceae. 134. Cyperoideae. 135. Gramineae.

B. Kryptogamen.

136. Equisetaceae Dec. 137. Marsileaceae Brown. Rhizosperma Dec. 138. Lycopodiaceae Dec. Brown. 139. Filicinae.

II. Gewächse mit Zellen ohne Gefässe und Kotyledonen.

A. Blätterartige.

140. Musci. 141. Hepaticae.

B. Blattlose.

142. Lichenes. 143. Hypoxyla Dec. 144. Fungi. 145. Algae.

Ausser diesen hat auch Batsch ein natürliche System geliefert. Eigenthümliche Ordnungen hat er: Arillatae, Celastrus, Evonymus; Pentacarpae, Dictamnus; Fimbriatae, Cactus, Mesembrianthemum; Caducae, Actaea, Thalictrum Hyacinthinæ, Asparagus, Aloe; Leucojaceae, Lencojum, Galanthus; Tubiferae, Narcissus, Pancrathum; Alliaceae, Allium, Asphodelus; Sempervirentes, Taxus, Juniperus. Einige dieser Ordnungen sind gut getrennt.

Oken theilt die Pflanzen in Wurzelpflanzen, Stengelpflanzen, Laubpflanzen, Blumenpflanzen und Fruchtpflanzen. Die Ordnungen sind in der ersten und zweiten Klasse nach den vier Elementen, in den drei letzten nach Wurzel, Stengel, Laub, Blume, Frucht gemacht, als: Wurzellaulinge, Wurzelblumlinge, Wurzelfruchtlinge. Der Entwurf ist gut, aber das System ist nicht ausgeführt. L.)

Dieses mag genug sein, den Anfängern eine kleine Uebersicht der wichtigsten Systeme zu geben; mit einem Blicke wird man finden, was noch zu thun übrig ist, und sich überzeugen, dass, bei der unzähligen und ins Unendliche abweichenden Bildung der Gewächse, der menschliche Scharfsinn nie ein ganz vollkommenes System aufstellen wird.

III. Grundsätze der Botanik.

154. **D**ie richtige Kenntniss der Gewächse hängt von der Art, sie zu ordnen, zu unterscheiden und zu benennen, ab. Dieses alles beruht auf einmal festgesetzten Regeln, die aus der Natur selbst genommen sind. Die Art zu ordnen heisst die Systemkunde; davon ist im vorigen Abschnitt gehandelt worden. Wie man aber die Gewächse unterscheiden lernt, diess muss noch genauer auseinander gesetzt werden. Vorzüglich gehört dazu, dass man eine genaue Kenntniss der Terminologie hat, sie gehörig anzubringen weiss, und die Regeln, welche aus dem Bau der Gewächse sich ziehen lassen, anwendet. Man kann sich diese Kenntniss durch die genaue Untersuchung der Blume und durch ein öfteres Anschauen der Pflanze, indem man sie ganz betrachtet, erwerben. Das erstere nennt man eine *Methode* (*Methodus*), das letztere die *äussere Gestalt* (*Habitus*). Die Methode oder die Kenntniss der Gewächse nach der Blume und ihrem innern Bau ist eigentlich die Sache eines Botanikers; die Kenntniss der äussern Gestalt aber ist nur Hülfsmittel, sich die Methode zu

erleichtern, denn nie darf ein Botaniker sich bloss sie verlassen.

(Es ist einseitig, nur auf die Blüthe zu sehen, der wahre Pflanzenkenner verachtet die übrigen Theile nicht. Dass jene sicherer sein sollte, diese, ist nicht ausgemacht. Die Blüthe ist änderlich genug, wie die gefüllten Blumen zeugen. Wenn die Anwendung der Blätter zum System bisher nicht gelungen ist, so kann dieses an schlechter Anwendung oder am Vorurtheil liegen. L.)

155. Die Blume allein und die darauf folgende Frucht ist der sicherste Theil des Gewächses, wo man die Kennzeichen wählen muss, und worauf ein System gründen darf. Es hat Botaniker gegeben, welche die Blätter dazu haben anwenden wollen, allein die Erfahrung hat gezeigt, wie trügerlich deren Systeme sind. So wie nun die Blume Mittel zur Errichtung eines Systems giebt, so giebt sie auch Kennzeichen, die Gattungen zu errichten. Die Arten aber müssen nach andern Merkmalen (§. 192 —) unterschieden werden.

156. Die erste Regel, welche aus dem vorhergehenden fließt, ist, dass die Kennzeichen der Klassen nicht mit denen der Ordnungen, und die der Ordnungen nicht mit denen der Gattungen einerlei sein sollen; dass aber die Gattungen, welche unter einer Ordnung und Klasse stehen, ohne Ausnahme auch Kennzeichen derselben haben müssen, z. B. *Solarium tuberosum*. Diese Pflanze steht bei Linné in der fünften Klasse, und in der ersten Ordnung; das Kennzeichen der fünften Klasse sind fünf Staubfäden der ersten Ordnung, ein Stempel. Die Gattung *Solarium* hat folgende Kennzeichen: einen fünfteiligen

Kelch, radförmige Blumenkrone und eine zwelfächrige vollkommene Beere. Wollte man also den Unterschied der Gattung in fünf Staubgefäßen und einem Stempel setzen, so würde man wider diese Regel handeln. Aus eben diesem Grunde müssen aber fünf Staubfäden und ein Stempel, sowohl der Gattung *Solanum*, als allen unter dieser Klasse und Ordnung stehenden Gewächsen zukommen.

Es finden zwar einige Ausnahmen statt, dass z. B. ein Staubfaden oder Stempel mehr vorkommt, aber diese Ausnahmen werden in der Folge genauer (§. 168.) angegeben.

157. Gattung (Genus), nennen wir eine Menge von Pflanzen, die in der Blume und Frucht übereinstimmen (§. 133.). Um die Gattungen zu unterscheiden, macht man von der Blume und Frucht eine Beschreibung, und dergleichen Beschreibung heisst der **Charakter (Character)**. Dieser ist dreierlei: *natürlich* (*naturalis*), *künstlich* (*factitius*) und *wesentlich* (*essentialis*).

Der natürliche Charakter (*Character naturalis*), ist eine weitläufige, nach der Terminologie abgefasste Beschreibung der Blume und Frucht einer Pflanze, die für alle übrige aus der Gattung gewählt wird. Dergleichen Beschreibung, wenn sie einmal entworfen ist, dient zur immerwährenden Stütze des Ganzen.

Der wesentliche Charakter (*Character essentialis*), ist eine sehr kurze Beschreibung der ganzen Gattung, die das Unterscheidende derselben von allen übrigen enthält.

Ein künstlicher Charakter (*Character factitius*), ist ein wesentlicher Charakter, wo man aber

die Zahl der Theile oder andere unbedeutende Dinge mit dazu genommen hat.

Der wesentliche Charakter ist beim schnellern Aufsuchen der Pflanzen sehr brauchbar, und wenn er gut gemacht ist, so erleichtert er sehr die Kenntniss der Gewächse. Der künstliche Charakter ist nur dann anzurathen, wenn Gattungen zu gross sind, und man sie deshalb in mehrere theilt; wenn es aber möglich ist, so muss man dergleichen zu vermeiden suchen.

Der wesentliche und künstliche Charakter muss im natürlichen liegen; ist dies nicht der Fall, so taugt einer von beiden nicht.

(Linné gebrauchte zuerst in seinen *Genera plantarum* den natürlichen Charakter, und nur die Herausgeber dieser Schrift haben ihn beibehalten; sonst wählt man dem wesentlichen Charakter. Nicht für den Anfänger war jener bestimmt, sondern nur für den Botaniker, der die Näherung versteht und das Wesentliche von dem Nichtwesentlichen unterscheiden kann. Dass man den natürlichen Charakter mit dem wesentlichen vermenget, ist schädlich gewesen. Linné sagt *Phil. bot.* §. 189: *Corrigitur novis detectis speciebus tantummodo, exclusione scilicet notarum superfluarum.* Dieses haben die späteren Herausgeber vergessen.

Ein künstlicher Charakter, wie der Verf. ihn schildert, ist so gut als ein wesentlicher, wenn die Kennzeichen beständig und unterscheidend sind; im entgegengesetzten gar kein Charakter. Linné sagt: *Factitius character genus ab aliis generibus ejusdem tantum ordinis artificialis distinguit*, und das ist der wahre Begriff. In einem *clavis generum* wendet man solche Charaktere an, unter dem Namen *analysis generum*. L.)

Solanum tuberosum, welches §. 156. als Beispiel der ersten Regel für Gattungen diente, kann auch hier den Unterschied der drei Charaktere, welche entworfen werden können, erläutern.

S O L A N U M.

Calyx Perianthium monophyllum, quinquefi-
 -lium, erectum, acutum, persistens.

Corolla monopetala rotata. **Tubus** brevissi-
 -mus. **Limbus** magnus quinquefidus, reflexo-pla-
 -ticatus.

Stamina Filamenta quinque, subulata minima.
 -therae oblongae, conniventes, subcoalitae, apice
 -is duobus dehiscentes.

Pistillum Germen subrotundum. **Stylus** fi-
 -liformis staminibus longior. **Stigma** obtusum.

Pericarpium Bacca subrotunda, glabra, apice
 -mucato-notata, bilocularis. **Receptaculum** utrinque
 -mucoso carnosum.

Semina plurima subrotunda, nidulantia.

Vergleichen weitläufige in der Kunstsprache ge-
 -gebene Beschreibung, heisst ein natürlicher Charakter,
 -der wird nach einer Pflanze entworfen; die etwani-
 -gen Abweichungen einiger Arten pflegt man noch be-
 -sonders anzuzeigen. Wenn man nun diesen natürli-
 -chen Charakter des Solani mit den andern Gattun-
 -gen, welche in derselben Klasse und Ordnung stehn,
 -sonders mit einigen verwandten, als: Capsicum,
 -Physalis u. m. vergleicht, so zeigt sich das Unter-
 -scheidende, z. B.

S O L A N U M.

Corolla rotata. **Antherae** subcoalitae, apice poro
 -remino dehiscentes. **Bacca** bilocularis.

Dieser wesentliche Charakter wird die Gattung
 -solanum sehr leicht unterscheiden. Gesetzt aber, es
 -finde sich eine Pflanze, die zwar ganz den Charakter
 -hat, aber darin abweiche, dass die Beere vierfährig
 -wäre; wenn man solche als eine besondere Gattung

unterscheiden wollte, so würde der Charakter l
lich sein, weil die Pflanze eigentlich doch zum
no, wie in der Folge (§. 168. 169.) gezeigt wird
hören müsste.

158. Die Natur verbindet, wie gesagt (§. jedes einzelne Gewächs mit allen andern durch wisse Aehnlichkeiten. Diese Aehnlichkeiten sind nun, worauf sich die Gattungen gründen. Es sieht aber auch leicht einsehn, dass sie eben die nicht wirklich in der Natur sind, und nur als Mittel der Kenntniss dienen (? L.). Gattungen setzen sich nur auf Blume und Frucht gründen. Aehnlichkeiten aber, welche wir unter den Gewächsen bemerken, sind nicht bloss an diesen, sondern an allen übrigen Theilen derselben zu finden.

159. Gattungen sind für die Wissenschaft nöthig; und um die Kenntniss derselben zu erlangen, muss man den ganzen Bau der Blume und Frucht genau kennen. Der Bau derselben ist entweder *natürlich* (Structura naturalissima), *abweichend* (differens), oder endlich *besonder* (singularis).

160. Der Bau (Structura) wird wieder in der *Zahl* (Numerus), nach der *Gestalt* (Figura) der *Lage* (Situs) und dem *Verhältnisse* (Proportio) betrachtet, und bei diesen sieht man darauf, ob sie natürlich, abweichend oder besonders sind. Ueberhaupt muss bei Gattungen immer auf Zahl, Gestalt, Lage und Verhältniss gesehen werden, weil diese keine gehörig bestimmt werden kann. Hi

stellen alle Gattungen und die meisten Regeln, die sich in der Folge angezeigt werden.

161. Der natürliche Bau (*Structura naturalissima*) ist diejenige Bildung der Frucht und Blume, welche am häufigsten vorkommt. Beim wesentlichen Charakter zeigt man sie nicht an; denn sie ist nur zum Maasstabe aller andern Bildungen. Der natürliche Bau der Blume ist folgender:

Der Kelch ist grün, kürzer als die Blumenkrone, die Blumenkrone zart, fällt sehr leicht ab, und ist vom Kelche eingeschlossen. Die Staubgefässe sind innerhalb der Blumenkrone, die Staubbeutel stehen gerade auf den Staubfäden, der Griffel nimmt die Mitte der Blume ein.

Nach der Zahl ist der Kelch und die Blumenkrone gewöhnlich fünfmal eingeschnitten, der Staubgefässe fünf und ein Griffel. Die Einschnitte oder Blätter des Kelchs und der Blumenkrone sind gewöhnlich mit den Staubgefässen von gleicher Zahl.

(Dieses alles ist wesentlich. L.)

Die Frucht pflegt sich immer nach dem Griffel zu richten: ist ein Stempel, so ist sie einfächrig, sind mehrere, so sind auch mehrere Fächer in der Frucht. (Ist ebenfalls nicht auszulassen, sondern wesentlich. L.)

Die Gestalt des Kelchs ist gewöhnlich mit aufrecht stehenden Einschnitten oder Blättern; die Blume zeigt sich mehr oder weniger trichterförmig; (ist wesentlich; L.) die Staubfäden zugespitzt; der Stempel ist einem schmalen und zugespitzten, mit einfacher oder verdoppeltem Griffel. (Ist wesentlich. L.)

Das Verhältniss ist: der Kelch zeigt sich um den dritten Theil kleiner als die Blumenkrone; die Staub-

fäden und Griffel sind klein.
(Gleichfalls wesentlich und ni-
tur auszulassen. L.) Die L-
schliesst die Blumenkron-
wechseln mit den F-
Kelchs ab. Die Sta-
oder Blättern de-
steht auf der St-
sind am Fruchtboden.

Noch gehört zum nat-
blättrige Blumenkrone auch ei-
und eine mehrblättrige Blumenkro-
trigen Kelch hat. (Doch stets zu b
menkrone und Kelch sind am Fru-
Bei mehrblättrigen Blumenkronen,
fasse auf dem Fruchtboden, bei ei-
Blumenkrone selbst. (Der Stand i
gen. L.)

Dieser natürliche Bau muss nie
gen mit eingemischt werden. So
spiel in dem natürlichen Charakter
sehr überflüssig sein, wenn Calyx
ridis, foliaceus, Corolla tenera, Anti-
farctae, Germen post florescentiam
dergleichen gesagt wäre, da dies
Blume zukommen, mithin zum nati-
ren; nur dasjenige, was vom na-
weicht, muss in solchen Beschre-
werden.

162. Unsere botanischen Kenn-
eingeschränkt sein, wenn die Natu-
Bau immer treu geblieben wäre, u-
Blumen nach einer Form geschaffe

er gerade das Gegentheil, und sind dadurch in uns mehrere ausgebreitete Kenntnisse im vesehen Reiche zu erwerben. Die ganze Terteie kann hier zum Beweise dienen; sie zeichs das Abweichende der Gewächse auf, und bweichungen, wenn wir sie bloss an der Blufrucht betrachten, geben uns den *abweichenm* (*Structura differens*) der Gewächse. Die Grundlage aller Gattungen; durch ihn, vermit dem natürlichen, bestehen nur Gattungen e Charaktere.

3. *Der besondere Bau* (*Structura singu-* ist derjenige, welcher ganz dem natürlichen ungesetzt ist, dieser giebt die schönsten Characstehn zum Beispiel bei einer einblättrigen Blume die Staubfäden auf dem Fruchtboden, da h dem natürlichen Bau nach auf der Blumenbefestigt sein sollten; oder umgiebt eine Art niggefässes die Blumenkrone, da es der Regel on der Blumenkrone eingeschlossen wird; so es ein besonderer Bau.

nige noch auffallendere Beispiele sind auf der Kupfertafel vorgestellt worden, die hier noch her aneinander zu setzen sind:

e Gattung *Cucullaria* Fig. 112. 113. zeichnet urch eine orchisartige Blume, (? L.) die auf eimenblatte die Staubbeutel befestigt hat, aus.

e Gattung *Rupala* Fig. 115. hat die Staubfäden r Spitze der Kelchblätter stehn.

e Gattung *Lacis* Fig. 116. hat keinen Kelch amenkrone, sondern eine sehr einfache, aus Staubgefässen und einem Griffel bestehende

Dimorpha Fig. 126. zeichnet sich durch ein einziges an den Seiten zusammengerolltes Blumenblatt aus.

Dorstenia Fig. 123. hat einen allgemeinen Fruchtboden, der mit Blumen männlichen Fig. 124 und weiblichen Fig. 125. Geschlechts dicht besetzt ist, die einen sonderbaren Kelch haben.

Sterculia Fig. 144. hat einen lang gestielten Fruchtknoten, der mit verwachsenen Staubfäden besetzt ist.

Eben so zeichnen sich die Blumen der *Periploca*, *Asclepias* und *Stapelia* aus; Fig. 83. 88. 89. 90. 91. 92. 98. 99. 100. Diese sind mit besonders gestalteten zu den Honiggefäßen gehörenden Theilen versehen, die bereits (§. 95.) angezeigt sind, und welche die Staubgefäße mit dem Griffel ganz bedecken. Die Staubgefäße sind sonderbar geformt, die Staubfäden sitzen in der Gestalt einer Gabel auf einem knorpelartigen Körper, und tragen an jeder Spitze ein Fach des Staubbeutels. (S. oben §. 95.)

Durch eine besondere Art des Nebenblatts (§. 55.) zeichnen sich zwei Gattungen aus, nemlich: *Ascia* Fig. 117. Diese Gattung hat ein gestieltes schlauchförmiges Nebenblatt (*Bractea ascidiformis stipitata*), das dicht hinter der Blume fest sitzt. *Ruyschia* Fig. 119 — 122. hat ein sitzendes schlauchförmiges Nebenblatt (*Bractea ascidiformis sessilis*), das mit zwei Lappen (*biloba*) an der Basis versehen ist, welche die Blume von hinten umgeben.

Dies wenige wird deutlich genug beweisen, dass die angeführten Blumen einen besondern, ganz dem gewöhnlichen entgegengesetzten Bau haben. Mehrere Beispiele lernt man durch fleissiges Zergliedern der

man konnte, was man überhaupt dem Anfänger mit dringend genug empfehlen kann.

164. Aus diesen verschiedenen Arten des Baues der Blume lässt sich folgender Erfahrungssatz herleiten: dass die Gattungen leichter zu unterscheiden sind, die einer besondern oder auch nur abweichenden Bauart haben, dass hingegen diejenigen, welche dem gewöhnlichen Bau am nächsten kommen, schon mit grösseren Schwierigkeiten bestimmt werden können. Der natürliche Bau der Blume und Frucht erstreckt sich auch auf alle besondere Familien des Gewächsbau, von welchen jede ihren natürlichen Bau, das ist, der gewöhnlich bei ihnen angetroffen wird, hat. Die Doldengewächse, Lilien, Schmetterlingsabtheilungen, kreuzförmige und zusammengesetzte Blumen sind deshalb, weil sie in ihrem Bau so viel Aehnlichkeit haben, am schwierigsten zu unterscheiden. Um die Gattungen leichter zu bestimmen, sind Regeln festgesetzt worden, welche dieselben unterscheiden lehren, und die man bei neu entdeckten Pflanzen anwenden muss. Es giebt Regeln, die im Allgemeinen für alle Gewächse gelten, und wieder andere, die nur bei Familien anzuwenden sind. Es können aber auch die Gattungen nach dem Bau der Blume und Frucht, nicht aber nach der Gestalt der Wurzel, Blätter, des Blüthenstandes oder andern Theilen unterschieden werden.

165. Die Blume und deren Theile sind bereits in der Terminologie bestimmt; dass aber nicht immer dieselbe mit allen Theilen versehen ist, welche man bei den meisten antrifft, ist auch schon (§. 78.) gesagt worden. Es kommen aber Fälle vor, wo die Blume

nur von einem Theile umkleidet ist, von dem nicht sogleich sagen kann, ob er Kelch oder Blkronen heissen müsse? Es wird daher nöthig hierüber eine Regel zu bestimmen, welche in solchen Fällen anzuwenden ist, damit man die Festsetzung der Gattung nicht irre.

Nach Hedywigs Meinung sollte Kelch und Blumenkrone nicht unterschieden werden, sondern Theile einen Namen haben. Nach ihm wird Kelch *Perigonium externum* und die Blumenkrone *perigonium internum* heissen, und wäre ein dritter Kelch vorhanden, so würde der innere *Perigonium terminatum* genannt werden. In zweifelhaften Fällen wäre dieser Vorschlag sehr gut, nur aber bei Gegenwart beider Theile würde man von deren Namen nicht den richtigsten Begriff erhalten.

Scopoli will, um Verwirrung zu vermeiden, wenn ein Theil nur angetroffen wird, dass man Kelch nennen soll. Dagegen streitet aber alle Erfahrung, da die Lilien nur einen Theil haben, der zart ist und den jeder, der auch nur wenig Pflanzen untersucht hat, sogleich für eine Blumenkrone halten muss.

Linné giebt folgende Regel für diesen Fall: Wenn nur ein Theil vorhanden und stehen die Staubfäden den Blättern oder Einschnitten desselben gegenüber, so heisst er Kelch; wechseln sie aber mit dem Kelch ab, so ist es eine Blumenkrone. Bei einer Pflanze die wenige Staubfäden, und höchstens so viele Einschnitte oder Blätter im vorhandenen Theile hat, ist diese Regel, da sie sich auf den natürlichen Blütenbau gründet, sehr zweckmässig, wenn die Zahl der Staubfäden doppelt so gross oder

sehnlicher ist, dann kann bei der Gegenwart eines heiles diese Regel nicht gelten. In solchen Fällen nennt man den Theil Kelch, der kürzer als die Staubfäden, grün und von fester Substanz ist. Blumenrone würde er dann heissen, wenn er länger als die Staubfäden, gefärbt und von zarter Substanz ist, auch nicht bis zur Reife der Frucht bleibt. Nebenher muss man in zweifelhaften Fällen noch ähnliche Gattungen damit vergleichen, und es wird sich selten zutragen, dass man über die Benennung des vorhandenen Theils gewiss bleiben sollte.

(Linné's Bestimmung ist in der Natur gegründet, weil alle nahegelegene Kreise von Theilen in der Pflanze wechseln, aber nicht immer leicht anzuwenden; doch wenn die Zahl der Staubfäden doppelt oder dreifach ist, unterscheidet man nach dem äussern und innern Kreise. Jussieu sah auf die Fortsetzung der Oberhaut des Blüthentheils in die Oberhaut des Stiels. Wenn eine solche vorhanden ist, heisst der Theil Kelch, wenn sie nicht vorhanden ist, Blume. Aber dieser Umstand ist bei verwandten Pflanzen, z. B. unter den Liliaceen, verschieden. Sprengel unterschied den Kelch durch die Menge der Spaltöffnungen, und allerdings ist dieses Kennzeichen mit den übrigen zu verbinden. L.)

166. Bei Bestimmung neuer Gattungen ist es nöthig: dass der wesentliche Charakter allen zu der Gattung gehörigen Arten zukomme, und keiner Abänderung unterworfen sei.

So wie die Frucht und die Blume der einen Art ist, muss auch die der übrigen sein. Es darf z. B. nicht die eine Art eine Beere, und die andere eine Steinfrucht haben, wie Linné es mit der Gattung *Rhamnus* gemacht hat, die eigentlich zwei besondere, nemlich *Rhamnus* und *Zizyphus*, ausmacht.

(Dieses Gesetz, das erste von allen, wird am we-

nigsten gehalten. Die Erläuterung des Verf. sagt eigentlich ganz etwas Anderes, nämlich: dass man Gattungen trennen müsse, welche verschiedene Früchte haben. L.)

167. *Der Charakter einer Gattung muss nach der Zahl, Gestalt, Lage und Verhältniss (§. 154.) der Blume und Frucht gemacht werden.*

Nur die Zahl, Gestalt, Lage und Verhältniss können, zusammen genommen, eine Gattung bestimmen, aber nicht eine von diesen besonders. (Warum nicht? L.) Es giebt oft Arten, welche in diesem oder jenem Stücke von dem Gattungscharakter abweichen, deshalb dürfen sie doch nicht als besondere Gattungen betrachtet werden. (Warum nicht? L.)

168. *Die Zahl allein kann niemals Gattungen bestimmen, und muss nie als etwas wichtiges angesehen werden.*

Nichts ist veränderlicher, als die Zahl der Staubfäden. Diese pflegen bei einer Gattung öfters sehr verschieden zu sein. Einige Pflanzen haben doppelt oder nur halb so viel Staubfäden, als sie haben sollen, z. B. soll ein Gewächs fünf Staubfäden haben und hat zehn; oder umgekehrt, es soll zehn haben und hat nur fünf. Es pflegen zwei in vier, drei in sechs, vier in acht, fünf in zehn, sechs in zwölf abzuändern, so dass sich die Zahl nach diesen Graden vermehrt oder vermindert. Auch kann in einem sehr fetten Boden die Zahl der Staubfäden sich um einige vergrössern, so wie sie sich in mageren um einen oder ein Paar vermindern kann. Wenn also der übrige Bau mit einer andern Gattung vollkommen übereinstimmt, und nur die Zahl eines Theils der Blume abweicht, sei es

Kelch, Blumenkrone, Staubgefäß oder Stempel, so ist es unrecht, deshalb eine Gattung zu machen.

Diese und einige folgende Regeln sind die einzigen Ausnahmen der §. 156. angeführten Regel.

169. *Wenn die Zahl in allen Theilen der Blume beständig ist, dann kann sie als ein Unterscheidungszeichen einer Gattung, doch aber nur mit Vorsicht gebraucht werden.*

Diese Regel kann nur mit vieler Vorsicht angewandt werden. Wenn es nur irgend möglich ist, so muss man nicht auf die Zahl sehn. Linné hat ein Beispiel dieser Regel an den Gattungen *Potentilla* und *Tormentilla* gegeben. Die Zahl unterscheidet diese beiden künstlichen Gattungen, die erste hat einen (fünftheiligen L.) doppelten fünfblättrigen Kelch und eine fünfblättrige Blumenkrone, die zweite einen (vierblättrigen L.) doppelten vierblättrigen Kelch und vier Blumenblätter. Der Kelch und die Blumenkrone bleiben zwar in ihrer Zahl beständig an beiden Gattungen, aber Nachahmung verdient doch dieses Beispiel gewiss nicht.

(Allerdings gehört die Zahl zu den veränderlichen Kennzeichen und kann daher für sich nicht zur Unterscheidung der Gattungen dienen. Will man *Tormentilla* behalten, so kann es nur als Unterart geschehen, und man müsste *Potentilla Tormentilla erecta* sagen, oder kurz *T. e. L.*)

170. *Der einblättrige und vielblättrige Kelch können wohl Gattungen bestimmen, aber nicht die Zahl der Einschnitte und Blätter. Eben dies gilt auch von der Blumenkrone.*

Es giebt nur einige Familien, bei denen der Kelch von Wichtigkeit ist, gewöhnlich wird auf die Zahl der Einschnitte oder Blätter desselben nicht geachtet.

Wenn zwei Pflanzen sich ähnlich sind, die eine aber einen einblättrigen, die andere einen aus mehrere Blättern bestehenden Kelch hat, so müssen sie als bestimmte Gattungen angesehen werden. Der Grund davon ist, dass niemals ein vielblättriger Kelch in einen einblättrigen übergeht, wohl aber die Zahl der Blätter des vielblättrigen Kelches, oder die Zahl der Einschnitte am einblättrigen, einer Veränderung unterworfen sein können. Eben so ist es auch mit der Blumenkrone.

171. Die Zahl der Staubfäden muss nach der Mehrheit der Blumen bestimmt werden, ist aber die erste sich entwickelnde Blume in der Zahl der Staubfäden von den andern verschieden, so richtet man sich nach dieser.

Sehr oft sind an einer Pflanze die Blumen nicht in der Zahl der Staubfäden übereinstimmend, und dann muss man sich nach der grössern Zahl richten, aber auch zugleich mehrere Arten damit vergleichen. Bisweilen zeigt sich zwar eine Verschiedenheit in der Zahl der Staubfäden, aber so, dass die erste Blume mehrere als die übrigen hat. In diesem Fall muss man natürlich nach der ersten Blume rechnen, weil diese sich am vollkommensten hat entwickeln können: auch zeigt die Aehnlichkeit mit andern Pflanzen, wie viel Staubfäden man eigentlich annehmen muss. Beispiele davon geben: *Ruta*, *Monotropa* und *Chrysosplenium*.

172. Man muss nicht zu viel Gattungen machen.

Diese Regel ist eine der wichtigsten. Viele Gattungen sind ein offener Schaden für die Wissenschaft. Ueberhaupt müssen die Unterschiede zwischen

Gattungen nicht zu sehr gesucht sein. Es ist die erste Pflicht eines Botanikers, die Wissenschaft so leicht als möglich zu machen, aber durch zu feine und gesuchte Unterschiede der Gattungen, wird er derselben mehr Schaden als Nutzen bringen.

Wenn man jede geringe Abweichung in der Bildung der zur Blume und Frucht gehörigen Theile als hinreichend ansehen will, eine neue Gattung aufstellen, so würde die Zahl derselben zum Schaden der Wissenschaft zu stark vermehrt werden. In diesem Fehler kann derjenige sehr leicht fallen, der nur wenige Gewächse gesehen hat. Sieht er aber mehr, so wird es ihm nicht an Gewächsen fehlen, die das Mittel zwischen den gegebenen Charakteren halten; so dass er gezwungen ist, das wieder zu vereinigen, was er anfangs trennte. Linné hat selbst zuweilen zu fein unterschieden; so ist der Unterschied zwischen *Prunus* und *Amygdalus* nicht gut, beide müssten, wenn streng nach der gegebenen Regel gehandelt werden sollte, vereinigt werden.

(Ob es zur Erleichterung der Wissenschaft diene, viele kleine Gattungen in eine grosse zu verwandeln, ist die Frage. Eine Trennung der grossen Gattungen in mehrere hat sehr erleichtert. L.)

173. *Auch auf die äussere Gestalt (Habitus) aller zu einer Gattung gehörigen Arten muss man achten, aber nie darauf bauen.*

Mit vielen Einschränkungen ist nur diese Regel anzuwenden, um nicht durch strenge Ausübung derselben der Wissenschaft nachtheilig zu sein. Bei neuen Gattungen muss man darauf sehn, ob die äussere Gestalt nicht mit einer andern übereinkomme; denn oft lehrt diese, dass die für eine andere Gattung gehaltene Pflanze zu einer schon bekannten gehört,

und nur etwas in der Zahl der Theile oder Gestalt der Blume abweicht. Wer aber auf die äussere Gestalt der Pflanze bauen will, wird gewiss mit Bestimmung der Gattungen nicht weit reichen.

Wenn eine Pflanze in der Blume und Frucht mit einer schon bekannten Gattung zusammenstimmt, aber ein ganz fremdes äusseres Ansehn hat, so muss die Pflanze nicht von der Gattung getrennt werden. Ein Beispiel mag dies erläutern. Ich nehme an, man entdeckte eine Pflanze, die nach der Blume und Frucht vollkommen eine Linde wäre, aber einen krautarfigen Stengel und gefiederte Blätter hätte. So sehr nun auch dieses äussere Ansehn von den übrigen Arten der Linde verschieden wäre, so muss man doch die Pflanze unter der Linde stehen lassen. Dieser Fall ist zwar nicht wirklich in der Natur vorhanden, aber ähnliche findet man häufig. Zur Bestätigung der obigen Regeln will ich aus eben der Gattung ein wirklich vorhandenes Beispiel anführen. In Nord-Amerika wächst ein Baum, dessen Frucht mit der unserer Linde übereinstimmt, in der Blume aber zeigen sich ausser den Blumenblättern noch andere kleine blumenblattartige Schuppen; da aber das äussere Ansehn vollkommen mit unserer Linde übereinstimmt, und nur ein so kleiner Unterschied in der Blume sich zeigt, muss die Pflanze zur Gattung *Tilia* gebracht werden. Bei der Esche haben wir Arten ohne Blumenblätter und Kelch, andere, die nur einen Kelch, und wieder andere die beides, Blumenkrone und Kelch, haben. Da aber alle übrige Merkmale zutreffen, so vereinigt man sie insgesamt unter der Gattung Esche.

(Die hier vorgetragenen Lehren sind unbestimmt und zweifelhaft. Ueberhaupt ist die Frage, ob

ein Kennzeichen Gattungen unterscheiden, oder ob viel solcher Kennzeichen erfordert werden, nicht ausgemacht. L.)

174. *Die Regelmässigkeit der Blume ist kein sicheres Kennzeichen für Gattungen.*

Nicht immer ist die gegenseitige Länge der Blumenblätter oder deren Einschnitte beständig; wer also darauf allein eine Gattung gründen will, thut unrecht. Es können auch noch Pflanzen entdeckt werden, die sich von andern nur durch die Unregelmässigkeit der Blume unterscheiden, wie schwankend würde die Kenntniss der Gewächse werden, wenn man wegen eines so kleinen Umstandes gleich die Zahl der Gattungen vermehren wollte.

(Auch dieses Gesetz ist sehr unbestimmt und nicht unbedingt anzunehmen. Unregelmässigkeit und Regelmässigkeit sind nicht veränderliche Kennzeichen, aber oft scheint eine Blume regelmässig, und ist es wirklich nicht, dann kann das Mehr oder Weniger die Gattung nicht trennen. L.)

175. *Die Gestalt der Blume ist der der Frucht allezeit vorzuziehen.*

Man trifft mehr Gattungen, deren Arten in der Gestalt der Blume übereinstimmen, als in der Frucht. Die ältern Kräuterkenner verliessen sich zu sehr auf die Figur der Frucht, die doch, wenn sie nicht anders als in der äussern Form abweicht, nichts bestimmt. Bei der Gattung Pinus haben wir das deutlichste Beispiel. Aus dieser hatte man ehemals, weil die Frucht bald rundlich, bald länger, spitziger oder stumpfer u. s. w. ist, mehrere Gattungen gemacht. Auch die Anzahl der Fächer in der Frucht hat sonst Botaniker irre geführt; sie allein kann aber nichts ent-

scheiden, weil die Zahl (§. 168.) niemals Gattungen bestimmen kann.

(Die angeführten Beispiele waren von geringen Unterschieden der Frucht, und daher ist dieser §. mit den folgenden zu vereinigen. L.)

176. *Geringe Abweichungen in der Gestalt der Blume gelten nicht bei Bestimmung der Gattungen.*

Die Gestalt der Blumenkrone ist sehr mannigfaltig, wie wir aus der Terminologie wissen, aber es giebt auch viele Arten derselben, die sich sehr ähnlich sind. Diese grosse Aehnlichkeit zeigt nun offenbar, dass der Uebergang der einen Art zur andern gering ist, und dass sich die Natur nicht nach unsern Bestimmungen richtet. Eine trichterförmige Blumenkrone kann leicht in eine präsentellerförmige übergehn, und umgekehrt; wenn Gattungen nur um solcher Kleinigkeiten willen getrennt werden sollten, so würde man eine allzu grosse Menge bekommen. Bei der Gattung *Convallaria* hat *Convallaria Polygonatum* eine röhrenförmige, *Convallaria majalis* eine glockenförmige Blumenkrone. (Hier scheint der Unterschied nicht gering. L.) Hieraus sieht man, dass geringe Abweichungen verwandter Arten der Blumenkrone nicht in Betracht kommen. Wenn aber Pflanzen mit einblättrigen und mehrblättrigen Blumenkronen verwandt sind, so müssen sie getrennt werden. Die Gestalt der Blumenkrone muss sehr abweichen, wenn Pflanzen deshalb sollen besondere Gattungen ausmachen.

177. *Wenn die Frucht bei verwandten Pflanzen in ihrem innern Bau sehr grosse Verschiedenheit zeigt, so müssen dieselben als Gattungen getrennt werden.*

Es können Pflanzen vollkommen in ihrer Blume übereinstimmen, aber eine ganz verschiedene Frucht haben; beruht die Verschiedenheit der Frucht nicht auf der Zahl der Fächer oder der Samen, oder auch auf der Gestalt derselben allein, so müssen die Pflanzen getrennt werden. Dies beweiset das schon angeführte Beispiel der Gattung *Rhamnus*, unter welchem Namen Linné aus Versehen zwei Gattungen vereinigt hat, nemlich die eine mit einer Beere, die andere mit einer Steinfrucht. Eben so ist die Gattung *Abroma* und *Theobroma* nur durch die Frucht verschieden. Vergleichende Unterschiede sind sehr schön und müssen nicht übersehen werden.

178. *Das Honiggefäß giebt die besten Gattungskennzeichen.*

Wenn ein Honiggefäß von besonderer Gestalt die Blume von der andern unterscheidet, so giebt dies die besten Kennzeichen. Es ist aber wohl zu merken, dass das Honiggefäß eine auffallende Bildung haben muss. So ist es z. B. unrichtig, die *Arenaria reploides* als eine besondere Gattung anzusehn, weil in der Blume Drüsen sind, oder die amerikanische Linde von der europäischen als Gattung zu unterscheiden, weil kleine Schuppen in der Blume bemerkt werden. Wenn aber, wie bei andern Pflanzen, cylinderartige oder fadenförmige Honiggefäße sind, so dürfen diese besondere Bildungen nicht übersehen werden. Die Regel ist nicht schwer zu beobachten, weil nur sehr wenige Ausnahmen sich finden.

(S. die Bemerkung zu §. 175. L.)

179. *Die Figur des Griffels und der Staubfüden*

kann keinen Gattungscharakter geben, sie müsst sehr sonderbar sein.

Es findet sich häufig, dass die Figur des (und der Staubfäden bei Arten einer Gattung verschieden ist, dass der Griffel mit den Staubfäden abgebogen ist, oder eine etwas abweichende Gestalt aber darauf kann man nicht immer achten. Zeigt aber in einer Gattung ein sehr ästiger Griffel, *Cordia*, oder getheilte Staubfäden, oder sonst wesentliche Verschiedenheit, so verdient sie besondere Aufmerksamkeit.

Wenn aber der Fruchtknoten innerhalb der Länge gestielt ist, wie bei den Gattungen: *Euph. Passiflora*, *Helicteres*, *Sterculia* u. s. w., so ist ein gutes nicht zu übersehendes Kennzeichen, auffallend Gattungen unterscheidet. *Linné* liess durch diesen Stiel, der nichts als Verlängerung Fruchtbodens ist, verleiten, denselben für einen ten Griffel unterhalb dem Fruchtknoten anzunehmen daher brachte er verschiedene Gattungen, die dicken Fruchtknoten hatten, zu seiner Klasse *Gymn.* (§. 152.)

180. *Die Lage des Fruchtknotens macht Hauptkennzeichen der Gattungen aus.*

Pflanzen mögen auch noch so übereinstimmend gebaut sein, und der Fruchtknoten befindet sich der einen unter, bei der andern über dem Kelch müssen sie als verschiedene Gattungen angesehen werden. Es ist noch kein Beispiel bekannt, dass die Lage des Fruchtknotens sich verändert hätte. Die einzige Ausnahme davon macht die Gattung *Saxifraga* bei dieser giebt es Arten, die den Fruchtknoten unter dem Kelche, andere die ihn halb unter und

r demselben, und endlich welche, die ihn ganz r dem Kelch haben. Hier sieht man aber den Uebergang ganz deutlich, und folglich muss auch bei der nur allein eine Ausnahme gemacht werden.

Die Gattung *Saxifraga* muss allerdings in mehrere getrennt werden. Die Uebergänge wovon der Verf. redet, sind hier nicht einmal anzutreffen, und wenn sie es wären, so würde dieses doch nicht von Folgen sein, denn man müsste gar viele Gattungen vereinigen, wenn man auf jene Uebergänge Rücksicht nehmen wollte. Es ist hier nur von Uebergängen der Form, nicht der Verwandlung nach die Rede. L.)

181. *Die Lage oder vielmehr die Anheftung der Staubfäden ist sehr wichtig bei Gattungen.*

Ob die Staubfäden auf dem Kelche, auf der Blumenkrone, oder auf dem Fruchtboden stehn, dies zeigt den Hauptunterschied aller Gattungen aus. Die Übereinstimmung der ganzen Pflanze oder Blume mag sein wie sie will, so werden doch die Gattungen nach der Anheftung bestimmt. Bei den nelkenartigen Pflanzen, vorzüglich bei der Gattung *Lychnis* und *Silene*, stehn einige Staubfäden auf dem Fruchtboden, andere auf der Blumenkrone. Diese nur machen eine Ausnahme. (Keinesweges. L.)

182. *Das Geschlecht (Sexus) der Pflanze kann niemals zum Unterschied der Gattungen dienen.*

Wenn eine Pflanze sich im Geschlecht von einer andern unterscheidet, so wird dieses beim Gattungscharakter nicht geachtet, wenigstens kann es zu keinem wichtigen Unterschied dienen. Man hat bemerkt, dass nichts unbeständiger als der Unterschied des Geschlechts ist, denn öfters werden durch Cultur Zwitterblumen in männliche oder weibliche verwandelt,

auch haben die verschiedenen Himmelsstriche den Einfluss. Z. B. *Ceratonia Siliqua* ist in unsern Gärten mit vollkommen getrenntem Geschlechte auf verschiedenen Bäumen (*Dioecia*) allezeit bemerkt worden. Aegypten aber findet man diesen Baum beständig Zwitterblumen. Viele Gattungen, z. B. *Lychnis*, *Ieriana*, *Cucubalus*, *Urtica*, *Carex* u. s. v. u. haben, die mit getrennten Geschlechtern vorkommen, doch alle übrigen in dem Geschlechte verschmolzen sind.

Auch geschlechtslose Blumen (*flores neutri*), weder Staubgefäße, noch Griffel haben und weder zwischen fruchtbaren angetroffen werden, wie in den Gattungen *Viburnum* und *Hydrangea*, können nicht zum Kennzeichen für Gattungen dienen. Die einzige Ausnahme machen die zur neunzehnten Klasse gehörigen Gewächse.

(Auch hier ist die Frage, ob solche Ausnahmen notwendig sind. L.)

Diese Regeln gelten für alle Vegetabilien. Es gibt aber verschiedene in ihrem Bau sehr nahe verwandte Gewächse, die eben wegen ihrer fast gleichförmigen Bildung mehrere Aufmerksamkeit und feinere Unterscheidungsmerkmale verlangen, um sie in Gattungen abtheilen. Die merkwürdigsten dieser natürlichen Familien können nur mit denen ihnen allein zukommenden Regeln hier angezeigt werden.

183. Die Gräser (§. 132. Nr. 5.) können nach der Zahl der Staubfäden, der Gegenwart oder des Mangel einer Granne an der Blumenkrone niemals in Gattungen abgetheilt werden. Die Zahl der Blüthen, der Spelzen, des Griffels und die Granne am Kolben aber dürfen nicht übersehn werden. Es zeigt sich

• wie auch die Gestalt der Spelzen und des
fasses gute Unterscheidungsmerkmale giebt.

• *Die Lilien* (§. 132. Nr. 6.) müssen nach der
(Spatha), ob diese ein- oder mehrblättrig, ein-
blumig ist, unterschieden werden. Ferner,
wenig andern Gewächsen vorkommt, dient
e, die Dauer der Blumenkrone, und die Rich-
Staubfäden zur Bestimmung der Gattungen.
ss also sehn, ob die Narbe eingeschnitten, und
sie es ist; ob die Blumenkrone abfällt, ver-
oder stehn bleibt; ob endlich die Staubfäden
stehn, oder gebogen sind, oder auch eine
Richtung haben. Ausserdem gelten noch die
nen schon angezeigten Regeln, sowohl bei
ls bei den übrigen Familien.

• *Die Doldengewächse* (§. 153. Nr. 45.) haben
n Familien die grösste Uebereinstimmung un-
nder. Sie haben eine fünfblättrige Blumen-
ünf Staubfäden, den Fruchtknoten unter der
zwei Stempel, ja sogar der Blütenstand und
cht, die aus zwei freien Samenkörnern (Sa-
en F.) besteht sind sich unter einander ähn-

und kann in den wenigsten Fällen einen guten Charakter abgeben. Man hat also einen andern Unterschied gefunden, und zwar in der Frucht. Obgleich diese immer aus zwei freien Samen (Samenhüllen) besteht, so ist ihre Gestalt doch merklich verschieden und auf dieser allein (? L.) beruhen bei dem Delonixgewächsen die für Gattungen sicheren Kennzeichen.

186. *Die Lippen- oder rachenförmigen Blüthen* oder die ganze vierzehnte Linnéische Klasse (§. 147) hat folgende Theile, nach denen nur allein die Gattungen derselben bestimmt werden können. Die Blumenkrone, den Kelch und die Richtung der Staubfäden. In der ersten Ordnung (§. 150.) kann die Frucht, welche bei allen gleichförmig gestaltet ist, keinen Charakter, so wenig als der Griffel geben, denn bei den meisten sind vier freie Samen, (Samenhüllen) und der Griffel besteht aus einem einfachen Stempel und einer zweitheiligen Narbe. Die Einschnitte des Kelchs also, und die verschieden gestalteten Lippen der Blumenkrone, so wie bei wenigen Gattungen die Richtungen der Staubfäden, denn bei den meisten geben sie in der Oberlippe, geben Charaktere für die Gattungen. In der zweiten Ordnung (§. 150.) giebt die Frucht, die schon weit mehr verschieden ist, eine grosse Menge von Kennzeichen, wornach sich die Gattungen bestimmen lassen. Merkwürdig ist bei dieser Familie, dass bei einigen dazu gehörigen Gattungen eine Lippe fehlt, und man hat bemerkt, dass den in der ersten Ordnung die obere, denen in der zweiten die untere Lippe fehlt. Als Beispiele der ersten Ordnung können *Teucrium* und *Ajuga* dienen, der zweiten Ordnung *Tourrettia* und *Castilleja*. Die verkehrte Blumenkrone (*corolla resupinata*) der

ant, bei der die Unterlippe wie die obere, und die Oberlippe wie die untere geformt ist, giebt kein gutes Kennzeichen ab. (Warum nicht? L.)

187. *Die kreuzförmigen Blumen* oder die zur sechsten Klasse gehörigen Gewächse (§. 149.) sind für den Botaniker, wegen der grossen Uebereinstimmung aller Theile am schwierigsten zu bestimmen. Allein die Frucht kann die Gattungen unterscheiden, und zuweilen die Honigdrüsen in der Blume, wenn aber der Kelch, ob er absteht oder anliegt. Die Blumenkrone könnte zwar auch einen Unterschied machen, aber sie ist bei allen gleichförmig, und die einzige Gattung *Iberis* zeichnet sich nur durch zwei kleinere Blumenblätter aus.

188. *Die Schmetterlingsblumen* oder die siebente Linnäische Klasse (§. 149.) hat auch in der Frucht und Blume viel Uebereinstimmendes. Der Unterschied ist hier das Vorzüglichste, worauf man merken kann. Nicht so schön sind die Charaktere von der Blumenkrone, denn es kommt bloss auf das Verhältniss der einzelnen Theile derselben an, oder auf ihre Lage, ob sie mehr auseinander gebreitet sind oder nicht. Dergleichen Charaktere sind nie (warum nicht?) anzurathen, ausser in dem Falle, wo man nicht anders unterscheiden kann, oder wenn die Lage oder das Verhältniss sehr merklich von andern verschieden ist, z. B. *Erythrina*, *Amorpha*, *Dimorpha* u. s. w. Die zusammengewachsenen Staubfäden geben nur sehr wenig Unterscheidendes, ob nemlich diese in einen Bündel oder in zwei verwachsen sind oder ob neun Staubfäden einen Bündel bilden und ein einzelner freier bei ihnen steht, welches bei den meisten Blu-

men dieser Familie der Fall ist. Die Narbe aber macht einen deutlichen Unterschied. Obgleich die Frucht der meisten Schmetterlingsblumen eine Hülse oder Gliedhülse ist, so weicht sie doch in ihrer Gestalt sehr ab, und nach der Gestalt, Bekleidung und Zahl der darin enthaltenen Samen können Gattungen gemacht werden.

189. *Die zusammengesetzten Blumen*, oder die neunzehnte Linnéische Klasse (§. 149.) haben wegen des sehr abweichenden Baues ganz andere Regeln. Bei diesen sieht man auf die allgemeine Blumengestalt, den Fruchtboden und das Federchen. Hierauf beruhen alle Gattungen dieser Familie. Das Geschlecht, welches Linné bei den Ordnungen derselben anwendet (§. 150.) ist für Gattungskennzeichen nicht anzurathen, eben so wenig die Gestalt der Blumen (Warum nicht? L.) Viele Gattungen dieser Klasse, die keine Strahlenblumen haben, bekommen hierdurch durch einen fettern oder feuchtern Boden, oder auch in einer wärmern Gegend Strahlenblumen, wie andere sie bisweilen verlieren. Eine bei uns gewöhnliche Pflanze, *Bidens cernua*, soll nach dem Gattungscharakter keine Strahlenblumen haben, und das noch, wenn sie auf sehr nassem schlammigen Boden steht, erhält sie dieselben. Linné, der beide Abänderungen geschnitten hat, hielt die Pflanze mit Strahlenblumen für verschieden, und nannte sie *Coreopsis* *Bidens*. Man sieht daraus, dass bei sehr ähnlichen Gewächsen der Mangel oder das Dasein der Strahlenblumen alle Aufmerksamkeit verdient, aber nicht zur Gattungsunterschiede gewählt werden kann.

190. *Die Cryptogamen* (§. 149.) oder die Ge-

der Botanik.

rächse der vier und zwanzigsten Klasse, den sich dem unbewaffneten Auge nicht zeigen nach der Frucht bestimmt werden. Es ist der Gattungscharakter dieser Gewächse gegeben, den man nur durch starke Vergrößerungen erkennen kann, und dann muss auch dieser Charakter deutlich sein.

(Dann kann man aber viele dieser Pflanzen gar nicht unterscheiden. L.)

Die Blumen der Cryptogamen sind von der Art, dass sie nur zu einer gewissen oft sehr kurzen Zeit, und dann bloss mit starker Vergrößerung zu sehn sind, auch hat man sie bei verschiedenen noch nicht beobachten können. Daher würde es sehr fehlerhaft (L.) sein, einen Theil der nicht leicht, oder doch nur mit vielen Schwierigkeiten sichtbar ist, zum Kennzeichen der Gattungen zu wählen; dagegen ist die Frucht leicht und nur durch eine mässige Vergrößerung zu bemerken, weshalb sie den Vorzug verdient. Man hat aber noch nicht alle Arten der Früchte bei den Cryptogamen genau untersucht, daher bleiben in dieser Klasse von Gewächsen noch Lücken, die wir sobald nicht ausfüllen können.

Linné hat bei den Farnkräutern die Art, wie die Früchte stehn (Inflorescentia), zur Bestimmung der Gattungen angewandt. Bei einigen stehn die Früchte in Reihen, bei andern in Kreisen, bald in der Mitte, am Rande, oder in den Winkeln des Wedels. Bei den andern Gewächsen darf der Blütenstand nicht, um Gattungen zu bestimmen, gebraucht werden, und doch ist es hier geschehn.

Die Kennzeichen, welche der Doctor Smith bei den Farnkräutern zur Bestimmung der Gattungen gegeben hat, sind in Willdenow's Grundriss, 1 Th.

wählt hat, sind die Decke (§. 64.) als ein leicht Merkmal; er sieht, wie sie sich löset, und in welcher Ordnung die Samenkapseln unter ihr gesteckt sind, bei den andern Farrnkräutern, die nicht auf der Rückseite blühen, muss man zur Gestalt der Frucht seine Zuflucht nehmen.

Die Laubmoose (§. 132.) sind in neuerer Zeit genauer untersucht worden; man kennt ihre Blumen und Früchte: daher ist man auch im Stande, neue Gattungen als vormalis zu geben. Bei diesen Gewässen kommt es bloss (? L.) auf das Maul der Büchse an (§. 120. D.). Dies giebt eine Menge Kennzeichen, die sehr beständig und leicht zu bemerken sind.

Die Lebermoose (§. 132.) lassen sich auch nach der Frucht, wie diese sich öffnet, leicht in Gattungen bringen.

Die Flechten (§. 132.) werden nach der Gestalt des Fruchtlagers (§. 128.), so weit man es kennt, in Gattungen getheilt, aber ihre äussere Gestalt ist nicht mit dazu genommen worden.

Die Pilze (§. 132.) werden so weit als man sie nach der Frucht kennt nach derselben unterschieden, wo aber diese noch unbekannt ist oder sich von derselben keine Charaktere entlehnen lassen; da muss man zur äusseren Gestalt seine Zuflucht nehmen.

191. Eine *Art* (*Species*) heisst jede einzelne unter einer Gattung stehende Pflanze, die aus den Samen gezogen unverändert dieselbe bleibt.

(Zu einer Art gehören Pflanzen, welche nur durch veränderliche Kennzeichen von einander verschieden sind. L.)

Eine *Abart* (*Varietas*) ist eine in der Farbe

Farbe, Grösse oder Geruch von einer bekannten Art verschiedene Pflanze, die leicht (nicht immer leicht. L.) aus dem Samen in die eigentliche Art, von der sie abstammt, wieder übergeht. Arten, die sich nur mit grosser Mühe von einander unterscheiden lassen, aber doch aus Samen gezogen beständig dieselben bleiben, werden sehr leicht mit den Abarten verwechselt, und wegen der grossen Aehnlichkeit, die sie mit andern haben, von einigen Kräuterkennern *Halbarten* (*Subspecies*) genannt. Da man aber mit der einfachen Eintheilung in Arten und Abarten alles bestimmen kann, und diese Abtheilung auch leicht zu verstehen ist, so scheint es überflüssig zu sein, Halbarten nachzuweisen zu müssen.

Die Abart darf nicht mit der *Missgestalt* (*Monstrum*) verwechselt werden. Wenn bei einer Pflanze Theile widernatürlich gebildet, oder wohl gar so gestaltet sind, dass die Blumen sich nicht natürlich entfalten, oder die Befruchtungsorgane angeschlossen, so nennt man solche eine *Missgestalt*. Kranke Pflanzen haben auch zuweilen das Ansehn einer Abart, sind aber doch leicht zu unterscheiden, wie wir in der Folge sehen werden. Die verschiedenen Regeln, nach welchen die Arten bestimmt werden, beruhen nicht auf dem Bau der Blume und Frucht, sondern auf andern Theilen.

(Eine *Missbildung* (*monstrum*) ist eine solche veränderte Bildung, wodurch der Theil unfähig wird seine Functionen gehörig zu verrichten. L.)

192. Bei der Bestimmung der Arten muss man nicht auf Farbe, Geruch, Geschmack, Grösse oder auf die Aussenseite, ob sie glatt oder haarig ist, sehn.

Wenn zwei Pflanzen nur bloss durch die der Blume, durch einen ganz verschiedenen (oder Geschmack, durch einen Zoll oder Fuss Stengel, endlich durch ein glattes oder haarigen oder Stengel verschieden sind, so können sie in Abarten angesehen werden. Unterscheiden alle Eigenschaften zusammengekommen eine Pflanz von der andern, dann könnte sie eher für eine besondere Art gelten.

Weisse oder schwarze Flecke auf den Blättern können bei Unterscheidung der Arten nur dann bestimmen, wenn ganz verschiedene, durch mehrere Merkmale abweichende Pflanzen, sich darin unterscheiden. Hingegen kann ein weiss oder schwarz getes Blatt, wenn sonst kein anderes Unterscheidungsmerkmal zu finden ist, nicht als ein Kennzeichen verschiedener Arten angesehen werden. Ueberhaupt ist es besser, wenn man, ohne auf die Farbe zu sehen, die Pflanzen unterscheidet.

Geruch und Geschmack können, weil sie sich vergleichungsweise bestimmen lassen, nicht für Kennzeichen angenommen werden.

Die Grösse hängt zu sehr von der Verschiedenheit des Bodens ab, als dass man darauf Rücksicht nehmen könnte. Sie kann nur dann als Merkmal angenommen werden, wenn sie vergleichungsweise braucht wird. So kann man sagen: der Stengel ist länger als das Nebenblatt, oder der Blattstiel länger als die Blume u. s. w. Auch die Bekleidung hängt von Umständen ab; denn ein haariges Blatt kann ebenfalls durch den verschiedenen Boden in ein glattes verwandelt werden.

(Es kommt doch in allen diesen Fällen darauf an,

nach ein solcher Unterschied durch die Cultur ändern lässt, oder nicht. L.)

Filzige, stachelichte, gewimperte, wollige Blätter und Stengel sind nicht so leicht einer Veränderung unterworfen, und geben die besten Unterscheidungsmittel.

193. *Die Wurzel giebt ein schönes wahrzügliches Kennzeichen, Arten zu bestimmen.*

Wenn die Wurzeln zweier sich ähnlicher Gewächse verschieden sind, so kann man sie als besondere Arten ansehen. Eine Ausnahme machen die cultivirten Gewächse. Die lange Cultur oder einige Kunstgriffe des Gärtners haben denselben öfters eine ganz fremde Gestalt gegeben, z. B. *Daucus Carota* hat wildwachsend keine rübenartige und gelbe Wurzel, nur durch Cultur erlangt sie diese erst. Nur allein bei wildwachsenden Gewächsen kann obige Regel gelten. So kann man aber die Wurzel als ein Kennzeichen der Art anzuführen vermeiden kann, und sich noch andere Merkmale an der Pflanze zeigen, so thut man besser, sie nicht als Unterscheidungsmittel zu gebrauchen, weil man nicht immer, zumal bei getrockneten Pflanzen, die Wurzel zu sehn Gelegenheit hat.

194. *Der Stengel giebt ein sicheres, Arten leicht unterscheidendes, Kennzeichen ab.*

Selten artet der Stengel aus, und deshalb giebt er das beste Kennzeichen; besonders ist der runde, eckige, gegliederte, kriechende Stengel u. s. w. sehr beständig. Nicht so sicher ist der ästige Stengel, er kann schon eher sich verändern, und giebt allein kein gewisses Kennzeichen.

195. *Die Dauer eines Gewächses giebt nur in dem ursprünglichen Vaterlande desselben ein gewisses Kennzeichen, Arten zu bestimmen.*

Wenn verwandte oder sehr ähnliche Pflanzen sich in der Dauer unterscheiden, dass die eine ein Sommergewächs, die andere ein Staudengewächs, oder auch ein Strauch oder Baum ist, so müssen sie als besondere Arten angesehen werden. Man muss aber die Dauer der Pflanzen in ihrem Vaterlande erkennen. Alle bei uns zweijährige Gewächse sind in einem warmen Klima einjährig. Einige Staudengewächse aus warmen Gegenden werden bei uns Sommergewächse; die Wurzel erfriert im Winter, und wir müssen sie wieder aussäen. Andere Staudengewächse sind in warmen Himmelsstrichen Sträucher, weil keine Kälte ihre Stengel verdirbt. Wenn also die Dauer eines Gewächses etwas Unterscheidendes zeigt, so muss man die andern Arten genau prüfen, ob sie nicht auch in einem mildern Klima länger ausdauern. Sind aber Pflanzen unter einer Himmelsgegend in der Dauer abweichend, so kann dieses als das sicherste Kennzeichen angesehen werden, z. B. *Mercurialis annua* und *perennis* haben sehr viel Aehnliches, aber der Name bestimmt schon ihre Unterschiede.

196. *An den Blättern lassen sich die meisten Gewächse von einander unterscheiden.*

Fast alle Gewächse lassen sich durch die abweichende Form ihrer Blätter von andern unterscheiden. Es giebt aber Fälle, wo sich die Pflanzen nicht ganz deutlich nach den Blättern bestimmen lassen. Sie machen die meisten Doldengewächse, zusammenge-

niste Blumen, alle Wasserpflanzen, Feigen und Moschurarten eine Ausnahme davon. Bei diesen Gewächsen sind die Blätter auffallenden Veränderungen unterworfen, dass man ohne Uebung nicht mit Gewissheit Art von Abart unterscheiden kann. Sieht man also eine Unbeständigkeit in den Blättern, so müssen andere Kennzeichen aufgesucht werden.

(Es kommt nur darauf an, ob die Blätter beständige oder veränderliche Kennzeichen darbieten; die Wasserpflanzen ändern allerdings in ihrer Gestalt sehr ab, die übrigen genannten Pflanzen nicht mehr oder weniger als andere. L.)

197. *Die Stützen geben ein sicheres Kennzeichen für Arten, was allen andern vorzuziehen ist.*

Unterscheidet sich eine Pflanze von der andern durch Stacheln, Blattansätze oder Nebenblätter, so können sie die Arten zu unterscheiden angewandt werden. Es ist aber dabei zu merken, dass diese Theile nicht vor der Erscheinung der Blume abfallen müssen, wenn sie als Kennzeichen gelten sollen.

(Kennzeichen sind sie immer, nur muss man sagen, dass sie abfallen. L.)

198. *Der Dorn (Spina) und die Ranke (Circulus) sind nicht immer als sichere Kennzeichen anzunehmen.*

Der Dorn ist nichts weiter als eine verhärtete, nicht vollkommen entwickelte Knospe, die, wenn die Pflanze in fetteren Boden gesetzt wird, in Zweige auswächst. Birnen, Citronen und mehrere Gewächse haben in magern Boden Dornen, die sich in fetterem vertieren (? L.). Einige Pflanzen, die sehr viele Dor-

nen haben, behalten sie auch im fettern Boden. Der Stachel (*Aculeus*) ist sehr beständig und verliert sich niemals durch Veränderung des Bodens. Eben so ändert auch die Ranke zuweilen bei Pflanzen, die Schmetterlingsblumen haben, ab. Man muss erst vollkommen überzeugt sein, dass der Dorn oder die Ranke niemals fehlt, wenn man dadurch die Arten richtig unterscheiden will.

(Wenn beide Theile sich nicht als veränderlich gezeigt haben, so zeigen sie Arten an, L.)

199. Am sichersten ist der Blütenstand.

So leicht hat man kein Beispiel aufzuweisen, wo der Blütenstand Abänderungen unterworfen wäre. Wenn Pflanzen sich auf diese Weise unterscheiden, so sind sie ohne Zweifel verschiedene Arten. Ungewisser aber ist die Zahl der Blumen; ob nämlich zwei, drei oder mehrere beisammen stehen. Ueberhaupt muss man merken, dass nichts in der ganzen Natur so unbeständiger als die Zahl zeigt, und dass nie sich auf ihr zu bauen ist.

200. Man muss nicht um einer Kleinigkeit willen eine Abart zur Art, oder eine Art zur Abart machen.

Wie aus der Geschichte unserer Wissenschaft erhellen, hat man im siebzehnten und im Anfange des vorigen Jahrhunderts jede nur unbedeutende Abänderung eines Gewächses für eine besondere Art angesehen, dadurch entstand die grösste Verwirrung. Es ist also Regel: lieber eine Pflanze für eine Abart ansehen, als sogleich eine eigene Art daraus zu machen. (Sicherer ist es doch, Verschiedenheiten, deren Un-

beständigkeit noch nicht erwiesen sind, als Kennzeichen von Arten anzusehen. Denn eine Abart wird übersehen, und dieses schadet der Wissenschaft; eine überflüssige Art erschwert nur. L.)

Eben so leicht kann eine sehr verschiedene Art als Abart angesehen werden, und für die Wissenschaft verloren gehn; daher muss man nach allen gegebenen Regeln sehn, und diese genau prüfen; sind alsdann noch nicht alle Zweifel gehoben, so bestimme man die Pflanze nach der grössten Wahrscheinlichkeit als Art oder Abart, vergesse aber nicht die Zweifel darzu anzuzeigen.

201. *Die gewählten Kennzeichen einer Art müssen unter allen Umständen zu finden sein.*

Wenn eine Pflanze auch noch so grossen Veränderungen unterworfen ist, so müssen doch die Kennzeichen so gewählt sein, dass sie bei allen Abarten erkennen sind. Es würde daher sehr fehlerhaft sein, eine Pflanze, die gewöhnlich ein fünfflappiges (Lincolobum) Blatt hat, und mit ganzen Blättern ändert, nach dem fünfflappigen Blatte von andern zu unterscheiden. Hier müssen, wenn es möglich ist, andere Kennzeichen aufgesucht werden, weil sonst der Anfänger, welcher nur die Abart, aber nicht die echte Art gesehn hat, nie zur Gewissheit kommen kann.

202. *Die Kennzeichen, wonach alle Arten einer Gattung bestimmt werden, müssen von einem oder wenigen Theilen hergenommen sein.*

Wenn eine Gattung viele Arten hat, und man wollte die erste nach der Achse, die zweite nach den

Blättern, die dritte nach dem Stengel, die vierte der Wurzel, die fünfte nach der Frucht u. s. v. unterscheiden; so würde niemand die bestimmte Pflanze mit Gewissheit erkennen.

(Es schadet nicht, wenn die Kennzeichen von nichtfalschen Theilen hergenommen sind, doch seien sie vergleichend aufgeführt sein, z. B. auf folgende Weise: *radice tuberosa, caule glabro, foliis lanceolatis und foliis sessilibus, caulibus teretibus glabris und foliis petiolatis lanceolatis* L.)

Es ist nothwendig bei den Arten einer Gattung darnach zu sehn, welcher Theil die besten Unterscheidungsmittel giebt, und sind dieses Theile, so müssen sie bei allen angezeigt und Verschiedenheit angemerkt werden, damit keine Unklarheiten oder Verwirrungen entstehen.

203. Nur zur Zeit der Blüthe oder der Frucht sind die Kennzeichen brauchbar.

Kein Botaniker kann mit Gewissheit die Gattung ohne Blüthe und Frucht bestimmen, er müsste durch öftere Uebung sich eine Fertigkeit, sie an den Blättern zu unterscheiden, erworben haben. Kennzeichen also, die von einer Pflanze vor der Entstehung der Blume oder Frucht gegeben werden, sind ganz unbrauchbar.

(Wenn die Kennzeichen bezeichnend sind, so müssen sie immer gebrauchen. L.)

204. Die übrigen Kennzeichen, wonach bestimmt werden, muss man aus der Erfahrung nehmen. Es ist aber bei der Beschreibung (Description) einer Pflanze zu merken: dass dieselbe nach der Terminologie ganz genau und zwar in folgender Ordnung

gesetzt sein muss. Erstlich wird die Wurzel, dann der Stengel, die Blätter, die Stützen, und endlich der Blüthenstand beschrieben. Auch muss bei einer kurzen Beschreibung die Farbe der Blume angedeutet sein, aber überflüssige, weitläufige und von selbst begreifliche Dinge, dürfen nicht bemerkt werden. Solche sind, dass die Wurzel sich unter der Erde befindet, die Blätter grün sind u. d. m. Die alten Botaniker haben öfters dagegen gesündigt.

205. Der Unterschied (Diagnosis) der Arten eine kurze Beschreibung einer Pflanze, die nur das Wesentliche enthält.

Was der Verf. Diagnosis nennt, wird von andern Charakter genannt. Dagegen nannte Scopoli zuerst und nach ihm viele andere diagnosis eine etwas längere Beschreibung der Pflanze, welche Kennzeichen enthält, wodurch die Pflanze leicht und beim ersten Blicke unterschieden wird, z. B. Farbe der Blume, grösse Länge der Blätter u. d. m. L.)

Dieser wird nach folgenden Regeln abgefasst:

Der Unterschied muss nicht zu lang sein, und wo möglich aus zwölf Wörtern bestehen.

Diese Regel gab Linné, als er noch nicht die Trivialnamen eingeführt hatte. Jetzt kommt man damit nicht aus. L.)

Bei dem Unterschiede muss man nur auf das Unterscheidende (§. 202.) sehn, dabei aber nicht alle entdeckten Arten der Gattung vergessen, um ihn so einzuordnen, dass der, welcher die Pflanze zum erstenmal sieht, und alle andere Arten derselben Gattung nicht gesehn hat, nicht mehr zweifeln darf, welche Pflanze er vor sich hat. Wörter, die überflüssig sind, müssen ausgelassen, und nur die, welche sie von au-

dern unterscheiden, angezeigt werden. Sind nach zwölf Wörter die Pflanze deutlich zu machen, so müssen sie gebraucht werden, denn es ist so, dass der Unterschied deutlich und lang, als unständig und kurz sei.

Der Unterschied muss in lateinischen Ausdrücken abgefasst sein, und alle Wörter im Ablative stehen.

Diese Regel näher zu bestimmen, mag das gebrauchte Beispiel von der Gattung *Solanum* bezeichnen. Es giebt sehr viele Arten davon, die eine, welche wir Erdtöfel nennen, wird von *Linné* unterschieden:

Solanum tuberosum, caule inermi herbaceo, foliis planatis integerrimis, pedunculis subdivis.

(Wenn man deutsch schreibt, kann man auch solche Unterschiede machen. Die Ablativi lateinischen sind oft sehr unbequem. Besser Nominativi. Weil man die Unterschiede als Bestimmungen gebrauchte, musste man wohl annehmen. L.)

Es muss in Unterschiede kein relativer Begriff liegen.

Was vorhin von der Bestimmung der Arten gesagt ist, gilt auch hier. Grösse, Farbe u. d. m. kann nichts bestimmen, weil man diese Dinge durch Vergleichung mit andern Gewächsen bestimmen kann, und man nicht immer die Gegenstände, welche verglichen werden, zur Hand hat. Zum Beispiel mag folgender Unterschied dienen, der gegen die Regel abgefasst ist.

Solanum arborescens, tomentosum latifolium; fructu magno cinereo. Barr. aequin. 104.

Wer kann wohl aus diesem Unterschiede die Pflanze erkennen?

*Es muss auch kein voneinander Ausdruck in dem
wechsele sein.*

Wenn man in einem Unterschiede nur sagt, was
Pflanze nicht hat, so kann offenbar dadurch nichts
sich werden. Z. B.

*Cuscuta caule parasitico, volubili, lupuliformi, as-
punctato, floribus racemosis, non conglomeratis
pedunculatis. Krock. siles. 251.*

Die angeführte Beschreibung ist aus andern Grün-
den schlecht. *Folium sessile* ist ein voneinander
Ausdruck, und so sind es viele sehr nothwendige,
z. B. *flos apetalus* etc. L.)

*Wenn eine Gattung nur aus einer Art besteht, so
muss diese durch keinen Unterschied bestimmt zu
sein.*

Man versteht sich von selbst, dass eine einzige Art
ohne Vergleichung mit andern, keinen Unter-
schied geben kann, daher man auch keinen bei einer
Gattung, die aus einer Art besteht, suchen darf. So
seltsam es sonderbar sein, bei *Butomus*, *Adoxa* u. v.
keinen Unterschied anzuführen, da nur eine Art von
diesen Gattungen bekannt ist, und also keine
Vergleichung statt finden kann.

Wenn aber von einer Gattung nur eine Art ent-
deckt ist, so muss eine genaue Beschreibung davon
gegeben werden, um, wenn mehrere gefunden wer-
den sollten, sie unterscheiden zu können.

Man kann alle diese Regeln ganz kurz zusammen-
fassen, wenn man sagt: ein Unterschied muss nur
das Auszeichnende bestimmt und bündig gesagt
sein.

206. Die vollständige Beschreibung des natürli-

20. *zinnoberroth* (*miniatus* s. *cinnabarinus*), fahl brennend Roth.

21. *ziegelfarben* (*lateritius*), die vorige Farbe nur matter und ins Gelbe spielend.

22. *scharlachfarben* (*coccineus* s. *phoeniceus*), zinnoberroth, sehr brennend und kaum merklich ins Blaue spielend.

23. *fleischfarben* (*carneus*), eine Mischung zwischen weiss und roth.

24. *safranfarbig* (*croceus*), sehr dunkles Orange

25. *hochroth* (*puniceus*), das angenehmste brennende Roth, wie Carmin.

26. *blutroth* (*sanguineus* s. *purpureus*), matter als das vorhergehende, aber sehr rein.

27. *rosenroth* (*roseus*), ein sehr blasses Blutroth.

28. *schwarzroth* (*atropurpureus*), sehr dunkelroth, das schon der schwarzen Farbe sich naht.

29. *violett* (*violaceus*), Blau mit Roth vermischt.

30. *lilafarben* (*lilacinus*), die vorige Farbe, nur ungleich matter und mehr ins Rothe spielend.

31. *rabenschwarz* (*ater*), das allerreinste und dunkelste Schwarz.

32. *gewöhnlich schwarz* (*niger*), was schon mehr ins Graue spielt.

33. *aschgrau* (*cinereus*), dunkel Schwarzgrau.

34. *perlfarben* (*griseus*), lebhaftes Hellgrau.

35. *blassgrau* (*canus*), mehr weiss als grau.

36. *bleifarben* (*lividus*), Dunkelgrau ins Violette spielend.

37. *milchweiss* (*lacteus* s. *candidus*), blendend Weiss.

38. *weiss* (*albus*), mattes Weiss.

sslich (albidus), schmutziges mattes Weiss.
 chtsichtig (hyalinus), durchscheinend klar
 sses Glas.

allein bei den Flechten und Pilzen werden
 rben zur genaueren Bestimmung gebraucht.
 auch bei diesen Gewächsen nicht so abwei-
 ie bei andern.

. Jeder Theil eines Gewächses pflegt auch
 te Farben zu haben.

Wurzel ist gewöhnlich schwarz oder Weiss,
 n braun, selten gelb oder roth, aber niemals

Stengel und die Blätter sind gewöhnlich
 tner roth, bisweilen weiss und schwarz ge-
 n seltensten gelb, äusserst selten blau, und
 ss oder braun, wenn sie filzig sind.

Blumenkronen sind von allen Farben, selten
 n, und noch seltener schwarz; der Kelch aber
 ähnlich grün, und selten von anderer Farbe,
 schwarz, (wenn nicht das schwarze perigo-
 na Veratrum nigrum Kelch zu nennen ist. L.)
 Staubfäden sind gewöhnlich durchsichtig oder
 eltener von anderer Farbe.

saftigen Arten Früchte sind von allen Farben.
 Kapseln sind braun, grün oder roth, selten

. Same ist schwarz oder braun, seltener von
 Farbe.

rbar ist es, dass gelbe Blumenkronen bei den
 mmengesetzten und den Herbstblumen am häu-
 en vorkommen. Weisse Blumenkronen finden
 am meisten bei Frühlingsblumen. Blaue und

weisse Blumen sind vorzüglich in kalten, rothe Blumen oder Blumen von schönen brennenden Farben gewöhnlich in warmen Himmelsgegenden. Weisse Beeren sind fast immer süß, rothe sauer, blaue süß mit sauer vermischt, und schwarz fade oder giftig.

210. Wenn gleich die Botaniker niemals auf die Farbe achten (§. 192.), so ist doch die Art, wie einige Blumen und Früchte dieselbe verändern, wichtig. Am meisten gehn die Farben ins Weisse über. Die rothe und blaue pflegt sich am häufigsten zu verändern. Seltener sind die Veränderungen in gelb, oder dass roth in gelb übergeht; blau geht sehr häufig ins Rothe über. Folgende Beispiele beweisen dieses:

Roth geht ins Weisse über bei:

Erica, Serpyllum, Betonica, Pedicularis, Dianthus, Agrostemma, Trifolium, Orchis, Digitalis, Carduus, Serratula, Papaver, Fumaria, Geranium u. a. m.

Blau verwandelt sich ins Weisse bei:

Campanula, Pulmonaria, Anemone, Aquilegia, Viola, Vicia, Galega, Polygala, Symphytum, Borago, Hysopus, Dracocephalum, Scabiosa, Jasione, Centaurea, Cichorium u. a. m.

Gelb verwandelt sich ins Weisse bei:

Melilotus (sind verschiedene Arten. L.), Agrimonia, Verbascum, Tulipa, Alcea, Centaurea, Chrysanthemum u. a. m.

Blau verwandelt sich in Roth bei:

Aquilegia, Polygala, Anemone, Centaurea, Pulmonaria u. s. w.

Blau verwandelt sich ins Gelbe bei:

Commelina, Crocus u. v. a. (sind verschiedene Arten. L.)

Roth geht ins Gelbe über bei:

Mirabilis, Tulipa, Anthyllis u. e. a.

Roth verwandelt sich in Blau bei:

Anagallis u. a. m. (verschiedene Arten. L.)

Weiss ins Rothe bei:

Oxalis, Datura, Pisum, Bellis.

Die Früchte, besonders die saftigen, verändern öfters ihre Farbe.

Schwarze Beeren verwandeln sich in weisse bei:

Rubus, Myrtillus, Sambucus u. s. w.

Schwarz verwandelt sich in Gelb bei:

Solanum (verschiedene Arten. L.)

Roth geht ins Weiss über bei:

Ribes, Rubus Idaeus.

Roth geht ins Gelbe über bei:

Cornus.

Grün ins Rothe bei:

Ribes Grossularia.

Schwarz in Grün bei:

Sambucus.

Die Samen der Pflanzen verwandeln auch häufig ihre Farbe in eine andere, z. B. Papaver hat weissen und schwarzen Samen.

Die Samen der Schmetterlingsblumen sind am häufigsten der Veränderung der Farbe unterworfen.

211. Die Blätter sind bei einigen Gewächsen im natürlichen Zustand gefleckt, aber nicht immer sind diese Flecke beständig, sie vergehn bisweilen ganz; Beispiele davon geben:

Schwarzgefleckte Blätter:

Arum, Polygonum, Orchis, Hieracium, Hypochaeris.

Weissgefleckte Blätter:

Pulmonaria, Cyclamen.

Rothgefleckte Blätter:

Lactuca, Rumex, Beta, Amaranthus.

Gelbgefleckte Blätter:

Amaranthus.

Einige Gewächse bekommen im Herbste rothe Blätter, Rumex; andere kommen bisweilen ganz roth vor, Angelica, Fagus, Beta, Amaranthus. Von zu grosser Hitze, Kälte, fehlerhaftem Bau der Gefässe, verschiedenem Boden und Lage werden die meisten Gewächse gelbgrün, hellgrün oder dunkelgrün. Durch ähnliche Zufälle werden bisweilen der Rand oder die Mitte des Blatts verändert. Die Gärtner lieben vorzüglich solche Gewächse, wie überhaupt alle Abarten, die für den Botaniker, der sich über die Bildung der Arten im Ganzen, aber nicht in der Farbe freut, keinen Reiz haben. Man nennt die Blätter, welche einen gelben Rand haben, *vergoldete Blätter* (folia aurata), wenn sie in der Mitte gelb gefleckt sind, *gelbbunte Blätter* (folio aureo-variegata); wenn der Rand des Blatts weiss ist, heisst man dergleichen Blatt *versilbert* (folium argenteo- s. albo-marginatum); wenn die Blätter weisse Flecke haben, nennt man sie *weissgefleckte* (folia albo- s. argenteo-variegata).

212. Die Blätter ändern ausser der Farbe noch in der Zahl, der Breite, den Beugungen und den Zertheilungen, ab. Die Zahl der Blätter kann nur bei zusammengesetzten, oder bei gegenüberstehenden abändern. Die Breite der Blätter kann auch sehr oft

verschieden sein, so dass ein eiförmig Blatt in ein längliches oder in andere Arten übergeht. In den Beugungen sind viele Blätter abweichend. Die Kultur ändert oft die Gestalt der Blätter, vorzüglich aber pflegt ein fetter Boden viele Beugungen auf der Blattfläche hervorzubringen. Zum Beispiele kann der gemeine Kohl dienen; auch einige andere Gewächse bekommen bisweilen wellenförmige oder krause Blätter.

Die Zertheilungen der Blätter verändern oft das Ansehn einer Pflanze sehr merklich. Die gewöhnliche *Bambucus nigra* hat bisweilen fein zerschnittene Blätter; *Alnus glutinosa* bringt bisweilen lappige oder zerschnittene Blätter hervor. Man hat überhaupt eine sehr grosse Menge von dergleichen Abänderungen beobachtet. Die Kultur ist der wahre Probestein der Pflanzen; durch das Aussäen der Abarten kann man oft wiederholtem Versuch mit Gewissheit entscheiden, was Arten und Abarten sind. Dies ist das einzige Mittel hinter die Wahrheit zu kommen. So wenig die vorher angezeigten Abarten die Aufmerksamkeit des Kräuterkenners verdienen, so genau müssen diese angemerkt werden.

213. Wer sich mit diesen Regeln so wie mit der Terminologie bekannt gemacht hat, wird dennoch, wenn es ihm an Uebung fehlte, mit Mühe eine ihm unbekannte Pflanze im System aufsuchen können, und es wird ihm um so schwerer werden, wenn er nicht Folgendes beobachtet.

Er betrachtet die Blume genau und sucht durch Bestimmung der Zahl, des Verhältnisses, der Verbindung und Vertheilung des Geschlechts derselben die

Klasse und Ordnung auszumitteln, wohin sie gehört. Hat er diese glücklich herausgebracht, so sucht er im System die Gattung zu erfahren. Hier können ihm aber einige Schwierigkeiten aufstossen, denen er auszuweichen bemüht sein muss.

Denn die Staubgefässe, so wie die Griffel, ändern nach dem mehr oder weniger fetten Boden, worin die Pflanze gestanden, und nach dem Klima öfters ab, so dass einige Staubfäden mehr oder weniger sich finden. Er muss mehrere Blumen untersuchen und nach der Mehrheit entscheiden. Oft aber ändern auch Pflanzen um das doppelte in der Zahl ab, so dass sie statt vier Staubfäden zwei oder auch achte haben. Daher muss er, sobald er in der Klasse, wohin die Pflanze zu gehören scheint, sie nicht finden kann, die andern nachschlagen. Bisweilen können auch Staubbeutel und Staubfäden zusammen hängen, was bei den übrigen Arten nicht der Fall ist, so wie das Geschlecht auch sehr vieler Abänderung unterworfen ist. Man muss also ausser den Klassen, wohin die Pflanze gehören kann, wenn man die Gattung nicht aufgefunden hat, die 21. 22. 23ste Klasse auch noch nachsehn. Hat man sich dann überzeugt, dass die Gattung neu ist, so kann man sie als solche aufführen. Herr Doktor Roth und Professor Hedwig haben sich dadurch um die Anfänger der Botanik verdient gemacht, dass sie von den auffallendsten Abweichungen in der Zahl und im Geschlecht Verzeichnisse entworfen haben, die das Aufsuchen erleichtern. Hat man an einer unbekannten Pflanze glücklich die Gattung ausgemittelt, so muss man auch die Art auszuforschen suchen. Man vergleicht die Diagnosen der Arten und nimmt nicht eher die Pflanze als bestimmt an, bis alle angegebenen Kennzeichen

an derselben zu finden sind. Findet man diese Diagnosen nicht hinreichend, so vergleicht man die Citate oder Synonyme und sieht, ob hier nicht Gewissheit zu finden ist. Linné hat unter den angeführten Schriftstellern, bei denjenigen, die eine gute Beschreibung gegeben haben, hinter der angeführten Pagina ein Sternchen (*) gesetzt, wodurch das fernere Aufsuchen sehr erleichtert wird. Wenn ihm aber die ganze Pflanze sehr wenig oder unsicher bekannt war, so hat er sie mit einem Kreuze (†) bezeichnet.

Die Dauer einer Pflanze hat Linné allemal hinter dem Vaterlande bemerkt, und zwar bei einem Baum oder Strauch †, bei einem Staudengewächse 2, bei einer zweijährigen Pflanze ♂, und bei Sommergewächsen ○ zum Zeichen gewählt.

Bei der Beschreibung der Blume bedient man sich auch um das Geschlecht zu bemerken, folgender Zeichen:

Zwitterblume (flos hermaphroditus) ♀.

Männliche Blume (flos masculus) ♂.

Weibliche Blume (flos femineus) ♀.

Männliche und weibliche Blumen auf einem

Stamm (flores monoici) ♂ — ♀.

Männliche und weibliche Blumen auf verschiedenen Stämmen (flores dioici) ♂ : ♀.

Geschlechtslose Blumen (flores neutri) †.

Zwitter und weibliche in einer Blume (flores hermaphroditi et feminei) wie bei der Klasse Syngenesia ♂ f ♀.

Zwitter und Geschlechtslose in einer Blume (flores hermaphroditi et neutri) in derselben Klasse ♂ f †.

206 III. Grundsätze der Botanik.

Zwitter und männliche Blumen auf einem St
(flores polygami) ♂—♂.

Zwitter und weibliche Blumen auf einem St
(flores polygami) ♀—♀.

Jeder Anfänger, der es weit in der Botanik
gen will, muss fleissig selbst untersuchen und
nicht auf andere verlassen, weil seine Kenntniss
durch bestimmter und sicherer wird.

IV. Namen der Gewächse.

214. **E**s scheint freilich von keiner grossen Wichtigkeit zu sein, eine Pflanze mit einem neuen Namen zu belegen, aber es ist doch jedem, den die Kenntniss der Gewächse beschäftigt, angenehm, den Namen derselben wohlklingend, leicht und überall angenommen zu finden. Sobald die Namen unbestimmt und unsicher sind, hört auch die Kenntniss der Dinge auf. Die ältern Botaniker waren nicht sehr darauf bedacht, die Namen der Pflanze zu erhalten. Jeder, der sich als Schriftsteller aufwarf, suchte ihnen neue zu geben, daher war zu den Zeiten kein unangenehmeres, unsicheres Studium, als die Botanik. Mit den barbarischen, trocknen, unbestimmten Namenregistern wurden die Menschen abgeschreckt, und mussten, um der Namen und Ungewissheiten willen, eine der schönsten Vergnügungen, die Erforschung der Natur, aufbehren. Durch sichere überall angenommene Namen sind wir im Stande, uns unter allen cultivirten Nationen, wo sich nur Kräuterkenner finden, verständlich zu machen.

215. Tournefort, der eine Reform mit der Kräuterkunde vornahm, bestimmte Gattungen und Namen.

für jede derselben; die Arten aber wurden durch kurze, oft nicht einmal bestimmte Beschreibungen unterschieden. Man war zwar schon mehr als vormal im Stande, sich auf die Gattungsnamen zu verlassen, aber die Arten blieben oft undeutlich. Linné hat sich, so wie überall in der Kräuterkunde, auch hier durch die sichere Bestimmung eines *Gattungsnamen* (*Nomen genericum*) und eines *Trivialnamens* (*Nomen triviale*), die er jeder Pflanze beilegte, ein grosses Verdienst erworben. Die Regeln, nach welchen Namen bestimmt werden, sind folgende:

216. Jede Gattung muss bestimmt und gewiss benannt werden, so wie auch eine neue Gattung einen neuen Namen haben muss. Ein einmal festgesetzter Name darf nie, wenn er gut ist, geändert werden. Eine Pflanze kann nur von einem Botaniker benannt werden, dem die Namen aller Gewächse bekannt sind, damit nicht zwei verschiedene Gattungen mit einem Namen belegt werden.

217. *Namen die allgemein angenommen sind, müssen beibehalten werden; und wenn neu entdeckte Pflanzen zwei Namen von verschiedenen Botanikern erhalten haben, muss der erste, wenn er gut ist, bleiben.*

Da man dem Linné in allen Stücken folgt, so ist es auch Pflicht, seine Benennungen, wenn sie wirklichen Gattungen zukommen, zu erhalten. (Nämlich weil eine Sprachverwirrung entstehen würde, wenn man die Namen ändern wollte. L.) Bei neuen Entdeckungen im Gewächsreiche trifft es sich öfters, dass zwei Botaniker an verschiedenen Orten zu gleicher Zeit eine und dieselbe neue Gattung unter verschiedenen Namen benennen. Einer von diesen Namen kann

ir der Gattung zukommen: man muss also den ältesten, wenn er gut und nach den Regeln gemacht ist, beibehalten, z. B. der Brodbaum wurde von Solander, Forster und Thunberg beschrieben. Solander nannte ihn *Sitodium*, Forster *Artocarpus*, Thunberg *Rademachera*. Forsters Name war der erste (?) und auch zugleich der beste, folglich wurde er von allen angenommen.

218. *Die Namen müssen nicht zu lang sein.*

Wenn der Name einer Gattung aus viel kleinen Wörtern zusammengesetzt ist, wird er zu lang und dem Gehör übeltönend. Einige Namen der ältern Kräuterkenner können hier zum Beweise dienen:

Calophyllodendron, Orbitochortus.

Cariotragematoden - Hypophyllocarpodendros,

Acrochordodendros, Stachyarpogophora.

Leuconarcissolirion, Myrobatindum.

(Es sind überdiess fast alle dreifache Zusammensetzungen. *Orbitochortus* wäre zu dulden. L.)

219. *Man muss keine Namen fremder Nationen, aber auch keine von europäischen nehmen, sondern wo möglich aus dem Griechischen zusammensetzen.*

Benennungen aus fremden Sprachen, wenn sie auch mit einer lateinischen Endigung versehen sind, klingen nie so gut, als griechische, und lassen sich auch nicht füglich zusammensetzen. Selbst Namen, die aus dem Lateinischen gemacht sind, haben nicht den Wohlklang; (? L.) noch weniger, wenn man sie aus dem Lateinischen und Griechischen zusammensetzt. Wenn es möglich ist, so muss man ihn aus zwei griechischen Wörtern machen, und eine lateini-

sche Endigung geben. Beispiele von fehlerhaften Namen sind:

aus den amerikanischen Sprachen:

Aberemoa,	Apeiha,	Apalotoa,
Bocoa,	Caraipa,	Cassipourea,
Conceveiba,	Coumarouna,	Faramca,
Guapira,	Heynassoli,	Icacorea,
Matayba,	Ocotea,	Pachira,
Paypayrola,	Quapoya,	Saouari,
Tocoyena,	Youacapona,	Vatoirea.

(Wenn diese Namen eine lateinische Endigung haben, so sind sie zu dulden. L.)

aus der malabarischen Sprache:

Manjapumeram,	Balam-pulli,
Cudu-Pariti,	Cumbuln.

aus der lateinischen Sprache:

Corona solis,	Crista galli,	Dens leonis,
Tuberosa,	Graminifolia,	Odorata.

(Diese Namen sind fehlerhaft, weil einige nicht einfach, andere adjectiva sind, die man nicht zu Gattungsnamen gebrauchen kann. Sonst sind lateinische Namen nicht zu tadeln, wie Betula, Quercus, Penicillium u. s. w. L.)

aus der deutschen Sprache:

Anblatum, Bovista, Beccabunga, Brunella.

aus der spanischen, italienischen, französischen, englischen und schwedischen Sprache:

Belladonna, Sarsaparilla, Galega, Orvala,
Amberhoi, Percepier, Crupina.

(Auch diese sind zu dulden, wenn sie eine lateinische Endigung haben. L.)

aus der griechischen und lateinischen Sprache zusammengesetzt:

Linagrostis, Cardamindum, Chrysanthemindum,
Sapindus, Calytriplex.

(Sie heissen voces hybridae und sind fehlerhafte Zusammensetzungen. Doch sind die aufgenommenen zu dulden. L.)

Solche Benennungen sind immer fehlerhaft, und dürfen, wenn auch gleich einige davon angenommen sind, nicht nachgeahmt werden.

Besser sind folgende Namen, und verdienen überall Nachahmung:

Glycyrrhiza von γλυκὺς süß und ῥίζα Wurzel,

Liriodendrum von λειριον lilienartig (Lilie. L.) und

δενδρον Baum,

Ophioxylon von ὄφις Schlange und ξύλον Holz,

Cephalanthus von κεφαλή Kopf und ἄνθος Blume,

Lithospermum von λίθος Stein und σπέρμα Same,

Leontodon von λέων Löwe und ὄδus Zahn,

Hippuris von ἵππος Pferd und ὄυα Schwanz.

Die griechischen Wörter müssen aber nicht fehlerhaft zusammengesetzt werden, z. B.

Aextoxicon statt Aegotoxicum. (Von αἶξ Ziege, Gen. αἰγός L.)

220. Man muss aber nicht Pflanzen mit dem Namen eines Thieres oder Minerals belegen.

Die Namen der Pflanzen müssen nicht mit Namen von Thieren oder Mineralien einerlei sein, sondern jede Gattung aller drei Reiche muss verschiedene Benennungen haben. Solche fehlerhafte Namen sind:

Taxus, Onagra, Elephas, Ampelis, Natrix, Delphinium, Ephemerum, Eruca, Locusta, Phalangium, Staphylinus, Granatum, Hyacinthus, Plumbago.

(Die beiden letzten Namen haben sich ein botanisches Bürgerrecht erworben, doch ist es allerdings richtig: dass man keine andern nach dieser Analogie bilden darf. L.)

221. *Namen, die von religiösen, himmlischen, moralischen, anatomischen, pathologischen, geographischen und andern Dingen hergenommen sind, müssen auch nicht angenommen werden.*

Wenn man eine Benennung wählt, welche auf irgend eine religiöse oder andere Sache Beziehung hat, die nicht unmittelbar verglichen werden kann, oder nicht jedermann bekannt ist, so tangt sie nichts.

(Warum nicht? Verba valent sicut nummi. Nur muss man nicht Pflanzen mit dem unveränderten Namen anderer Dinge benennen, denn ein Name soll nicht zwei ganz verschiedene Sachen bedeuten. L.)

Fehlerhafte Namen der Art sind:

Religiöse:

Pater noster,	Oculus Christi,
Morsus Diaboli,	Spina Christi,
Fuga Daemonum,	Palma Christi,
Calceus Mariae.	

(Hier liegt der Fehler darin, dass zwei Namen vorhanden sind, statt eines einzigen. Gestattet man für einen Gattungsnamen zwei Worte zu nehmen, so könnte man auch drei Worte nehmen, oder vier, oder eine ganze Rede. Diese sind also immer zu verwerfen. L.)

Poetische:

Ambrosia,	Cornucopiae,	Protea,
Narcissus,	Adonis,	Cerbera,
Circaea,	Phyllis,	Andromeda,
Gramen Parnassi,	Barba Jovis,	
Labium Veneris,	Umbilicus Veneris.	

(Die hier angeführten einfachen Namen haben sich ebenfalls in der Botanik das Bürgerrecht erworben, doch darf man keine andern danach machen. Cerbera und Circaea sind aber sehr gute Namen. L.)

Vom Standorte und Vaterlande:

Hortensia, China, Molucca, Ternatea.

(*Hortensia* ist zu dulden. Ternatea ist ein Beiwort und daher als Gattungswort nicht tauglich. China und Molucca taugen nichts; es sind unveränderte Namen der Länder. L.)

Moralische:

Impatiens, **Patientia**, **Concordia**.

Anatomische:

Clitoris, **Vulvaria**, **Priapus**, **Umbilicus**.

Pathologische:

Paralysis, **Sphacelus**, **Verruca**.

Oekonomische:

Candela, **Ferrum equinum**, **Serra**, **Bursa pastoris**.

(Die Namen, welche zugleich andere Dinge bedeuten, sind zu verwerfen, wie *Patientia*, *Serra* u. s. w. *Impatiens*, obgleich ein Adjectivum, hat's Bürgerrecht erhalten. Zusammengesetzte Namen, wie *Ferrum equinum*, schicken sich, wie schon oben erwähnt wurde, zu Gattungsamen nicht. L.)

222. *Die Namen der Gattungen müssen nach Ähnlichkeiten oder Eigenschaften gemacht werden, die aber nicht an einer Art, sondern an mehreren derselben Gattung zu finden sind.*

Wenn man die Namen nach dem wesentlichen Charakter der Gattungen oder von der Gestalt des Saamens, seiner Aehnlichkeit mit andern Pflanzen, oder überhaupt der Gestalt der Blume geben kann, so haben dergleichen den Vorzug, dass man sogleich einen Begriff von der Gestalt bekommt. Die Eigenschaften eines Gewächses und die Farbe geben keine gute Benennungen, doch muss man dazu bisweilen seine Zuucht nehmen. Wenn aber Gattungen Namen von sehr ungewissen Dingen, z. B. einem wolligen Blatte oder

Stengel, der nur einer einzigen Art zukommt, gegeben werden, so sind sie nicht empfehlungswerth.

(Es ist ein äusserst seltener Fall, dass eine Gattung durch ein Kennzeichen sich von allen andern unterscheidet, gewöhnlich ist der Charakter einer Gattung aus mehreren Kennzeichen zusammengesetzt, welche einzeln auch andern Gattungen kommen, nur in dieser Verbindung nicht. Will man also nach diesen Kennzeichen die Namen giebt, so passen sie nicht auf eine, sondern mehrere Gattungen, und geben daher einen sehr ungenauen Begriff, sobald man die Namen als bezeichnend ansieht. Oft muss auch der Charakter einer Gattung geändert werden, wenn neue Arten hinzukommen. Für Aehnlichkeiten giebt es keine Regel. Man muss die Namen als unbestimmt betrachten. L.)

Namen die nur nach einem Theile des Gewächses gemacht sind, und keine Nachahmung verdienen:

Cyanella, wegen der blauen Blume; es giebt 3 Arten mit gelben und weissen.

Argophyllum, wegen der filzigen weissen Blätter.
Gratiola, wegen der Güte der Arzneikräfte.

Samolus, von der Insel Samos, wo die Pflanze erst gefunden wurde.

223. *Namen, die sich auf oides, astrum, aster, des, ago, ella, ana endigen; muss man sorgfältig vermeiden.*

Man drückt sonst durch diese Endigungen Aehnlichkeiten der Pflanzen mit andern aus, und det dadurch zugleich einen Zweifel an. Ueberhaupt müssen solche Endigungen, da sie nicht einmal wohlklingend sind, vermieden werden. Zum Beispiel folgen folgende dienen:

Alsinoides,

Alsinella,

Lycoperdastrum,

Lycoperdoides,

Alsinastrium,	Juncago,
Alsinastroides,	Erucago,
Alsinastriiformis,	Portulacaria,
Anagalloides,	Breyniana,
Anagallastrum,	Ruyschiana,
	Clathroidastrum.

(Allerdings werden solche Namen wenig gebraucht, ungetrachtet sie sehr gut sind. Nur muss man adjectiva nicht nehmen, wie diejenigen, welche sich auf oides endigen. L.)

224. *Man muss auch gleichlautende Namen zu vermeiden suchen.*

Ein Namen kann bisweilen sehr gut sein, aber er hat den Fehler, dass er mit andern fast gleichklingt; dann muss er, um nicht durch Druckfehler oder unrichtliche Aussprache Verwirrung zu veranlassen, geändert werden. Solche Namen sind:

Conocarpus, Ambrosia, Gaura, Symphonia,
Conocarpus, Ambrosinia, Guarea, Siphonia.

(So ähnlich sind doch diese Namen nicht, und wenn die Gattungen nicht nahe stehen, ist keine Verwechselung zu befürchten. L.)

Eben so wenig darf man durch Versetzung der Buchstaben eines schon angenommenen Namens, also durch ein anagramma, einen neuen machen.

Mahernia von Hermannia,
Galphimia von Malpighia,
Parosela von Psoralea.

(Ist allerdings eine Spielerei. L.)

225. *Der Name einer Klasse oder Ordnung kann nie als Gattungsname gebraucht werden.*

Die Alten brannten öfters die Benennung ganzer Familien für einzelne Gattungen; dies macht aber, Willdenow's Grundriss. I Th.

dass Anfänger dadurch leicht irre geführt werde und man bisweilen nicht weiss, ob von einer Gattung oder Klasse die Rede ist. Solche Namen sind:

Lilium, Palma, Filix, Muscus, Fungus u. d. m.

226. *Die grösste Belohnung eines Botanikers ist die Benennung einer Gattung nach seinem Namen, und solche Namen muss man zu erhalten suchen. (?? L.)*

Kein Denkmal von Marmor oder in Erz gegraben ist so bleibend, als dieses. (?? L.) Es ist der einzige Weg, wie man das Andenken wahrer Botaniker oder Beförderer dieser Wissenschaft auch bei der späteren partheilosen Nachkommenschaft beständig erhalten kann.

Man muss aber den Namen des Botanikers nicht verändern, sondern unverändert beibehalten, und ihm eine schickliche lateinische Endigung geben, z. B.

Linnaea, Royenia, Thunbergia, Sparrmannia, Gleditschia, Halleria, Buxbaumia, Retzia u. m. d.

(Wenn aber die Namen so ausgesprochen werden, dass man sich damit nicht verständlich machen kann, z. B. Deschampsia, Goodyera? L.)

Wenn der Name des Botanikers schon eine lateinische Endigung hat, darf er nicht so bleiben, sondern muss eine schickliche Endigung erhalten. Daher sind folgende unveränderte Namen als Gattungsbenennungen fehlerhaft:

Laguna, Senra, Milla, Cosmos, Acosta, Galinsoga

Sie werden schicklicher heissen:

Lagunaea, Senraea, Millea, Cosmia, Acostaea, Galinsogaea.

Eben so ist es nicht gut den Vornamen des Botanikers mit hinein zu bringen, weil die Benennung dadurch ungewöhnlich lang wird, z. B.

Gomortega, von Gomez Ortega.

der Gewächse.

Auch dürfen nicht zwei Namen von Personen in eine Gattungsbenennung verknüpft werden.
z. B.

Carludovica.

227. Um die Arten besser kennen zu lernen, gab Linné jeder Pflanze noch ausser dem Gattungsnamen einen zweiten, welcher der Trivialname (§. 215.) genannt wird. Dadurch wird die Kenntniss der Gewächse ungemein erleichtert. Man muss bei Trivialnamen Folgendes bemerken:

228. *Ein Trivialname muss kurz, nicht wie der Gattungsname, also nie Substantiv, sondern immer Adjectiv sein.*

Die Trivialnamen haben die Absicht, dem Gedächtnisse zu Hülfe zu kommen: sind sie also, wie Gattungsnamen, zusammengesetzt, so entsprechen sie ihrem Zwecke nicht. Es ist auch widersinnig, einen Gattungsnamen, der eigentlich ein Substantiv ist, wieder mit einem Substantivo zusammenzustellen. Aus dieser Ursache sind die Benennungen:

Carex Drymeja,	Juncus Tenageja,
Carex Chordorhiza,	Scirpus Baeothryon,
Carex Heleonastes,	Lichen Aipolius u. m. d.

immer fehlerhaft. Der Trivialname soll ein Adjectiv sein, und wo möglich die Eigenheiten der Art ausdrücken. Besser sind daher die Benennungen:

Carex paniculata, Campanula patula.

Carex canescens, Campanula persicifolia u. s. w.

(Dass der Trivialname kein Substantiv sein soll, ist eine willkürliche Regel, vielmehr sind solche Namen allen andern vorzuziehen. Denn sie bleiben unverändert und bezeichnend, wenn auch die Gattungen verändert werden. L.)

229. *Die Gestalt, Bekleidung, und überhaupt das Unterscheidende geben, wenn es möglich ist, besten Trivialnamen.*

Wenn man das Unterscheidende, es bestehe worin es wolle, ganz kurz in ein Adjectivum zu menfassen kann; so verdient dergleichen Namen vielen andern den Vorzug. Es muss aber das Activ nie zu lang werden, auch niemals aus zwei Wörtern bestehn. Wenn sich aber der Trivialname nicht so ausdrücken lässt, dann nur nimmt man zu Eigenschaften, Standort und dergleichen Dingen seine Zuflucht.

230. *Die Farbe und das Vaterland geben unsichersten Trivialnamen.*

Man kann es niemals einer Pflanze ansehen, ob in diesem oder jenem Lande allein wächst, und nicht noch eine entdeckt werden könnte. Eben wenig weiss man, ob eine Pflanze in ihrer Farbe ständig sein wird. Solche Trivialnamen sind also niemals anzurathen. Linné hat ein *Polemonium coelestem*, es ändert aber mit weisser Blume ab. *Evonymus europaeus* ist nicht der einzige seiner Gattung in Europa; es giebt noch zwei, den *Evonymus verrucosus* und *latifolius*, die beide in Europa wachsen. Mehrere Beispiele könnte man hier anzeigen, die beweisen, dass solche Namen nicht viel taugen.

(Das Schlimmste ist, wenn Namen geändert werden, weil man sie nicht für passend hält. Dadurch ist eine grosse Namenverwirrung in der Botanik gekommen. L.)

231. Die Abarten, wenn sie von Wichtigkeit sind, muss der Botaniker kennen, sie durch ein

der Gewächse.

zweiten Namen anzeigen, und allezeit 1
schen Buchstaben bezeichnen. Die Haupt
sie abstammen, muss oben an stehn, z. B.

Der Kohl, *Brassica oleracea*.

grüner Kohl	—	—	<i>a. viridis.</i>
rother Kohl	—	—	<i>β. rubra.</i>
weisser Kohl	—	—	<i>γ. capitata.</i>
Wirsingkohl	—	—	<i>δ. sabauda.</i>
Blaukohl	—	—	<i>ε. laciniata.</i>
Blumaschkohl	—	—	<i>ζ. selenisia.</i>
Buschkohl	—	—	<i>η. saabellica.</i>
Blumenkohl	—	—	<i>θ. botrytis.</i>
Kohlrüben	—	—	<i>ι. napobrassica.</i>
Kohlrabi	—	—	<i>κ. gongylodes.</i>

Auf diese Art kann man mit wenigen Worten Gat-
tung, Art und Abart bezeichnen, wozu die alten Bo-
taniker ganze weitläufige Beschreibungen nöthig hat-
ten, die man nicht so leicht behalten konnte.

232. Der grosse Nutzen der Linnéischen Benen-
nungen ist einigen Botanikern nicht so einleuchtend
gewesen, deshalb haben sie darin einige Aenderungen
treffen wollen. Hieher gehören die Vorschläge, welche
Ehrhart und *Wolf* gethan haben. Ersterer hat, da
doch in der Natur keine eigentlichen Gattungen sind,
und sie nur durch den Scharfsinn der Botaniker auf-
gestellt werden, jeder Pflanze nur einen Namen geben
wollen, womit er in seinem *Phytophylacio* den An-
fang gemacht hat, z. B.

Polyglochin ist *Carex dioica*.

Psyllophora ist *Carex pulicaris*.

Ammorrhiza ist *Carex arenaria*.

Caricella ist *Carex capillaris*.

Limonaetes ist *Carex pallescens*.

Baeochortus ist *Carex humilis* u. s. w.

Die Kräuterkunde würde durch solche Namen sehr erschwert werden. Werden aber die Gewächse in Gattungen abgetheilt, so sind höchstens nur 2000 Gattungsnamen zu behalten: da nach des Herrn Ehrharts Vorschlag 30000 Gewächse, die bis jetzt bekannt sind, mit eigenen Namen versehen werden müssten. Welches menschliche Gedächtniss ist im Stande, alle diese Namen zu fassen? Nimmt man nun noch an, dass auf unserm Erdball, nach einer mässigen Berechnung, 80000 verschiedene Pflanzen sind, so sieht man leicht ein, dass die Idee gar nicht auszuführen ist.

Der Vorschlag des Herrn Wolf ist von ganz anderer Art. Er glaubt, es würde für die Kräuterkunde ungleich vortheilhafter sein, jede einzelne Verschiedenheit der Gewächse, die auf Figur der Blume, Staubfäden, Griffel, Frucht, Blätter, Wurzel, Stengel, Stützen, Blütenstand, Geruch, Farbe und Eigenschaften Bezug hätte, durch einen besondern Buchstaben anzuzeigen, dass man bei allen Gewächsen nur aus diesen Buchstaben den Namen zusammensetzen dürfe, um so gleich den ganzen Bau und die Eigenschaften desselben vor Augen zu haben. So scharfsinnig auch dieser Vorschlag ist, so wenig kann er angewandt werden. Es lässt sich leicht denken, welche barbarische Namen daraus entstehen müssen, und dass viele Consonanten dadurch gehäuft werden, die man nach gewissen Regeln aussprechen muss. Um sich nur einmal halb so viel Fertigkeit darin zu erwerben, würde ein halbes Menschenalter erfordert, und der Vorthheil, den man dadurch erlangen könnte, würde wahrlich nicht so gross sein.

(Einen ähnlichen Vorschlag that schon Adanson. L.)

Der Herr Regierungsrath Medicus thut den Vorschlag, noch ausser den beiden Namen einen Familiennamen hinzuzufügen. Jede Pflanze würde auf diese Art ihrer drei haben. Es kann auch dieser Vorschlag nicht angenommen werden: denn wozu soll man das Gedächtniss mit mehreren Namen beschweren, da man schon aus der Klasse und Ordnung weiss, mit welchen Gewächsen die Pflanze verwandt ist.

(Eher möchte man den dritten Namen für die Unter- oder Halbarten bestimmen. L.).

233. Der Trivialname einer Pflanze, da er in den meisten Fällen ein Adjectiv ist, muss sich mit einem kleinen Buchstaben anfangen, z. B.

<i>Rhus glabrum</i> ,	<i>Lythrum virgatum</i> ,
<i>Aster annuus</i> ,	<i>Euphorbia segetalis</i> ,
<i>Centaurea ovina</i> ,	<i>Asclepias tuberosa</i> u. s. w.

Auch die Trivialnamen, welche vom Vaterlande hergenommen sind, müssen klein geschrieben werden, z. B.

<i>Hieracium sabaudum</i> ,	<i>Cyperus maderaspatanus</i> ,
<i>Dianthus chinensis</i> ,	<i>Verbena bonariensis</i> ,
<i>Althaea narbonensis</i> ,	<i>Evonymus europaeus</i> u. s. w.

Nur dann wird der Trivialname gross geschrieben, wenn vormals die Pflanze diesen Namen als eine generische Benennung hatte, z. B.

<i>Rhus Cotinus</i> ,	<i>Lythrum Salicaria</i> ,
<i>Rhus Coriaria</i> ,	<i>Lythrum Hyssopifolia</i> ,
<i>Dianthus Armeria</i> , <i>Asclepias Vincetoxicum</i> u. d. m.	

Endlich wird der Trivialname auch gross geschrieben, wenn er das Andenken des Entdeckers der Pflanze erhalten soll, z. B.

<i>Hieracium Gmelini</i> ,	<i>Euphorbia Gerardiana</i> ,
<i>Hieracium Kalmii</i> ,	<i>Erica Sebana</i> u. s. w.

7. Namen der Gewächse.

vielen Namen, welche die Endigung auf oides
den klein geschrieben; es sei denn, dass
vorher zur Bezeichnung einer Gattung ge-
wäre, z. B.

anatanoides, *Caucalis daucoides*,
nosoides, *Prinula cortusoides* u. a. m.
ispiele, wo der in oides sich endigende
na gross geschrieben wird, können dienen:
ia *Tithymaloides*, *Reseda Sesamoides*,
u. m. c.

V. P h y s i o l o g i e.

234. **A**usser der Eintheilung in die drei Reiche der Natur (§. 2.) lassen sich die Naturalien füglich in zwei grosse Hauptklassen bringen, nemlich in unorganische und organische. Unorganische sind die, welche aus ungleichartigen Theilen chemisch oder mechanisch verbunden sind, und die durch eine Anhäufung von aussen, selbst auch dann, wenn sie etwas regelmässiges in ihrer Gestalt haben, gebildet werden. Organische hingegen heissen solche, die aus mehreren verschieden gebildeten Werkzeugen regelmässig zusammengesetzt sind, welche sich bei einer und derselben Art in allen Individuen im natürlichen und gesunden Zustand gleich geformt zeigen. Sie vergrössern sich von innen nach aussen, haben eine Bewegung ihrer Säfte, und bringen ihres gleichen hervor, so dass sie in der einmal begränzten Form immer wieder zum Vorschein kommen. Zu den organischen Körpern zählt man Thiere und Pflanzen. (Das organische Reich ist von dem unorganischen so sehr und in aller Rücksicht verschieden, dass man eine Menge zutreffender Kennzeichen angeben kann, von welchen auch einige hier genannt sind. Dass an dem organischen Körper alles, auch

die ganze Dauer selbst eine Periode hat, ist der bestimmtesten und die meisten Folgen sich ziehendes Kennzeichen. L.)

235. Die organischen Körper hängen in Hinsicht ihrer Verschiedenheit allein von der Materie Form ab. Bei aller Nachforschung sind diese letzten Punkte, welche uns, ehe wir sie in ihre Elemente zerlegen, auffallen. Die Lebenskraft oder Erregbarkeit ist die Empfänglichkeit organischer Körper für einen äussern Reiz; sie ist bloss Resultat Form und Mischung. Wirken die Elemente untermischt aus ihnen gemischten Stoffe auf die organischen Körper ein, welche, so lange ihre Form nicht verändert wird und durch die Einnahme und Ausgabe der Stoffe ihre Mischung nicht leidet, leben, das heisst Erregbarkeit haben, so nennen wir diese Einwirkung Reiz. Die Empfänglichkeit für denselben oder die Erregbarkeit, setzt durch ihn die Organe in Thätigkeit, wodurch die Lebensthätigkeit oder die Erregung vorgebracht wird. Mit der Zunahme und der Dauer des Reizes vermindert sich die Erregbarkeit, hört am Ende gänzlich auf. Also eben der Reiz, welcher die Erregbarkeit zur Lebensthätigkeit befördert, den Untergang des organischen Körpers mithin ist Leben in Thätigkeit gesetzte Erregbarkeit, wodurch ein beständiges Zersetzen und Verbinden der Stoffe, welche zur Mischung des organischen Körpers gehören, hervorgebracht wird. Durch das Leben werden die organischen Körper ausgebildet, verjüngt, unterhalten und die durch Zufall beschädigten Theile ergänzt. Das Assimilations-Vermögen, Bildungstrieb und die Reproduktionskraft sind nur Folgen des Lebens. So wie die Schnell

bei das Zusammenziehen nur Eigenschaften der Materie allein sind. Durch die Erregbarkeit geschehen im organischen Körper die Verbindungen der Stoffe nach andern Gesetzen, daher sie mit der fehlenden Erregbarkeit zerstört werden, das heisst: die Stoffe woraus die organischen Körper zusammengesetzt sind, verbinden sich, wenn die Erregbarkeit fehlt, nach den Regeln, welchen unorganische Körper unterworfen sind. (S. die Anmerk. zum folgenden §. L.)

236. Die *Schnellkraft* (elasticitas), welche der Materie der organischen Körper eigen ist, zeigt sich auch bei den Gewächsen, sowohl im lebenden als im toten Zustande. Man findet sie in der Holzfaser, in Wurzeln und andern Theilen oder Produkten der Pflanzen.

Das *Zusammenziehen* (contractilitas s. vis virtus) ist besonders der Holzfaser eigen. Bei der ökonomischen und technischen Benutzung desselben, ist das Ausdehnen und Schwinden des Holzes eine höchst lästige Eigenschaft, die nur durch eine eigene Behandlung desselben vernichtet werden kann. Die trocknen Stengel der *Anastatica hierochuntica*, welche man Rose von Jericho zu nennen pflegt, die Samenhülsen aller Arten *Mesembrianthemum*, von denen die grössern bei den Naturalienhändlern Blume von Candia heissen, die trocknen Kelche der *Carlina vulgaris*, verhalten sich wie das Holz, sie werden bei nasser Witterung ausgedehnt, und ziehen sich bei trockner zusammen. Eben so verhalten sich die Flechten und Moose, welche während dem Sommer vertrocknet zu sein scheinen, aber bei kühler, feuchter Witterung und im Herbst sich wieder ausdehnen und weiter wachsen.

Das Zusammenziehen der Holzfasern macht zu Hygrometern geschickt. Man nahm ehemals an, dass das Holz nur durch Ausdehnung der Zwischenräume der Holzfasern an Breite gewinnen könne, sobald Feuchtigkeit eindringt; Herr *de Luc* hat aber gezeigt, dass auch die Fasern selbst, ob wohl in sehr geringem Grade, sich der Länge nach ausdehnen und zusammenziehen, und will dabei die sonderbare Bemerkung gemacht haben, dass das Buchsbaumholz seine Fasern der Länge nach in der Feuchtigkeit verkürzt, bei trockner Atmosphäre aber verlängert. Die Verlängerung und Verkürzung der Breite soll sich aber wie alle übrige Holzarten verhalten. Er hat eine grosse Menge Hölzer in dieser Rücksicht untersucht, aber keins gefunden, was sich wie das Buchsbaums verhält.

(Das Zusammenziehen der Pflanzenfasern, oder vielmehr der Pflanzenzellen, geschieht durch das Verdunsten der in ihnen und zwischen ihnen enthaltenen Feuchtigkeit. Es ist also keine eigene Kraft, und der Gegenstand gehört gar nicht hieher. Doch wäre es nicht unwichtig zu untersuchen, wiefern das hygroskopische Zusammenziehen und Ausdehnen mit dem Baue der Pflanzen in Beziehung steht. L.)

Dass die Gewächse, als organische Körper, auch Empfindbarkeit haben, leidet keinen Zweifel, da ihr Fortwachsen, Ausbilden und Hinwelken davon viele Beweise abgiebt. Nur bei einigen wird an verschiedenen Theilen die Wirkung des angewendeten Reizes sichtbar.

Die Blätter der *Mimosa pudica*, *sensitiva*, *casta* der *Oxalis sensitiva*, *Smithia sensitiva*, *Dionaea Muscipula* und anderer unter den Wendezirkeln und Äquator wachsenden Pflanzen, ziehen sich beim Berühren zusammen. Minder sichtbar, aber doch zu erwe

ist die Reizbarkeit der Blätter bei den wunder-
n gebildeten Sonnenthauarten *Drosera rotundifolia*
1 *longifolia* unserer Gegend. Eben so verhalten
h die Staubfäden der *Urtica*, *Parietaria*, *Berberis* u.
der Stempel einiger Gewächse, besonders aber die
rbe der *Martynia Probooscidea*. Das Licht hat auch
son besondern Reiz auf die Vegetabilien, der durch
rsache sehr deutlich zu erweisen ist.

Ueber diesen Gegenstand wird unten geredet wer-
den. L.)

(Der Verf. hat in diesen beiden §. §. manche Dinge
einseitig und fehlerhaft vermengt. Da sie Gegen-
stände der allgemeinen Physiologie sind, so ge-
hört ihre Erörterung eigentlich nicht hieher. Be-
sonders ist es eine willkührliche Behauptung,
dass die Lebenskraft oder das Leben von Form und
Mischung abhängt, denn eben sowohl kann man
sagen, dass Form und Mischung vom Leben ab-
hängen. Leben ist Veränderung, also Bewegung
aus einem innern Princip, welche von Innen, nicht
von Aussen allein bestimmt wird. Die bloss phy-
sischen Bewegungen, z. B. die von der Anziehung
abhängigen, werden zwar durch ein inneres Prin-
cip hervorgebracht, aber durch das Aeusserere al-
lein bestimmt; die Richtung und Geschwindigkeit
womit sich ein gezogener Körper bewegt, hängt
allein von der Entfernung und Masse des anzie-
henden Körpers ab. Nicht so bei den lebendigen
Körpern. Ein Aeusseres ist nothwendig, ein Reiz
(stimulus), um die Lebensthätigkeit zur Aeusse-
rung zu bringen, sie in Bewegung zu setzen, aber
die Stärke dieser Bewegung rührt nicht von Masse
oder Näherung, sondern von der eigenthümlichen
Wirkung des Reizes auf den lebendigen Körper
her, so wie von der Empfänglichkeit des letztern
für den gegebenen Reiz. Daher hat der lebende
Körper Reizbarkeit (*irritabilitas* oder *incitabilitas*):
die Stärke der lebenden Bewegung steht
zwar mit der Stärke des Reizes in einem geraden
Verhältnisse; es entsteht direkte Schwäche, wenn
der Reiz zu schwach ist, aber nur bis zu einem
gewissen Grade, über denselben hinaus nimmt

die lebende Bewegung mit der Zunahme des Reizes ab; es entsteht indirekte Schwäche. Dieses ist das Gesetz des Lebens, welches J. Brown zuerst bestimmt und gründlich aufgestellt hat. Aber es betrifft nur das Quantitative des Lebens. Ausserdem hat noch das Leben eine qualitative Seite, eine zweckmässige Bewegung um bestimmte Formen hervorzubringen, einen Bildungstrieb, und zwar wo auch die bestimmte Form von Innen aus entwickelt oder erzeugt wird. So reiht sich das Leben den übrigen Naturerscheinungen an. (L.)

237. Die Naturforscher haben immer Aehnlichkeiten zwischen den Thieren und Pflanzen aufgesucht. *Aristoteles* nannte die Gewächse umgekehrte Thiere. *Linne* trieb dieses noch weiter, seine lebhaftere Phantasie führte ihn aber hierin zu weit, indem er die Wärme das Herz, und die Erde den Magen der Gewächse nannte, richtiger aber verglich er die Blätter derselben mit den Lungen der Thiere. Vergleichen der Art müssen aber immer hinken, da zwischen Thieren und Pflanzen die Form der Organe, aus denen sie zusammengesetzt sind, so sehr verschieden ist. Am glücklichsten war aber in diesem Punkte der unvergessliche *Bonnet*, der auf eine sehr scharfsinnige Art das Ei, die Leibesfrucht, die Ernährung und die Befruchtungsorgane der Thiere mit denen der Pflanzen verglichen hat. (? L.)

238. Die Aehnlichkeiten, welche die Naturforscher aufsuchten, bestanden grösstentheils in Eigenschaften, die organischen Körpern, ohne auf ihre Bildung zu sehn, zukommen. Die Unähnlichkeiten zwischen Thieren und Pflanzen verdienen daher wohl eine nähere Anzeige.

Die Thiere nehmen durch eine bestimmte Oeffnung Nahrung zu sich, und haben einen besondern Canal, durch den sie den Unrath abführen.

Pflanzen hingegen nehmen auf ihrer ganzen Fläche Nahrung ein und haben ausser der Auskleidung, welche sie mit den Thieren gemein haben, keinen bestimmten Canal zur Ausführung des Unraths, man müsste denn die Tropfen an den Wurzeln verschiedener wuchernden Pflanzen dahin zählen wollen, wovon unten mehr gesagt wird.

Die Pflanzen haben einen von den Thieren ganz verschiedenen Bau; sie bestehn aus Bündeln von Geweben, die sich mannigfaltig verbinden, und mit einem Bindegewebe umgeben sind. Muskeln und Nerven fehlen ihnen gänzlich. Das Holz, was einige mit den Knochen verglichen haben, hat nicht die geringste Elasticität mit denselben.

Sie bestehn aus der *Haut* (Epidermis s. Cutis), welche bei den holzartigen Gewächsen die *Rinde* (Cortex) überzieht. Sie bedeckt den *Bast* (Liber). Hierauf folgt der *Splint* (Alburnum) oder das sogenannte weiche Holz. In diesem ist eingeschlossen das *Mark* (Medulla).

Der Stengel der Kräuter hat keinen Splint, und kein Holz. (Die Theile sind allerdings da, nur nicht so hart, als in den Bäumen. L.) Das Mark fehlt zuweilen, besonders bei denen, die im Wasser wachsen. (Nur bei sehr wenigen Wassergewächsen. L.)

Die Thiere, wenn wir einige Würmer ausnehmen, sind einfache Geschöpfe, die meisten Pflanzen aber nicht; nur die Sommergewächse und Palmen sind einfache Gewächse, (auch diese nicht, denn sie haben Knospen, wie andere Gewächse, welche sich

nur gleich entwickeln. L.) die andern alle zusammengesetzt. Wenn das Samenkorn eines Sommergewächses (. 132. Nr. 8a.) in die Erde gelegt wird, so wächst daraus eine Pflanze auf, die sogleich blüht, Samen trägt, und dann abstirbt. Die Knospen der Bäume, Sträucher und Staudengewächse sind wie Sommergewächse zu betrachten, denn sobald sie blühen und Samen tragen, gehen sie gänzlich aus. Der Stamm der Bäume und Sträucher, so wie die Wurzel der Staudengewächse, haben eine grosse Menge von Knospen, die alle von dieser Beschaffenheit sind, sie können als ein Behältniss mehrerer Sommergewächse angesehen werden, und sind daher nicht einfache, sondern wie die Polypen des Thierreichs zusammengesetzte Geschöpfe. Unter der Rinde dieser Gewächse ist nach Beschaffenheit der Art, wie beim Wachstum näher bestimmt wird, die Anlage mehrerer Knospen vorhanden, die, sobald sie eine hinlängliche Quantität Nahrungssaft erhalten, sich entwickeln können. Aus diesem Grunde können die neu hervorgeschossenen Zweige der gekappten Weide nicht als reproducirte Theile angesehen werden.

239. Die chemische Zergliederung lehrt uns, dass die Bestandtheile der Vegetabilien von denen der Thiere sehr verschieden sind. *Kohlenstoff*, *Wasserstoff* und *Sauerstoff* sind die Substanzen, aus denen die Natur vorzüglich die Gewächse zusammengesetzt hat. Bei den Thieren findet sich der *Stickstoff* in allen Theilen derselben, ausgenommen im Fette. Hingegen wird er nur bei einigen Gewächsen und zwar in einzelnen Theilen derselben angetroffen.

Kickstoff ist nicht so gar selten im Pflanzenreiche. Man hat ihn in neuern Zeiten in manchen Stoffen gefunden. L.)

Kohlenstoff ist der Hauptbestandtheil der Vegetabilien, bei thierischen Körpern aber ist es der *Wasserstoff* (? L.) Darum liefern die Gewächse bei trockner *distillation* eine so grosse Menge kohlenengesäuertes, und hinterlassen viele schwarze Kohle.

Schwefel und **Phosphor**, die beide häufig (nämlich der Schwefelsäure und Phosphorsäure, sonst selten, L.) bei den Thieren anzutreffen sind, werden sparsam im Gewächsaereich bemerkt. Der Schwefel zeigt sich in der zersetzten und mit Wasser zergossenen Wurzel des *Rumex Patientia*. Der zu bereite *Spiritus* von *Cochlearia officinalis* hält geschwefeltes Wasserstoffgas. Phosphor und Schwefel zeigen sich beide bei den Gewächsen der zehnten Klasse (*Tetradynamia*), welche auch Stickstoff enthalten, auch finden sie sich im Samen der Getreidearten. Die Samen von *Sinapis alba* und *ticum aestivum* geben bei der Destillation Phosphor, und die Asche aller *Tetradynamisten* hat phosphorhaltige Kalkerde.

Kali fehlt fast keinem Gewächse, aber sie enthalten nach Verhältniss sehr wenig, nur die *Farrnkräuter* und *Erigeron canadense*, so wie die Früchte von *linga vulgaris* und *Aesculus Hippocastanum* sind züglich damit versehen. Am häufigsten findet es sich mit vegetabilischen Säuren verbunden.

Natrium haben nur die am Meeresstrande wachsenden Vegetabilien.

Kalkerde bleibt in der Asche der Gewächse zurück, sie war vorher mit vegetabilischen Säuren verbunden. Am häufigsten ist sie bei der *Chara tomentosa*. Willdenow's Grundriss. I Th.

tesa; Ein Pfund derselben giebt sechs Loth kohlensauren Kalk. Bei den Pilzen, z. B. *Peziza* und *Byssus*, soll keine Kalkerde anzutreffen sein!

Thonerde, *Kieselerde* und *Bittererde* sind weit sparsamer in den Gewächsen anzutreffen. Die erste kommt am seltensten vor; die Kieselerde ist in der Asche der meisten Gewächse, im Bambusrohr (*Bambusa arundinacea*) macht sie eine eigene Cocretion, besonders findet man sie bei den Gräsern, auch macht sie einen Bestandtheil der Pflanzenstoffe, z. B. beim Hanf und Flachs aus. In dem Holze der *Aulus glutinosa* und *Betula alba* scheint sie anzukommen, da dieses beim Drechseln öfter Funken sprüht. Bittererde ist bei weitem seltener als Kalkerde; einige Gewächse haben sie aber in nicht geringer Menge, z. B. *Salsola Soda* hat in einem Pfunde nahe fünf Quentchen völlig reine Bittererde.

Schwärze wollen einige bei den Gräsern gefunden haben:

Eisen, aber noch häufiger Braunstein, zeigt sich in der Asche fast aller Gewächse.

Das Gold was die Chemiker in der Asche von *Vitis vinifera*, *Quercus Robur*, *Carpinus Betulus*, und *Hedera Helix* gefunden haben, wurde erst durch das Blei, was zum Ausscheiden des Goldes gebraucht werden sollte, hineingebracht.

(Ganz kann dessen Gegenwart nicht gelängnet werden. Auch Kupfer kommt in den Pflanzen nach neueren Versuchen vor. L.)

Von den Neutral- und Mittelsalzen finden sich folgende im Gewächsreiche am häufigsten: *Schwefelsaures* und *Salzsaures Kali*, wie auch *Schwefelsaure Kalkerde*. Seltener trifft man: *Schwefelsaures Natrum*, z. B. *Tamarix gallica*, *Salzsaures Natrum* bei verschiedenen Seestrandspflanzen, und in *crystallinischer*

V. Physiologie.

323

sind aus den Blättern einer südamerikanischen
 Pflanze; *Salpetersaures Kali* bei *Borago officinalis*,
Elephantopus scaber, *Mesembrianthemum crystallinum*
 u. a. m.; *Achillea Millefolium*, *Fumaria officinalis*,
Scilla arvensis u. m. a.; *Salpetersaure Bittererde*
 v. Zon Mays.

(Hier sind nur die Verbindungen der sogenannten
 Mineralsäuren mit Basen genannt. Die Verbindun-
 gen der Pflanzensäuren sind ebenfalls hieher zu
 rechnen. Von diesen Säuren ist im folgenden §
 die Rede. L.)

240. Aus den eben angeführten entfernten che-
 mischen Bestandtheilen werden nach Verschiedenheit
 der Proportion und nach der Art der Mischung man-
 chmal Stoffe gebildet, welche man die *niederen Be-
 standtheile* der Vegetabilien nennt. Bis jetzt hat man
 folgende gefunden:

1) *Schleim*, eine geruch- und geschmacklose zer-
 fließliche (nicht immer L.) Substanz, die in kaltem
 und warmem Wasser auflösbar ist, und demselben
 seine Klebrigkeit mittheilt. Sie findet sich fast bei al-
 len Pflanzen, nur macht sie bei einigen den Hauptbe-
 standtheil aus, z. B. in den Wurzeln der *Althaea of-
 ficialis*, in den Stengeln des *Astragalus creticus* und
Rumex, in den Blättern der *Malva rotundifolia*, im
 Inneren der *Cydonia vulgaris* und der *Plantago Cynops*,
 in den Blumen des *Verbascum Thapsus* u. s. w. Aus
 der Rinde einiger Bäume schwitzt sie als Gummi
 aus, z. B. *Mimosa nilotica*, *Prunus domestica* und
Pinus.

(Gummi und Schleim sind noch zu unterscheiden.
 Jenes ist fest, durchsichtig oder durchscheinend,
 innerlich glänzend, muschlicht im Bruch. So das
 Gummi *Mimosae*, *Tragantgummi*; *Kirschgummi*
 u. a. machen eine besondere Substanz aus, die im

Wasser nur quillt und sich sehr wenig auflöst.
Der Schleim einiger Samen überzieht die Oberfläche derselben. L.)

2) *Zucker*, hat einen eigenthümlichen süßen Geschmack und löset sich im kalten und warmen Wasser, auch im (heissen L.) Weingeist auf. Er findet sich in sehr vielen Gewächsen, aber selten rein, fast immer mit Schleim, Extractivstoff, Säure oder säuerlichen Neutralsalzen vermischt. (Der eigentliche Zucker ist krystallisirbar, der Schleimzucker nicht. L.) Reinen Zucker geben: *Saccharum officinarum*, *Acer saccharinum*, *dasycarpum*.

Der Honig und die Manna sind in der Mischung vom Zucker wenig verschieden.

(Man theilt den Zucker in Rohrzucker, Traubenzucker und Mannazucker, wozu man noch den Schwammzucker rechnen kann. Der Traubenzucker löset sich weniger in Wasser auf, als der Rohrzucker und schmeckt daher auch nicht so süß. Der Mannazucker zeichnet sich dadurch aus, dass er nicht in Gährung geräth, und durch die Gährung nicht zerstört wird. Der Schwammzucker krystallisirt besonders leicht.

Zu dem Schleimzucker gehört als Art der Süßholzzucker, welcher durch Schwefelsäure aus den Auflösungen niedergeschlagen wird. L.)

3) *Vegetabilische Säuren* bestehen aus Kohlenstoff, Wasserstoff und Sauerstoff, und ihre Verschiedenheit rührt nur von dem abwechselnden Verhältnisse der Bestandtheile her. Es sind jetzo sechs Arten der Pflanzensäuren bekannt, nemlich:

a) *Weinsteinsäure* findet sich als säuerliches Neutralsalz mit Kali verbunden in den Früchten der *Vitis vinifera*, der *Tamarindus indica*, der *Berberis vulgaris*, des *Rhus typhinum*; im Kraute der *Melissa officinalis* und *Centaurea benedicta*, in den Wurzeln der *Ononis* u. m. a.

b) *Kleesäure* kommt wie die vorige mit Kali zum Theil verbunden als Sauerkleesalz bei verschiedenen Oxalis und Rumex Arten vor. Durch Kalkerde völlig neutralisiret, findet sie sich in sehr vielen Rinden und Wurzeln, besonders aber in beträchtlicher Menge im Rhabarber.

c) *Citronensäure* findet sich mit wenig Schleim verbunden in den Früchten von Citrus medica, Vaccinium Oxycoccus, Vitis Klaca und Prunus Padus. Mit Schleim und beinahe gleichen Theilen Apfelsäure trifft man sie bei Ribes Grossularia, Rubus Macra, Ribes rubrum, Vaccinium Myrtillus, Pyrus Aria, Prunus Cerasus, Fragaria vesca u. s. w.

d) *Apfelsäure* ist von den vorhergehenden darin unterschieden, dass sie sich nie in crystalinischer Gestalt darstellen lässt. Man findet sie nur als reine Säure, nie mit Kali verbunden. Gewöhnlich ist sie mit Citronensäure vergesellschaftet. Beinahe rein, nur mit Zucker und Schleim verbunden, enthalten sie die sauern Aepfel, die Früchte von Sambucus nigra, Prunus spinosa, Sorbus aucuparia und Prunus domestica. Sehr viel apfelsaure Kalkerde, nur mit einem Ueberschuss von Apfelsäure, enthält der Saft mehrerer Arten von Sedum, Sempervivum, Crassula und Mesembrianthemum.

e) *Benzoesäure* lässt sich ohne zerstört zu werden sublimiren. Man findet sie im Harze des Styrax Benzoin, im Balsam des Myroxylon peruiferum und Toluifera Balsamum, endlich in der Frucht der Vanilla aromatica, (im Zimmt u. s. w. L.).

f) *Gallussäure* hat die Eigenschaft das Eisen schwarz

niederzuschlagen, und findet sich mit Gerbestoff verbunden in allen adstringirenden Gewächsen.

(Essigsäure, welche nur sehr concentrirt Krystalle bildet, kommt ebenfalls rein in den Pflauzen vor. Ferner Bernsteinsäure, Chinasäure, Mekonsäure u. a. m., vorzüglich aber verdient die in vielen Vegetabilien vorkommende Gallertsäure hier einer Erwähnung. L.)

4) *Stärkmehl* verbindet sich nicht mit kaltem Wasser, nur mit kochendem, und macht damit den bekannten Kleister. Es ist ein Bestandtheil der Getreidearten, der knolligen und andern Wurzeln, z. B. Orchis, Arum, Jatropha Manihot, Solanum tuberosum, Bryonia alba und dioica, Paeonia officinalis u. s. w. Das Mark einiger Palmen ist reines Stärkmehl, z. B. der bekannte Sago von Caryota urens. Es findet sich auch in dem Samen einiger Gewächse, so wie bei vielen Flechten, z. B. Aesculus Hippocastanum, Amygdalus communis, Cetraria islandica, Baecomyces ruficarinus u. s. w.

(Salep macht schon den Uebergang zum Schleim, denn er quillt im kalten Wasser auf. Die Keimkörner der Kryptophyten, welche auch hier angeführt werden, sind verschieden. L.)

5) *Kleber* kommt selten im Pflanzenreiche vor, (nicht selten L.) er löset sich bei keiner Temperatur im Wasser auf, (auch nicht im Weingeist, L.) ist vor dem Austrocknen sehr klebrig, zähe und elastisch, wird beim Trocknen hornartig, und verbrennt auch mit eben dem Geruch, überhaupt da er Stickstoff enthält, nähert er sich den animalischen Stoffen. Man scheidet ihn aus dem Mehl des Weizens durch Auswaschen mit kaltem Wasser, (mit Eiweiss gemengt L.); ausserdem findet man ihn in den Säften der Buchen und Birken, und in der Holzfaser mehrerer Gewächse.

Ammonium oder flüchtiges Laugensalz, wird erst bei der chemischen Zerlegung aus Stickstoff und Wasserstoff in der Pflanze gebildet, und ist selten schon bei ihnen als solches anzutreffen.

6) **Meisestoff** löset sich (ungeronnen L.) nur im kalten (warmen L.) Wasser auf, (nicht im Weingeist L.) verhärtet sich durch kochendes Wasser und giebt wegen des Stickstoffs bei der Destillation flüchtiges Laugensalz. Man findet ihn in den mehligten Samen verschiedener Gewächse, bei den Tetradynamisten, in den Säften des Weisskohls, in der Wurzel der *Ulla maritima* u. m. a.

7) **Extractivstoff**, abgesondert von andern Bestandtheilen, worin er in den Pflanzen verbunden ist, stellt eine feste (oder dickflüssige L.) bittere und herbe (peckende (nicht immer L.) Substanz dar, die sich bei jeder Temperatur im Wasser und Weingeist auflöst. (Er löset sich immer in Wasser und Weingeist, er nicht im Aether auf. L.) Er zeichnet sich besonders durch seine grosse Verwandtschaft zum Sauerstoff aus, den er aus der Luft anzieht, und dadurch Wasser unauflöslich wird. Er findet sich in fast allen Pflanzen ohne Ausnahme, aber niemals rein, sondern mit Schleim, Zucker, Harz, Säure u. dgl. verbunden. Man hat ihn erst in den neueren Zeiten kennen gelernt, sonst wurde er fast immer mit dem Anzenschleim verwechselt, oder wenn er mit Sauerstoff verbunden, mithin im Wasser unauflöslich geworden war, für Harz gehalten. Der Name Seifenstoff, den man dieser Substanz zuweilen giebt, ist nicht passend, und giebt zu irrigen Begriffen Anlass.

8) **Gerbestoff** ist eine feste zerreibliche, braune (im ersten Zustande weisse L.) Substanz, von sehr zusammenziehendem Geschmack, die mit dem Extrac-

V. Physiologie.

stivstoff einige Aehnlichkeit hat, sich aber dadurch unterscheidet, dass er die thierische Gallerte in eine zähe im Wasser unauflösliche, der Fäulniss widerstehende Substanz verwandelt. Hierauf gründet sich die Eigenschaft der Gewächse, welche diesen Stoff enthalten, die gallertartige Haut der Thiere in unauflösliches Leder zu verwandeln. Es schlägt auch der Gerbestoff die in Säuren aufgelösete Metalle farbig nieder. Das Eisen schlägt er schwarz nieder, wodurch die bekannte Dinte entsteht. Man findet ihn immer (oft L.) mit der Gallussäure verbunden in sehr vielen Baumrinden, Hölzern, Wurzeln, in den Blättern einiger Gewächse und in den durch Insekten entstandenen Auswüchsen. Vorzüglich häufig ist er bei *Quercus Robur* und *pedunculata*, *Rhus typhinum*, in der Rinde von *Salix*, *Alnus*, *Fraxinus* und *Cinchona*, in der Fruchtschale der *Juglans regia*, in den Wurzeln von *Tormentilla*, *Potentilla*, *Fragaria*, *Polygonum bistorta* u. d. m.

(Man kann den Gerbestoff als eine Art des Extractivstoffes ansehen, und diesen in folgende drei Klassen theilen: 1) Saurer Extractivstoff. Er färbt oft Lackmustinctur roth und wird von Galläpfeltinctur nicht niedergeschlagen; er schlägt manche Metallauflösungen nieder, besonders die, welche Eisenoxyd enthalten. Hieher gehört der Gerbestoff, der bittere Stoff der *Quassia* und anderer bitterer Pflanzen, der Kaffeestoff u. a. m. 2) Indifferenten Extractivstoff. Er schlägt besonders nur das Bleioxyd aus der Essigsäure, oft nur aus den basischen Verbindungen nieder, z. B. der Färbestoff vieler Pflanzen. 3) Der basische Extractivstoff, welcher von der Galläpfeltinctur niedergeschlagen wird, wie der Extractiv der *Angustura*, der *Columbowurzel* u. a. m. L.)

9) *Fettes Oel* ist eine entzündliche geruch- und geschmacklose Flüssigkeit, die sich weder im Wasser

1) **Weingeist** (doch in sehr reinem L.) auflöst, mit wässrigem Leugensalze aber zur Seife, die im Wasser auflöslich ist, wird, und bei der Hitze des siedenden Wassers (nicht immer, oft nur in grösserer Hitze) sich zerstört. Es besteht vorzüglich aus Wasserstoff und Kohlenstoff, und findet sich fast ausschliessend in den Samen und Früchten der Gewächse, z. B. *Amygdalus communis*, *Juglans regia*, *Olea europaea*, *Ricinus communis*, *Linum usitatissimum* u. d. m. *Persea esculenta* ist das einzige bis jetzt bekannte Gewächs, dessen Wurzel ein fettes Oel giebt. (Doch auch es die Knollen L.)

2) **Wachs** ist ein durch Sauerstoff verdicktes Pflanzenöl. (?) Es zeigt sich in den Früchten (auch in den Blüthen L.) von *Laurus nobilis*, *Myrica cerifera*, *Myrica sebifera* (auf der Oberfläche der Stämme und Blätter als grauer Staub (*pruina*), L.) und in dem Blüthenstaub fast aller Gewächse; aus diesem bereiten die Bienen ihr Wachs,

(Es löst sich in heissem Weingeist auf, und fällt in der Kälte daraus nieder. L.)

3) **Harz** ist eine spröde feste Substanz, die nicht in Wasser, wohl aber im Oel (nicht immer aber im reinen L.) und Weingeist auflöslich ist, durch gelinde Wärme erweicht wird, (oft erst durch starke Hitze, z. B. an der Flamme des Lichts sich entzündet.) Man findet es bei sehr vielen Pflanzen, z. B. *Pinus sylvestris*, *Pinus niperus* u. s. w. Ist es mit ätherischem Oele verbunden, so nennt man es Balsam (auch Weichharz L.) Man will, dass man den Namen Balsam nur solchen Harzen geben soll, die Benzoösäure enthalten.

4) **Federharz**, *Cahutschouc* ist eine lederartige sehr elastische Materie, die weder im Wasser, noch in Weingeist, und nur im (reinsten L.) Aether auflöslich

ist. Sie kommt als ein Milchsaft aus dem Stamm der heissen Zone, z. B. *Siphonia Caluchua*, *Gomphora madagascariensis* u. a. Man findet das Fedorharz auch in den Beeren von *Viscum album*. Wahrscheinlich ist es ein Bestandtheil mehrerer sogenannten Gummiharze.

13) *Gummiharze, Schleimharze* sind kein bloss Gemische von Schleim oder Gummi und Harz, (sich dings und das folgende ist unrichtig L.) sondern von einer gemischten Natur und als eigenthümliche näher Bestandtheile der Gewächse zu betrachten. Sie quellen in Milchgestalt aus mehreren Gewächsen. Einige nähern sich der Natur des oxydirten Extractivstoffes, überdies enthalten sie Harz, Zucker, Schleim, Fedorharz und ätherisches Oel. Mehrere in den Apotheken sogenannte Gummiarten gehören hieher, z. B. *Opium foetida*, *Sagapenum*, *Ammoniacum*, *Galbanum* u. m. v.

14) *Ätherisches Oel* ist eine entzündliche flüchtige Flüssigkeit, die sich im Weingeist, zum Theil auch in Wasser auflöst, einen ausgezeichneten Geschmack und Geruch besitzt, und ohne zerstört zu werden, sich überdestilliren lässt. Man findet es in sehr vielen Gewächsen, und alle Theile desselben können es enthalten, als Wurzeln, Hölzer, Rinden, Blätter, Blumen und Früchte, doch enthalten letztere es meistens in der äussern Schale. Ob sie gleich in den wesentlichen Eigenschaften alle immer mit einander übereinkommen; so findet sich doch eine grosse Verschiedenheit bei denselben in der Farbe, Geruch, Geschmack, Consistenz und Schwere. Durch das Alter verdicken sie sich zu Harzen, indem sie sich mit dem Sauerstoff verbinden.

15) *Campher* ist eine feste zerreibliche sehr ent-

stachelige Substanz, von weisser Farbe, die einen ausgezeichneten Geruch und Geschmack besitzt, und sehr wichtig ist. Er findet sich besonders in allen Theilen der *Laurus Camphora*, so wie bei mehreren Arten dieser Gattung, z. B. *Laurus Cinnamomum* u. d. m. Einige ätherische Oele enthalten ihn ebenfalls, z. B. *Arundula Spica*, *Origanum Majorana*, *Salvia officinalis* u. a. m.

(Kampherähnlich ist auch der Stoff, welcher aus der *Anemone pratensis* sich mit Wasser überdestilliren lässt. L.)

16) *Scharfer Stoff*, er findet sich bei solchen Gewächsen, die im frischen Zustande Brennen im Munde Blasen auf der Haut machen, diese Eigenschaft durch das Trocknen verlieren. Z. B. *Scilla maritima*, *Arum maculatum*, *Helleborus niger*, *Chelidonium majus*, *Digitalis purpurea*, *Ranunculus* die meisten Arten u. a. w. Zuweilen ist er mit ätherischen Stoffen verbunden, z. B. *Cochlearia Armoracia*, *officinalis*, *Sinapis alba*, *nigra* u. a. m.

(Er ist in einigen Pflanzen ein Harz, z. B. *Piper*, in andern Extractivstoff, z. B. den angeführten nicht Schotengewächsen, oder ein ätherisches Oel, z. B. Schotengewächsen, oder ein alkalischer Stoff. L.)

17) *Betäubender Stoff*, man hält ihn für die Ursache der üblen Wirkung, die mehrere Pflanzen durch ihren Genuss auf das Gehirn äussern, indem sie das Empfindungs- und Bewegungsvermögen vermindern, in grössern Gaben Schlaf machen und endlich Schwindel, Betäubung und den Tod verursachen. Von der Art sind: *Papaver somniferum*, *Hyoscyamus niger*, *Datura Stramonium*, *Prunus Laurocerasus*, *Atropa Belladonna* u. m. a.

(Er ist zuweilen, wie im Opium ein Alkaloid, oft

nur ein basischer Extractivstoff, in *Prunus Lau-
rocerasus* Blausäure. L.)

Die beiden letztern Stoffe sind noch nicht hinlänglich untersucht und bestimmt.

18) *Holzfasern* (Faserstoff, L.), sie muss nothwendig als ein eigenthümlicher Bestandtheil der Gewächse betrachtet werden, da sie sich durch ihr chemisches Verhalten von allen andern unterscheidet. Sie löset sich in keinem Auflösungsmittel auf, hat keinen Geschmack und Geruch, und enthält ausser den drei nothwendigen Grundstoffen der Gewächse auch noch Stickstoff.

(Von einigen Pflanzen lässt er sich durch Kochen in Wasser auflösen, z. B. von den Kartoffeln. L.)

19) *Harziger Färbestoff* (Chlorophyll. L.) giebt den Pflanzen die grüne Farbe. Wasser wirkt nicht auf ihn, Alkalien und Säuren lösen ihn nicht auf, verändern aber seine Farbe in die braune. Concentrirte Schwefel- und Salpetersäure zerstören ihn gänzlich. Der Weingeist löset ihn auf und wird davon grün gefärbt, aber durch zugegossenes Wasser lässt er sich nicht fällen, nur durch Säuren und Alkalien wird er in unauflöslichen Flocken niedergeschlagen. Oele ziehen ihn aus dem Weingeist aus, und dem Lichte ausgesetzt verliert er seine Farbe. Er besteht aus Wachs und Kleber. (Gewiss nicht. L.)

Man nimmt auch noch in den Gewächsen einen eigenen *Färbestoff* an; allein die Eigenschaft einiger Pflanzen, den Zeugen eine bestimmte Farbe mitzutheilen, ist mehreren näheren Bestandtheilen der Vegetabilien gemein. Oft ist es reiner, öfter mit Sauerstoff verbundener Extractivstoff, zuweilen sind auch die färbenden Bestandtheile harziger Natur. Mehrere sehr bekannte Farben, als Indigo, Waid, Lakmus u. s. w. sind nicht näher Bestandtheile der Vegetabilien, aus denen sie gezogen werden, sondern wahre Kunstprodukte.

(Einige wichtige Klassen von Stoffen machen die *Alkaloide* aus. Sie schießen in Krystallen an, oder sind wenigstens krystallisch, weissen, lösen sich sehr schwer in Wasser und Weingeist auf, neutralisiren die Säuren, und haben oft sehr starke Wirkung auf den organischen Körper. Hierher gehört das Morphinum, Cinchonin und Chinin aus *China fusca* und *flava*, Strychnin aus *Strychnos Nux Vomica* u. s. w.

Es giebt aber auch solche krystallisirbare Stoffe in manchen Pflanzen, welche die Säuren nicht neutralisiren, sonst aber den vorigen sehr ähnlich sind. Dahin gehört Piperin, Parillin aus der *Saparilla* u. a. L.)

241. Durch die chemische Zergliederung, welche wir zwar mit den Bestandtheilen der Gewächse macht, aber nicht mit ihrem innern Bau, hierüber uns, nur die Anatomie belehren. Neue Untersuchungen von *Bernhardi*, *Mirbel*, *Treviranus*, *Sprengel*, *Rudolphi* und *Link* (*Moldenhawer*. L.) haben gezeigt, dass die Gewächse viel einfacher gebildet sind, als man bis dahin geglaubt hat. Die vielen Arten von Gefässen die in ihnen sind gesehn worden, lassen sich auf sehr wenige zurückbringen, da ihre Gestalt sehr veränderlich ist. Das Resultat mannigfaltiger und mühsamer Untersuchungen derselben ist folgendes:

(Die folgende Darstellung des Verf. ist meistens aus meinen Grundlehren der Anatomie und Physiologie der Pflanzen genommen, da der Verf. keine eigene Untersuchungen darüber hatte. Es werden also nur Zusätze zu machen sein, wo Missverständnisse Statt fanden, und wo neue Untersuchungen hinzu kamen und wo ich selbst meine Meinung änderte. L.)

Ein *Zellengewebe* (*Tela cellulosa*, *Contextus cellulosus* s. *Utriculi*) nimmt fast den ganzen innern Raum der Pflanze ein. Es besteht aus dünnen Häuten, die in geschlossene Fächer abgetheilt

sind. Die Form der Fächer oder Zellen ist bei einer und derselben Pflanze verschieden, so wie die Gröszen derselben. Jede Zelle ist gänzlich geschlossen und mit keinen sichtbaren Poren, selbst nicht bei der stärksten Vergrösserung versehn. Was man für Poren annahm, waren kleine Körner, die sich bei der chemischen Untersuchung entweder als Stärkmehl, oder Schleimkügelchen zeigten und wahrscheinlich zur Ernährung der Pflanze dienen.

(In einigen Pflanzen, z. B. *Cycas circinalis*, kommen Zellen mit scheinbar grossen Löchern vor. Es sind aber keine Löcher, sondern dünnere Stellen in den Wänden der Zellen. L.)

Die Scheidewände, so wie der obere und untere Boden der Zellen, sind einfache Häute, die bei den nächsten Zellen dieselbe Bestimmung haben. In einer und derselben Pflanze sieht man grosse und kleine mehr oder weniger eckige mit runden ohne alle feste Regel gemischt. An verschiedenen Gewächsen sieht man eine besondere Vertheilung der Zellen und kann daher folgende Arten des Zellengewebes unterscheiden:

A. *Regelmässiges Zellengewebe* (*Contextus cellularulosus stricte sic dictus*), die Zellen stehn alle in Reihen neben einander, sie sind gewöhnlich walzenförmig, vom Saftestrotzend sind sie fünf-sechseckig, konisch, fassförmig, seltener kugelförmig. Ihre Grundfläche macht mit den Seitenwänden bald einen rechten, bald aber auch einen schiefen Winkel. Es ist allen mit sichtbaren Blüten versehenen Gewächsen (*vegetabilia phaenogama*) die zur ersten bis 23sten Klasse des Linnéschen Systems gehören eigen. Unterarten davon sind:

1) *Das einfache Zellengewebe* (*contextus cell-*

als simplex), die Wände der Zellen sind aus andern Zellen geformt. Von diesem giebt es: das lockere Zellengewebe (*contextus cellularis laxus* s. *Parenchyma*), ist aus weitem Netz zusammengesetzt, deren Basis mit den Seitenflächen fast immer einen rechten Winkel macht und welche sich mit den Enden zusammen verbinden. L.) Man findet es in dem Marke der Stämme; es macht die Hauptmasse der meisten Wäachse aus.

Der Bast oder straffe Zellengewebe (*liber seu contextus cellulosus strictus vel fibrosus*), diese Art des Zellengewebes ist viel schwieriger zu erforschen, als die vorhergehende; man findet sie am deutlichsten in den Staubfäden der Wurzel und dem Baste, L.) weniger deutlich als im Blattnetze der Pflanzen, (in der Wurzel und im Baste) zu erkennen. Sie macht das netzartige Gewebe des Bastes (zum Theil L.) selbst aus; und findet sich mit im Holze. Die Zellen sind schmal, lang gezogen, an den Grundflächen niedrig, öfter sogar spitzig auslaufend, weniger regelmässig, bald sogar spitzig oval oder wohl gar fast sphärisch.

Die Zellen verbinden sich nicht mit den Grundflächen, sondern die Enden liegen neben einander. L.) Man kann auch die Fasergefäße (*vasa brevia, succosa*) rechnen. Sie sind einfach, sehr dünn, cylindrisch und legen sich mit den Enden eben einander. Dieses Umstandes wegen mag man sie zum Zellgewebe rechnen, wie Moldenower that, der Länge wegen hingegen zu den Gefäßen. L.)

Das zusammengesetzte Zellengewebe (*contextus cellulosus compositus*), findet sich bei den

Wassergewächsen, z. B. Nymphaea, Ceratophyllum, Cyperus, Scirpus, Sparganium, in den Blumensblättern von Cynoglossum linifolium, (u. a. m. L.) in den Samenkapseln der Anagallis und überhaupt nicht selten. Zuweilen fließt es in das einfache Faser. Es besteht aus Zellen, deren Seitenwände aus kleinen runden Zellen zusammengesetzt sind.

B. *Unregelmäßiges Zellengewebe* (Contextus cellulosus irregularis), dieses zeigt sich in sehr mannigfaltiger Form und ist den Gewächsen mit unsichtbaren Blüthen (vegetabilia cryptogama), besonders aber (allein L.) denen der letzten Ordnungen eigen und ist von allen am wenigsten gründlich untersucht, woran vorzüglich die Kleinheit desselben Schuld ist. Man unterscheidet:

1) *Das blasenförmige Gewebe* (contextus vacuolusus), ist dem lockern Zellengewebe ähnlich, aber die Zellen sind getrennt, jede Zelle hat mit der Haut der andern keine Gemeinschaft. Man sieht es in der Kruste der Lichenen und in ihren Häuten.

2) *Das faserige Gewebe* (contextus floccosus), es kommt dem Baste nahe, aber die Zellen sind getrennt. Man sieht es in der innern Substanz der Lichenen, und in den Pilzen, deren Grundlage es bildet.

3) *Das fadige Gewebe* (contextus filamentosus), es ist dem Baste noch ähnlicher, nur sind die Zellen entfernter. An den Tangarten wird man solches gewahr.

4) *Das häutige Gewebe* (contextus membranosus), besteht aus zarten Häuten, die den ganzen Körper ausmachen, z. B. bei den Conferven. Unsere Vergrößerungsgläser reichen nicht hin, uns den wahren innern Bau kennen zu lehren.

242. In dem Zellengewebe nimmt man noch besonders gestaltete Körper wahr, welche gewöhnlich *Spiralfasern* oder *Spiralgefäße* (*vasa spiralia*, *pneumato-chymifera*, *fistulae spirales*) genannt werden. Sie bestehen aus einem schmalen in der Mitte concaven Bande, der spiralförmig gedreht ist (Fig. 282.) und eine hohle Röhre durch seine Windungen umschreibt. Eigentlich kann man sie nicht Gefäße nennen, da eine offene Rinne spiralförmig laufend kaum diesen Namen verdient.

(Jetzt scheint mir doch Hedwigs Meinung die richtigere zu sein, dass nämlich dieses Band nicht eine hohle Rinne, oder eine dichte Faser, sondern eine wahre Höhle ist, welche Flüssigkeiten aufnimmt. L.)

Hedwig glaubt, dass der Raum mit einer zarten Haut bekleidet sei, die einen Kanal bildet. Die sorgfältigsten Nachforschungen zeigen aber, dass eine solche Haut nicht vorhanden ist.

(Der Verf. scheint hier die eben angeführte Behauptung Hedwigs, dass nämlich die gewundene Faser eine Röhre sei, mit der zu verwechseln, dass die Windungen selbst wiederum mit einer Haut verwachsen sind, welches allerdings oft richtig ist. Eine andere Beobachtung hat Moldenhawer gemacht. Die Spiralgefäße zeigen fast immer zarte Längsfasern, welche die Windungen mit einander verknüpfen, mit dem Alter stärker und sichtbarer werden und dem Ganzen ein netzförmiges Ansehen geben. An *Musa paradisiaca* ist dieses deutlich zu erkennen und zu sehen, dass sie nicht zum anhängenden Zellgewebe gehören. L.)

Ueberhaupt sind die Spiralfasern von mannigfaltiger Gestalt bei einer und derselben Pflanze und verändern sich auch mit dem zunehmenden Alter gar sehr. Man unterscheidet folgende Arten:

- 1) *Eigentliche Spiralgefäße* (*vasa spiralia*), wo

das Band bald eng, bald weitläufig gewunden ist. Oefter sind es doppelte (oder vielfache. L.) Bänder, die sich über einander (zugleich. L.) winden. Die Bänder lassen sich bei den meisten Gewächsen abwickeln, nur die Gräser haben diese Spiralgänge eng verwachsen, dass es nicht möglich ist sie zu trennen.

2) *Getüpfelte Gefässe* (*vasa punctata*), sind Spiralgefässe an denen das Band, welches sie bildet, öfter umgedreht ist und dicht gerollt erscheint, eben daher haben sie das Ansehn von Röhren die mit Punkten besetzt wären.

(Der Verf. hat hier die Sache unrichtig gefasst. Es sind Gefässe mit kleinen runden Erhabenheiten. Diese Erhabenheiten liegen in Reihen, und zeigen dadurch sowohl, als durch den Uebergang in die folgenden Gefässe, dass sie aus einer Verwachsung der Gänge der Spiralgefässe ursprünglich geformt sind. Es giebt aber auch solche Gefässe mit runden Oeffnungen, oder vielmehr dünneren Stellen, z. B. in den Tannen, wie Moldenhawer gezeigt hat. L.)

3) *Treppengänge* (*fistulae scalares*), sind Spiralgefässe, deren Band sich wie bei dem vorigen, gar nicht abrollen lässt, folglich ganz dicht gerollt ist und hin und wieder Löcher zu haben scheint, weil eben dieses Band an einigen Stellen umgeschlagen ist.

(Die Spiralgefässe verwandeln sich zuerst in Treppengänge, dann in punctirte Gefässe. Zu den Treppengängen rechnet man die Spiralgefässe, deren Windungen sich nicht abrollen lassen, dann durch die Spiralgefässe mit unterbrochenen Windungen, welche endlich ganz zu punctirten Gefässen werden. Eine Umdrehung des Bandes findet von Natur nicht Statt. L.)

4) *Ringgefässe* (*vasa annularia*) sind Spiralgefässe, die sehr entfernt gerollt sind und wo dieses Gefäss eben wegen der von einander getrennten Windungen Schleifen macht.

(Diese Darstellung ist unrichtig. Es sind vollkommene Ringe, die näher oder entfernter stehen. Sie scheinen erst dadurch gebildet zu sein, dass die Windungen von einander gerissen sind, und sich regelmässig zusammengefügt haben. L.)

Sie werden nur bei sehr rasch in die Höhe gedachsenen Pflanzen wahrgenommen.

5) Schnurförmige Gefässe (*vasa moniliformia*), auch Halsbandförmige Gefässe oder wurmförmige Körper genannt, sind getüpfelte Gefässe oder Treppengänge an einigen Stellen zusammengeschnürt, doch nicht verschlossen. Nur im höchsten Alter scheinen sich die zusammengeschnürten Stücke zu trennen. Ueberhaupt entstehen die schnurförmigen Gefässe später bei Veränderungen in den Pflanzen. L.)

Noch eine Veränderung der Spiralgefässe ist hier zu erwähnen, welche dadurch entsteht, dass die Spiralwindungen sich in zwei Aesten theilen und sich dann mit der obern oder untern Windung vereinigen. So entsteht oft mit Hilfe der Längsfasern in den alten Gefässen ein wahres Netz. L.)

Alle diese unterschiedenen Gefässe sind nicht von einander verschieden und keinesweges als besondere Arten anzusehn. Man sieht den allmählichen Uebergang des einen in das andere. Alle Spiralgefässe werden durch das Alter in Treppengänge verwandelt, ob es gleich nicht zu leugnen ist, dass man an jungen Pflanzen schon Treppengänge gesehen hat.

Ob die Spiralgefässe Flüssigkeit oder Luft führen, darüber sind die Meinungen sehr getheilt, und wenn es gleich scheint, dass durch sie die Säfte in die Höhe gehn, so ist die Sache noch bei weitem nicht entschieden. *Malpighi* hielt sie für Luftgefässe, vielleicht weil er eine Aehnlichkeit zwischen ihnen und den Tracheen der Insekten wahrnahm. *Moldenhawer* hält sie für Saftgefässe. *Mustel* wollte sie nicht Gefässe kennen, sondern sah sie nur für eine gedrehte Faser

an, durch die das Wachsthum befördert würde. *Hedwig* glaubte, dass sie Saft führen und der hohle Kanal, den sie umschreiben, mit einer Haut umgeben sei und Luft aufnehme.

(Diese Meinung scheint mir jetzt die wahrscheinlichste, wobei dann die Säfte in der Nähe der Luft, und nur durch eine zarte Membran davon getrennt, verändert werden, wie das Blut in den Lungen der Thiere. L.)

Das dergleichen Haut nicht anzutreffen ist, findet sich schon oben widerlegt. *Sprengel* ist *Mustels* Meinung, *Mirbel* der des *Moldenhawer*, *Bernhardi* sucht die Meinung des *Malpighi* zu beweisen.

Wenn man Zweige in verschiedenen gefärbte Flüssigkeiten stellt, so steigt diese in den concaven Höhlungen der Spiralgefässe aufwärts und macht ihre Windungen deutlich. Bis jetzo ist es aber noch nicht möglich gewesen ein Pigment zu finden, was ohne die Pflanze zu verletzen, fein genug wäre, durch Begiessen derselben von der Wurzel aufgenommen zu werden und in die Gefässe aufzusteigen. Einspritzungen mit Quecksilber geben uns keine reine Resultate. Das Quecksilber bahnt sich Wege die in der Natur nicht sind und man wird zu falschen Schlüssen verleitet.

243. Ausser den hier angeführten Theilen nimmt man in den Gewächsen keine andern Organe (die unten erwähnten eigenen Gefässe, so wie die zurückführenden oder lymphatischen Gefässe ausgenommen, L.) wahr, und wer unbefangen untersucht, wird bald merken, dass die abweichende Form des Zellengewebes und der Spiralgefässe täuschen und zur Annahme mehrerer Gefässe verleiten kann. Bemerkenswerth sind aber noch die *Spaltöffnungen* (stomata seu

ori) welche sich auf der Oberhaut der Pflanzen zeigen. Es sind längliche Spalten von ausserordentlicher Klarheit, die sich öffnen und schliessen. Sie sind in der Regel des Morgens offen und bei der heissen Mittagssonne geschlossen. Durch scharfe Dämpfe, so wie bei welken Pflanzen, schliessen sie sich. Man sieht sie an allen Theilen der Pflanze, welche der Luft ausgesetzt sind und welche eine grüne Farbe haben, häufiger auf der Unterfläche der Blätter als auf der obern. Sie fehlen den unter Wasser befindlichen Blättern, so wie der Fläche derselben, welche auf dem Wasser schwimmt. Blätter so umgedreht sind, haben auf der der Erde zugekehrten Seite mehrere Oeffnungen. Sie kommen den Pinus-Arten (keinesweges. L.) so wie den Algen, Moosen, Lichenen, Pilzen und verwandten Gewächsen. Der Kelch hat sie nur wenn er grün ist. Von der äussern Seite, den Blumenblättern fehlen sie, wenn diese vorher vom Kelche bedeckt waren, sie finden sich aber bei solchen, welche keinen Kelch haben ausserhalb an den Seiten welche in der Knospe der Luft ausgesetzt waren. An einigen Staubfäden auch am Pistill an grössern Früchten sieht man sie ebenfalls. Fig. 279. 280. 281. sind solche vorgestellt. Wenn man das Oberhäutchen abzieht, so sieht man diese Oeffnungen mit verschiedenen geformten Linien bezogen. Diese Linien hielt *Hedwig* für lymphatische Gefässe (vasa lymphatica). Nach genauerer Prüfung sind diese Linien nur der Abdruck des unter der Haut befindlichen Zellengewebes und keine für sich bestehende Gefässe.

(Sprengel hielt diese lymphatischen Gefässe, wie sie *Hedwig* nannte, für eine optische Täuschung; man sehe nämlich neben dem obern Rande der Zellenwand, auch den untern und so stelle sich

das Gefäß dar. Dieses will vermuthlich der V. sagen. Andere, und ich selbst glaubte, Hedwig sei durch Intercellulargänge getäuscht worden. Jetzt scheint mir Hedwig Recht zu haben, und es ist mir wahrscheinlich, dass diese Gefässe mit Hedwigs zurückführenden Gefässen, welche sich zwischen den Zellen überhaupt befinden, in Verbindung stehn. L.)

Die Spaltöffnungen stehn nicht immer auf der Mitte einer Zelle, sondern sind bald zur Seite, bald auch sogar zwischen zwei Zellen gestellt, so dass keine Weise eine regelmässige Vertheilung derselben zu bemerken ist. Von dieser Hautöffnung geht aber kein Kanal nach innen, so dass man Röhren, die derselben in Verbindung wären, antreffen könnte, endigt sich ohne alle weitere Vorrichtung in der geschlossenen Zelle. (S. oben. L.)

244. Das Zellengewebe lässt aber noch in der Pflanze Räume unbesetzt, die man zuweilen für Gefässe besonderer Art gehalten hat und welche hier angeführt werden müssen. Hierher gehören:

1) *Die Zellengänge* (ductus cellulares), die schmale Zwischenräume, welche an den Rändern der Zellen wahrgenommen werden und die man beim Durchschneiden derselben leicht bemerkt. Man nennt sie sonst zurückführende Gefässe (vasa reducuntia). Auf der Oberhaut drücken sie sich leicht ab, indem sie doppelte Linien der Zellen bilden, deren Abdruck auf den Figuren 279. 280. 281. zu sehn ist.

(Oft sind zwischen den Zellen keine Gefässe vorhanden, aber oft scheinen mir wahre Gefässe in den Zwischenräumen derselben sich zu befinden, auch sich mit einander zu verknüpfen oder anastomosiren. Hedwig erkannte sie schon und nannte sie vasa revehentia. Aber nach ihm hat niemand sie anerkannt. In den Moosen, in den

Bracteen mancher Pflanzen scheinen sie mir deutlich und sogar durch eine besondere Farbe ausgezeichnet. In dem schlaffen Zellgewebe sieht man sie auch deutlich und zwar zuweilen bündelförmig. L.)

2) *Die Behälter* (folliculi cellulares), verbreiten sich überall zwischen den Zellen, sie sind kleine Höhlungen, die an bestimmten Oertern, öfter sehr regelmässig gestellt vorkommen und übertreffen die Zellengänge meistens sehr an Grösse. Eigentlich sind sie besondere Aushöhlungen des Zellengewebes, worin sich ein besonderer, von den übrigen verschiedener Saft, absondert. In diesen Behältern ist bei dem Kadelhölzern der Harzsaft, bei den milchgebenden Pflanzen die Milch, in der Fruchtschale der Citronen u. s. w. das wohlriechende Oel, bei andern Gewächsen eine mehr oder weniger consistente Flüssigkeit enthalten.

(Mit diesem Saftbehälter hat der Verf. die eigenen Gefässe (vasa propria) verwechselt, welche einen Milchsafte in sehr vielen Pflanzen, oder auch einen gelben Saft, wie in *Chelidonium* und *Bocconia*, oder einen ungefärbten Saft, wie in *Zea Mays* u. a. führen. Es sind gegliederte Röhren, deren Glieder aus langgestreckten, aber in einander mündenden Zellen bestehen. Sie verästeln sich und anastomosiren mit einander häufiger in den Blättern, seltener in den Blattstielen, Zweigen und Stämmen. Sie liegen fast immer in Bündeln, sowohl um die Holzbündel und neben denselben im Holze, als auch in der Rinde und im Marke. Herr Prof. Schultz zu Berlin, hat zuerst eine Bewegung des Saftes so wahrgenommen, dass der Saft in einem Bündel vorwärts, in dem andern rückwärts fliesst, und durch die Anastomosen in den ersten Strom zurückkehrt. L.)

3) *Die Lücken* (lacunae seu tubuli), finden sich äusserst selten in jungen Pflanzen, sie werden erst, wenn sie mehr ausgebildet ist, durch die Aus-

dehnung des Stamms und Zurückweichen des Zellgewebes gebildet. Es sind (oft. L.) senkrecht durch den Stengel laufende Röhren, gewöhnlich ist es eine, die in der Mitte des Stiels vorkommt, z. B. *Scirpus palustris*. Bisweilen stehn mehrere solcher Röhren regelmässig vertheilt wie bei *Poa aquatica*, *Equisetum* und in den Blattstielen von *Canna*. An der letzteren sieht man in der Jugend die Stellen, wo die Röhren späterhin erscheinen mit einer grünen Materie angefüllt. Seltener ist die Röhre zierlich sternförmig (nämlich vermöge des nach allen Seiten getrennten und gesonderten Zellgewebes. L.) Die Lücken sind mit Luft gefüllt, die aber nach *Links* und *Rechts* von Untersuchungen von der atmosphärischen nicht verschieden ist.

245. *Die Drüsen (Glandulae)*, hat man bei den Gewächsen sich sehr stark zusammengesetzt gedacht, weil man sie in ihrer Bildung mit den thierischen Drüsen gleich geformt glaubte. Nicht alle Feuchtigkeiten, welche die Pflanzen absondern, werden aus Drüsen geschieden. *Link* unterscheidet wahre und unächte Drüsen. *Die wahren Drüsen (glandulae verae)*, bestehn aus runden angehäuften Zellen, die einen eigenthümlichen Saft absondern. In ihnen findet sich kein Spiralgefäß. Ob aber der Saft aus sie aussondern aus den Zellen oder aus den Zellengängen kommt, lässt sich schwer bestimmen. (Hier ist er immer in den Zellen. L.) Die gestielten Drüsen sind eben so zusammengesetzt, nur dass zuweilen bis in die Basis des Stiels ein Spiralgefäß dringt. *Die unächtigen Drüsen (glandulae spuriae)*, bestehn auch aus runden Zellen, die zwar einen besonders gefärbten Saft enthalten, aber ihn niemals ausschütten.

erwellen machen sie durchscheinende Punkte, wie bei *hypericum perforatum*, oder dunkle braune gelbe oder auch grüne Punkte an verschiedenen Pflanzentheilen, erwellen ragen sie hervor, wie an den Sägezähnen der *Isiden*, oder stehn erhaben in mannigfacher Gestalt, kugelig oder auch gestielt. Man muss sich aber sehr hüten nicht Haare, die an der Spitze kopfförmig sind oder eine abgesonderte zähe erhärtete Materie haben, für gestielte Drüsen zu halten. Den Uebergang von den unächtlichen Drüsen zu den *Warzen* (*verrucae*) sieht man sehr häufig, dass sich schwer ein Unterschied machen lässt.

Die dunkeln länglichen Körper in der Oberhaut der *Pinus*-Blätter, möchten vielleicht solche Drüsen, die mit einer krümeligen grünen Masse angefüllt sind, sein. Man hat sie für Spaltöffnungen angesehen, die aber nicht sind, ob sie gleich die Form zu haben scheinen.

(Es sind gewiss Spaltöffnungen, nur durch eine abgesonderte Materie verstopft; und wenn diese durch heisses Wasser abgesondert ist, deutlich zu erkennen. L.)

Der Honig oder süsse Saft der Blumen wird nicht immer durch Drüsen, sondern auch öfter, ohne besondere Vorrichtung, von dem Zellengewebe ausgeschieden.

246. Auf der Oberfläche der Pflanzen zeigen sich noch besondere Theile, die man theils zu den Gefässen rechnen wollte, theils für Produkte derselben ansah. Dahin gehören die Haare, die Borsten, der Reif, die Bläschen. Die Haare (§. 76.) rechnet *Schrank* zu den Nebengefässen (*vasa secundaria*) der Gewächse. Sie bestehn aus einer oder auch aus einer einfachen Reihe übereinander stehender Zellen.

Die Borsten (§. 76.) sind aus nebeneinander liegenden Zellen gebildet. Der Reif (§. 124.), welcher sich als ein feiner Staub auf den Früchten der Pflaumen, und der Weintraube, oder auch auf den Stengeln und Blättern mehrerer saftigen *Cacalia*-Arten und andern Gewächsen zeigt, ist eine abgesonderte Materie des Zellengewebes, die harziger (wachsartiger L.) Natur ist und sich fast wie Wachs verhält. Aehnlich, nur grösser sind die Körner, welche auf den Kelchen der Thymian-Arten, und auf den Blättern anderer gewürzhaften Pflanzen vorkommen (aber wirkliches Harz. L.) Auf den Früchten der *Myrica*-Arten sind auch ähnliche Absonderungen, die man als Wachs benützt. Die *Bläschen* (*papulae*), welche auf den *Mesembrianthemum*-Arten vorkommen, und wenn sie in grösserer Menge von ansehnlicher Grösse erscheinen, ihnen den Namen des Eiskrauts verschafft haben, sind nur eine Erweiterung der vom Saft strotzenden Zellen.

(Auch sind die Blumenblätter mit solchen erhabenen, aber sehr kleinen Bläschen bedeckt, und haben davon ihren Sammtglanz, eben so die Narben. L.)

Dass das Zellengewebe Harze und Balsame absondern kann, sieht man an den Knospen verschiedener Bäume, z. B. der Rosskastanien, der Pappeln u. m. a.

247. Das Zellengewebe ist ganz weiss von Farbe und nur allein bei den Farnkräutern findet es sich um die Gefässbündel von brauner Farbe (aber doch vom verdichteten Saft gefärbt. L.) Die Spiralgefässe sind stets weiss, und auch der Saft, den sie enthalten, scheint ungefärbt zu sein. Es fragt sich aber, wie entsteht das Zellengewebe? Sprengel glaubt, dass es aus den kleinen durchsichtigen Körnern, die

an darin, aber noch häufiger im Samen nicht, gebildet werde. *Link* aber zeigt, dass diese Körnchen loses Stärkmehl oder Schleim sind. In den Zwischenräumen wo in der Folge die einfachen Zellgänge erscheinen, bemerkt man in der jungen Pflanze eine zusammengedrückte Masse, die aus einem Gewirre von zarten Fasern öfter zu bestehen scheint, und diese dehnt sich daher wahrscheinlich beim fernern Wachsthum zu neuen Zellen aus. (? *L.*) Die Spiralgefäße, meint *Sprengel*, da sie später als das Zellgewebe erscheinen, müssen aus diesem gebildet werden. *Link* glaubt, dass sie zwischen den Zellen des lastes aus einer sich dort ergossenen Flüssigkeit, welche *Duhamel* mit dem Namen *cambium* belegt, entstehn. (? *L.*) Sie wachsen weiter durch Vergrößerung aus und zwischen ihnen entstehen neue. Uebrigens fehlen den Moosen, Lebermoosen und allen darauf folgenden Ordnungen der Cryptogamie (§. 152.) die Spiralgefäße gänzlich.

Die Säfte welche das Zellengewebe, die Zellgänge und Behälter enthalten, sind nach Verschiedenheit der Art sehr mannigfaltig. Sie sind:

Harzig bei vielen Nadelhölzern.

Gummigt bei den Fruchtbäumen und einigen *Acacia*-Arten.

Lymphatisch fast bei den meisten Gewächsen.

Eben so verschieden ist die Farbe der Säfte, nemlich:

Weiss bei *Euphorbia*, *Papaver*, *Leontodon*, *Ficus* l. s. w.

Gelb bei *Chelidonium*.

Roth bei *Rumex sanguineus*, *Dracaena Draco*, *Pterocarpus Santalinus*, *Calamus Draco*.

Blau an der Wurzel der *Pimpinella nigra*.

Grün bei einigen Doldengewächsen.

Farbenlos bei den meisten Pflanzen.

(Die bloss etwas schleimigen, mehr oder weniger süssen Säfte, welche der V. lymphatische nennt, scheinen in den Fasergefässen vorzüglich enthalten zu sein. In den Zellen finden sich besonders stark schleimige, gummiartige, süsse, saure, mit Extractivstoff versehene Säfte, auch fettes Oel mit Schleim verbunden, am häufigsten Grünstoff oder Chlorophyll. Aetherisches Oel und Harze sieht man in der Regel nur dann in den Zellen, wenn sie eine besondere Stellung, vielleicht Dicke, haben und Glandeln bilden. Gummiharze, auch Harze, kommen in den Behältern oder den eigenen Gefässen vor. Wachs liegt bloss auf der Oberfläche. L.)

Die Säfte, welche in den Früchten sich finden, sind wie bekannt von allen Farben. *Rafn* entdeckte in den Säften der Pflanzen viel Uebereinstimmendes mit dem Blute der Thiere. Er sah bei einer 135maligen Vergrösserung im Milchsaft der *Euphorbia palustris* runde Kügelchen, wie Blutkugeln, in einer etwas klareren, aber nicht wasserhellen Flüssigkeit schwimmen. Dasselbe sah schon *Fontana* im Saft des *Rhus Toxicodendrum*. *Rafn* sah aber bei der genannten *Euphorbia* ausser den Kügelchen noch Prismen, die sich bei *Euphorbia Peplus*, *Helioscopia*, *Esula*, *Cyparissias*, und *Lathyris*, obwohl mit einiger Verschiedenheit, zeigten. Ausser den Euphorbien sah er die Prismen bei keiner andern Pflanze, als bei der *Hura crepitans*. *Euphorbia canariensis*, *Caput Medusae*, *Clava*, *neriifolia*, hatten in einem Tropfen Milchsaft nur ein, höchstens zwei Prismen. Weingeist machte den Saft der Euphorbien gerinnend, und bildete viel fasriges Wesen; die concentrirte Schwefelsäure verwandelte ihn auch in Fasern, die aber nicht

so stark waren. Der Saft von *Chelidonium majus* bestand nur aus dicht aufeinander gepackten Kugeln. Die ungefärbten Pflanzensäfte, selbst diejenigen, welche ganz wässrig zu sein scheinen, zeigten ihm jene Kugeln. Zum Beweise, dass die Säfte einiger Pflanzen, namentlich der *Potentilla Anserina*, nicht wie *Flaub* glaubt, unausgearbeitetes und blosses Wasser sind. Bei den Pflanzen die weites Zellengewebe haben, z. B. *Musa paradisiaca*, *Strelizia reginae*, fand er die Kugeln kleiner und minder zahlreich als bei den *Euphorbien*.

Link fand, dass das Körnige des Safts der *Euphorbia* erst durch hinzugegebenes Wasser bemerkbar wird, und sah keine Aehnlichkeit zwischen dem Pflanzensaft und thierischem Blute.

(Deutlicher werden die Körner durch Hinzumischen von Wasser, ob aber dadurch erzeugt, zweifle ich jetzt, so wie an dem daraus gezogenen Schlusse. L.)

Die Prismen im Milchsaft der *Euphorbia* bemerkte er auch zuweilen, er traf aber diese Prismen häufig in der Wurzel der *Oenothera biennis* und untersuchte sie chemisch. Weder Wasser, noch Weingeist, auch selbst Alkalien wirkten nicht auf sie, die letztern im concentrirten Zustande griffen sie nur sehr wenig an. Salpetersäure war das eigentliche Auflösungsmittel derselben, worin sie sich ungemein schnell auflösen liessen. Uebrigens hatten sie keinen Geruch, Geschmack und Farbe.

Rudolphi machte die merkwürdige Entdeckung, dass in den grossen Zellen der *Nymphaea*-Arten, sternförmige Haare sind, deren Zweck noch nicht erforscht ist.

248. Nach diesen von den Anatomen des Pflanz-

zenreichs gemachten Entdeckungen im Allgemeinen, wird es am schicklichsten sein, die merkwürdigsten Verschiedenheiten, die sich bei den Vegetabilien von ihrer Entstehung aus dem Samen bis zum Tode finden, der Reihe nach durchzugehen, und die daraus bis jetzt gezogenen Folgerungen kurz zusammen zu fassen; damit die jährlich sich erneuernden Scenen des Lebens und Todes in ihrer mannigfaltigen Gestalt um so deutlicher werden.

249. Der Bau des Samens ist bereits (§. 123.) erklärt worden, und es ist bekannt, dass er mit dem thierischen Eie gleiche Bestimmung hat, das heisst, die Grundlagen eines neuen seinen Eltern völlig gleichen Geschöpfs enthält, was nur auf günstige Umstände seiner Entwicklung harrrt. Alle Gewächse pflanzen sich durch Samen fort, und man kann dreist mit *Harvey* ausrufen: omne vivum ex ovo. Es ist zwar nicht zu läugnen, dass sie noch nicht bei allen entdeckt sind, doch wo sie vormals hartnäckig geläugnet wurden, nemlich bei den Moosen, Flechten, und Pilzen hat der unermüdete Fleiss der Naturforscher ihr Dasein bei vielen erwiesen; so dass kein Zweifel übrig bleibt: man werde sie noch in der Folge bei denen, wo man sie jetzt nur ahndet, bemerken.

Nach ewigen und unwandelbaren Gesetzen der Natur sieht man, wie im Thierreiche, aus dem Samen immer dieselbe Art wieder entstehn, so dass nie ein anderes Gewächs daraus hervorsprossen kann, es mögen auch die Umstände bei dessen Keimen noch so verschieden sein. Der Entwurf des Keimes ist von der Natur eng begrenzt, und nichts ist im Stande hierin eine Umänderung der Theile hervorzubringen. Die-

be Form wird sich bis ins Unendliche erhalten und pflanzen.

Der Same hat seine Häute, Samenhappen und im (§. 123.). Ausserhalb sieht man an ihm, einen lers gefärbten oder doch besonders bezeichneten ick, der die Stelle bemerkbar macht, wo derselbe mals durch die Nabelschnur befestigt war, und iche man den Nabel (hilum auch umbilicus. L.) mt. Ausser dieser Narbe wird man noch eine klei- re gewahr, die *Twypin* entdeckte, welche die Stelle ichnet, wo während der Befruchtung ein eigener mal (ductus spermaticus) war, der die befruchtende esse in das Samenkorn führte. (Einen solchen Ka- t gibt es nicht. Die micropyle ist eigentlich eine e Öffnung in den Umgebungen des Samens. L.) e kleine Narbe wollen wir die *Befruchtungsnarbe* (atrix fructificationis) nennen. In ihrer abbarschaft liegt jederzeit der Keim. Wenn die men in einer Fruchthülle (§. 107.) verschlossen sind, ist die Befruchtungsnarbe in der Nähe des Nabels egen und folglich findet sich auch dort der Keim. an aber die Samen ohne Fruchthülle, also frei chsen (§. 106.), so trifft man den Nabel, da wo Same fest sitzt, und die Befruchtungsnarbe an der tze des Samens gerade an dem entgegengesetzten e desselben; in ihrer Nachbarschaft liegt auch der im, daher steht dieser dem Nabel gegenüber. Zum weise können hier alle Umbellen (§. 153. Nr. 45.) nen. An dem Samen der Gräser bemerkt man, ih- Feinheit wegen, keine Befruchtungsnarbe und ob gleich freien Samen tragen, so liegt doch unten in Gegend des Nabels der Keim, da man ihn der el nach dem Nabel gegenüber vermuthen sollte.

Der Grund davon ist folgender. Von den beiden Griffeln geht auf jeder Seite des Fruchtknotens längs dem Samen, der Befruchtungskanal bis zum Nabel und ist seiner grossen Kleinheit wegen bei dem reif gewordenen Samen nicht zu sehn.

Die Samensubstanz, welche den Keim umgiebt, ist von sehr verschiedener Konsistenz und Ansehn. Sie besteht bei dem noch unreifen Samen aus einem Zellengewebe, was ganz voller kleinen Körner gepackt ist. Diese Körner sind entweder Stärkmehl oder Schleim. Beim reifgewordenen Samen wird das Ganze hart. Macht man die Getreidekörner zu Mehl, so wird durch das blosse Knäten im Wasser sich das Stärkmehl auswaschen lassen, die zuckerartigen Bestandtheile lösen sich im Wasser auf und das Zellengewebe bleibt als Kleber zurück. Der Quittensamen, da dessen Zellengewebe mit Schleimkügelchen angefüllt ist, wird durch das Quetschen im Wasser denselben einen zähen Schleim mittheilen; anders sind diese Schleimkügelchen, welche noch Oel enthalten, bei der Mandel beschaffen, da sie das Wasser milchartig machen. Wenn die Samensubstanz grün ansieht, so sind die Zellen mit Körnern ausgefüllt, die den grünen harzigen Farbestoff mit Schleim enthalten. Absichtlich scheint die Natur diese kleinen Körner des Zellengewebes, deren Beschaffenheit sehr mannigfaltig ist, zur Ernährung des Keims bestimmt zu haben.

(Sowohl das Eiweiss (albumen), als die Kotyledonen und der Dotter, geben die Nahrung für den jungen Keim her. Oft fehlt einer oder der andere dieser Theile. Die Körner in den Zellen dieser Theile sind immer Stärkmehl, nie, so viel mir bekannt ist, Schleim, nur der Althaenschleim zeigt sich als Körner. Der Schleim der Quittensamen liegt als ein häutiger Ueberzug auf den Samen.

Die Zellenhaut ist nicht Kleber, sondern dieser findet sich in den Zellen. L.)

Wird nun das Samenkorn in die Erde gelegt, so dringt die Feuchtigkeit leicht durch diese beiden Oeffnungen in die Substanz desselben ein, die nöthige Wärme der Atmosphäre befördert dieses Eindringen noch mehr. (Nicht allein durch den Nabel, sondern auch durch die testa, wird die Feuchtigkeit eingesogen. L.) Die zwischen dem Zellengewebe liegenden Kügelchen werden aufgelöst, der Same beginnt dicker zu werden; die Häute desselben, so wie selbst das feinere Zellengewebe, fangen durch die Wärme an Gas auszuschleiden. Eine Eigenschaft, die die Oberhaut aller Pflanzen, so wie die Samenhäute und das Zellengewebe haben, wie der Genuss derselben auch durch die Erfahrung heweiset. (? L.)

Kohlensaures Gas, was in der Nähe des Nabels zwischen der äussern und innern Haut des Samens sich zu entfalten scheint, (? L.) wird auch zum Theil entnommen. Die aufgefangene Luft, welche der keimende Samen entbindet, bestand in 10 Kubikzoll, bald aus 2, bald aus 3, 5 bis 8 Kubikzoll kohlensaurem Gas und 6; bis 8 Kubikzoll Stick- und Wasserstoff-Gas vermischt. Sie gab diese Luft in der Berührung mit dem Sauerstoff der Atmosphäre bei der Entzündung einen Knall. (Immer verwandelt sich das Sauerstoffgas der Atmosphäre über dem keimenden Samen in Kohlensäure. Alle andern Gasentwickelungen sind zufällig. L.)

Die weicher gewordene Samensubstanz enthält eine Milch ähnliche Flüssigkeit, welche dem Keim zugeführt wird. Die Erregbarkeit des Keims wird durch diese gereizt und die Lebensthätigkeit des Keims beginnt. Ist die Samensubstanz von der Beschaffenheit Willdenow's Grundriss. 1 Th.

heit, dass sie über die Erde sich erhebt, und nachher in Blätter verwandelt wird, so hat sie auf ihrer Oberhaut auch schon die Spaltöffnungen (§. 243.). Uebrigens besteht Samensubstanz und Keim aus einem blossen Zellengewebe und nur der Theil des Keims, welcher über der Erde sich zu entfalten bestimmt ist, hat Spaltöffnungen. Von Spiralgefässen ist im Keim, ehe er nicht sich entwickelt hat, nichts zu bemerken.

Der Keim besteht wie bekannt (§. 123.) aus dem Schnäbelchen (rostellum) und dem Blattfederchen (plumula). Aus dem erstern entsteht die Wurzel, aus dem andern die Pflanze oder der Theil des Gewächses über der Erde. Schneidet man eine gekeimte Pflanze ganz senkrecht mit ihren Theilen durch, so dass sie in zwei gleiche Hälften getheilt ist, so wird man von der Mitte einer jeden Samenlappe nach dem Schnäbelchen zu, eine hohle Rinne gewahr, die man *Saftgang* (ductus chyliferus) nennt, welche bis zum Sitze des Schnäbelchens fortläuft, zwischen dem Marke desselben und dem Fleische sich befindet und am Ende das Mark umgiebt. Dieser Saftgang muss die nährenden Flüssigkeit, welche die Samenlappen enthalten, der jungen Pflanze zuführen. Er ist eigentlich eine Lücke (§. 241.), die durch die Erweiterung des Zellengewebes hervorgebracht wird, indem bei der Vergrösserung der Samensubstanz zu Samenlappen das Zellengewebe nach dem Mittelpunkt hin zurückweicht.

(Der Saftgang ist keinesweges immer vorhanden, und verdient den ihm gegebenen Namen nicht, sondern nur den ihm von dem Verf. richtig gegebenen einer Lücke. Werden die Säfte in erwachsenen Pflanzen durch feine Röhren geführt, so wird in der jungen wohl kein weiter Kanal dazu sein. L.)

V. Physiologie.

255

Die Erfahrung lehrt uns auch, dass keimende Pflanzen, wenn sie selbst schon etwas ihre Blätter entfaltet haben, die Samenlappen nicht ohne Schaden entbehren können, eben so wenig wie das junge Säugethier die nährenden Brust der Mutter.

Nach meinen Erfahrungen vertrocknet das Schnäbelchen der Pflanze, wenn man gleich nach dem Aufgehen des Samens beide Samenlappen abschneidet, und alles fernere Wachstum hört auf. *Fabroni* will aber gefunden haben, dass man den jungen Pflanzen ohne Schaden die Hälfte der Samenlappen nehmen kann; ja er hat sogar einigen sie ganz genommen und sie wuchsen doch fort. Wahrscheinlich machte er aber diesen Versuch bei solchen Pflanzen, wo das Blattfederchen schon beträchtlich vergrößert war. Nach *Hedwigs* Beobachtungen kann man das Blattfederchen weg schneiden, und an dessen Statt entwickeln sich zwei neue Triebe. Ob bei allen Gewächsen? daran zweifle ich sehr.

250. Ein merkwürdiges Phänomen des keimenden Samens ist, dass das Schnäbelchen zuerst sich verlängert, allemal in die Erde geht, und sobald dieses sich befestigt hat, kommt erst das Blattfederchen auf verschiedene Art (§. 252.) zum Vorschein. Legt man den Samen verkehrt in die Erde, so dass das Schnäbelchen nach der Oberfläche zugekehrt ist, so wird es doch nie nach oben wachsen. Es verlängert sich, geht demohngeachtet aber in die Erde und kehrt den Samen um, dass er in seine rechte Lage kommt. Diese Erfahrung, welche man täglich machen kann, und die bei der Schneidebohne *Phaseolus vulgaris*, bei der Saubohne *Vicia Faba* und andern Küchenkräutern am leichtesten zu sehn ist, hat die Aufmerksamkeit der Botaniker rege gemacht. *Percival* erklärt dies für Instinkt, und sucht dadurch zu beweisen,

dass die Pflanzen Empfindung und Bewusstsein haben. *Hedwig* giebt zwei Gründe an, wodurch er das Streben des Schnäbelchens nach unten erklären will, nemlich einmal würde durch die beiden Saftgänge der Saft in der Spitze des Schnäbelchens angehäuft und diese erhielte dadurch mehr Gewicht, dass sie dem Gesetzen der Schwere nachgeben müsste und in die Tiefe herabgesenkt würde, und zweitens würde die Feuchtigkeit in der Spitze dieses Schnäbelchens von der Feuchtigkeit der Erde angezogen. Beide Gründe scheinen mir aber nicht dieses Phänomen zu erklären, denn erstens sind Schwere und Anziehung eine und dieselbe Kraft, zweitens so ist in den Samenlappen bei weitem mehr Feuchtigkeit enthalten, sie haben auch ein grösseres absolutes Gewicht, und dennoch werden sie sobald das Schnäbelchen sich befestigt hat, öfters über die Erde hervorgebracht. Wir können diese sonderbare Erscheinung eben so wenig erklären, als wir bestimmt den Grund angeben können, warum verschiedene Raupen sich einspinnen, andere in die Erde gehn; sie bleibt uns eben so unbekannt, wie viele andere Dinge in der organischen Körperwelt. Das einzige womit wir unsere Unwissenheit zu verheelen suchen, ist, dass wir diese Erscheinung für Wirkung der Erregung oder Lebensthätigkeit erklären. *Percival's* Meinung ist ein übereilter Schluss, der weiter keine Aufmerksamkeit zu verdienen scheint.

(Wenn auch nicht von Empfindung und Bewusstsein die Rede seyn kann, so ist doch der Ausdruck Instinkt nicht zu tadeln. Merkwürdig sind *Knights* Versuche über die Richtung der Wurzeln, die er an einem schnell umlaufenden Rade angebracht hatte. Er beobachtete nämlich, dass der Stamm gegen den Mittelpunkt, die Wurzel aber gegen den Umfang zu wuchs. Bestimmter und überzeugender sind *Dutrochet's* Versuche; er liess Samen

auf einem Rade keimen, welches aber nicht in der Runde, sondern nach einer Seite durch Stößen in Bewegung gesetzt wurde und sah, dass der Stamm gegen die Richtung des Stosses, die Wurzel in der Richtung des Stosses wuchs. So wachse auch, meint er, die Wurzel in der Richtung der Schwere gegen den Mittelpunkt, der Stamm der Schwere entgegen. Aber da der Stamm nach einer bekannten Erfahrung gegen das Licht wächst, so konnte man wohl beide Erscheinungen mit einander vereinigen, und das Wachsen des Stammes nach oben, als ein Wachsen gegen die Richtung des Lichts erklären. Es ist kein Gegenstand, dass der Stamm beim Keimen auch im Dunkeln diese Richtung annimmt, denn am Tage blühende Pflanzen, öffnen ihre Blüthen auch im Dunkeln, wenigstens zuerst. In dem Wachsen der Wurzel nach unten zeigt sich die Polarität der Pflanze. L.)

51. Bemerkenswerth ist es, dass nicht die Sackpflanze mit einem Schnäbelchen versehen, sondern vielmehr gehören dahin einige Wassergewächse, nämlich die Wasserlinsen und vielleicht alle vom Doctor Martius genannte acotyledonea. Ich machte im Jahre 1806, so viel mir bekannt ist, diese Entdeckung zuerst, da ich die Wassernuss *Trapa natans*, eine der widerbarsten Pflanzen, genauer untersuchte. Die sogenannten Nüsse dieser Pflanze, wenn sie im Wasser, in dem natürlichen Standort der Pflanze liegen, treiben ein langes Blattfederchen, was in senkrechter Richtung der Oberfläche des Wassers zustrebt, an den Seiten haarförmige, ästige Blätter in grossen Intervallen treibt, von diesen Blättern neigen sich einige nach unten und wurzeln sich in den Boden fest. Es wurde also nicht durch eine besondere Wurzel, die als Schnäbelchen schon im Samen war, sondern durch die Litter die Befestigung der Pflanze im Boden gemacht, hier möchte es eben so schwer, wie beim Schnäbel-

chen zu bestimmen sein, warum einige der unteren Blätter sich herabsenken, und an ihren haarförmigen Spitzen Würzelchen treiben?

(S. den Zusatz zu §. 123. L.)

Man sieht aber hieraus, dass das Schnäbelchen einigen Samen enthehrlich ist, aber ein fruchtbarer Samen ohne Blattfederchen und Samenlappen ist gar nicht denkbar. Das Blattfederchen hat noch nie jemand bei irgend einem Samen zu läugnen gewagt, aber die Samenlappen leugneten *Linné*, *Gürtner*, *Jussieu* und viele andere Botaniker, vorzüglich bei den zur Cryptogamie (§. 149.) gehörigen Gewächsen. Nur *Jussieu* bringt mit *Gürtner* noch einige Gewächse zu seinen samenlappenlosen Pflanzen (acotyledones), denen das Schnäbelchen fehlt. Die Samenlappen hat die Natur dazu den Gewächsen gegeben, damit das junge Pflänzchen durch sie in seiner zarten Kindheit genährt werde. Mir ist noch kein Fall bekannt, wo ich diese Weise Vorkehrung der Natur nicht angetroffen hätte. Ich habe absichtlich alle solche, denen die Samenlappen fehlen sollten, untersucht, und sie immer gefunden. Dass man einigen Samen die Samenlappen gänzlich absprach, einigen nur einen, anderen zwei, und endlich verschiedenen mehr zueignet, kam daher, weil man theils nicht richtig beobachtete, theils etwas für Samenlappen hielt, was ein Theil des Blattfederchens ist. *Gürtner* nennt bei denjenigen Samen, wo das Blattfederchen nicht im trocknen Zustande deutlich zu bemerken ist, oder wo das Blattfederchen nur allein über der Erde kommt, die Samensubstanz *Eiweiss* (albumen). Wenn ihm aber bekannt war, dass die Samensubstanz über der Erde erscheint, und dasselbst in Blätter umgewandelt wird, nennt er sie Cotyledo-

nen, sprach ihnen aber das Eiweiss ab. We er ein Albumen annimmt, belegt er die Blattfederchen mit dem Namen der Cotyledonen. Erscheint die Masse des Samens ganz feste, so heisst sie bei ihm Eidotter (vitellus). Bei den Gräsern zeigt sich neben dem Blattfederchen eine kleine Schuppe, die im Keimen zu einer Scheide wird, diese hält er auch für Eidotter, nennt sie aber das *Schildchen* (scutellum). Bei der Gattung Pinus nimmt er Eiweiss an und nennt die Blattfederchen Cotyledonen.

Samensubstanz, Mutterkuchen, Samenlappen, Cotyledones (S. 123.) nenne ich die Masse im Samen, welche zur Ernährung des Keims bestimmt ist, sie ist immer gegenwärtig, sie mag weiss, gelb oder grün seyn, sich in Blätter über der Erde verwandeln oder unter derselben bleiben. Vergleicht man den keimenden und gekeimten Samen sorgfältig, so wird es leicht inne, dass bald die Samenlappen mit ihrem wahren Namen Cotyledonen, bald aber das Blattfederchen so fälschlich ist benannt worden. Es müssen daher die angenommenen Unterschiede von acotyledones mono-di-, und polycotyledones gänzlich wegfallen, so wie die von Gärtner eingeführten Ausdrücke semina albuminosa, exalbuminosa und vitellus.

Ausserst merkwürdig ist die Art des Keimens bei den Pinus-Arten. Die Cotyledonen sind in zwei Hälften, die an der Spitze zusammenhängen, getheilt; das Blattfederchen wächst mit drei, fünf bis neun in einem Stern nachher sich ausbreitenden Blättchen aus; die äussere Haut umschliesst den Samen dicht, besonders an der Spitze und sobald derselbe sich über der Erde befindet, fällt diese äussere Bedeckung mit den beiden in derselben befindlichen Cotyledonen ab, die bei Pinus pinea und Cembra dann noch sogar geniessbar sind. Das Blattfederchen steht wie ein Stern da und wer nicht genau darauf merkt, glaubt, dass

die Samenlappen sich in mehrere Blätter verwandelt haben. Auf ähnliche Art verhalten sich alle vormalis zu polycotyledones gerechnete Gewächse.

(Der Verf. würde grosse Verwirrungen gemacht haben durch seine Wortänderungen, wenn man ihm gefolgt wäre. Aber in diesem Stücke hat er keinen Beifall erhalten. Auch ist es nicht zu billigen an Gestalt und Verhalten verschiedene Theile, wie Samenlappen und Eiweiss und Dotter für einerlei zu erklären, weil sie eine gleiche Verrichtung haben. Und nun gar, wenn Eiweiss vorhanden ist, Theile, welche den Samenlappen in allen Stücken ähnlich sind zu trennen und für Blattfederchen zu halten! S. den Zusatz zu §. 123. L.)

252. Mir sind nur drei Verschiedenheiten welche die Samenlappen beim keimenden Samen zeigen bekannt. Entweder sind die Samenlappen in zwei Theile gespalten, oder sie hängen beide so fest zusammen, dass sie sich nicht trennen können. Im ersten Fall kommen sie aus der Erde zum Vorschein und bekommen das Ansehn von Blättern, diese nennen die Botaniker dicotyledones und dies ereignet sich bei den meisten Pflanzen; als ein gemeines Beispiel führe ich die Schneidebohne *Phaseolus vulgaris* an. Im zweiten Fall bleiben sie in der Erde und das Blattfederchen kommt nur heraus, z. B. bei den Wikken *Vicia sativa*, Erbsen *Pisum sativum*, bei allen Gräsern, Liliën u. s. w. Im dritten Fall werden die Samenlappen oder die beiden Hälften des Samens nicht getheilt, aber über die Erde hervorgeschoben und an ihrer Spitze entfaltet sich das Blattfederchen, z. B. *Juncus* u. s. w. Mehrere Verschiedenheiten habe ich nicht wahrnehmen können (§. 123.); und jeder kann sich leicht von der Wahrheit dieser Erfahrung überzeugen.

253. Ich habe fünf Hauptverschiedenheiten wie

Samenlappen sich verhalten bemerkt, diese nenne: *Hautkeime* (Dermoblastae), *Fadenkeime* (Nemoblastae), *Einschnittskeime* (Plexeoblastae), *lkeime* (Geoblastae) und *Kugelkeime* (Sphaeoblastae).

1) *Hautkeime* (Dermoblastae), heissen solche, die Samenlappen in Gestalt einer Haut, unregelmäßig zerreißen. Man trifft sie bei den Pilzen an, sie grösstentheils gleich nach der Entwicklung schwinden.

Niemand hat sie gesehen. Die Samen der Pilze und Algen keimen geradezu durch Verlängerung an beiden Enden. L.)

Hier fehlt es noch an zahlreichen Beobachtungen, besonders bei den kleinen Pilzen, und es mögen sich an diesen noch Verschiedenheiten zeigen, die sich zwar vermuthen lassen, wovon aber nichts Gewisses bekannt ist. Die meisten dahin gehörigen Gewächse sind so fein, dass man nur mit Mühe von ihrem Dasein und wesentlichen Unterschieden Nachricht haben kann, geschweige dass man schon jetzo dergleichen subtile Untersuchungen erwarten sollte.

2) *Fadenkeime* (Nemoblastae), diese zeigen h bei den Moosen, und mögen sich auch vielleicht in den Flechten finden, doch fehlt's bei den letztern Beobachtungen. Die Substanz der Samenlappen stösst sich bei ihnen in zwei Hälften und zerreisst in regelmässiger, fadenförmiger Gestalt.

Einige Jungermanniaarten keimen auf diese Art. Bei den Lichenen scheint es mir aber, als wenn das Federchen sich in einen flachen Lappen ausdehnte, die Samenlappen aber nicht sich trennen und hervorwachsen, sie würde also zu den Geoblastis gehören.

Die Moose keimen mit fadenförmigen, verästelten, confervenartigen Theilen allerdings, aber in den Samen hat diese Theile noch niemand beobachtet.

Die Samen der Lichenen keimen durch bloße Verlängerung. L.)

3) *Einschnittskeime* (Plexeoblastae), sind solche, wo die Samenlappen über der Erde in zwei Theilen zum Vorschein kommen und sich in Blätter verwandeln, die von den übrigen Blättern der Pflanz eine verschiedene Gestalt haben. Sie sind elliptisch bei der Gattung Phaseolus; linienförmig bei den Doldengewächsen und bei Plantago; herzförmig bei den Pflanzen der sechszehnten Linnéischen Klasse; umgekehrt herzförmig bei den Pflanzen der funfzehnten Linnéischen Klasse; nierenförmig bei den rachenförmigen Blumen; keilförmig und an der Spitze vielmal getheilt, bei der Linde u. s. w.

Die Farrnkräuter, welche ich öfter habe keimen sehn, gehören zu dieser Abtheilung, nur ist bei ihnen folgende Verschiedenheit, entweder theilen sich beide Samenlappen, und werden zwei Blättchen, oder sie theilen sich nur zur Hälfte, hängen unten noch zusammen und verwandeln sich in ein nierenförmiges Blättchen. Marchantia und Riccia scheinen sich wie Farrnkräuter zu verhalten.

(Die Farrnkräuter keimen mit Blättern, welche von den nachfolgenden sehr verschieden und gar nicht einer Marchantia gleichen. Aber von den wahren Samenblättern unterscheiden sie sich dadurch, dass eines nach dem andern hervorstößt, und welkt. Im Samen sind sie noch nicht zu sehen, wie die wahren Samenblätter. L.)

4) *Erckeime* (Geoblastae), heißen die, welche die Substanz der Samenlappen unter der Erde behalten, z. B. die Wicke, Erbse, Gräser, Lilien u. s. w. Diese sind zweierlei Art, nemlich:

a) *Wurzelkeime* (Rhizoblastae), wo der Same ein Schnäbelchen hat, und gleich Wurzel treibt, wie bei den meisten hieher gehörigen Gewächsen.

b) *Unwurzelkeime* (Arhizoblastae), wo dem

Samen das Schnäbelchen fehlt, wie verschiedene Wasserpflanzen und parasitische Gewächse.

(S. oben §. 251. L.)

5) *Kugelkeime* (*Sphaeroblastae*), heissen die, deren Samenlappen sich nicht spalten, sondern die in kugelförmiger Gestalt auf einem kleinen Stiel aus der Erde hervorkommen und an der Seite das Blattfederchen haben. Man sieht dieses bei *Juncus bufonius*, *subverticillatus* und einigen damit verwandten Gewächsen. Verschiedene Botaniker, denen diese sonderbare Art des Keimens unbekannt war, haben die angeführten Pflanzen nicht erkannt und für neue zur 24ten Linnéischen Klasse gehörige Gewächse gehalten. (Von diesen Gegenständen ist schon oben §. 123. geredet worden. Die Eintheilung des V. ist durchaus unrichtig. L.)

254. Es ist längst bekannt, dass jede Pflanze einen eigenen Boden liebt, daher keimen auch nicht die Samen in allen Erdarten, oder wenn sie auch in einem ihnen nicht zutrüglichen Boden aufgehen, so sterben sie doch gleich ab. Man hat viele Versuche gemacht in andern Stoffen, als die gewöhnlichen Erdarten sind, Pflanzen zum Keimen zu bringen. *Sukkow* liess in gepulvertem Flussspat und Schwerspat Salatpflanzen aufwachsen. *Bonnet* hat in Sägespänen, Papierspänen, Baumwolle, ja sogar in einem alten Buche Pflanzen wachsen lassen. Dass man auf einem wollenen Lappen Kresse, (*Lepidium sativum*) zum Keimen bringen kann, ist eine sehr bekannte Sache. Des Herrn *von Humboldt* gemachte Versuche, Samen in Metallkalken, besonders Mennig, Bleiglätte und Mastikot aufgehen zu lassen, sind ungleich belehrender. Auch in gestossener Kohle und Schwefel keimten die

Samen sehr gut. Er fand dass der Sauerstoff ein außerordentliches Reizmittel für die Pflanzen war, und dass sie ohne denselben nie zum Aufgehn kommen. Daher ging das Keimen in oxydirten Metallkalken so schnell vor sich, besonders aber war es im Mennig am auffallendsten. Hingegen in Oel, Kohlenstoff, Wasserstoff, Blei-Eisen- und Kupfer-Feilspänen, so wie in gepulvertem Bleiglanz, Alkalien, ging kein Same auf. Er fiel auf den Gedanken, den Sauerstoff, als ein Reizmittel den Samen zum schnelleren Keimen zu zwingen, anzubringen, und fand, dass in einer Temperatur von 20 Graden Reaumur in oxydirter Kochsalzsäure alle Samen schneller keimten. Nur ein Beispiell statt mehrerer. Die Samen der Kresse (*Lepidium sativum*) keimten nach Verlauf von 6 bis 7 Stunden in oxydirter Kochsalzsäure, wenn sie aber in gewöhnlichem Wasser lagen, so geschah dieses erst nach 36 bis 38 Stunden. In einem Schreiben vom Februar 1798 an mich, meldet er mir, dass man in Wien von dieser Entdeckung vielen Nutzen gezogen habe, und dass 29 bis 30 jährige Samen von den Bahamischen Inseln und Madagascar, deren Keimkraft oft vergeblich ist geprüft worden, durch diesen Weg zum Aufgehn sind gebracht worden, und dass die davon gezogenen Pflanzen gut fortwachsen. *Mimosa scandens*, die noch in keinem botanischen Garten keimte, ist gut aufgegangen. Da aber nicht jeder Gärtner sich oxydirte Kochsalzsäure machen kann, so hat Herr von Humboldt eine leichtere Methode gewählt, durch die man sie ohne Schwierigkeit gleich erhält. Man nimmt einen Kubikzoll Wasser, einen Theelöffel gemeine Kochsalzsäure, zwei Theelöffel Braunsteinkalk, mischt dieses zusammen, wirft die

Wasser kochen, und lässt alles in einer Wärme von 16 bis 20 Graden *Reaumur* digeriren. Die Samen keimen darin ganz vortreflich, nur versteht es sich von selbst, dass man sie sobald der Keim erscheint aus der Feuchtigkeit nehmen muss. Dass der Same nicht durch die Kochsalzsäure leidet, beweisen die zahlreichen Samen unter der Aufsicht des Herrn von *Jacquin* gezogenen Pflanzen, welche alle ganz vortreflich vegetirten, da doch verschiedene als Samen in oxydirtter Kochsalzsäure gelegen haben.

Man sind alte Samen am besten gekernt, wenn man sie zwischen einem wollenen Lappen auf ein warmes Mistbeet legte, und diesen mit oxydirtter Kochsalzsäure befeuchtete.

Im botanischen Garten ist das Einweichen der Samen in oxydirtter Salzsäure, welche man von den Apotheken erhalten kann, seitdem üblich, und geschieht mit Nutzen. L.)

Man kann keimen Samen die schon alt sind oder gewöhnlich zwei Jahre und länger liegen, wenn sie 24 Stunden in schwachem Essig geweicht werden.

Der Sauerstoff in der atmosphärischen Luft ist es, der die Samen zum Keimen reizt und daher lässt es sich erklären, dass sie nach des Herrn Direktor *Achard* Versuchen in comprimirter Luft viel schneller wie in gewöhnlicher zum Keimen gebracht werden.

Ausser dem Sauerstoff reizt auch aufgelöster Salzmist die Samen sehr zu keimen. Aus diesem Grunde ist zu erklären, dass sie im Miste sogleich aufgehen und er als ein Düngungsmittel dient, denn im Kuhmist sind Kochsalzsäure und Ammoniak enthalten. In Flüssigkeiten die keinen Sauerstoff enthalten, geht der Same nie auf, daher wird er nicht im Oel, welches

aus Wasserstoff und Kohlenstoff besteht, zum Keimen gebracht.

(Nur macht Schwefel (wohl ausgewaschener) eine Ausnahme, indem die Samen darin schneller keimen, als in gewöhnlicher Gartenerde. L.)

255. Das *Schnäbelchen* des Samens ist es, welches denjenigen Theil der sich unter der Erde befindet hervorbringt, den man gewöhnlich den abwärtssteigenden Stock oder die Wurzel (§. 10.) nennt. Mehrere Botaniker wollen aber nur denjenigen Theil einer Pflanze mit dem Namen der Wurzel belegen, der ihr die Nahrung aus der Erde zuführt, und Wurzelhaare (*radicula* §. 11.) heisst. Bemerkenswerth ist es, dass das Schnäbelchen bei den Gewächsen, welche Zwiebeln haben, sich in die Zwiebel; bei einigen, die einen mittlern Stock (§. 13.) haben, in solchen verwandelt wird, z. B. Cyclamen; endlich so vergeht bei einigen Gewächsen bald nach dem Hervorkeimen das Schnäbelchen und die wahre Wurzel entwickelt sich zur Seite. In den meisten Fällen wird aber das Schnäbelchen der abwärtssteigende Stock selbst.

(Ueber den Unterschied von Exorhizen und Endorhizen s. §. 123. L.)

Bei den Staudengewächsen besteht der abwärtssteigende Stock aus einer Zwiebel, Knolle, aus Wurzelfasern oder einem Wurzelstock (§. 11.) Bei den Sommergewächsen aus einem gewöhnlich wenig zertheilten Stock oder aus Wurzelfasern; bei den Sträuchern und Bäumen aus einem fast wie der Stamm zertheilten Wurzelstock, und an dem der Forstmann wie bereits oben (§. 12.) ist bemerkt worden, zwei besondere Theile unterscheidet, nemlich den starken senkrecht herabgehenden Theil, den er *Herz-* oder *Pfal-*

Wurzel nennt, und die Theile, welche horizontal unter der Dammerde fortlaufen, denen er den Namen *Stammwurzeln* giebt.

(Genauere Bestimmungen sind oben gegeben worden. L.)

Ueberhaupt hat der abwärtssteigende Stock stets eine Neigung in die Erde zu steigen, nur ist seine Richtung nach Verschiedenheit der Pflanze nicht immer dieselbe, da er bald senkrecht, bald wagerecht, bald aber auch schief geht. Findet die senkrechte Wurzel ein Hinderniss abwärts zu gehn, so steigt sie entweder über den Gegenstand fort und folgt dann ihrer natürlichen Richtung oder geht um denselben herum.

256. Alle Verästelungen der Gefässe, welche *Anastomosis* nennt, zeigt sich bei den Vegetabilien ganz anders, als bei den Thieren. Bündel von Gefässen theilen sich in kleinere und legen sich nicht an andern zu neuen Bündeln auf die mannigfaltigste Weise zusammen, so dass niemals wahre Äeste, sondern immer nur geradeaus laufende Gefässe wahrgenommen werden. So verhält sich die Wurzel und eben so der Theil über der Erde.

257. Die Wurzel hat kein Mark, keine Rinde und der äussern Haut fehlen die Spaltöffnungen, nur wenn sie alt wird, dringt Mark ein, läuft aber gleich spitz zu und endiget sich nicht in der Spitze, sondern hört weit vor derselben auf. Eine Ausnahme macht die *Balsamine* (*Impatiens Balsamina*) an der *Bernhardi* das Mark ganz durchlaufend fand.

(Rinde kann man sehr wohl das umgebende Zellgewebe nennen. In die Wurzeln der Bäume dringt Mark tief ein. L.)

Die Wurzel besteht aus Haut, Parenchyma oder regelmäßigem Zellengewebe, Bast und Holz. Das Holz wird aus den Spiralgefässen (und Bast. L.) gebildet, die mit dem fortschreitenden Alter in Treppengänge und punktirte Gefässe verwandelt werden, und es nimmt stets den Mittelpunkt ein, daher bleibt bei gemessbaren Wurzeln, wenn sie weich gekocht werden, in der Mitte dasselbe, als eine starke Faser zurück. Der Bast umgiebt das Holz, (Bast und Spiralgefässe zusammen, machen Holz. L.) er aber wird vom Parenchyma eingeschlossen. So zeigt sie sich in den jährigen Gewächsen, bei den zweijährigen schiebt sich ein neuer Gefässbündel in die Mitte ein, welcher vom Bast und Parenchyma umschlossen ist. Das Parenchyma selbst dringt in den Bast ein. Die Wurzel, welche viel Jahre besteht, so wie die der Bäume und Sträucher, legt jährlich einen neuen Ring von Gefässen an, der aber nicht ausserhalb, sondern in der Mitte erzeugt wird und die äussern Ringe ausdehnt. Das Parenchyma dringt zwischen die Kreise von der Peripherie nach dem Mittelpunkt zu ein und macht dadurch divergirende Strahlen, die sich beim Querschnitt zeigen und Spiegelfasern genannt werden. Die concentrisch liegenden Ringe von Gefässen geben sehr leicht das Alter der Wurzel an. In hohem Alter dringt, eben weil die neue Anlage von Gefässen in der Mitte geschieht, das Mark ein oder sie wird hohl, wie besonders dieses einige knollige Wurzeln deutlich zeigen.

(Nur an den zweijährigen habe ich bemerkt, dass ein neuer Ring im Innern um das Mark entsteht, an den Sträuchern und Bäumen tritt erst Mark in die Wurzel, dann legen sich Holzringe an, wie im Stamme. L.)

Bei der rothen Rübe (*Beta vulgaris*), welche nur zwei Jahre alt wird, zeigen sich gleich im ersten Sommer concentrische Ringe, die aber nicht von Holz- oder Gefässringen, wie bei den mehrere Jahre lebenden Wurzeln gebildet werden, sondern durch abwechselnde Schichten von dichtem und lockerem Parenchyma entstehen. Bei den Wasserpflanzen wird das Holz der Wurzel durch Lagen von Parenchyma sehr getrennt, eben so verhalten sich die Zäsern der Zwiebelgewächse. Die Wurzel der Farrnkräuter zeichnet sich besonders dadurch aus, dass statt des Bastes sich ein braunes Zellengewebe findet.

258. Die Knollen und Zwiebeln sind verschieden gebaut. Mehrere (alle. L.) Knollen bestehen aus einem blossen Zellengewebe oder Parenchyma, was mit kleinen Körnern von Stärkmehl oder Schleimkügelchen angefüllt ist, mit kleinen Bündeln von Spiralgefässen durchzogen. Je zahlreicher diese Bündel sind, desto mehr Knospen kann der Knollen entwickeln. Die Zwiebel (§. 12. Nr. 43—55.) ist sehr verschieden geformt. Ihr Wurzelstock, der eine mannigfaltige Lage hat, ist wie die Wurzel (die Knolle. L.) gebaut, die Bedeckung aber, sie mag blättrig, häutig, netzförmig oder halbnetzförmig sein, besteht aus Häuten, die aus einem Zellengewebe mit Bast gebildet sind. Ist sie feste, so ist die feste Bedeckung ein Zellengewebe oder Parenchyma.

Die Dauer vieler Knollen und Zwiebeln, so wie mehrerer Staudengewächse, ist öfter nur auf ein Jahr von der Natur bestimmt, sie erzeugen aber eine oder mehrere neue derselben Art, die im folgenden Jahre den über der Erde befindlichen Theil austreiben. Solche Wurzeln verändern ihren Standort und haben die

Bewegung von einem Orte zum andern in gewisser Rücksicht, mit den Thieren gemein. Die kriechende Wurzel läuft unter der Erde fort, der Zweig von dem die neue Sprosse entstand, stirbt ab, und auf einem entfernten Orte steht die junge Wurzel. Die hoden- und handförmige Wurzel (§. 12. Nr. 35. 36.) besteht wie bekannt, aus zwei Knollen, einer derselben vertrocknet und auf der entgegengesetzten Seite bildet sich ein neuer. Dieses geschieht jährlich, und so kommt die Pflanze nach einer Reihe von Jahren auf einem andern Flecke zum Vorschein. Die feste Zwiebel (§. 12. Nr. 47.) namentlich der Zeitlose (*Colchicum autumnale*) macht es eben so; an der Seite der alten entsteht eine neue, die alte vergeht und allmählig kommt sie an eine andere Stelle.

(Hieher gehört der lange, dünne, cylindrische Wurzelstock, den die Zwiebeln einiger Laucharten oft nach unten treiben, aus dessen Ende eine neue Zwiebel entsteht, z. B. von *Allium descendens*. L.)

Die abgeissene Wurzel (§. 12. Nr. 8.) hat Anfang eine perpendikuläre Gestalt. Nach dem ersten Jahre verholzt sich die senkrecht gehende Wurzel und an den Seiten derselben treiben neue Aeste, die alte Hauptwurzel muss eingehen, verfault daher, und dieses giebt ihr die eigenthümliche Form.

259. Merkwürdig und aller Aufmerksamkeit werth, ist die Wahl der Nahrungsmittel bei den kriechenden Wurzeln, die man an einigen derselben wahrgenommen hat. Man hat in einem aus guter Erde bestehenden Garten auf einem mit unfruchtbarem Sand angefüllten Fleck eine Erdbeerpflanze gesetzt. Die Stengel und die Wurzel verlängerten sich alle nach der Seite hin wo guter Boden war, und die Mutterpflanze ging ein. Mehrere ähnliche aufgezeichnete

Beispiele sind für jetzt, da die Pflanzenphysiologie noch so zurück ist, unerklärbar.

(Genau besehen überzeugt man sich, dass die Wurzeln nur dann, wenn sie eine gute Erdschicht erreicht haben, sich vergrössern und verästeln, so dass es scheint, als hätten sie sich dahin gezogen. L.)

260. Der abwärtssteigende Stock (§. 10.) mag man aus dem Wurzelstock, Wurzelfasern, Knollen, der Zwiebeln von mannigfaltiger Form zusammengesetzt sein, so sind doch diese Theile fast immer mit Wurzelfasern besetzt, die, wie die Blätter, in jedem Jahre erneuert werden. (? L.) Im Frühling und Herbst, ja selbst im Winter, wenn alles mit einer Schneedecke belegt ist, treiben im kalten und gemäßigten Klima neue, an der Stelle der alten vertrockneten hervor. Im warmen und heissen Klima geschieht dieses zur Regenzeit, also immer zu der Zeit, wann die ganze Vegetation zu schlafen scheint. (Die Regenzeit ist der Sommer. L.) Die Aeste der Wurzeln entstehen, wenn sich kleinere Gefässbündel vom grösseren trennen, durch die Haut vom Parenchyma begleitet, seitwärts dringen und sich verlängern. Die (Enden der L.) Wurzelfasern enthalten keine Gefässe, sind bloss zellig. Alle Wurzeln, die zur Ernährung der Pflanze etwas beitragen, saugen an der Spitze ein, und endigen sich papillenartig. Bei der Entengrütze, Lemna, deren Wurzeln im Wasser schweben, ist die einsaugende Spitze mit einer kleinen Mütze, welche mit der Calyptra der Moose Aehnlichkeit hat, bedeckt. (Ich sehe nur eine kegelförmige Verdickung der Rinde, wie sie sich bei vielen andern Wurzeln zeigt. L.)

261. Nicht alle Pflanzen stehen auf der Erde, und daher geht auch nicht bei allen die Wurzel in die Erde. Die Schmarotzerpflanzen (*plantae parasiticae*) machen davon eine Ausnahme. Die Flachsascide (*Cuscuta europaea*), wenn sie aus dem Samen aufgegangen ist, verlängert ihr fadenförmiges Blattfederchen, schlägt sich um nahe wachsende Pflanzen, als Flachs, Nessel u. s. w. und läuft an diesen fort. Ihr Schnäbelchen vergeht und auf der ganzen Fläche des fadenförmigen vielästigen Stengels treibt sie, da wo sie auf die Pflanzen anliegt, Warzen, die die Stelle der Wurzeln vertreten. Die Lichenen sind durch ähnliche (siehe L.) Wärschen auf dem Stamm der Bäume bestigt, wenige von ihnen durchbohren die äussere Haut. Die Sphärien (*Sphaeriae*) wachsen meistens (oft L.) auf dem Bast abgestorbener Aeste, durchbohren oder heben die äussere Haut auf, und sitzen dann warzenförmige Wurzeln fest. Der Mistel (*Viscum album*), dringt mit seinen Wurzeln in die Holzsubstanz der Zweige ein und verwächst mit dieser ganz. Unter den zahlreichen Arten der Schmarotzerpflanzen, welche die heisse Zone aufzuweisen hat, zeichnet sich eine Art derselben, die in Indien jenseits des Ganges häufig angetroffen wird, nemlich *Aërides odorata*, besonders dadurch aus, dass sie im Zimmer aufgehangen, in freier Luft fortwächst und blüht. Loureiro, ein Augenzeuge des Gesagten, versichert, dass sie im Zimmer an der Decke viele Jahre vegetirt, und durch den Wohlgeruch ihrer häufigen Blüthen, die Einwohner desselben erfreut. *Latania chinensis* und *Rhapis acaulis*, so wie einige andere kleine Palmen, unterscheiden sich dadurch besonders, dass ein Theil ihrer Wurzel neben dem Strunk aus der Erde hervor-

steht, wodurch sie das Ansehn erhalten, als ständen sie neben einem verdürzten Strunk. Bei den Moosen besteht die überaus zarte fein haarige Wurzel aus blossen Parenchyma, (auch dieses ist nicht einmal zu sehen, sondern die Wurzel erscheint haarförmig. L.) wie die feine Wurzelzaser der andern Gewächse.

262. Der abwärtssteigende Stock, oder die Wurzel, ist im strengsten Sinn eigentlich die Pflanze selbst. Die Stengel, Blätter und Blüthen, welche sie treibt, sind ihre Verlängerungen, die sie ihres Unterhalts wegen zu machen gezwungen ist. Man kann diese abschneiden und immer wird die Wurzel neue Verlängerungen ausschicken. Die Wurzel kann zertheilt werden, jeder Theil wird eine Pflanze für sich bilden, behält aber immer der Stengel; es sei denn bei einigen kletterartigen Gewächsen, wo der Stengel eigentlich eine Verlängerung der Wurzel selbst ist. Dass hier die Palmen, so wie die harzigen und trocknen Gewächse, z. B. Pinus, Erica, Rhododendron u. s. w. eine Ausnahme machen, weil diese selten ohne Nachtheil des Ganzen verletzt werden dürfen, braucht nicht erst erinnert zu werden.

(Eben so könnte man sagen der Stamm sei die Pflanze selbst, denn der Stamm, auch der krautartige, kann immer Wurzeln treiben, wenn nicht äussere Umstände es verhindern. Eben so müssen äussere Umstände die Wurzel begünstigen, wenn sie Stamm treiben soll und viele vermögen dieses nicht, L.)

263. Dass der abwärtssteigende Stock, vom Stamm über der Erde nicht verschieden sei, beweisen die Erfahrungen, welche man mit dem Umkehren der Pflanz gemacht hat. Wenn man einen Pflaum- oder

Kirschbaum, der noch nicht zu stark ist, mit der Krone im Herbste der Erde zubeugt, die Hälfte der Krone vergräbt, und die Hälfte der Wurzeln sorgfältig von der Erde entblösst, sie mit Moos anfänglich bedeckt und nach und nach ganz frei lässt; im folgenden Jahre zu derselben Zeit mit dem übrigen Theil der Krone und Wurzel es eben so macht: so wird er an den Zweigen der Wurzel Blätter und an den Zweigen der Krone Wurzeln treiben, endlich mit der Zeit wie vorher an der Krone, auf der entblösten Wurzel blühen und Früchte tragen. Mit einem Weidenbaume lässt sich dieses Experiment viel schneller und sicherer machen.

(Nie lässt sich eine Pflanze umkehren, wenn nicht die Wurzel schon durch das Eindringen des Markes gleichsam in Stamm verwandelt ist. Die Wurzelasern schneidet man bei einem solchen Versuche sorgfältig ab. Jährige Gewächse und Staudengewächse lassen sich nicht umkehren, wenigstens sind mir wiederholte Versuche nicht gelungen. L.)

264. Aus dem Schnäbelchen der Samen entstand die Wurzel, aus dem Blattfederchen aber, was allezeit nach oben strebt, entsteht der Theil der Pflanze über der Erde, er mag nun geformt sein wie er will.

Der Stiel (Stamm L.) der Gewächse ist sowohl in seinem äussern und innern Bau sehr abweichend gebildet. Bei den mit Spiralgefässen versehenen Gewächsen fehlt er fast nie, ausser bei sehr wenigen stiellosen Pflanzen (p. 37.). Die spirallosen Gewächse, welche sich besonders durch ein unregelmässiges Zellengewebe auszeichnen, haben innerhalb einen gleichförmigen Bau und man kann eigentlich die Verlängerungen, welche stielartig sind, kaum mit diesem Na-

gen. Die Moose haben einen Stiel (Stamm), welchen ihnen Spiralgefäße, aber mit Bast sind umhüllt.

krautartige Stiel (Stamm der Dikotyledonen) In der Mitte Mark oder statt dessen, eine Höhle, die von Spiralgefäßen, die im Alter zu Ringen und getüpfelten Gefäßen umgewandelt, eingeschlossen, um diese liegt Bast und folgt Parenchyma. Die Spiralgefäße stehen einzeln oder eckig und der Ring den sie beschreiben, wird öfter vom Parenchyma unterbrochen, mehr in der Jugend als im Alter. Es schieben sich immer neue Spiralgefäße ein, wodurch die Unterbrechung erneuert wird. Die äussere Haut, so lange sie grün ist, hat Spaltöffnungen.

holzartige Stiel (Stamm der Dikotyledonen) Im ersten Jahre wie der krautartige beschaffen, dann wird er eine stärkere Rinde hat. Die Rinde ist bei den krautartigen Gewächsen, so wie bei den holzartigen unter der Oberhaut als ein Parenchyma, was (oft L.) mit grünen Körnern durchsetzt ist. Durch das fortschreitende Wachsthum wird die Rinde nach und nach gelblich und zuletzt braun gefärbt, auch verliert sie ihre Oberhaut wenigstens in den meisten Fällen, besonders bei heranwachsenden Dicke des Stamms. Der Unterschied in der Dicke der Rinde bei einer Art rührt nicht von der Alterszeit her, sondern von der Beschaffenheit der Wurzel. Es giebt einige Bäume und Sträucher, die jährlich verlieren und neue erzeugen, z. B. *Salix occidenalis*, *acerifolia*, *Potentilla fruticosa*.

Das Parenchyma was auf die Rinde (Oberhaut) folgt, ist in der jungen holzartigen Pflanze

nach Verhältniss viel stärker, als in der erwachsenen. Auf dieses folgt der Bast, welcher sich wieder an das Holz anschliesst. Die Spiralgefässe, welche in Treppengänge und getüpfelte Gefässe übergehn, bilden (nebst dem Baste L.) das Holz. Beständig schieben sich neue Spiralgefässe nach und zwar in der Mitte des Holzes, dicht um das Mark, so wie auf allen Punkten, am häufigsten aber am äussern Umfange. Auch Bast dringt in das Parenchyma ein, gerade umgekehrt als bei der Wurzel, wo das Parenchyma in den Bast tritt. Durch das fernere Wachsthum wird das innere Holz wegen der Menge gedrängter Gefässe immer dichter und das Mark drängt sich vom Mittelpunkt aus, nach der Peripherie hin und bildet in Holze die Spiegelfasern.

(Vielmehr wird das Zellgewebe durch das Anwachsen der einzelnen Holzbündel zusammengedrückt und bildet die Spiegelfasern. L.)

Es wird aber das Mark nicht zusammengedrückt, wie man ehemals meinte, denn die Zellen desselben sind noch eben so weit, als in der jungen Pflanze, was nicht der Fall sein könnte, wenn es zusammengepresst würde. Es muss aber in der alten holzartigen Pflanze gänzlich verschwinden, weil so viel Gefässe den Raum desselben einnehmen.

(Es entstehen nämlich in dem innern Zellgewebe, dem sogenannten Mark, noch immer Bündel von Holz meistens in Ringen gestellt, welche Hill die corona nannte. Diese wachsen zusammen, legen sich an das innere Holz an und machen dass dadurch das Mark endlich ganz wie früher das umherliegende Zellgewebe zusammengedrückt wird, und verschwindet. Nur in einigen Fällen, z. B. im Hollunder, verbinden sich diese Bündel nicht, sondern werden mit dem Marke saftlos, wie Moldenhawer richtig bemerkt, aber unrichtig gegen die ganze hier von dem Verfasser nach meinen

Grundrissen der Anatom. und Physiolog. d. Pfl. gegebene Theorie angewandt hat. L.)

Das Holz der bejahrten Pflanze zeigt concentrische Ringe und Lagen, die mit den Jahren desselben stimmen, so dass sich das Alter darnach ganz genau ansehn lässt. Woher, fragt es sich nun, woher kommen diese Jahrringe? Sie scheinen so zu entstehen, dass die sich immer zwischen schiebenden Gefäßen, im Gefäßkreis ausdehnen, dünner oder vielmehr gekrümmter machen, und dadurch der nach Verhältniss jährlich anlegende Ring dicker und abgesondert erscheint, obgleich die ganze Holzmasse von einer Beschaffenheit ist.

Das Letztere ist nicht treffend dargestellt. Es legt sich allerdings jährlich ein Ring zwischen Holz und Rinde an, doch muss man dieses nicht so genau nehmen, als ob in dem alten Holze durchaus kein neues Holz nachwuchs. Indessen ist der Wuchs zwischen Holz und Rinde so stark, dass er dort einen neuen Jahrring bildet. Dass dieses ne angewachsene Holz des letzten Jahrringes sich von dem ältern Jahrringe unterscheidet, liegt darin, dass sich das Holz vom vorigen Jahre zusammenzieht und also dichter wird. L.)

Die Rinde verwandelt sich niemals in Bast oder Lenz, wie man vormals glaubte, sie bleibt stets vom Laste getrennt und lässt sich im Frühling ohne Schwierigkeit davon ablösen, im Sommer, Herbst und Winter sitzt sie aber fest. Die Ursache dieser Erscheinung ist, dass im Frühling eine grosse Menge von Säften angehäuft ist, welche sich besonders zwischen der Rinde und dem Baste findet, dahingegen werden im Sommer die Säfte zur Bildung der übrigen Theile verwandt, und im Winter haben sie sich noch nicht ersetzt, und können deshalb nicht angehäuft sein, mithin kleben noch Bast und Rinde zusammen.

Daubenton und Desfontaines fanden, dass das Holz

der Palmen, strauchartigen Lilien und Gräser von dem anderer Gewächse verschieden ist. Sie nennen es büschelförmiges Holz (*lignum fasciculatum*), dahingegen das gewöhnliche netzförmiges (*lignum reticulatum*). Es zeigen sich bei den genannten Gewächsen keine concentrischen Holzringe. Die Gefäße laufen in zerstreut stehenden Bündeln durch den ganzen Stamm und sind vom Parenchyma überall umgeben. Den Palmen und strauchartigen Lilien fehlt das Mark und die Rinde und wegen der geraden Bündel von Gefäßen haben sie keine Aeste, nur wenige bekommen sie, wenn ihre Spitze verletzt wird. Die strauchartigen Gräser sind eben so beschaffen, nur haben sie in der Mitte ihres Halms eine Höhlung, die zuweilen mit lockerem Marke angefüllt ist.

(Die Holzbündel der Monokotyledonen stehen zwar in Ringen, bleiben aber immer von einander getrennt und bilden also kein zusammenhängendes Holz, könnten daher auch eigentlich kein Mark haben. Diejenigen, deren Stamm in der Jugend von scheidenartigen Blättern eingeschlossen ist, haben keine Rinde, die übrigen aber allerdings. Dass manche Monokotyledonen keine Aeste haben, rührt nicht von den einfachen Holzbündeln her, denn viele Gräser haben diese und doch Aeste. L.)

Aubert du Petit Thouars sieht jede holzartige Pflanze als ein Aggregat mehrerer Gewächse an, eine Meinung die freilich nicht neu ist, da man jede einzelne Knospe für ein Sommergewächs halten kann, was, so bald es Blüthen und Früchte getrieben hat, eingeht. Er glaubt, dass von jeder Knospe sich Gefäße verlängern und abwärts durch die Pflanze gehen, so dass das Holz eigentlich ein Gebilde der Wurzelfasern aller Knospen ausmacht. Wenn man einen gepropften Baum an der Pfropfstelle öffnet, so zeigt sich allerdings auch, dass vom Pfropfreis Fasern in den

Hauptstamm auf eine kurze Strecke sich verlaufen, wie auch *Link* beobachtet hat, und ich an gepfropften Zweigen der *Robinia viscosa*, welche auf *R. Pseudacacia* gesetzt waren, sahe. Es scheint daher dessen Meinung nicht ganz ohne Grund zu sein, und es liesse sich das Anwachsen des Holzes auf diese Art einigermaßen erklären. Jedoch verdient die Sache noch eine genauere und sorgfältigere Prüfung und mehrere zahlreiche Erfahrungen.

Die baumartigen Farrnkräuter gleichen in der Bildung ihres Stocks den Palmen und strauchartigen Liliaceen, nur dass die Bündel von Gefässen nicht von gleicher Grösse (auch nicht immer von cylindrischer, sondern von ganz und halbringförmiger Gestalt. L.) sind, sondern kleinere und grössere untermischt zerstreut stehn.

Einige Wasserpflanzen als *Potamogeton*, *Hippuris*, *Callitriche*, haben die Holzbündel in der Mitte des Stengels und das Mark fehlt ihnen gänzlich.

265. Wenn die Gefässbündel bei einem Baum oder Strauch geradeaus laufend bleiben; so schießt der Stamm ohne einen Ast zu machen in die Höhe. Die sogenannten Wasserschüsse oder Lohden, welche der Haselstrauch (*Corylus Avellana*), die Berberitze (*Berberis vulgaris*) und alle abgehauene Stämme der Bäume treiben, sind ein Beweis davon. Sobald aber die Spiralgefässe eine schiefe Richtung erhalten, bilden sie Knospen und es entstehen Zweige. Auch kann durch Hülfe der Kunst ein solcher gerader Schuss zum Treiben der Zweige gezwungen werden, wenn man einen Querschnitt durch die Rinde thut. Die getrennten Gefässe heilen den Rand der Wunde, bekommen eine schiefe Richtung und sind bei ihrer ferneren

Verlängerung gezwungen, mehrere Knospen oder Augen zu bilden, aus denen Zweige entstehen. Hieraus ergibt sich, wie die Aeste an den Gewächsen gebildet werden. Sie entstehen nur dadurch, dass sich kleine Bündel absondern, eine schiefe Richtung nehmen, durch die Rinde, vom Parenchyma begleitet, dringen, und auf diese Weise, indem sie zuvor Knospen erzeugen, zu Zweigen auswachsen.

(Diese sogenannten Wasserschüsse oder Wasserreiser entstehen aus dem Stamme oder der Wurzel, ohne durch ein Blatt, aus dessen Winkel sie hervorkommen, vorbereitet zu sein. Der Grund des der Verf. anzeigt ist gewiss nicht der wahre. L.)

266. Das Wachsthum der holzartigen Gewächse ist sechserlei Art, nemlich:

1) *Laubhölzer* (*Arbores et Frutices*), diese haben ihre Stengel mit Blättern besetzt, und an der Basis jedes Blattstiels entsteht eine Knospe, die sich wieder in einen blattrreichen Zweig verwandelt, der mit Knospen besetzt ist, die sich auf dieselbe Art ausbilden. Wächst nun der Haupttrieb anfangs gerade in die Höhe, dass durch den schnellen Antrieb der Säfte sich nicht die Seitenknospen in Aeste verwandeln können, oder wenn sie wirklich darin sich ausgebildet haben, nicht ferner fortwachsen können; so wird eine solche Pflanze zum Baum, der einen geraden einfachen Stamm mit ästiger zertheilter Krone hat. Theilt sich aber der Stengel gleich unten, ist der Trieb der Säfte bei ihnen weniger rasch, dass jede Knospe sich zum Zweig entfalten kann; so bleibt eine solche Pflanze ein Strauch. Durch Boden, Standort, Klima und Kunst können Bäume in Sträucher und umgekehrt verwandelt werden.

2) *Halbsträucher* (*Frutices minores*), haben blatt-

eiche Zweige, die aber sehr dünne sind und einen lünnen Gefässring absetzen; daher können sie nicht bloß an der Basis des Blattstiels sich entwickelnde Knospe entfalten und ihre Zweige sind sparsam. Sie können auch, weil sie nur dünne sind, nicht lange lauern; sondern müssen öfter durch Triebe aus der Wurzel den Abgang der alten ersetzen.

3) *Nadelhölzer* (*Arbores acerosae*), haben blattreife Zweige, die aber nur an der Spitze und zwar auf einem Punkte mehrere Knospen entwickeln, von denen die mittelste geradeaus wächst, die andern aber nur Seite sich entfalten. Daher kommt das quirlförmige Wachsthum der Fichtenarten, an denen sich eben dadurch, da jährlich ein neuer Quirl erzeugt wird, sehr bestimmt das Alter sagen lässt.

4) *Strauchartige Gräser* (*Gramina fruticosa*), haben einen knotigen, mit zerstreut stehenden Blättern besetzten Halm. Jeder Knoten treibt Aeste und ausser dem Knoten zeigt sich keiner.

5) *Palmen* und *strauchartige Lilien* (*Palmae et Lilia frutescentia*), diese haben einen einfachen Stamm, der nur an der Spitze Wedel oder Blätter treibt, wird diese verletzt, so geht der Stamm aus. Die strauchartigen Lilien sind zuweilen im Stande durch Seitenzweige sich zu erhalten, doch ist alsdann die Schönheit ihres Wuchses und Ansehens dahin.

6) *Baumartige Farrnkräuter* (*Filices arborescentes*), haben einen einfachen, an der Spitze mit Wedeln besetzten Stamm, der niemals verletzt werden darf, weil er sonst sogleich abstirbt und weder Aeste, noch aus des Wurzel neue Stämme treiben kann.

Es giebt aber ausser diesen Arten des Wachsthums

der holzartigen Pflanzen noch viele, die den Uebergang von einer Art in die andere machen.

(Diese Abtheilungen sind alte Eintheilungen, mehr geltehaft und jetzt zu verwerfen. Auch sind die angegebenen Gründe des Verf. nicht immer billigen. L.)

267. Die schönsten von allen holzartigen Stämmen sind unstreitig die Palmen, wovon die wahrhaftige Hand der Natur nur allein die warmen Zonen beschenkt. Ausser diesen aber verdient doch eine besondere Art des Wachsthum's Erwähnung, die in verschiedenen westindischen Bäumen, welche nicht den Palmen gehören, eigen ist. Dahin gehören die Gattungen *Theophrasta* und *Spathelia*. Diese haben einen einfachen hohen astlosen Stamm, der an der ganzen Fläche mit büschelweise stehenden Blättern verziert ist. Wie sonderbar muss sich eine Landbesitzerin gruppiren, die astlose Bäume hat!

Aber vor allen wunderbar muss ein Baum angesehen sehn, der im heissen Afrika am Senegal wächst, und unstreitig der dickste unsers Erdballs ist. Es ist der Affenbrodbaum (*Adansonia digitata*). Der Stamm desselben wird nur 10 bis 12 Fuss hoch, hat aber eine so beträchtliche Dicke, dass dessen Durchmesser von 25 bis 30 Fuss angetroffen wird. Er hat also 75 bis 90 Fuss im Umfange. Die Krone des Baumes selbst ist nicht unbedeutend, von der Spitze des so starken Stammes gehn zahlreiche 50 bis 60 Fuss lange, dicke Aeste nach allen Richtungen aus. Man darf sich daher wohl nicht wundern, dass ein hohler Stamm des *Adansonia* öfters die Wohnung mehrerer Negerfamilien ausmacht.

Nicht minder sonderbar ist der Mangobaum (*Bil-*

hora Mangle), der seine Aeste zur Erde senkrecht abbeugt, und in Stämme verwandelt, so dass ein ziger Baum die feuchten Ufer unter den Wendekeln in Asien, Afrika und Amerika auf eine Meile ist und darüber mit einem Wald überzieht, der aus dicken Stämmen besteht, die oben wie eine dicht chorene Laube zugedeckt sind.

Es sind nicht Aeste, sondern dicke Wurzeln, welche herabsteigen und welche Gemmen und Stämme treiben. L.)

Eben so merkwürdig sind einige grosse Bäume im innern Amerika, die parasitisch auf andern Bäumen wachsen, so dass ein Baum auf dem andern gestellt

268. Es giebt aber Stengelarten, die man beim Blick nicht dafür halten sollte, die auch im Bau der Gefässe verschieden sind. Die ganze Gattung Fackeldisteln, oder wie einige Arten davon insgesamt heissen, indianische Feigen (Cactus) gehört hiezu. Fig. 233 ist ein Stengel der Art abgebildet. Die Lenke, welche gemeinhin für Blätter gehalten werden, sind Theile des Stengels. Die Blätter dieser Gattung selbst sind pfriemförmige, fleischige Spitzen, welche öfter an ihrer Basis mit kleinen Stacheln umgeben sind. Sie fallen gleich nach der Entwicklung des Gliedes ab, und ihre vormalige Stelle bezeichnet eine Narbe oder Büschel von Stachel. Auf ähnliche Weise ist der Stengel bei einigen Arten der Gattung Euphorbia, Cactalia und Stapelia beschaffen. Das Holz bei ihnen zusammengedrückt und das Saftige ihres Inneren rührt von der überaus dicken saftreichen Rinde her. Zuweilen sind die Holzringe dieser Gattung rund, die Rinde aber eckig, daher dann am

Stamm hervorspringende Ecken sich zeigen
Euphorbia officinarum, *Cactus peruvianus* u.

269. Der Dorn (§. 73.) ist in Rücksicht anatomischen Baues wie ein holziger Stengel und weicht in nichts von ihm ab. Er entwickelt sich gewöhnlich aus einer nicht gehörig entfalteten Blüthe, die zwar den Anfang gemacht hat, sich aus dem Mangel der Nahrung aber in Gestalt eines spitzigen blattlosen Zweiges stehn bleibt. Der holzige Stengel eines Baums oder Strauchs ist, bleibt er festsitzen, wenn man auch ihn abzieht. Dass er aber aus Mangel der Nahrung Ursprung nimmt, lässt sich durch die Kulturpflanzen beweisen. Unsere meisten Obstbäume, Dornen, durch die Pflege des Gartens wird ihnen eine bessere Nahrung zugeführt, die Dornen werden in Blüthen verwandelt, und verschwinden ganz. Nur Pflanzen wie der Schlehdorn, die mit Dornen besetzt sind, verlieren sie nicht ganz auf diesem Weg ihre Zahl gleich vermindert wird.

(Sind aber die sogenannten wilden Obstbäume auch von derselben Art, als die zahmen?)

Eben so verhalten sich in Rücksicht ihrer Beschaffenheit die Dornen, welche nicht aus dem Mangel einer vollkommen ausgebildeten Knospe, sondern aus anderen Theilen der Pflanze sind. Es verwandelt sich zuweilen die Blattstiele der gefiederten Blätter in Dornen, wie bei *Alnus*, *Tragacantha*, und andern Arten dieser Gattung. Die Blumenstiele vergrößern sich, werden spitzig, wenn Blumen und Frucht abgefallen sind, nehmen die Dornen-Gestalt an, z. B. *Hedysarum* u.

oder endlich die Afterblätter werden spitzig, holzig, bleiben stehn und gehn in Dornen über, z. B. *Acacia*. Solche Umwandlungen, die besonders häufig an den orientalischen Gewächsen anzutreffen sind, verschwinden durch die Cultur nicht.

270. Der Stachel (§. 74.) ist eine Verlängerung der Haut, daher lässt er sich mit dieser ablösen. Er besteht aus Zellengewebe und Bast. Die Cultur kann ihn, da keine Gefässe in ihm sich finden, und er nur mit der bedeckenden Haut zusammenhängt, nicht in einen Trieb umwandeln. Die Stacheln haben zuweilen eine sonderbare Gestalt, so sieht man sie fast in Form einer kurz gedrehten Ranke bei der *Nauclea aculeata* u. a. m. Auch die Afterblätter werden zuweilen an einigen Pflanzen, nemlich: *Robinia Pseudacacia*, *Berberis vulgaris* u. s. w., in Stacheln ausgebildet.

(Dass fast alle hier angeführten Theile Dornen sind, ist schon oben erwähnt worden. L.)

271. Die Ranke (§. 65.) hat auch dieselbe Zusammensetzung der Gefässe, wie der krautartige Stengel. Sie ist ein Blattstiel ohne blattförmige Erweiterung (oder Ast L.) der aber darum, weil er nicht seine Säfte zur Bildung eines Blatts angewendet hat, mehr verlängert ist, und durch diese Verlängerung zu schwach wird, die gerade Richtung beizubehalten, daher kommt dessen aufgerollte und gedrehte Form. Es scheint als wenn der verminderte Luftzug einen besondern Reiz auf die Ranke selbst äussert, weil jede durch Ranken kletternde Pflanze, wenn sie entfernt von einer Wand, Baum oder Gesträuch gepflanzt wird, alle Ranken nach der Seite hinschickt, wo der Ge-

Willdenow's Grundriss. 1 Th. 25

fassen, (und Bast oder ein Holzbündel, L.) mitenchyma umgeben.

274. Die Blätter sind aus eben den Gefässen zusammengesetzt, woraus die Wurzel, Stengel und deren Pflanzentheile bestehen. Die Art aber wie vertheilt sind, macht hier eine auffallende Verschiedenheit. Ein grosser Gefässbündel dringt in die des Blatts ein, und vertheilt sich auf der Fläche selbsten netzförmig nach der Art wie die Pflanzen anastomosiren (§. 256.). Von der Anastomose der Gefässe auf den Blättern hängt deren ganze Gestalt ab, und diese an jedem Gewächse verschieden ist, ist die Mannigfaltigkeit der Blätter nicht zu verweren. Wenn der grosse Gefässbündel sich in grosse Theile spaltet, so entsteht ein gedrehtes; und theilt er sich in mehrere, so werden alle Arten der zusammengesetzten Blätter, welche in Terminologie bestimmt sind, erzeugt. Theilt sich Bündel von Gefässen von der Basis des Blatts in kleinere, so wird ein geripptes Blatt, läuft er gerade aus und giebt einzelne Bündel seitwärts ab, bildet sich ein adriges. Sind am Rande des Blatts zahlreiche Anastomosen, so wird es ein ganzrandiges (folium integerrimum), laufen aber die Gefässbündel in kleine Aeste ohne sich zu vereinigen dem Blatte zu, so entsteht, nach Beschaffenheit der Umstände ein gezähntes, gesägtes, gekerbtes u. s. w. Blatt.

(Nicht immer. Es giebt ganzrandige Blätter, Gefässbündel zum Rande laufen, aber nicht denselben hinaus wachsen. Es giebt gesägte Blätter, in deren Sägezähne keine Gefässbündel gehen. L.)

Der Hauptgefässbündel, welcher sich absondert, zum Blatte sich auszudehnen, ist zuweilen bei

tern Blättern mit einer Markröhre begleitet, oder auch in mehrere vereinigte Bündel getrennt, und hat bald eine runde, bald flache oder mondformige Gestalt auf seinem Durchschnitt. Die saftigen und runden Blätter haben das Parenchyma in der Mitte. Auch sind die Zellen des Parenchyma nach Verschiedenheit der Blätter anders geformt.

Die Bündel der Blätter sind Spiralgefäße. (und ist. L.) Dieses Netz wird auf beiden Flächen und in allen Zwischenräumen mit einem Zellengewebe bedeckt, auf beiden Seiten ist die Haut, welche mit Pflöffnungen versehen sind, die häufiger auf der untern als auf der obern angetroffen werden, und denen, welche keine grüne Farbe haben, gänzlich fehlen (243.).

Der Blattstiel der Blätter ist in anatomischer Rücksicht wie der Stengel gebaut, nur machen die Gefäße seiner Basis wegen der schiefen Richtung die sie bilden, einen Knoten, der Gelegenheit zur Entwicklung der Knospe giebt, weil dadurch die Trennung der Bündel veranlasst wird. (? L.)

Dieser Knoten ist wie der Untersatz einer Zwiebel beschaffen. Man sieht auch bei wurzelnden Geophyten, dass daraus Wurzelasern hervortreiben, so wie bei Stecklingen.

Bei sitzenden Blättern, das heisst bei solchen, denen der Blattstiel fehlt, ist selten ein solcher Knoten, sei dann, dass die Mittelrippe von beträchtlicher Stärke ist, daher werden sie nicht immer an ihrer Basis Knospen treiben.

275. Vor allen Theilen der Gewächse zeigen die Blätter eine besondere Reizempfindlichkeit, besonders in diesem der Fall bei den zusammengesetzten. Durch

bloßes Berühren zieht sich die Blätter der *Mimosa pudica*, *sensitiva*, *casta*, *viva*, *Oxalis sensitiva*, *Smithia sensitiva* u. v. a. zusammen, und bleiben, wenn man einzelne Blättchen oder den Hauptblattstiel berührt, einige Minuten in einer zusammengezogenen Lage. Fast alle gedrehten, und aus kleinern Blättchen zusammengesetzten Blätter, legen sich des Abends, wie die genannten reizbaren Pflanzen, zusammen, so dass ein Blättchen das andere deckt, und das Ganze zusammengedrängt ist. Wer des Abends mit der Laterne in der Hand den Garten besucht, wird viele Pflanzen in diesem Zustande finden, den man den Schlaf genannt hat (§. 7.). Es giebt Pflanzen die hierin eine bestimmte Stunde des Tages beobachten, in welcher sie ihre Blätter schliessen und öffnen. *De Hameel* stellte mit der *Mimosa sensitiva*, die zu einer bestimmten Stunde des Abends ihre Blätter schließt und sie auch um eine gewisse Zeit öffnet, Versuche an. Er setzte diese Pflanze in einen ledernen Koffer, den er mit wollenen Decken bedeckte und fand, dass sie ihre Blättchen des Morgens um die bestimmte Zeit öffnete und am Abend schloss. Im luftleeren Raum aber soll das Öffnen und Schliessen der Blätter zu verschiedener Zeit geschehn.

(De Candolle's Versuche hierüber sind weit bestimmter. L.)

Ein südamerikanischer Strauch (*Portiera hygrometrica*), legt jedesmal, wenn es regnen will, seine gefiederten Blätter zusammen, und ist der sicherste Wetterprophete den man haben kann.

In den Sümpfen von Süd-Carolina wächst *Dionaea Muscipula*, die eine wunderbare Bildung des Blatts hat. An der Spitze eines lanzettenförmigen Blatts (Blattstiels L.) steht eine mit kurzen Stacheln besetzte

ständige Verlängerung, (Blatt L.) die sobald ein Insekt oder anderer Körper darauf liegt, sich zusammenlegt, und nicht eher öffnet, als bis der eingeschlossene Gegenstand völlig ruhig ist.

Unsere Sonnenthauarten, (*Drosera rotundifolia* und *angifolia*), deren Blätter am Rande und auf der Fläche mit gestielten unächtigen Drüsen besetzt sind, ziehen nach *Rothe's* Beobachtungen ebenfalls, wenn sie gereizt werden, obwohl sehr langsam zusammen.

Ein nordamerikanisches Farrnkraut, *Onoclea sensibilis* genannt, hat seinen Beinamen bloss deshalb erhalten, weil die jungen Wedel, welche sich zu entfalten beginnen, sobald sie berührt worden, zusammenschrumpfen, es zeigt aber dieses Gewächs sonst keine Spur einer Reizempfindlichkeit.

Die auf Zeylon wachsende *Nepenthes destillatoria* hat an der Spitze des Blatts einen blattförmigen Schlauch (§. 55.), wovon Fig. 28. eine Abbildung gegeben ist, der sich von Zeit zu Zeit öffnet und schliesst, auch mit Wasser anfüllt. Eben dieses thun noch zwei andere Arten dieser Gattung, nemlich *Nepenthes Phyllomphora* und *madagascariensis*.

Vor allen andern Gewächsen aber ist das am Ganges wachsende *Hedysarum gyrans* das wundervollste. Es hat gedreite Blätter, von denen das mittelste die andern an Grösse weit übertrifft, alle diese Blätter bewegen sich aus freien Stücken. Das grosse Blatt steigt ruckweise auf- und abwärts, die beiden zur Seite befindlichen kleinern, haben eben diese Bewegung, nur etwas stärker. Hält man die Blätter fest, so scheint es nachher, wenn sie losgelassen werden, so wollten sie das Versäumte nachholen, denn ihre Bewegungen sind einige Augenblicke schneller, bis

sie wieder den gewöhnlichen Gang gehn. Kein Reiz hat auf dieselbe Einfluss, und es findet auch kein Zusammenziehen der Blätter, wie bei andern reizbaren Pflanzen statt. Die Bewegung der Blätter hängt aber nicht vom Reize des Lichts ab, denn sie geschieht bei dem Sonnenlichte und in der Dunkelheit, ja selbst im Schlafe der Pflanze. Bemerkenswerth ist es, dass die Blätter bei der höchsten Erektion und recht warmen heitern Tagen, gleich der thierischen Muskelfaser, eine zitternde Bewegung haben.

(Hier muss also die dreifache Art der Bewegung, die periodische, wohin der Schlaf gehört, die auf äussern deutlichen Reiz entstandene, wie die der *Mimosa pudica* und die zufällige, nicht periodische, nicht auf einen deutlichen äussern Reiz entstandene, wie die vom *Hedysarum gyrans*, wohl unterschieden werden. L.)

276. Mit den Blättern stimmen in Rücksicht der anatomischen Beschaffenheit ihrer Theile die Aestblätter und Nebenblätter vollkommen überein, nur dass die letzteren zuweilen anders gefärbt sind und dann keine Spaltöffnungen haben.

(Sie sind für die Blätter, was für die Stämme die Samenblätter, für jeden Ast das unter ihm befindliche Blatt ist. L.)

277. Aus dem, was über die innere Beschaffenheit, die chemischen Bestandtheile und überhaupt im Allgemeinen von den Vegetabilien hier gesagt ist, lässt sich, so weit die Erfahrungen reichen, ein Schluss über deren Lebensprocesse machen. Wie die Thiere sind sie mit Gefässen versehen, die Säfte enthalten, sie haben eine Empfänglichkeit für den angebrachten Reiz und sind also reizbar, sie entfalten und bilden sich aus wie diese. Daraus schon allein könnte

er Schluss gezogen werden, dass bei ihnen ein Umlauf der Säfte sein müsse.

In unsern Tagen wird es wohl schwerlich jemand wagen, mit *Jampert* mathematisch zu erweisen, dass die Gewächse keine Gefässe haben: da deren Dasein durch *Grew*, *Malpighi*, *Mustel*, *Moldenhawer*, *Hedwig*, *Sprengel*, *Link*, *Rudolphi*, u. m. a. hinlänglich erwiesen ist, und jeder Zweifler durch den Augenschein von deren Existenz überführt werden kann. Nur stimmen die Physiologen nicht ganz mit einander überein.

Hales dachte sich die Bewegung der Säfte bei den Vegetabilien, wie das Steigen einer Flüssigkeit in Kapillarröhrchen und wollte, dass sie durch blosse Anziehung, so wie durch Licht und Wärme fortgetrieben würden.

Malpighi war der erste, der den Gefässen Reizbarkeit zuschrieb, und behauptete, dass ihr Durchmesser verengt und erweitert würde. Er wollte sogar in den Spiralgefässen eine dem motu peristaltico der thierischen Eingeweide ähnliche Bewegung gesehn haben. Hier wurde er aber wider Willen getäuscht, da dergleichen Spiralgefässe an der Luft sogleich trocken werden und wegen ihrer ausserordentlichen Feinheit zusammenrollen.

Corti nimmt die Reizbarkeit der Gefässe an. Er will unter dem Mikroscope an 65 Pflanzen in den Gefässen eine Saftbewegung von einem Gelenke zum andern gesehn haben, und meint dass jeder Knoten mit dem dazwischen befindlichen Raum sein eigenes von den übrigen Theilen unabhängiges Kreislaufs-System habe.

(In neuern Zeiten hat Herr Pr. Schultz in Berlin eine Strömung des Saftes in den eigenen Gefässen

wahrgenommen. Er steigt an einer Seite Höhe und kehrt an der andern durch Aussen in den erstern Strom zurück, so dass viele Kreisungen dieses Saftes in den Pflanzen vorgehen. Diese Beobachtungen sind von auch von mir selbst wiederholt und richtig funden. L.)

Miller nahm nach *Hales* ein blosses Steigen Fallen der Säfte, ohne einen bestimmten Kreislauf. Die Wärme sollte das Steigen und die Kälte das Fallen der Säfte bewirken.

Walker, der durch Versuche die Bewegung der Säfte an Bäumen, die im Frühlinge thränen, untersuchen wollte, behauptet, dass im Frühjahr der Saft zuerst in die Wurzel, nach und nach höher und endlich bis in die Spitze steigt, was von der Temperatur der äussern Luft abhängt, niemals aber sollen die Säfte abwärts fallen. Deswegen treiben die Entomologen zuerst aus, Der Saft soll zwischen der Rinde und dem Holze aufwärts gehen, die Wärme aber soll nicht allein hervorbringen, sondern eine unbekannte Ursache mitwirken. Er läugnet nicht geradezu einen Kreislauf, nur meint er, dass der Saft bis zum Entwickeln der Blätter eine ganz andere Bewegung habe, als wenn er belaubt sei.

Die andern Physiologen des Gewächsreichs haben sich den Umlauf der Säfte verschieden gedacht. Einige glauben, der Saft steige nur durch die Wirkung der Wärme des Bastes in die Höhe. Andere behaupten, dass der Saft selbst durch die Wurzel zum Holze aufwärts durch die Rinde abwärts gehe. Damit stimmen diejenigen überein, welche die Pflanzen mit giftigen Flüssigkeiten anzufüllen suchten. Sie wollen wissen, dass der farbige Saft vom Kerne der Pflanze in das Holz gehe, von da soll er den Blättern

silt werden, und aus diesen durch die Rinde seinen
 ickweg nehmen.

278. Nimmt man nun mit *Hales* an, dass der
 ft allein durch Anziehung, Luft und Wärme in den
 fassen der Gewächse steigt; so müsste daraus fol-
 n, dass im Frühling die Bewegung langsamer als
 Sommer sei. Allein nach *Hales* eigenen Versu-
 en soll die Schnelligkeit, womit der Saft im Wein-
 cke im Frühjahr bewegt wird, fünfmal stärker
 die Bewegung des Bluts in den Pulsadern eines
 fardes sein. Diese Geschwindigkeit soll im Sommer
 geringer ausfallen und im Herbste ganz fehlen.
 Wenn die Wärme die Ursache der Bewegung des
 safts wäre, so müsste sie im Sommer bei zu-
 mender Hitze viel stärker als im Frühlinge gefun-
 den werden. Wer sieht nicht hieraus schon, dass
 es keinen mechanischen Ursachen, sondern von der
 Reizbarkeit des Innern der Pflanze dies Phänomen
 abhängt?

Die Reizbarkeit der Gefässe hat *Brugmanns* da-
 durch zu beweisen gesucht, dass die abgeschnittenen
 Zweige der *Euphorbia Lathyris* und *Myrsinites*, die
 eine grosse Menge Milchsaft geben, zu milchen auf-
 hörten, sobald der Schnitt mit einer stark verdünnten
 Auflösung von Alaun und Eisenvitriol, die auf dem
 Papier keinen Fleck zurücklässt, bestrichen wurde.
Van Marum hat diese Versuche wiederholt, aber
 nicht denselben Erfolg gesehn. *Uslar* will jedoch be-
 merkt haben, dass die abgeschnittenen Stengel von
Euphorbia exigua und *sylvatica*, die in eine Auflösung
 von Alaun oder scharfen Säuern getaucht wurden, so-
 gleich oder doch bald nachher zu fliessen aufhörten.

Durch mehrere merkwürdige Versuche beweist

von *Marum* die Reizbarkeit der Pflanzen. Er hat durch die Zweige von *Euphorbia Lathyris*, so wie durch die ganze Pflanze von *Euphorbia Esula* und *Cyparissias* 20 bis 30 Sekunden einen elektrischen Strom gehn. Beim Durchschneiden derselben fand sich, dass sie keinen Milchsaft fließen liessen, ungeachtet man durch einen Druck etwas davon hervorkommen sah. Dieselbe Erfahrung machte er an den Aesten der *Ficus Carica*, die 15 Sekunden einem elektrischen Strom ausgesetzt gewesen waren.

Girtanner behauptet, dass der Sauerstoff bei den Gewächsen ein Reizmittel sei. Der Sauerstoff habe mit der Pflanzenfaser eine nähere Verwandtschaft als mit andern Körpern. Alle Körper, die begierig den Sauerstoff an sich ziehen, wären Reizmittel für die Pflanzen und müssten ihr Wachsthum befördern.

Dies würde einigermassen mit den Versuchen des Herrn von *Humboldt*, die er über das Keimen der Pflanzen angestellt hat (§. 254.) übereinstimmen, und eben so den Erfahrungen von *Ingenhous*s und andern, nicht entgegen sein: dass Getreide und mehrere Gewächse auf schlechtem Boden, wenn er mit sehr verdünnter Schwefelsäure begossen wird, eben so gut wachsen, als wäre er stark gedüngt worden. Auch lehrt uns die Chemie, dass der Sauerstoff sich aus der Atmosphäre sehr leicht mit Erd- und Steinarten, besonders mit der Pflanzenerde (humus) verbindet. Jeder Gärtner und Forstmann weiss, dass die im Frühjahr gepflanzten Bäume besser wachsen, wenn man Löcher für sie im Herbst gegraben hat, die den Winter hindurch den Einwirkungen der Luft ausgesetzt waren. Auch haben Versuche gelehrt, dass Aecker, die ein halbes Jahr hindurch in lockern öfter gerühr-

in Erdhaufen aufgedigten den Einwirkungen der Luft ausgesetzt waren, eine reichlichere Erndte gaben, als wenn sie gedüngt waren, und diese Fruchtbarkeit sich länger, als durch hineingebrachten Düng hielt.

(Der Sauerstoff macht den in der Dammerde befindlichen Extractivstoff in Wasser auflöslich. L.)

279. Ausser dem blossen Sauerstoff giebt es noch andere Körper, welche die Pflanzen reizen, wozu denen aber die meisten sich deshalb nur wirksam zeigen, weil sie entweder Sauerstoff enthalten oder ihn entbinden.

Wasser aus Quellen oder Flüssen macht als Nahrungsmittel, auch zugleich weil es beim Vegetationsprocess zerlegt wird, ein Reizmittel aus.

Wärmestoff ist ein vorzügliches Reizmittel der Vegetabilien, da er den Sauerstoff gasartig und alle Viscositäten flüssiger macht, mithin die Einwirkung der Stoffe stärker wird. (? L.) Nur müssen die Grade desselben der Pflanzenfaser angemessen sein. So werden tropische Pflanzen mehrere Wärme als Gemüths- oder Polargewächse ausstehn können.

Kochsalzsaures Ammoniak befördert nach Bruggemanns Erfahrungen die Vegetation (§. 254.). Der Zweig der Else wurde in reines Wasser, ein anderer in die Auflösung von kochsalzsauerem Ammoniak gesetzt. In 24 Stunden zog der erstere $\frac{1}{2}$, der letztere der Flüssigkeit ein, woraus sich der wahrscheinliche Schluss ziehen lässt: dass das kochsalzsaure Ammoniak durch seinen Reiz die Thätigkeit der Gefässe erhöht habe. Salpetersaures Kali wird von den holländischen Gärtnern, als ein Wachsthum beförderndes Mittel gebraucht. Die Zwiebeln von Narcissen, Hya-

cinthen und andern Gewächsen treiben im
 worin dieses Neutralsalz aufgelöst ist, viel
 hervor. Auch fand *Tromsdorf*, dass ein Ast
tha piperita in einer Salpeterauflösung um
 schwerer geworden war, da hingegen ein Zw
 selben Pflanze in gemeinem Wasser nur 145
 wicht erhalten hatte. *Barton* will aber ge
 Gegentheil behaupten, da einige Gran von
 saurem Kali eine *Kalmia* getödtet haben. W
 kann aber nicht ein für die meisten Pflanze
 ger Reiz ändern zu heftig und tödlich sein?

(Auch kann ein heilsamer Reiz in grosse
 schädlich werden. L.)

Barton fand, dass in mit Kampfer abge
 Wasser ein verwelkter Zweig sich sehr sch
 holte, was nicht erfolgte, wenn er ihn in
 Wasser stellte. Ein welker Zweig des Tulpe
 (*Liriodendron Tulipifera*) und die verwelkt
 einer gelben Iris erholten sich und blieben la
 in frisch, was beim gewöhnlichen Wasser i
 schah. Ich machte diesen Versuch mit einem
 der *Silene pendula*, deren Blumenkronen sch
 zusammengerollt waren, nach einer Stunde
 die Blumenblätter steif ausgebreitet, als w
 eben erst aufgeblüht. Sollte wohl der Wi
 des Kampfers die vegetabilische Faser so sehr
 dass dadurch diese Erscheinung hervorgebrach
 oder liegt der Erfolg in der ganzen Misch
 Kampfers, dass gerade das Verhältniss des
 stoffs mit Wasserstoff verbunden, wie es sich
 selben findet, nur die Faser reizen kann? D
 der Zeit mag die Frage näher bestimmen.

(Herr Dr. Goeppert hat gezeigt, dass die da

V. Physiologie.

303

thum befördernde Kraft des Kampfers auf einer Täuschung beruhe. L.)

Das Licht äussert auch einen starken Reiz, auf die Anzenfasern selbst. Es ist jedermann bekannt, dass Gashaus-Pflanzen ihre Stängel und Blätter allezeit den Fenstern zu neigen. Eine Pflanze die mehrere Tage in einem dunkeln Zimmer eingesperrt ist, wird wenn man durch eine kleine Oeffnung einige Lichtstrahlen hineinfallen lässt, ihre Stängel dahin biegen. Dem ist es nicht bekannt, dass die *Lupinus*-Arten, besonders *Lupinus luteus*, ihre Blätter und Stängel in der Luft der Sonne zukehren, und ihr so folgen, so man nach deren Richtung die Tageszeit bestimmen kann?

Das Licht hat noch besonders den Nutzen für die Vegetabilien, dass es die Zersetzung des eingeregneten Wassers (? L.) und Abscheidung der Sauerstoff fördert, denn wann dies Sauerstoffgas sich bei den Gewächsen anhäuft, so werden alle ihre Theile welk, wie dieses Pflanzen, die im Dunkeln vegetirt haben, beweisen. Selbst das Lampenlicht bewirkt schon das Auscheiden des Sauerstoffs, wie der Versuch des Herrn von Humboldt beweiset, bei welchem ich Augenzeuge war: der in einem finstern Keller aufgewachsene Kresse (*Lepidium sativum*) durch den ärmlichen Schein einer Lampe, die mehrere Tage unterhalten wurde, grün machte. Nicht alle Gewächse können dem Reize eines starken oder anhaltenden Lichts widerstehen. Für jedes Gewächs scheint ein bestimmter Grad der Reizmittel und so auch des Lichts bestimmt zu sein, den sie nicht ohne Schaden überbreiten können. Junge Pflanzen sind weit empfindlicher dagegen als ausgewachsene, daher gedeihen sie im Schatten am besten. Alle Waldpflanzen wach-

den durch zu vieles Licht getödtet. Dieses beweisen auch die Erfahrungen von *Medicus*, *Desfontaines* und *Uslar*, welche fanden, dass die Reizempfänglichkeit bei den Pflanzen des Morgens am stärksten, des Mittags schwächer und des Abends am schwächsten war.

Sonnebier hat den Versuch gemacht, durch ein Prisma die Lichtstrahlen zu theilen, um zu sehn, welcher von den sieben Strahlen der Vegetation am günstigsten sei, und er fand: dass Sallatpflanzen im gelben Strahl am besten, nächstdem im violetten wachsen. Diejenigen auf die der weisse Strahl fiel, kamen denen am nächsten, die im gesammelten Lichte standen.

280. Die Reizempfänglichkeit der Pflanzen wird aber durch alle Reizmittel, wenn sie zu stark oder anhaltend wirken, getödtet. Jeder Reiz muss der Faser angemessen sein: Zum Beweise dessen können alle unterirdische Gewächse und in finstern Kellern wachsende Schimmelarten dienen, deren näheres Kenntniss wir den Nachforschungen eines *Scopoli* und von *Humboldt* verdanken. Sie brauchen zu ihrem Wachsthum nur eine sehr geringe Menge Sauerstoffgas, sobald sie daher an die freie Luft gebracht werden, vergehn sie. Wie dieses auch schon die allgemein bekannte Erfahrung beweiset, das Zimmer oder Behältnisse worin es stockt oder schimmelt, durch den freien Luftzug von dieser Unbequemlichkeit befreit werden können.

Opium soll die Reizempfänglichkeit der Pflanzen tödten, bei *Hedysarum gyrans* und *Mimosa pudica* wurde sie dadurch geschwächt und fast gänzlich getödtet.

(Die schädlichen Wirkungen des Arseniks und an-

derer Gifte auf die Pflanzen ist von länger und anderen gezeigt worden. Die Pflanzen sind sehr leicht durch Salze, welche eben nicht ätzend sind, z. B. durch kohlensaures und schwefelsaures Natrium zu tödten. Ich habe gesehen, dass sie Auflösungen von Salzen, Giften, z. B. Arsenik u. dgl. durch Zweige und Blätter resorbiren, doch nur dann besonders, wenn sie durch die Wurzeln keine Feuchtigkeit aufnehmen können. L.)

In kohlensaurem Gas sterben die Pflanzen sehr bald; eben so in reinem Stickstoffgas und Wasserstoffgas. In dem letztern sterben die Pflanzen sogleich, ist es aber mit etwas Sauerstoffgas gemischt, so halten sie sich eine kurze Zeit und wachsen dabei sehr üppig, Herr von Humboldt brachte den 14. Februar 1792 eine keimende Zwiebel des Frühlingsafrans (*Crocus vernus*) die er eingepflanzt hatte, in den Bergwerken zu Freiburg mehrere Lachter tief unter die Erde. Es war die Luft in dieser Grube so sehr mit Wasserstoffgas verunreiniget, dass das Licht verlöschte und die Lungen angegriffen wurden. Der Trieb der Zwiebel entfaltete sich, die Blätter wurden grün, die Blume gelb und die Staubbeutel fingen an zu stauben, aber am siebzehnten Tage ging schnell die ganze Pflanze in Fäulniss über. Mehrere Gewächse gaben ähnliche Resultate. Die Pflanzen halten sich nur so lange als sie Sauerstoffgas aushauchen können, hört diese Operation auf, so ist es um sie geschehn. Eben so sahen Sennebier und Ingenhouss in Wasserstoffgas eingeschlossene Pflanzen, Tag und Nacht Sauerstoffluft ausstossen; wäre diese Gasart verbraucht gewesen, so hätten die Pflanzen sich auch nicht länger gehalten.

281. Sicher werden, wie obige zahlreiche Erfahrungen lehren, die Säfte der Pflanzen nicht bloss durch mechanische Gesetze in Bewegung gebracht, Willdenow's Grundriss. I Th.

sonst die denselben eigenthümliche Reizempfänglichkeit treibt sie fort. Vom Steigen der Säfte bei warmem Wetter und vom Fallen derselben in kalten Tagen kann auch nicht mehr die Rede sein, sondern die Erfahrungen und selbst die Analogie mit den Thieren deuten gar deutlich auf einen Umtrieb hin. Wie sollten sich denn wohl die Säfte der Bäume verhalten, welche unbelaubt und ohne ein Zeichen des Wachsthum zu verrathen, im Winter nackt da stehen, wenn bei der langen Reihe von kalten Tagen, die in ihren Gefässen befindliche Feuchtigkeit, beständig im Fallen begriffen wäre? Man müsste am Ende die Zweige innerhalb ganz ohne alle Flüssigkeit finden, was doch nie der Fall ist. Ein Stillstand der Säfte ist auch nicht denkbar, und ein Gefrieren derselben bei sehr kalten Tagen gar nicht. Die Erfahrung lehrt uns, dass wenn die Säfte bei zärtlichen exotischen Pflanzen durch Kälte gerinnen, diese sterben müssen. Der Umtrieb der Säfte muss also bei ihnen, da sie wegen der ungünstigen Jahreszeit keine Verlängerungen machen können, weniger rasch, aber doch vorhanden sein. Sie scheinen sich eben so wie die Säugethiere, z. B. das Murmelthier, die Schlafkatze, zu verhalten, die den Winter hindurch gleich den Amphibien und einigen Insekten einen Todtenschlaf haben und erst mit der rückkehrenden Frühlingswärme erwachen. Wie die Circulation des Bluts bei diesen Thierarten zu der Jahreszeit beschaffen ist, darüber fehlt es auch noch an Versuchen.

Als ein Beweiss, dass ein blosses Steigen des Saftes bei den Gewächsen sich findet, dient die wichtige, aber falsch verstandene Erfahrung, dass nach der Mitte des Januars, bei uns nach dem Tage Fabian Se-

Wegen, den Monat Januar, der Saft in die Röhren zu. Man glaubt man sei er auf seiner Rückreise, um im Frühlinge bei der Hand zu sein. Er aber Bäume, Sträucher und alle Staudengewächse im Winter für todt hält, oder glaubt, dass sie nicht lebendig sind, irret gewaltig.

Den ganzen Sommer hindurch schickt die Wurzel durch ihre Zäsern eingesogene Nahrung zum Stengel und was dieser aus den Blättern einsaugt, wird vollständig zur Bildung neuer Theile verwandt, bis er weder die Entwicklung durch Erschöpfung der Kräfte aufhören muss, wie bei den Sommergewächsen, oder bis die Theile über der Erde, welche dem Einflusse der Witterung nicht widerstehen können, abfallen, wie bei den Staudengewächsen, Sträuchern und Bäumen. Mit dem Fall der Blätter bei den holzartigen Gewächsen und mit dem Verdorren des Stengels bei den Staudengewächsen, sind auch alle wirkende Kräfte erschöpft. Die grosse Quantität Nahrung, welche die Wurzel zur Pflanze schickte, wird verarbeitet; bei den Bäumen und Sträuchern zur Bildung der Aeste, des Holzes, Splints, Bastes, der Blätter, Blumen, Früchte und Wurzel; bei den Staudengewächsen zur Bildung der Theile über der Erde, der Frucht und der Wurzel selbst. Die Zäsern, welche zeither die Nahrung zuführten, fangen an spröde zu werden, und können diesen Dienst nicht mehr thun. Der in den Gefässen befindliche Saft kann nicht mehr über der Erde Verlängerungen der Pflanzen machen, da die Temperatur der Luft zu ungünstig ist. Es fängt daher von dem Moment, wo die Blätter der holzartigen Pflanzen und die Stengel der Staudengewächse einwelken, die Pflanze an neue Würzelchen an die

Stelle der alten zu erzeugen. Bohrt man in dieser Zeit, das ist im späten Herbst bis Mitte Januar, unter unserm Himmelsstrich, eine Birke oder Ahorn-Arten an, so wird gar kein Saft fliessen. Die Pflanze hat zwar Saft, aber nur so viel als sie nothdürftig braucht und hinreicht die Würzelchen aufs neue zu bilden. Aus diesem Grunde gehn auch Obstbäume die zu voll getragen haben, weil ihre Kräfte durch den grossen Aufwand der Säfte zu sehr erschöpft sind, ein. Hat der Baum oder Strauch die Würzelchen getrieben, womit das Gewächs bis gegen die Mitte des Januars zu Stande kommt, so verrichten die lebhaften jungen Würzelchen ihr neues Geschäft, sie saugen Feuchtigkeit ein, die sie bearbeiten. Sie sammeln so viel Saft als für den kommenden Sommer zur Bildung aller Theile erfordert wird. Bohrt man jetzo den Stamme an, so fliesst bei denen Gewächsen, die früh schon auszutreiben pflegen, und daher ihrer Natur gemäss schon einen grossen Vorrath von Säften gebildet haben, eine grosse Quantität Flüssigkeit ab. Kommen aber am Ende des Januars und im Februar gelinde Tage, so hört alles Fliessen des Safts auf, und Bäume die nun erst angebohrt werden, liefern keinen mehr; man merkt erst wieder ein Fliessen desselben, wenn kalte Witterung eintritt. Diejenigen, welche der Theorie vom Steigen und Fallen der Säfte zugethan sind, behaupten, dass bei warmen Tagen der Saft zu hoch gestiegen und bei kältern mehr gefallen sei. Dieser Wechsel des Fliessens und Nichtfliessens rührt aber daher, dass sobald heitere, gelinde Witterung einfällt, die Ausdünstung bei den Gewächsen auch rascher von Statten geht und nun natürlich die Quantität des Safts vermindert werden muss, bei den kälte-

ren Tagen aber kann keine grosse Ausdünstung von sich gehn und er muss sich daher anhäufen.

(Die Erscheinungen des aufsteigenden Safts im Frühling lassen sich dadurch leicht erklären, dass die Erstarrung der Gefässe von unten auf gehoben wird, auch bei kaltem Wetter wieder eintreten kann. L.)

Aus eben dem Grunde sind die Wurzeln der Stau-
gewächse, die zum Arzneigebrauch eingesammelt
werden, im Winter und Frühjahr wirksamer, als im
Sommer, wo sie Blätter und Blüthen besitzen, weil
zu der Zeit durch ihre neuen Würzelchen mehrere
neue Säfte gebildet haben.

282. Es ist wohl keinem Zweifel unterworfen,
dass den Gewächsen von der Natur ein bestimmter
Wärmegrad gegeben worden ist, nur wird dieser so
weit wie im Thierreich überall gleich sein. Wir
wissen dass die Wärme des Bluts grösser bei den
Thieren als bei den Säugethieren, bei diesen wieder
grösser als bei den Fischen und Amphibien ist. Auch
ist es wahrscheinlich, dass in bestimmten Zeiten diese
Temperatur vermindert, oder auch vergrössert wer-
den kann. Es giebt Gewächse die schon aufhören zu
vegetiren, wenn das Thermometer zwei Grad über
den Frostpunkt ist, andere welche sterben wenn es
den Gefrierpunkt kommt und wieder andere die
10, 20, ja sogar 30 Grade und darüber unter dem
Frostpunkte ohne Schaden ertragen können. Schon
aus diesem scheint zu folgen, dass die Säfte derjenigen,
welche so bedeutende Kältegrade überstehen können
stärker, als die sie umgebende Atmosphäre sein
müssen, weil sie sonst solche nicht zu überleben im
stande wären. Eben so können andere Gewächse
eine ansehnliche Hitze überstehn und dabei üppig ve-

getöten, da hingegen Pflanzen der Polarländer und hohen Alpengipfel wohl in die Höhe treiben und vergehen müssen. Wir sehen im Winter die Wurzeln der Birke mit Eis bedeckt und wenn die wärmere Jahreszeit eintritt, hat sie doch keinen Schaden davon gelitten. Einheimische Bäume haben bei grosser Kälte in den lebenden Zweigen flüssige Säfte, und erstorbene Aeste, wenn sich Wässrigkeit innerhalb findet, zeigen sich diese in Eis verwandelt.

Wenn man bei heissen Sommertagen ein von Gewächsen entblößtes, der Sonne ausgesetztes Land berührt, und gleich darauf die Hand auf ein Stück frischen, gleichfalls den Sonnenstrahlen ausgesetzten Bauren legt, so wird man die Erde viel heisser als den Rasen finden. Früchte, die der Sonne ausgesetzt an Bäumen hängen, werden kühler als ein daneben stehendes Glas Wasser sein.

Somnerat fand auf der Insel Luçon einen Bach, worin das Wasser so heiss war, dass ein Thermometer darin eingetaucht 174 Fahrenheit zeigte. Wenn Schwalben 7 Fuss hoch darüber wegflogen, fielen sie sogleich ohne Bewegung nieder, dessen ungeachtet bemerkte er an den Ufern desselben zwei *Aspalathus*-arten und den *Vitex Agnus Castus*, die mit ihren Wurzeln in den Bach reichten. Auf der Insel Tanna fanden die Herren *Forster* den Boden in der Gegend eines feuerspeienden Berges auf 210 Grad Fahrenheit erwärmt, und doch war dieser mit blühenden Gewächsen besetzt.

Die *Hunterschen* und *Schöpfchen* Versuche beweisen eben dasselbe. Ersterer brachte eine dreijährige Fichte unter Wasser in einer künstlichen Kälte von 15 bis 17 Grad Fahrenheit. Der jüngste Trieb er-

4. Die Fichte wurde in die Erde gesetzt, der jüngste Trieb blieb aber welk, der erste und zweite hingegen war frisch. Von einer jungen Haberpflanze, die drei Blätter hatte, wurde ein Blatt in eine künstliche Kälte von 22 Graden gehalten, was sogleich erfror, die Wurzel wurde in eben diese kalte Mischung gebracht, blieb aber unversehrt. Er pflanzte darauf das Gewächs, und es wuchsen alle Theile, nur das vorne Blatt nicht. Eben dieser Versuch wurde auch an Bohnen wiederholt. Das Blatt einer jungen Bohnenpflanze wurde in einer kalten Mischung zum Gefrieren gebracht, ein anderes frisches Blatt wurde in ein bleiernes Gefäß aufgerollt gelegt, nebenbei lagte das erfrorne Blatt was vorher aufgethaut war, und steckte dies Gefäß in eine kalte Mischung. Der Rand des frischen Blattes fror, so weit er mit dem bleiernen Gefäß in Berührung stand, zwischen 17 und 15 Linien, die Atmosphäre war 22 Grad. Das gefrorne Blatt fror weit eher. Der Versuch wurde wiederholt, es zeigte sich derselbe Erfolg.

Der ausgepresste Saft des Spinats und Kohls fror 29 Grad und thauete zwischen dem 29 und 30 Grad auf. Der gefrorne Saft wurde in ein bleiernes Gefäß gethan, und in ein anderes mit kalter Mischung von 28 Graden gesetzt. Die Blätter einer wachsenden Bohnenpflanze und Bohnen wurden auf die gefrorne Flüssigkeit gelegt, die auf dem Orte nach einigen Minuten aufgethauete. Eben diese Wirkung zeigten die Blätter, wenn sie auf eine andere gefrorne Stelle gerückt wurden.

Schöpfung hat in Nordamerika folgende Versuche angestellt: Er bohrte in verschiedene Stämme Löcher, und verstopfte. In ein dergleichen Loch steckte er

dann bei kaltem Wetter einen Thermometer, um die innere Wärme, mit der der Atmosphäre zu vergleichen. Der Erfolg war aber zu verschiedenen Zeiten und nach Verhältniss der Dicke des Baums nicht derselbe. Einige andere Versuche stellte er mit dem Thermometer an, indem er die Temperatur der äussern Luft mit der der Blätter verglich.

Die oben angeführten Versuche des Herrn *Hunter* bestätigen deutlich die Meinung, dass den Gewächsen eine bestimmte Temperatur der Säfte eigen ist. Die *Schöpschen* aber können, wie er auch selbst vermuthet, nichts Bestimmtes in Rücksicht der eigenthümlichen Temperatur der Pflanzen entscheiden.

Salomé brachte Thermometer in das Mark der Bäume und fand die Temperatur des Stammes auf folgende Art. War die Temperatur der Atmosphäre 2 Grad über den Frostpunkt, so stand es in den Bäumen 9 Grad. Dieser höhere Stand blieb bis zum 14 Grade, sobald aber die äussere Temperatur 15 war, zeigt sich die der Stämme nur 14. Vielleicht war die Ursache der Verminderung der Wärme die beginnende Vegetation, wodurch der Wärmestoff gebunden wird.

Hermstädt sah bei kalten Tagen, aus dem angebohrten Stamm von *Acer saccharinum* den Saft herausfliessen, der bald darauf in dem darunter gestellten Gefässe in Eis verwandelt ward. Er fand, dass ein in die Oeffnung gestecktes Thermometer, obgleich die Atmosphäre auf 5 Grad unter dem Gefrierpunkte erkältet war, doch noch 2 Grade über dem Eispunkte zeigte. Bei einer darauf eintretenden Kälte von 10 Grad unter Null, zeigt doch noch das Thermometer in dem Stamm einen Grad über dem Gefrierpunkt. Wenn dagegen das Thermometer in einen abgestorbenen

V. Physiologie.

400

umhüllten geschützt wurde, so war dessen innere Temperatur von der umgebenden Luft nicht verschieden. Es kann also diese verschiedene Temperatur der lebenden Bäume nicht von der schwachen Wärme lebender Kraft des Holzes herrühren, sondern muss dem Holz eigenthümlich sein. Runkelrüben, Mohrrüben, Fenchelrüben und Erdtöpfeln zeigten in ihren Säften bei 1 bis 5 Grad Wärme, wenn sie sich auch in einer Kälte von 6 bis 7 Graden unter Null befanden, aber das Thermometer auf 10 bis 12 Grade hin, so erstarrten sie und waren gänzlich erfroren. Apfel und Birnen erfrieren aber schon bei einer Kälte von 3 Graden.

Die noch fortvegetirenden Theile der Pflanzen zeigen, so scheint daraus zu folgen, einen hohen Grad, vermöge der Temperatur ihrer Säfte, wenn sie nach organisirt sind, übersteht, ihre Säfte bleiben flüssig und erstarren nicht, und wenn sie erstarren, so hört ihr Leben auf. Merkwürdig ist die Entdeckung der Wärme in einzelnen Pflanzentheilen zu gewisser Zeit. *Lamark* machte die Entdeckung, dass das receptaculum von *Arum italicum* zur Zeit der Befruchtung sich beträchtlich erwärmt, dass man durch die bloße Betasten schon eine Erhitzung dieses Theils wahrnehmen kann. *Bory de St. Vincent* giebt in seiner Reise die von Herrn *Hubert* auf Isle de France angestellten Versuche mit dem *Caladium esculentum*, die äusserst interessant sind. Die Temperatur der Luft war am Morgen 21 Grad über Null und das receptaculum dieser Pflanze hatte sich bis auf 42 Grade erhöht. Die Versuche wurden auf die mannigfaltigste Weise wiederholt, und gaben stets dasselbe Resultat, selbst Wachs, was darauf geklebt wurde, schmolz.

Noch ist diese Erscheinung nicht erklärt, nicht weiss, was für eine eigenthümliche Zeit zur Begattungszeit bei den Aroiden vorgeht.

Gräser, Wurzeln und Nadelhölzer, überh diejenigen Gewächse, welche zähere Säfte können der Kälte weit eher, als andere stehn. Bäume aber, die ihre Blätter abwerfen sind, sobald diese noch gegenwärtig sind, empfindlich gegen dieselbe. Die Ursache liegt darin zu liegen, dass alle Säfte, sobald die Blätter abgeworfen sind, in stärkerer Bewegung und mehr verdünnt sind, also auch um so eher gefrieren können. Bei früh eintretenden Wintern findet man, dass Bäume, die entblättert wurden, nicht den Winter überleben.

(Dass die Pflanzen eigenthümliche Wärme zeigen die Versuche nicht. In Haarröhren gefrieren Flüssigkeiten nicht leicht, weil das Gefrieren nöthige Erschütterung nicht leicht zu bringen ist. Dass im Winter das Innere des Stammes oft eine höhere Temperatur als die umgebende Luft hat, ist nicht zu verwundern. Winde und Verdunstung ausserhalb des Stammes vermehren. Den jungen Zweig tödtet die Kälte, wie sie einen lebendigen Körper tödtet, und der erschlafte Zweig, worin alle Säfte stehen, gefriert leichter.

Die Hitze in den Blüthen ist lokal, wie richtig erwähnt. Die Entwicklung und Ernährung von gekohltem Wasserstoffgas (an der Luft) scheint die nächste Ursache zu sein.

Die Ursache warum entblätterte Bäume von der Kälte leiden, als andere, ist wohl so mechanisch, als der Verfasser meint. Die zarten Theile, werden leichter durch die Kälte getödtet, und jede Verderbung erstreckt sich der Pflanze bald über den ganzen Körper.

283. Der Umlauf der Säfte kann aber bei den Gewächsen nicht von der Art sein, wie man bei den Säugethieren, Vögeln, Fischen, Amphibien und Insekten findet, weil man sonst einen Hauptpunkt

in alle Flüssigkeiten ausgehn, und wo sie wieder zusammenreffen, hätte bemerken müssen. Wäre eine solche Circulation, so würden nicht aus jedem kleinen Zweige eines Weidenbaums wieder junge Sprosse hervorwachsen können. Der Umtrieb der Säfte muss aus vielen Stücken von dem des Thierreichs verschieden sein, wie folgende Erfahrungen beweisen. Die Impatiens Balsamina (Impatiens Balsamina) wird, sobald das Wasser fehlt, da sie eine Wiesenpflanze ist, gleich welk werden. Giesst man sie an, so werden nach fünf Minuten alle Blätter und der Hauptstengel wieder aufrecht stehn. Ein Baum oder Strauch wird nicht so schnell erholen. Ich sah einen Kirschbaum, dessen Stamm dicht unter der Krone vom Sturm abgebrochen war, und wo die Krone nur noch durch einen schmalen Streifen Rinde mit dem Stamm zusammenhing. Man befestigte dieselbe sogleich. Die Knospen waren eben geöffnet, die Blumen aber noch geschlossen. Ueber acht Tage merkte man nichts an der Krone, vielmehr blühte sie prächtig, aber bald nachher verwelkte alles. Eben so sahe ich an abgebrochenen Aesten von Obstbäumen die Früchte reif werden, auch sah ich Obstbäume, deren Stämme erfroren waren, die aber doch austrieben und sich bis gegen die Mitte des Junius hielten, dann aber eingingen. Sträucher, deren Wurzeln verfault oder von Insekten verzehrt sind, werden eine lange Zeit minfärbige Blätter haben, aber sich doch noch immer halten, und selbst noch einen kleinen Zeitraum nachher verwelken, wenn schon die Wurzeln zerstört sind.

Die Spiralgefässe (§. 242.) hält man für diejenigen, durch welche der Saft aufwärts steigt, was man besonders dadurch zu beweisen bemüht ist, dass die

farbigen Flüssigkeiten, worinn man abgeschaltene Zweige stellt, in ihnen aufwärts steigen, und ihnen färben. Man bedenkt aber nicht, dass der geschnittene Zweig sich in einer nicht natürlichen befindet und sieht, wie bereits oben angeführt niemals, dass eine noch so stark gefärbte Flüssigkeit durch die Wurzeln aufgenommen wird. In der That scheinen doch die Versuche, welche *Link* an dem Aufsteigen des Safts durch dieselben zu machen. Er lösete, an einem blattvollen Ast eines jährigen im besten Wuchse stehenden Pflanzens, die Rinde rund herum einen Zoll breit ab, band und überzog die Wunde mit Baumwachs, um den geringsten Schaden zu leiden, grünte der Ast fort. Hierauf nahm er einen andern eben so beschaffenen Zweig, von dem er nicht bloss die Rinde sondern auch das Holz bis auf eine Linie dick um das Mark herum wegschnitt, verband ihn eben so sorgfältig, und damit er nicht abbrechen möchte, steckte er noch einen Stock daran. Auch dieser grünte nach wie vor, ohne den mindesten Schaden zu leiden. Darauf wählte er einen ähnlichen Zweig, schnitt ihn der Länge nach auf, lösete behutsam das Holz, und nahm einen Zoll langes Stück davon heraus, verschloss die Wunde sorgfältig, und band den Stock an den Ast, um das Abbrechen desselben zu verhindern. Nach einigen Stunden wurden die Blätter welk, am andern Tage hingen alle, und kurz darauf war er völlig abgestorben. Das Holz (§. 264.) besteht aus Treppengängen und getüpfelten Gefäßen. Ueberall schieben sich neue Spiralgefäße jährlich hinzu, und vorzüglich sind sie um das Mark zu sehen. Hieraus folgt, dass diese den Saft aufsteigen lassen.

üssen, weil in den beiden ersten Versuchen die Spiralgefässe noch erhalten waren, konnte der sich über den Schnitt befindliche Theil ohne Schaden fortwachsen, und bei dem letzten Versuche, da demselben die Spiralgefässe genommen waren, konnte er nicht beharren, sondern musste hinwelken. *Duhamel* machte einen ähnlichen Versuch. Er zog einem Baum die unze Rinde des Stammes ab und bedeckte sie sorgfältig gegen die äussere Luft, ohne dass er dadurch Schaden litt. Die Rinde hatte sich nach einem Jahre wieder erzeugt. Ich sahe einen Pflaumenbaum, der rissige Rinde hatte, und schlecht trug, man zog ihn ab, verhüllte den Stamm, und nach einigen Jahren trug er reichlich, und war mit neuer schöner Rinde überzogen.

Dass die Richtung der Pflanze dabei gleichgültig ist, beweisen die Erfahrungen, wo man den Stamm eines Baumes umgekehrt hat, und die Wurzel Blüthen, die Krone aber Wurzelasern zu treiben, gezwungen hat. (§. 263.) Eben dieses beweisen abgeschnittene Zweige von Pflanzen, deren Spiralgefässe sich anfüllen lassen, man mag den untern Theil derselben in ihre Spitze hinein stellen.

Das Aufwärtssteigen des Safts wäre also ausser dem Zweifel gesetzt, aber wo geht er weiter hin. Die Spiralgefässe endigen sich an der Spitze plötzlich ohne feiner zu werden, oder sich allmählig zu verlieren, wie die thierischen Gefässe. Es muss also wohl in Zellengewebe die zugeführte Feuchtigkeit aufnehmen, und zwar in der ganzen Länge der Pflanze. Unbewaffnetes Auge entdeckt keine Spur einer Oeffnung, und doch füllen sich die Zellen. Es muss folglich nothwendig ein Durchschwitzen von Zelle zu

Zelle statt finden. *Link* machte auch in dieser Hinsicht entscheidende Versuche. Er wählte Pflanzentheile, die Gallussäure und Gerbestoff enthalten, und setzte diese in eine Auflösung von schwefelsaurem Eisen. An einem Stücke des Wurzelstocks der *Musa siaca* wurden alle Spiralgefässe schwarz gefärbt. Hieraus hervorgeht, dass in demselben eine zu- und abziehende Flüssigkeit geführt wird. Zweige von *Eiche*, von *Sempervivum glutinosum*, *Telephium*, und Blätter von *Rheum Rhaponticum undulatum*, wurden in diese Auflösung gesetzt. Sie zeigten sich zuerst schwarze Flecke neben den Nerven der Blätter, sie gingen von dort zu den Aesten über, und drangen endlich zu den Blättern und Zweigen. Zuweilen sah er aber auch, dass die Flecke an den grössern Zweigen früher als an den kleineren Zweigen und Blättern entstehen. Bei einer Untersuchung fanden sich die Spiralgefässe und die Zellen aber neben denselben mit schwarzer Flüssigkeit gefüllt. Der Saft in den Blättern der *Succotrina* wird an der Luft, durch die Einwirkung des Sauerstoffs röthlich gefärbt, oxygenirte Salze bringen schneller diese Erscheinung hervor. Er setzte ein abgeschnittenes Blatt dieser *Aloe* in solche Flüssigkeit und fand nach einigen Tagen rothbraune Flecke durch das ganze Blatt. Es zeigten sich unter dem Mikroskop die Spiralgefässe bis auf ein einziges hin, das farblos, der Bast war mit dem farbigen Saft und einige Stellen des Zellengewebes. Die Versuche mit adstringirenden in eine Auflösung von schwefelsaurem Eisen gestellten Pflanzen beweisen, dass die Flüssigkeit erst in die Spiralgefässe geht, um sich dann in das Zellengewebe absetzen. Aus dem

Wie mit der Aloë geht dasselbe hervor, nur mit dem Unterschiede, dass aus dem Zellengewebe die Feuchtigkeit in den Bast dringt.

Das Abwärtssteigen des Safts geschieht durch den *Canal de Rinde L.*, dieses beweisen folgende Erfahrungen. Wenn man um einen dünnen Zweig eine Leinwand schürzt, so wird über dem zusammengeknüpften Theil eine Anschwellung nach Verlauf einiger Monate entsteht. Gewöhnlich bedient man sich dieses Mittels, um Zweige von Gewächsen, die sich schwer durch Stecklinge vermehren lassen, zum Wurzel schlagen geschickter zu machen. Eben so sieht man bei einem durch die Rinde kreisförmig um den Stamm gezogenen Schnitt, den obern Theil der Wunde sehr flüssig werden, und bei Kirschbäumen aus dem Saft mehr Gummi sich absondern, auch wird er mit der Zeit dicker. *Thom* fand, dass Obstbäume, welche andere unter freiem Himmel ausdeutende Höhlen hatten, besser blühten und bessere Früchte an den Zweigen trugen, woran man kreisförmig einen schmalen Streifen Bast abgelöst hatte. Der Saft wurde abwärts steigen, zurück gehalten, und es bildeten sich daraus die beabsichtigten Theile aus.

Die Gefäße der Pflanzen verbinden sich nicht wie die Thierreiche (§. 256.) sie laufen stets gerade aus, ungeachtet wird ihre Verbindung, wenn auch einige Unterbrechungen kommen sollten, nicht aufgehoben. Dieses beweiset eine sehr wichtige, von *Link* gemachte Erfahrung. Er schnitt aus dem dicken Zweige eines Apfelbaums im Julius ein mehr als Zoll langes Stück, so dass die Rinde auf der einen Seite bis dem Holze bis über dem Marke hinaus weggenommen war, so dass nur noch auf der andern Seite

V. Physiologie.

die Rinde mit dem äussern Holze übrig blieb. Eine Zoll höher nahm er ein ähnliches Stück in entgegengesetzter Richtung heraus. Hierdurch waren nun alle Gefässe unterbrochen, es konnte der Saft nicht mehr gerade in die Höhe steigen. Er verband die Wunde sorgfältig, befestigte einen Stock an dem Zweig, um das Abbrechen zu verhindern, und fand, dass derselbe ungestört fortwuchs. Das Wachsthum ging langsamer, wie sich vermuthen lässt, aber unterbrochen war es nicht, weil durch das Austreten des Safts in das Zellengewebe die Communication wieder hergestellt wurde.

Der Umlauf des Saftes geht also so von statten, dass die Spiralgefässe den Saft aufwärts führen, auf der ganzen Länge in das Zellengewebe absetzen, von dort geht er durch den Bast abwärts, wird in die Zellen wieder abgesetzt, und von den Spiralgefässen aufwärts neuer aufgenommen. Dies geschieht aber nicht in regelmässigen Intervallen, sondern ohne bestimmte Ordnung dabei zu beobachten. Der Stengel giebt den Blättern Säfte, diese geben sie dem Stengel wieder. Bei eintretendem Mangel an Feuchtigkeit zehren die Pflanzen öfter durch sich selbst, wie Zwiebeln, welche trocken gestellt sind, beweisen, welche Blätter und Blüthen entfalten, aber dabei die ganze Zwiebel aufzehren.

Dass nicht mechanisch der Saft fortgeschafft, also nicht durch blosse Anziehung fortbewegt werde, ist wohl gewiss, gleichwohl hat man kein Zusammenziehen und Ausdehnen der Gefässe wahrgenommen, und eben so wenig die Zellen sich erweitern und zusammenziehen sehn. Es scheint, als wenn die blosse Spannkraft der Gefässe und des Zellengewebes diesen bewirkt.

(Ich bin zu dieser meiner ersten Meinung, welche der Verfasser genau vorträgt, zurückgekehrt, und nehme die in der vorigen Ausgabe zugefügten Anmerkungen zurück. Der Saft scheint nur in den gewundenen Spiralgefäßen aufzusteigen, der mittlere Kanal, wenn nicht eine Ueberfüllung Statt findet, leer zu bleiben, oder vielmehr nur mit Luft gefüllt, welche für die erste Zubereitung des Safts in diesen Gefäßen wirksam sein mag. Nur scheint es mir jetzt, als ob die zurückführenden Gefäße die Verbreitung des Saftes im Zellgewebe, und aus demselben zurück befördern, unbeschadet jedoch des langsamern Ueberganges aus einer Zelle in die andere, vermöge des Durchschwitzens. Auch muss hinzugefügt werden, dass der in den Zellen zubereitete Saft zuletzt in die eigene Gefäße übergeht, und dort durch sein Kreisen das Leben in Thätigkeit erhält. L.)

284. Nicht alle Nahrung, welche die Gewächse ihrer Fortdauer gebrauchen, nehmen sie aus dem Boden worin sie stehn, vielmehr wird die grösste Theil derselben aus der Atmosphäre eingesogen. Besonders nehmen Sträucher, Bäume und saftige Gewächse die meiste (? L.) Nahrung aus der Luft. Die niederschlagenden Feuchtigkeiten, als Thau, Nebel und Regen werden von ihnen begierig eingesogen. In Spaltöffnungen (§. 243.) welche auf der Oberhaut des Pflanzenkörpers gelegen sind, hat die Natur zum Aufsaugen der dunstförmigen Feuchtigkeiten bestimmt (? L.) daher sind sie häufiger auf der Unterfläche der Blätter. Der nächtliche Thau und überhaupt die aufsteigenden Dünste können von ihnen bequem aufgenommen werden. Hedwig glaubte, dass sie zum Ausdünsten bestimmt wären, dagegen spricht aber ihr Geschlossensein um die Mittagsstunde (? L.) Er zählte bei einer Feuerlilie, in einer einzigen Quadratlinie 577 solcher Oeffnungen. Legt man diese Zahl als die öf-

Willdenow's Grundriss. 1 Th.

ter vorkommende zum Grunde, so hat ein Quadrat Fläche 83088 Spaltöffnungen. Wie viele Oeffnungen der Art muss ein grosser belaubter Baum haben? Man sieht daraus, das die Quantität der der Luft aufgenommenen Dünste bei einer vollsigen Pflanze gar nicht unbedeutend sein kann.

(Die Spaltöffnungen, da sie sich nur an gewissen Theilen befinden, dienen vielleicht auf irgend eine Art, zur Darstellung oder Erhaltung dieser Function. Ihre Function ist noch nicht gehörig aufgeklärt. An den Tannenarten sondern sie deutlich harzige Substanz ab. L.)

Bonnet bewies die Aufnahme der Feuchtigkeit durch die Spaltöffnungen (die untere Fläche der Blätter, denn von Spaltöffnungen wusste Bonnet nichts. L.) mit einem schönen Versuche. Er legte ein Blatt des weissen Maulbeerbaums (*Morus alba*) mit der Oberfläche auf Wasser, und es hielt sich sechs Monate lang frisch und grün. Dagegen blieb ein Blatt desselben Baums, was mit der Unterfläche auf dem Wasser lag, sechs Monate lang frisch und gut.

Die Gewächse saugen auch Luftarten ein, was würde es nicht zu erklären sein, woher sie die grosse Menge von Kohlenstoff nehmen, woraus sie grösstentheils bestehn. Ueberhaupt dringt die Luft durch Pflanzentheile. Die Lücken und Räume des Zellgewebes (§. 244.) sind damit angefüllt. Man findet in allen bei den Gewächsen mit Luft gefüllten Theilen, keine andere als die atmosphärische.

(Viel saugen die Pflanzen aus der Luft ein, ob die meiste Nahrung, ist sehr die Frage. Dass die Spaltöffnungen zum Einsaugen dienen, scheint sehr unwahrscheinlich. Die obere Fläche der Blätter saugt nicht ein, wenn man die Versuche nach Bonnet anstellt, ungeachtet sie oft Spaltöffnungen hat. Den Kohlenstoff nehmen die Pflanzen aus dem Extractivstoffe der Dammerde, aus

mit Kohlensäure versehenen Wasser, am wenigsten aus der Kohlensäure der Atmosphäre. L.)

285. Das Ausdünstungsgeschäfte wird von den Laaren der Gewächse (§. 246.) betrieben. Man glaubte oftmals, dass sie nur zum Einsaugen der Feuchtigkeit und wässrigen Dünste bestimmt wären. Es zeigen sich aber an den Spitzen der Haare öfter kleine Tropfen, weil sie harzige und andere Feuchtigkeiten, dass ihre Bestimmung wohl keinem Zweifel unterworfen bleibt. Nejenigen, welche keine Haare haben, scheinen ohne besondere sichtbare Oeffnungen zu haben, die Ausdünstungen durch die Oberhaut zu schwitzen. Bonnet bestrich die Blätter mit Oel, wodurch der Ausdünstungsprocess gänzlich unterdrückt ward, sie erhielten eine schwarze Farbe und fielen ab. Dasselbe sah ich an einer Glashauspflanze, deren Blätter man, um die Schildläuse zu tödten, mit Oel bestrichen hatte, und welche daher alle abfielen. Pflanzen die dem Staube ausgesetzt sind, werden bei anhaltender Dürre, eben weil ihre Fläche verstopft ist, die Blätter abwerfen.

Die Ausdünstungen der Gewächse sind aber zweierlei Art, nämlich wässrige und gasartige. Die wässrigen sind beträchtlich. Hales machte viele Versuche, um dieses deutlich darthun, z. B. eine drei Fuss hohe Pflanze der Sonnenblume, verlor im Durchschnitt gerechnet, in einer Stunde ein Pfund und acht Loth. Während der Nacht fand sich, wenn kein Thau fiel, ein Verlust von sechs Loth, war aber Thau gefallen, so hatten die Blätter vier bis sechs Loth Feuchtigkeit eingesaugen; am Tage hingegen war die Ausdünstung immer sehr ansehnlich. (Hales unterschied aber wässrige und gasartige Ausdünstung nicht. L.) Watson stellte ein Trinkglas von 20 Quadratzoll Inhalt

bei sehr warmem Sonnenschein, nachdem es mehrere Monate nicht geregnet hatte, umgekehrt auf einen abgemähten Grasplatz, nach zwei Minuten zeigte es sich voller Wassertropfen, die überall herunterliefen. Er sammelte dieselben durch ein genau abgewogenes Stück Mousselin und wiederholte diese Versuche mehrere Tage, zwischen 12 und 3 Uhr. Hieraus berechnete er, dass ein Morgen Land in 24 Stunden 600 Quart Wasser ausdünstet.

Eine eigene Art wässriger Ausdünstung nahm *Brugmanns* an den Wurzeln einiger wuchernden Pflanzen wahr. Er hatte einige Pflanzen der Art in ein mit Erde gefülltes Zuckerglas gesetzt, und sah des Nachts an den Spitzen der Wurzelfasern einen Tropfen Flüssigkeit. Er will bemerkt haben, dass sobald ein solcher Tropfen die Wurzeln anderer Gewächse berührte, dieselben vertrockneten. Geschah dieses öfter, so musste die Pflanze eingehn. Auf diese Art soll:

Der Hafer (*Avena sativa*) von *Serratula arvensis*,

Der Flachs (*Linum usitatissimum*) von *Scabiosa arvensis* und *Euphorbia Peplus*,

Der Weizen (*Triticum aestivum*) von *Erigeron acris*,

Der Buchweizen (*Polygonum Fagopyrum*) von *Spargula arvensis*,

Die Mohrrübe (*Daucus Carota*) von *Inula Helenium* getödtet werden. Daraus schliesst er, dass die Unkräuter mit der aus ihren Wurzelsasern tröpfelnden Flüssigkeit die neben ihnen stehenden Gewächse unterdrücken. Sollte aber nicht vielleicht schon deshalb das Unkraut die kultivirte Pflanze verdrängen, weil es rascher den Nahrungsstoff zu sich nimmt, sich schneller ausbreitet, und dadurch alles fernere Wachstum der nebenstehenden Pflanze verhindert?

Auch ausserhalb der Erde sieht man besonders bei jungen raschwachsenden Pflanzen öfters auf den Blättern, besonders an der Spitze Tropfen stehn.

Die gasartigen Ausdünstungen der Gewächse bemerkte zuerst *Bonnet* 1754, nach ihm *Priestley* 1773, diesem folgte *Ingenhous* 1779, und nach diesem mehrere berühmte Physiker, als: *Sennebier*, *Schrele*, *Achard*, *Scherer*, *Succow* (*Saussure*. L.) u. m. a. Kein Zweig der Pflanzenphysiologie hat eine so zahlreiche Menge von Versuchen aufzuweisen als dieser. Die Resultate aller dieser mühsamen Untersuchungen sind folgende: Die Pflanzen geben im Sonnenlichte eine grosse Quantität Sauerstoffgas von sich, in der Nacht stossen sie aber eine Luftart aus. (? L.) die für Thiere nicht zum Athmen taugt, aber die Menge derselben ist bei weitem geringer als diejenige der Sauerstoffluft, welche sie am Tage verlieren. Es entsteht dadurch in der Atmosphäre eine beständige Cirkulation, indem die Pflanzen die von den Thieren durch das Athmen verdorbene Luft verbessern.

Die Blätter auf ihrer Oberfläche, alle grünen Stengel, und überhaupt dasjenige, was grün an den Gewächsen ist, stossen im Sonnenlichte Sauerstoffgas aus, besonders aber grüne Wasserpflanzen, Nadelhölzer, Gräser und viele saftige Gewächse. Weniger von dieser Luftart geben Baumblätter als Kräuter. Kein Sauerstoffgas geben selbst im Sonnenlichte: *Ilex Aquifolium*, *Prunus Laurocerasus*, *Mimosa sensitiva*, *Acer glabrum* variegatis, Blumenblätter, reife Früchte, Rinde der Bäume, Blattstiele und Rippen der Blätter. Die in der Nacht ausgehauchte Luft ist, wie gesagt, weit geringer, und nach Verschiedenheit der Gewächse von verschiedener Mischung, entweder reines kohlensau-

res Gas, oder in den meisten Fällen mit Wasserstoffgas, zuweilen auch mit Stickstoffluft vermischt.

Wenn aber auch die Experimente der genannten Physiker sich bestätigen, und keinem Zweifel weiter unterworfen sind, so bleibt es noch sehr die Frage, ob bei den Pflanzen wirklich solche Ausscheidungen von Gasarten vor sich gehen? Man erhielt dieses Resultat auf keinem andern Wege, als wenn man Blätter und Zweige von Gewächsen unter Wasser hielt. In dieser Lage befinden sich die Pflanzentheile durchaus nicht im natürlichen Zustande, dazu kommt, das gesponnene Glas unter Wasser den Sonnenstrahlen ausgesetzt, auch Sauerstoffgas ausschleudet. Wenn man Pflanzenzweige in Behälter einschliesst und durch Quecksilber die Communication mit der äussern Luft abschneidet, so haben genaue Versuche mit dem Barometer keine Veränderung der eingesperrten Luft wahrnehmen lassen. Es bleibt daher noch den Naturforschern vorbehalten, die hier obwaltenden Zweifel zu lösen,

(Es ist kein Zweifel, dass in der Nacht und im Dunkeln Sauerstoff in und mit den Stoffen der Pflanze verbunden werde, am Tage hingegen sich wiederum scheide, Th. de Saussure hat gezeigt (Recherches chimiques s. la vegetation. Gen. 1804.) dass die Pflanzen Sauerstoffgas und zwar durch ihre grünen Theile einziehen, dass sie dasselbe in ihrem Innern zu Kohlensäure verbindet, und dass endlich diese Kohlensäure am Licht zerfällt und Sauerstoffgas entwickelt wird. Nicht grüne Theile verwandeln das Sauerstoffgas sogleich in Kohlensäure, ohne dasselbe vorher einzuziehen. Hiermit stimmen, überhaupt genommen, die Versuche und Beobachtungen überein, welche ich im zweiten Hefte der Jahrbücher der Gewächskunde erzählt habe. Saftige Gewächse haben des Morgens eine freie Säure, verlieren diese aber, wenn sie eine Zeitlang im Licht ge-

standen haben, also des Mittags, behalten sie aber, wenn sie vor dem Licht verwahrt werden. Wir sehen daraus, dass nicht immer Kohlensäure, als welche das Lakmuspapier nicht röthet, sondern auch oft eine andere Säure entsteht. L.)

286. Die Hauptnahrung der Gewächse ist Wasser, aus der Erde nehmen sie dieses mit ihren Wurzeln zu sich, und über der Erde ziehen sie alle in Dünste aufgelösete Feuchtigkeit an. Das Licht bewirkt durch seinen Reiz eine Zersetzung des Wassers so, dass dieses in seine Bestandtheile, Wasserstoff und Sauerstoff zerlegt wird. (? L.) Der Sauerstoff geht mit dem Wärmestoff eine Verbindung ein, wird gasförmig und strömt durch die ganze Pflanze und zu den grünen Theilen heraus. Der Wasserstoff verbindet sich mit dem Kohlenstoff, den die Gewächse gleichfalls einsaugen und mit mehreren Elementen, welche der Pflanzkörper nach Maassgabe seiner Organisation in mannigfaltigem Verhältnisse aufnimmt, woraus alsdann die Vegetabilien die ihnen eigenen Säfte und Bestandtheile bilden.

In der Nacht, wo das Licht nicht die Wasserzersetzung bewirken kann, entstehen Verbindungen und Abscheidungen anderer Art, daher strömen dann die Gewächse kohlensaures und Stickgas aus. Der wenige vorhandene Sauerstoff kann die Faser nicht so stark reizen, mithin ist die Summe der Ausdünstung viel geringer. Der Reiz, den der durch das Licht gehedene Sauerstoff auf die Faser geäussert hat, verursacht eine Erschlaffung, wodurch der Schlaf der Pflanzen oder das Zusammenlegen der Blätter entsteht.

Das Licht ist den Gewächsen also gar nicht entbehrllich, da es sie mittelst seiner Einwirkung ernährt.

Wenn die unterirdischen Gewächse und einige Schimmelarten abgerechnet werden, bei denen die Vegetation nach andern bis jetzo nicht erforschten Gesetzen vor sich geht; so können die übrigen ohne den Einfluss des Lichts nicht leben. Die Richtung und jeder Art eigenthümliche Lage ihrer Theile hängt allein davon ab. Schattenliebende Pflanzen verlangen auch Licht, aber ein gemässigt, weil die freien auf sie einwirkenden Sonnenstrahlen sie zu heftig reizen würden. Junge Pflanzen wollen auch wie die meisten Cryptogamen Schutz gegen das allzustarke Licht haben, können aber nicht ohne dessen Einfluss leben. Bäume und die meisten Gräser verlangen viel Licht, daher haben alle Bäume nach der Mittagsseite eine stärkere Krone als gegen Norden.

Eben durch das Zersetzen des Wassers entsteht auch die den Gewächsen eigene Temperatur (§. 282.). Die Physiker stimmen aber nicht völlig mit ihren Erklärungsarten. *Sennebier* und *Hassenfratz* behaupten, dass der durch das Zersetzen frei werdende Sauerstoff sich mit dem Wärmestoff der vegetabilischen Faser verbindet und in Gasgestalt aus den Gewächsen herausströmt. Dagegen meint *von Humboldt*, dass die Pflanzen aus der Atmosphäre Wärmestoff aufnehmen und mit dem Sauerstoff, der durch die Einwirkung des Lichts abgeschieden wird, zur Luft verbinden. Er glaubt, dass auf diese Art der kühlende Schatten der Bäume entstehn könne.


Nach andern Gesetzen scheint bei den Pilzen das Geschäfte des Einsaugens und Aushauchens der Stoffe zu geschehen; doch fehlt es hier noch an Erfahrungen. *Agaricus campestris* und *androsaceus* sollen beständig Wasserstoffgas aushauchen. Der Sauerstoff

heist ihnen aber doch ein Reizmittel zu sein, weil sie meistens, in Wasser- und Stickstoffgas eingesperrt, sehr schnell verderben.

(Die Zersetzung des Wassers und die Theorie des Wachsthum, wie sie hier gegeben werden, ist nicht erwiesen. Saussure läugnet die Zersetzung des Wassers ganz. Wohl aber wird es in den Pflanzen mit den andern Bestandtheilen zu einem festen Körper verbunden. L.)

287. Wie die Stoffe welche die Gewächse zu sich nehmen, assimilirt werden, dass heisst, in die Pflanzentart eigenthümlichen Säfte sich zusammenzusetzen, ist uns ein Geheimniss. Die Assimilation hat man bei allen organischen Körpern noch nicht erklären können, ob es gleich nicht an mannigfaltigen Theorien darüber fehlt. Einige wollen dieses bewundernswürdige Geschäft der Organe, durch blosse Anordnung der Theile, andere durch die Form der dazwischen wirkenden Organe, andere wieder durch die Form der Stoffe erklären, aber bei dem allen blieb alles blosse nicht zu erweisende Hypothese. So viel scheint indessen gewiss, dass das Verhältniss der Theile, so wie die Bildung und Richtung der Organe und daraus entstehende grössere oder geringere Reizempfänglichkeit, die verschiedenen Mischungen bewirken können. Wer sagt uns aber wie es kommt, dass jeder Theil einer Pflanze öfter im Geruch und Geschmack verschieden sei? So riecht die Wurzel der *leucia vera* nach Teufelsdreck, die Blume aber verströmt einen sehr angenehmen Duft. Der Stamm schwitzet das milde bekannte arabische Gummi aus, und seine Säfte die er enthält, sind herbe und zusammenziehend.

Es scheint aber, als wenn die Gewächse alle, bei



ressante Versuche angestellt. Er säete i
Schwefel verschiedene Getreidearten, be
destillirtem Wasser und verhinderte, da
oder andere fremdartige Körper dazu gela
auf diesem Wege war er sicher, dass ke
zu den Pflanzen kamen, und doch hatten
arten dieselben Bestandtheile, eben die
Metalle (nemlich Eisen und Braunstein)
den Halmen und Aehren derselben gefun
die auf die gewöhnliche Weise gewachse

Ich darf hier nur an die Versuche erinn
mit jungen Küchlein, welche eben
geschlüpft sind und noch keine Nahrung
gemacht hat. Man fand nemlich, dass
lein fünfmal mehr Kalkerde als das
Bebrüten enthielt. Hier muss doch
durch die organische Kraft aus der
erst gebildet worden sein, oder ist
Weg denkbar, durch den sie in den
langen konnte?

Einige Naturforscher halten dafür, dass
zen aus dem Boden erdige, salzige, sch
öliche Substanzen einziehen und absetzen
ben daher, dass der Dünger den Gewä
die Bestandtheile liefere und sie desha

phosphor und andere in den thierischen Excrementen enthaltene Bestandtheile finden, aber man sieht bei den Getreide nicht eine grössere oder geringere Menge solcher Bestandtheile, sie mögen in niemals düngtem oder in stark mit Dünger versehenem Boden wachsen. Der Dünger wirkt nur als Reizmittel (L.) auf die Faser der Gewächse, damit sie den Nahrungstoff um so begieriger an sich ziehen können. Ihre Bestandtheile bilden sie aus dem eingesogenen Wasser und der aufgenommenen Luft nach der Verschiedenheit ihrer Organe selbst. Man sieht dies besonders aus den oben angeführten Versuchen (S. 375.) wo umgegrabene Erde, die sich mit Sauerstoff gesättigt hatte, so wie der mit verdünnter Schwefelsäure begossene Boden die Gewächse rascher wachsend machte, als vieler in die Erde gebrachter Dünger.

Der Pflanzen Nahrung ist hauptsächlich Wasser und Luft, aber ausser diesen nehmen sie noch aus dem Boden Extractivstoff und zuweilen selbst Salze auf. Die Dammerde macht ein Nahrungsmittel des Pflanzenreichs aus, ohne welche diejenigen, welche in der Erde gewurzelt sind, nicht bestehen können. Reine Erden, so wie andere Substanzen, lassen auf einen gewissen Punkt die Entwicklung der Pflanze zu, aber man hat noch kein Beispiel, dass solche Gewächse vollständig geblüht und reifen Samen erzeugt hätten. Die Dammerde, welche von verfaulten Vegetabilien entsteht, enthält vorzüglich einen Extractivstoff, der durch üppig wachsende Pflanzen ausgezogen werden kann, worauf sie alsdann ihre Fruchtbarekeit verliert. Der Dünger ist ein Reizmittel für die Pflanzen, zugleich aber macht er auch

den Extractivstoff auflöslicher, und setzt bei Vermodern wieder neuen ab.

(Durch den verfaulten und ganz zersetzten I wird die Dammerde mit Extractivstoff vers welcher die Pflanze hauptsächlich ernährt. im blossen Wasser und Luft gezogene Pfl erlangen nie einen vollkommenen Zustand. stoff macht den Extractivstoff auflöslich; daher die Dammerde durch Auslaugen alle löslichen Extractivstoff verloren hat, so sie durch Aussetzen an die Luft die Eigen wiederum den Wasser-Extractivstoff mit len. Daher der Nutzen des Pflügens, Grats. w. L.)

288. Es ist den Physiologen des Pflanzen nicht möglich gewesen, den Saft der Spirale des Zellengewebes und Bastes besonders auszu den und zu untersuchen. Die Zartheit der macht eine solche Nachforschung durchaus unmö gliche. Liesse sich dieses ausführen, so würden wir scheinlich eine Verschiedenheit in den Säften d nannten Theile bemerken und neues Licht darb halten. Es scheint aber als wenn das Zellenge besonders zur Bearbeitung der Säfte geeignet denn in demselben setzen sich Kügelchen v verschiedener Beschaffenheit ab (§. 249.) es schei die zwischen ihnen sich bildenden Räume (§. die abgesonderten Stoffe aus. Drüsen (§. 245.), si gen zu den wahren oder unächten gehören, b aus Zellengewebe, in diesem finden sich andere abgeschieden. Die Spiralgefäße erhärten nur, dass man in ihnen einen besonders bereiteter wahrnimmt. Sie werden in Treppengänge und terte Gefäße verwandelt und verhärten sich e zur Holzfaser.

Die verhärteten Fasern der Pflanzen, welch

Holz kennen, werden aber nach Verhältniss, wie den Kohlenstoff vermöge ihrer Organisation verschiedene Grade der Härte haben, und je härteres Holz anfällt, desto langsamer ist der Wuchs Baums oder Strauchs. Die festesten und härtesten haben daher den meisten Kohlenstoff und brauchen lange Zeit zu ihrem vollkommenen Wachsthum, die weisse Buche (*Carpinus Betulus*), die rothe Buche (*Fagus sylvatica*), die Eiche (*Quercus Robur pedunculata*), die Ceder von Libanon (*Pinus Cedrus*), der Affenbrodbaum (*Adansonia digitata*) u. v. a. Es giebt es auch Ausnahmen von der Regel, zum Beispiel die sogenannte unächte Acacie (*Robinia Pseudacacia*), wächst sehr rasch und hat ein festes hartes Holz.

Die Güte des Holzes einer und derselben Art, hängt vom Alter des Baumes ab. Je älter der Baum ist, desto härter, dichter und fester ist sein Holz. Jährlich sich einschiebenden neuen Spiralgefässe machen es immer dauerhafter. Unsere Vorfahren wählten zum Bau ihrer Gebäude die ältesten Baumstämme, daher findet man noch in alten Gebäuden festes schönes Holz und in den von uns aufgeführten sieht man oft schon nach wenig Jahren den Stamm oder es ist durchaus verfault.

Jeder Strauch oder Baum macht bei uns jährlich zwei Triebe, der eine, welches der Haupttrieb ist, entfaltet sich im Frühjahr, der andere ist nicht so stark und kommt gegen den längsten Tag, also um den 21. Juni, woher er auch Johannistrieb genannt wird. Der erstere wird von der Menge von Säften gebildet, welche die Wurzel den Winter hindurch eingesogen hat (§. 281.), der zweite wird durch die im Frühjahr

eingesogenen Feuchtigkeiten hervorgebracht. warmen Zone sind beide Triebe gleich stark dort die Gewächse viel üppiger wachsen.

289. Erquickend für unsere Augen ist die Farbe der Pflanzenwelt. Die Ursache, warum Pflanzenblätter grün aussehen, hat lange Zeit Naturforscher beschäftigt, und zu mancherlei Irrthümern verleitet. Zu den Zeiten der Phlogistontheorie war man sehr bald mit der Erklärung fertig, daß die grüne Farbe für ein blosses Spiel des Phlogistons hielt, welches dieses aus der Reihe der Wesen vertilgt ist, und man suchte andere Erklärungsarten gesucht. *Berthollet* hat aber gezeigt, daß die grüne Farbe der Pflanzen nicht aus einem einfachen Blau zusammengesetzt sei, weil das Prisma il nicht wie das von anderen Stoffen, in gelbe und violette Strahlen zerlegte.


Wenn man mit Weingeist die grüne Farbe der Blätter auszieht und diese Mischung der Sonnen- und atmosphärischen Luft aussetzt, so verliert sie ihre grüne Farbe ganz. Der Sauerstoff der Atmosphäre verbindet sich mit der Mischung verbunden und das Verschwinden derselben bewirkt. Tröpfelt man aber Ammoniak hinein, der wie bekannt aus Wasserstoff und Stickstoff besteht, so entzieht letzterer der Mischung den Sauerstoff und die grüne Farbe ist wieder hergestellt. Nach allen Erfahrungen ergibt sich, daß Blätter grün sind, wenn der Sauerstoff durch die Lichtstrahlen zerstört ist, grün sind, und wo er sich aufgehäuft hat, bleiche oder weisse Farbe haben. (§. 279.) Die Mischung des Wasserstoffs und Kohlenstoffs, welche sich im harzigen Färbestoff (§. 240. Nr. 19.), vorfindet, diese Farbe hervorruft, findet, macht das Pflanzen aus.

290. Die schwarze Farbe der Rinde, an den lehartigen Gewächsen ist nach *Berthollets* Erfahrungen eine Wirkung des Sauerstoffs der Atmosphäre. Herr von *Humboldt* wiederholte seine Versuche und fand, dass Holz in Sauerstoffgas eingeschlossen, binnen zwei bis drei Tagen schwarz wurde, die Luft war mit Kohlenstoff gemischt. Es scheint, als wenn der Sauerstoff des Dunstkreises sich mit dem Wasserstoff der Pflanzenfaser verbindet und dadurch die Faser frei macht, so dass sie durch ihre Farbe bemerkbar ist, und schwarz erscheint.

291. Die Blätter der Pflanzen haben eine verschiedene Dauer, die meisten des warmen Klima bleiben 3 bis 6 Jahre an den Zweigen sitzen, wenige in kälteren Himmelsstrichen haben sie so lange und dann nur diejenigen, welche zähe Säfte führen, wie *Ilex aquifolium* und *Viscum album*, oder deren Säfte harter Art sind, z. B. alle Nadelhölzer. Alle übrigen Blätter der kälteren Himmelsstriche fallen im Herbste ab. Dieses geschieht aber auf mancherlei Art. Einige Blätter welken allmählig hin und fallen ab, oder bleiben verbleibend bis zum Frühling stehn, andere fallen selbst bei gelinden heitern Herbsttagen noch grün herunter. Auch von allen verschiedenen entlaubt sich *Robinia pseudacacia*. Ihre gefiederten Blätter lassen erst alle Fiedelchen fallen und alsdann fällt endlich der Hauptstiel, auf dem sie befestigt waren.

Man hat mancherlei Gründe angeführt, warum die Pflanzen im Herbste sich entblättern, die vornehmsten Meinungen der Naturforscher über diesen Gegenstand sind:

Du Hamel nahm erstlich an, dass der Blattstiel



abfallen sah, und ersann folgende Erklärung: Feuchtigkeit, welche die Wurzel zuführt, das Wachsthum des Blattstiels, die Starke derselben verursache dessen Austreibung, sobald ihm dadurch die Säfte entzogen, das Abfallen der Blätter bewirken.

Mustel glaubt, dass die Blätter im Winter ausdünsten; daher entsteht bei ihnen Verstopfung der Säfte, die einen Querbruch am Blattstiels hervorbringt, wodurch die Blätter sich lösen müssen und abfallen.

Frolik meint, dass die Blätter ein Leben haben, bei dem man verschiedene Perioden nimmt. Ihr Leben ist aber an das Leben der Pflanze gebunden, und hängt von dieser ab. Wenn sie ihr grösstes Alter erreicht haben, so kann ohne sie eine Zeitlang bestanden. Blätter trennen sich von dem lebenden Theile, jeder todte Theil im Thierreiche vom ge-

Hätten die Hypothesen des *Du Hamel* ihre Richtigkeit, so müssten im Winter die Blätter nie von den Bäumen fallen. In Ostindien einige Bäume, die sich z

seiner Erscheinung sein. *Frolik's* Meinung ist richtig und stimmt mit allen Erfahrungen überein.

Die wahre Ursache des Entblätterns liegt darin, dass den Sommer hindurch, durch die häufig zugeführten Säfte, die Gefäße des Blattstiels allmählig verholzen, so wie das ganze Blattnetz eine mehr holzartige Consistenz erhält. Die Säfte müssen daher allmählig in Stocken gerathen und am Ende hören die Verbindungen zwischen dem Stengel und dem Blattstiel auf. Die Wunde, welche dadurch der Stengel erhält, verharscht, ehe sich der Blattstiel trennt. Die aufgehobene Gemeinschaft zwischen dem Blatte und dem Stengel in Rücksicht der Gefäße macht, dass der verbindende Blattstiel am Ende sich völlig löset, und dass besonders bei hellem stillem Wetter die Blätter fallen müssen, denn die Sonnenstrahlen befördern noch den Antrieb der Säfte, die Verbindung mit dem Blatt hat aufgehört, und es muss natürlich durch die Bewegung des wenigen Safts eine kleine Erschütterung geschehn, die hinreichend ist, den Fall des Laubs zu befördern.

Bei der Eiche kann das Blatt im Herbste nicht fallen, weil die Gefäßfaser sehr zähe ist, und eben durch den Zusammenhang mit dem Knoten des Blattstiels und dem Stengel nicht aufgehoben werden kann. Bei der *Robinia Pseudacacia* verstopfen sich leicht die kleinen zarten Blattstiele der Blättchen, sie trennen sich daher früher vom allgemeinen Blattstiel, der noch saftig genug ist, eine kurze Zeit sich zu halten, bald aber auch, da er ohne Blättchen nicht bestehen kann, ihnen folgen muss. Es liegt also in der Natur des Blatts, wie lange es sich am Stamme hält, und hängt keinesweges von der Witterung ab. Die *Willdenow's Grundriss*. I Th.

eigenthümliche Organisation muss auch hier übersehn werden, da sie allerdings mächtiger darauf hat. Hingegen ist nicht zu läugnen, dass im Herbst eintretende Kälte die Blätter zu ihr Abfallen befördern kann.

(Der Verf. hebt seine eigene Meinung zu dadurch wieder auf, dass er eine mehr Erklärang vom Verstopfen der Gefässe einnenngt. Allerdings ist der Periodism der und ihrer Theile der einzige Grund vom der Blätter. Kälte kann das Abfallen h aber Wärme es nicht ganz verhindern.

292. Das Wachsthum der Pflanze wird die Entwicklung der Blume begrenzt. Hat wächs die gehörige Festigkeit erlangt, was grossen Mannigfaltigkeit derselben nicht zu und in einem Alter geschieht, so ist es für weiter fortzupflanzen, und es bildet sich ein Theil, den wir Blume nennen. Die Ankunft baldige Erscheinen derselben, kann man bei tigen Gewächsen gewöhnlich daran erkennen die Blätter immer kleiner werden, bis endlich kleinern zarteren Theile der Blume selbst sich ckeln, *Goethe* hat daher nicht unrecht, wenn Wachsthum der Pflanzen ein Ausdehnen und menziehen nennt. (Doch nicht allein in dieser bedeutung. L.) Wie dieses auch schon *Wol* weisen sich bemühte.

293. Die Blume wird durch die Trennung (mehrerer L.) Gefässbündels gebildet, *Linné* sich davon eine ganz irrige Vorstellung. Er Mark der Pflanze, was er für eben so wichtig das Rückenmark der Thiere hielt, für das

bildende im Gewächsreiche an. Die ganze Vegetation
 schah nach seiner Meinung durch dasselbe. Der
 me selbst war ein Stückchen Mark, was sich von der
 utter trennt, um eben die Erscheinungen darzubie-
 n, die die alte Pflanze gewährte. Er ging aber noch
 eiter, indem er jedem Theil des Gewächses eine
 stimmte Kraft zueignete, einen Blumentheil auszu-
 lden. So sollte der Kelch durch die Rinde, die Blu-
 enkrone durch den Bast, die Staubgefässe durch das
 olz und der Stempel durch das Mark gebildet sein.
 ine sinnreiche Hypothese dehnte er aber noch wei-
 r aus; indem er annahm, dass bei holartigen Ge-
 wächsen jeder Zweig fünf Jahre zu seiner völligen
 ickelung bis zur Blume bedürfe, und dass in je-
 m Jahre etwas für die künftige Blume vorgebildet
 rde. So würden im ersten Jahre, da der Zweig
 ch aus der Knospe entfaltet, die Schuppen, im zwei-
 n Jahre der Kelch, im dritten die Blumenkrone, im
 erten die Staubgefässe vorgebildet, im fünften Jahre
 er wird dieses alles auf einmal, woran die Natur
 nf volle Jahre zum Ausbilden brauchte, völlig ent-
 ickelt.

Linné mag in so fern Recht haben, dass jedes Ge-
 wächs eine bestimmte Zeit bedarf, um zu blühen,
 as erst bei ihnen eine grössre Quantität von Säften,
 ie mehr bearbeitet sind, um jene für die Fortdauer
 er Arten so wichtigen Theile bilden zu können, vor-
 ähig sein muss; aber dass jährlich irgend ein Blüthen-
 heil als Entwurf vorausgebildet werde, möchte wohl
 schwerlich anzunehmen und zu erweisen sein. Eben-
 o wenig können wir annehmen, dass das Mark das
 einzige Bildende der Vegetabilien sei. Aus dem an-
 geführten Nutzen und der Bestimmung des Marks (§.

272.) erhellt, dass es den Gewächsen entbehrt ist, als man ehemals glaubte. Dass aber Rinde Holz und Mark jedes für sich einen Theil der hervorbringen, streitet so sehr gegen alle Evidenzen, dass es kaum eines Worts bedarf, um widerlegen zu wollen. Man findet bei den einblüthigen Blumen nichts als Verlängerungen der Stängelgefäße, aber nie dass von jedem der genannten Theile eine Verlängerung zum künftigen Kelch, Kronenrand u. s. w. sich erstreckt. Wie sollte bei der gemeinen Sonnenblume (*Helianthus*) wo auf einem grossen Fruchtboden zahlreiche Blumen stehn, von der Rinde, Bast u. s. w. der Fruchtboden Verlängerungen sich zu jedem Blüthenstempel verbreiten können? Es würde hier eine Verfallung aller dieser Partikeln entstehen müssen, die nicht antrifft. Wie, frage ich ferner, sollten die Staubgefäße bei den holzlosen Kräutern, und Stempel bei den marklosen Gewächsen erzeugen? Wer sieht nicht hier, dass alle diese Behauptungen bloss Hypothesen sind, die selbst schon anatomische Untersuchungen sich widerlegen!

(Dass die Rinde nicht den Kelch, der Spindel die Blume u. s. w. bilde, zeigt die Anatomie. Linné's Lehre hier falsch zu sein. Aus der Theorie der Knospen ging hervor. Da nämlich die Blätter in ihren Winkeln Knospen, die Blätter dieser Knospen in den Winkeln wiederum Knospen u. s. f. haben, Linné die Blumenblätter als die Blätter der Knospen an, welche eigentlich in den Winkeln der Kelchblätter sitzen sollten u. s. f. So eine Reihe von fünf Jahren heraus, in der eigentlich die Knospen in den Winkeln des jährigen Blattes erst künftiges Jahr entwickeln. Aber die Theile der Blüthe gehören alle der Knospe, wie der wechselnde Stand zeigt.

Die Blume aber erscheint nicht immer wie gewöhnlich in den Winkeln der Blätter oder auf dem Stengels; sondern man sieht sie auch bisweilen bei einigen Gewächsen an ganz ungewöhnlichen Stellen zum Vorschein kommen.

Rohria petioliflora hat ihre Blumen auf dem Stengel sitzen, was sich auch bei der *Salsola arbuscula* und einigen andern Pflanzen findet.

In der Mitte des Blatts findet sich die Blume bei einigen Arten der Gattung *Ruscus*.

Am Rande der Blätter blühen die meisten Arten der Gattungen *Phyllanthus*, *Polycardia*, und auch eine *Ruscus* die *androgynus* genannt wird.

Auf den Zweigen, wo keine Blätter sind, blühen *Ardisia ramiflora*, *Cerantia Siliqua*, *Averrhoa bilimbi* und *Carambola*, *Boehmeria ramiflora* und mehrere Gewächse.

Sehr merkwürdig ist der Standort der Blume bei einigen Bäumen der warmen Zone. *Cynophyllanthus*, ein ostindischer stark belaubter Baum, blüht anders als unten am Stamme einzelne Blüthen; seine blattreiche Krone bringt keine Blüthen hervor.

Omphalocarpum procerum, ein hoher afrikanischer Baum, hat nur am Stamme die Blumen zu sitzen. *Carica cauliflora*, ein amerikanischer Baum, blüht am Stamm und den Hauptästen.

Die Blume, (§. 77.) besteht aus dem Kelch, der Krone, Honiggefäßen, Staubgefäßen und dem Fruchtknoten.

Der Kelch und die Blumenkrone, sind im Bau und der Bildung der Gefäße ganz so wie die Blätter. Der Kelch, wenn er grün ist, dunstet

auch wie die Blätter im Sonnenlicht Sauerst aus, ist er aber gefärbt, so geschieht dieses nich

Das Einsaugungs- und Ausdünstungsgeschäft durch die blättrigen Theile der Blume, so wie die Blätter der Pflanze betrieben. Nur dass die hige Blume andere Gasarten ausstösst. Bis jet noch nicht ausgemacht, ob die Erscheinung, v Dictamnus albus bei warmen heitern Sommernä wenn kein Mond scheint, giebt, durch Wassers oder durch die Ausdünstung eines feinen äther Oels hervorgebracht wird. Wenn man diese bli Pflanze in Menge hat und durch einen ausgesp Faden um diese Zeit schnell, sogleich aber ein nendes Papier in der Gegend hat, so verbreit augenblicklich eine feine blaue gleich verlös Flamme.

(Diese Flamme entsteht von dem ölig-ha Stoffe, welcher aus den Spitzen der Haare sch sich leicht entzündet und die Flamme der sten Haarspitze mittheilt. Bei jedem W wenn es nur nicht regnet, gelingt die Entzün wenn man die Flamme einer Kerze am St hinaufspielen lässt. L.)

An *Tropaeolum majus* und andern Blumen von orange Farbe sah *Linne's* Tochter in dunkeln h warmen Sommerabenden ein elektrisches Blitze

(Wahrscheinlich nur eine optische Erscheinun

Die Honiggefäße (§. 92.), wenn sie nie blossen Drüsen bestehn, kommen in ihrer Bildu der Blumenkrone überein.

295. Die Staubgefäße (§. 97.) bestehn au Staubfaden und Staubbeutel. Sie sind die män Begattungsorgane. Der Staubfaden ist in der V lung der Gefäße bald dem krautartigen Stenge

den Blättern gleich, je nachdem seine Form verschiedene ist, die ausserordentlich abweicht, aber bei jeder Pflanze fast immer in einerlei Gestalt angetroffen wird. Die Staubbeutel bestehen aus einer dünnen Haut, die mit dem Blumenstaub (pollen) angefüllt ist.

Der Blumenstaub oder Samenstaub kommt unter mancherlei Form vor, die man aber nur unter dem Mikroskop gewahr werden kann. *Jussieu, Du Hamel, Needham, von Gleichen* und andere, bemerkten unter einem stark vergrössernden Mikroskop, dass die Körner des Blumenstaubs mit Gewalt bei der Berührung mit Wasser aufrissen und eine schleimigte Masse austiessen. *Kölreuter* behauptet aber, dass der reife Blumenstaub nicht bei der Berührung mit Wasser plötzlich aufspringt, sondern durch feine Oeffnungen, der ist er mit Stacheln versehen, durch die Stacheln die ölichte Feuchtigkeit nach und nach von sich lasse, so man deutlich auf der Wasserfläche eine schimmernde Haut bilden sieht. Er sagt ferner, dass jedes Körnchen Blumenstaub aus einer doppelten Haut, einer äussern, dicken, knorpelartigen, elastischen, die mit feinen Gefässen besetzt ist, worin die Oeffnungen für die ölichte Feuchtigkeit sein sollen, und einer innern sehr zarten Membran besteht. Der innere Raum soll mit einem feinen elastischen Zellengewebe, worin die ölichte befruchtende Masse enthalten ist, angefüllt sein. *Hedwig* stimmt aber, nach seinen neuesten Untersuchungen, *Kölreuters* Behauptungen nicht bei. Er sagt, dass jedes Staubkörnchen aus einer gefässreichen Haut besteht, und innerhalb mit einer schleimigten Masse angefüllt sei, aber gar kein Zellengewebe habe, dass ferner der Blumenstaub auf einmal diese schleimigte Masse von sich giebt und nicht

V. Physiologie.

ungen allmählich ausschwitzt. Er unter-
blumenstaub der auf der weiblichen Narbe
Dienste verrichtet hatte und fand diese
bestätigt. Auch die Staubgefässe der
nach ihm blosse Körnchen Blumenstaub
nach wie dieser verhalten. Er findet zwei-
dieser befruchtenden Masse und dem männli-
den der Thiere im Ansehn die grösste Aehn-
nur dass, wie im Thierreich, diese nach
enheit der Art, bald mehr bald weniger con-
st.

Körnchen des Blumenstaubs sind nicht bei
flanzen in Hinsicht ihres innern Baus gleich
at. Sie bestehn aus einer Haut, worin entweder
artes Zellengewebe mit der befruchtenden Masse
oder kein Zellengewebe, und nur allein
se gefunden wird. Nach diesem verschie-
denen Bau lassen sie die in ihnen befindliche Materie
in auf einmal, bald aber durch ihre Oeffnungen all-
mählig heraus. Im ersten Fall zerplatzen sie, im letz-
tern werden sie entweder trübe, oder es kommt eine
trübe Materie heraus, die auf dem Wasser schwimmt,
zuweilen aber auch sich zu Boden schlägt. Alle
Körnchen Blumenstaub sind durch feine Fäden im
Staubbeutel befestiget, die man ihrer grossen Zartheit
wegen nur bei wenigen deutlich bemerken kann. Am
auffallendsten sind sie bei *Oenothera biennis* und *Im-
patiens Balsamina*.

Die meisten Erfahrungen stimmen also dahin
überein: dass die in dem Blumenstaub enthaltene be-
fruchtende Feuchtigkeit kein Oel, sondern eine mehr
schleimige Masse ist, und dass sie sich nicht leicht
mit Wasser vermischt. So viel lehrt uns aber die Er-

ahrung, dass dieser Schleim eine grosse Quantität Oel enthält, weil erstlich sich aus Blumenstaub Oel pressen lässt, weil er durchs Licht geworfen sich zertheilt, und weil endlich die Bienen aus ihm ihr Nahrung zu bereiten wissen. Es folgt aber keineswegs daraus, dass die ganze Masse ölig sei, eben so wenig, wie der Mandelkern ein bloß öliges Körper sein kann, weil sich Oel aus ihm pressen lässt, er hat diese ölige Flüssigkeit in einer schleimigen Masse eingehüllt.

Es lässt sich so wenig wie im Thierreiche bestimmen, worin das Befruchtende der männlichen Fruchtbildung liegt. Ist es ein feiner ölichter Duft, oder ist es ein feiner geistiger Hauch, wie andere meinen, ist es Elektrizität, oder sonst etwas? Dieses Alles liegt noch in tiefem Dunkel gehüllt.

(Ueber den Bau des Blumenstaubes haben wir in neuern Zeiten treffliche Untersuchungen von Ad. Brongniart erhalten. Ein Pollenkorn besteht aus zwei Membranen, einer äussern zelligen und einer innern häutigen. Die letztere dringt, wenn das Korn auf der Narbe eine Zeit gelegen, aus der äussern als ein Auhang, oder zuweilen, als zwei Anhänge hervor, worin sich kleine Körner und zuweilen auch eine ölige Flüssigkeit befinden. An diesen Körnern hatte Amici eine eigenthümliche Bewegung bemerkt und Brongniart läugnet sie nicht ganz, doch glaubt er, dass die Temperatur darauf grossen Einfluss habe. Rob. Brown entdeckte dazwischen kleinere sich bewegende Theilchen, die er jedoch in vielen andern Substanzen auch mineralischen beobachtete. L.)

Die chemische Zergliederung des Blumenstaubes zeigt hauptsächlich, dass eine harzartige Substanz, die aus Wachs und Kleber besteht, Eiweiss und Kleber die Hauptbestandtheile ausmachen. *Fourcroy* und *Auguelin* fanden aber im Blumenstaub der Dattel-

palme keine harzartige Materie, sondern Aepfelsäure, phosphorsauren Kalk, phosphorsaure Talkerde, eine thierische Materie, die sich im Wasser mit Hülfe von Säuren auflöset, und der Gallerte ähnlich wurde, endlich auch eine thierische, dem Eiweis ähnliche Substanz. Vielleicht ist die Mischung nicht bei den Gewächsen immer dieselbe. Merkwürdig ist bei der Dattelpalme die Phosphorsäure, welche man auch im männlichen Samen der Thiere in grosser Menge vorzüglich in der Verbindung mit Natrum angetroffen hat.

296. Das weibliche Zeugungsorgan der Pflanzen ist der Stempel (§. 101.); dieser besteht aus dem Fruchtknoten, Griffel und der Narbe. Der Fruchtknoten ist nach der Verschiedenheit der Pflanzen mannigfaltig gebildet. Er besteht aus allen den Gefässen, die wir in den übrigen Theilen der Gewächse angemerkt haben, nur ist ihre Richtung und Vertheilung in jeder Pflanze verschieden. Der Same, wenn nicht selbst der Fruchtknoten in ein Samenkorn verwandelt wird, liegt in demselben, und hängt durch die schon beschriebene Nabelschnur mit ihm zusammen (§. 123.) Er ist innerhalb mit einer klaren Flüssigkeit angefüllt, in der man nichts wahrnimmt. Wenn der Fruchtknoten aber in ein Samenkorn verwandelt wird, so hängt die Nabelschnur mit dem Fruchtboden zusammen und ist öfters ausserordentlich kurz. Die innere Beschaffenheit eines solchen Fruchtknotens ist eben wie beim Samen der im Fruchtknoten enthalten ist.

Der Griffel ist, wie aus der Terminologie erhellt (§. 103.), bei den Gewächsen von verschiedener Gestalt. Er ist wie der Stengel zusammengesetzt und hat oben hohle Röhren, die durch ein lockeres Zel-

lengewebe mit der ganzen Fläche des Fruchtknotens und mit der Nabelschnur des Samens Zusammenhang haben, sich aber schon früh im Zellengewebe verlieren. (Solche hohle Röhren sieht man nicht; es sind Papillen. L.)

Hedwig fand bei der mikroskopischen Untersuchung der Kürbisarten und damit verwandten Gewächse, auf den Narben hohle Kanäle, und entdeckte einen festen gelben knorpelartigen Körper, der bei den Kürbisarten viereckig war, durch den ganzen Griffel fort lief, und sich in der Nabelschnur der Samen endigte. Er schien ihm undurchdringlich und nicht fähig Feuchtigkeit zu führen. Da er aber unstreitig zur Begattung als Leiter oder Zuführer das einige beitragen muss, so nannte er ihn Befruchtungsleiter (conductor fructificationis). Sein Nutzen ist uns aber noch verborgen, auch ist es bis jetzt noch nicht ausgemacht, ob mehrere Pflanzen ihn besitzen, und ob nicht andere Einrichtungen zu demselben Zweck bei verschiedenen Gewächsen gemacht sind.

(In allen von mir untersuchten Pflanzen fand ich die Gefäßbündel gegen den Umfang des Griffels gestellt und in der Mitte Zellgewebe. Auch die gelbe Masse in dem Griffel der Cucurbitaceen besteht aus Zellgewebe. Ad. Brongniart glaubt, dass die mit einer eigenen Bewegung versehenen Pollenkörner sich zwischen den Zellen durchdrängen und durch die Mikropyle zum Samen gelangen. L.)

Die Narbe besteht aus hohlen einsaugenden Kanälen, (eigentlich Papillen mit Saft gefüllt. L.) deren Beschaffenheit nur durch mikroskopische Vergrößerungen bemerkbar ist. Nur diese einsaugenden Röhren machen die eigentliche Narbe aus. Was in der Terminologie Narbe genannt wird (§. 104.) ist es nicht

V. Physiologie.

, und zuweilen ist es nur ein kleiner Theil
den, zuweilen aber ist auch der ganze Griffel
Narbe.

Was das Federchen betrifft, das man bei den zu-
angesetzten Blumen (§. 124.) findet, und was
reifen Samen völlig ausgebildet anzutreffen ist;
man ich nicht mit *Rafn* es für eine unorgani-
blose Faser halten. Es ist eine blosse Ver-
eng des Zellengewebes, von derselben Be-
inheit, wie die Haare an andern Pflanzenthe-
246.), die sich verhärtet, und während der
lung des Samens, da durch sie die Ausdünstung
ert wird, auswächst.

ist offenbar der Kelch, von mehr zusammenge-
tztem Baue als die Haare. L.)

997. Die mannbare, oder zur Begattung fähige
Narbe, ist mit einer Feuchtigkeit bedeckt, die *Köhler*
auch für öhlicht hält, deren Natur aber noch bis
jetzo unerforscht ist. Der Zeitpunkt, wo die Narbe
feucht ist, und die Staubbeutel platzen, ist derjenige,
wo bei ihnen das Geschäft der Begattung vollzogen
wird. Die Begattung geschieht aber bei den Pflanzen
auf eine so merkwürdige Weise, dass man ohne Be-
wunderung nicht die weisen Vorkehrungen betrach-
ten kann, welche die Natur zur Erreichung ihrer Ab-
sichten wählte. Die meisten Blumen sind Zwitter,
das heisst, sie enthalten männliche und weibliche
Zeugungsorgane, und daher sollte man glauben, dass
bei dergleichen Blumen das Begattungsgeschäft ohne
Umstände vollzogen würde, was aber nicht bei allen
der Fall ist.

Der Rektor *Sprengel* hat über diesen Gegenstand
viele Beobachtungen angestellt, unter denen die mei-

sten sehr wichtig sind. Er entflocht zwei verschiedene Hauptarten der Begattung, nemlich die Dichogamie (Dichogamia) und die Homogamie (Homogamia). Dichogamie nennt er die Art von Begattung, wo in einer Zwitterblume ein Zeugungstheil sich zuerst entwickelt, und wenn dieser seine Zeugungskraft verloren hat, das andere Zeugungsorgan seine Vollkommenheit erreicht. Sie ist doppelter Art; erstlich wenn die männlichen Zeugungslieder sich entfalten ehe die weiblichen entwickelt sind, diese nennt er die männliche Dichogamie (Dichogamia androgyna) und zweitens der umgekehrte Fall, wenn die weiblichen Zeugungswerkzeuge früher wie die männlichen ausgebildet werden, welche er weibliche Dichogamie (Dichogamia gynandra) nennt. Homogamie heisst bei ihm die Art der Begattung, wenn beide Zeugungstheile zu gleicher Zeit in einer Zwitterblume entfaltet werden.

Wenn nun bei einer Zwitterblume die Dichogamie statt findet, da kann, wie jeder leicht einsieht, die Begattung nicht ohne ein Mittel geschehen, wodurch beide Organe der Zeugung einander näher gebracht werden. *Linne* glaubte, dass der Wind vorzüglich dieses Geschäft übernehmen müsse, aber es steht der Gewächse so wenige, wo er ihnen zu diesem Zweck behülflich sein könnte, weil die Gestalt der Blume häufig von der Art ist, dass sie dem Winde her den Zugang verhindert, als ihm dazu beförderlich ist. *Kölreuter* war der erste, der deutlich wahrnahm, dass viele Insekten von der Natur zu diesem Zwecke bestimmt sind, und *Sprengel* hatte Mäuse und Geduld genug, bei den Blumen zuzusehn, wie es die Insekten anfangen, um die Begattung der Pflanzen zu vollziehn.

Er fand, dass die zahlreichen Bienen und Hummelarten, so wie viele von den geflügelten Insekten zu der Absicht von der Natur ausersehn sind. Ja er beobachtete sogar, dass einige Blumen nur bestimmte Insekten, die allein auf dieselben angewiesen waren, zu diesem Zwecke hatten, und stellte darüber sehr viele Beobachtungen an. Die Insekten besuchen aber nicht die Blumen in der Absicht, um bei ihnen die Begattung zu verrichten; sie gehen nur dem süßen Saft nach, der in ihrem Grunde ausschwitzet. Ihr haariger Körper, den ihnen die Natur nicht ohne Absicht gab, wird vom Blumenstaub beschmutzt, und sobald sie eine andere Blume derselben Art besuchen, streichen sie, ohne es zu wollen, den Blumenstaub an der Narbe ab, und die Befruchtung ist geschehen. Jedes Insekt, was nicht für eine Blume bestimmt ist, sondern mehrere ohne Unterschied besucht, wird auf diejenige Art, auf die es sich zuerst am frühen Morgen setzte, den ganzen Tag hindurch aufsuchen, und keine andere berühren, es sei denn, dass keine der Art mehr anzutreffen ist.

Nur diejenigen Blumen, welche süßen Saft in ihrem Grunde absondern, werden von Insekten befruchtet und von ihnen besucht. Verschiedene Blumen besitzen eine oder mehrere farbige Flecken, die Sprengel ein Saftmal (*macula indicans*) nennt, weil sie allezeit ein Merkmal sind, dass in der Blume Honig ausschwitzet, und nach seiner Meinung die Insekten zum Besuche herbei locken. Die Haare in den Blumen sind immer so angebracht, dass sie das Einfallen des Regens verhindern, und die Insekten abhalten, auf der Stelle in die Blume hineinzugehn, damit sie jederzeit ihren Weg über die Begattungsorgane neh-

men müssen. Eben den Zweck haben die fadenförmigen und blattförmigen Hervorragungen, die zu den Theilen der Blume gezählt werden (§. 96.), welche zur Beschützung des Honigs dienen. Es würde zu weitläufig sein, eine umständliche Erzählung der Art, wie die Insekten die Begattung verrichten, anzuführen, da man bei einiger Bekanntschaft mit den Blumen dieses selbst zu sehn und zu beobachten, Gelegenheit hat. Man sehe nur den gewöhnlichen Garten-Schwertel (*Iris germanica*), mehrere Blumen aus der Klasse *Didynamia*, die gewöhnliche Schwarzwurzwur (*Symphytum officinale*) und mehrere andere an, um sich einen deutlichen Begriff davon zu machen. Eine der merkwürdigsten Arten der Begattung durch Insekten sieht man an der *Aristolochia Clematites*, die ich beschreiben will. Die Blume, welche Fig. 371. verkleinert abgebildet ist, hat eine zungenförmige Blumenkrone, die unten kugelförmig ist, nach oben sich in eine Röhre verlängert, und mit dem Rande flach lanzenförmig ausläuft. Der Stempel steht in dem runden Bauch der Blumenkrone, dessen Fruchtknoten ist von sechs Staubbeuteln umgeben, die kürzer als er sind. Der Fruchtknoten hat keinen Griffel, sondern ist mit einer sechseckigen Narbe versehen, die flach ist, und auf der Oberfläche die einsaugenden Punkte hat. Die Staubbeutel können, da während der Blüthezeit die Blume aufrecht steht, den Staub nicht auf die Narbe streuen. Der Blumenstaub muss daher in den Boden der Blume ungenutzt fallen, wenn kein Insekt dazu kommt. Macht man den Versuch und hält durch einen festverschlossenen dünnen Flor alle Insekten von dieser Pflanze ab, so wird kein Samen erfolgen. Es fügt sich auch öfter, dass diese

Pflanze in Gärten blüht, ohne Samen zu bringen, ein besonderes Insekt nur an dieser Pflanze die Fruchtbildung verrichtet, was sich nicht in allen Fällen findet. Dieses Insekt heisst *Tipula pennic*. Der runde Boden der Blume ist innerhalb glatt, die Röhre aber ist mit dichtstehenden Haaren besetzt, alle nach innen gebogen sind, so dass sie einen Trichter öffnen, in den das Insekt bequem hinein kriechen kann, aber da ihm bei der Rückkehr alle Haare entgegenstehen, nicht wieder herauskommen kann. Es kriechen mehrere dieser kleinen Insekten durch die Röhre, müssen aber in der Höhlung der Blume verbleiben. Unruhig, in einem so engen Behältniss der Willen eingesperrt zu sein, durchkriechen sie ständig den innern Raum, und schleppen dabei reichenden Blumenstaub auf die Narbe. Nach vollendeter Begattung neigt sich die Blume, die vorher die Röhre verschlossen hielten, verschraubt und legen sich dicht an die Seitenwand, dadurch werden die kleinen eingeschlossenen Mücken freigegeben und können nun ihre weitere Bestimmung vollenden. Wer bewundert nicht hier die Vorkehrung der Natur, um eine unbedeutend scheinende Blume zu befruchten? und solcher Beispiele liessen sich eine zahllose Menge anführen. Die dichogamischen Blumen werden, wie gesagt, nicht anders als durch Insekten befruchtet. Es blühen ihrer mehrere nacheinander an einer Pflanze und das unruhige Insekt fliehet von Blume zu Blume, trägt den Blüthenstaub von der einen zur andern. *Epilobium angustifolium* zum Beispiel einer männlichen Dichogamie, (und *Euphorbia Cyparissias*, als ein Beweis der weiblichen Dichogamie dienen.

Die homogamischen Blumen, das ist, solche Zwitterblumen, wo die männlichen und weiblichen Zeugungsorgane sich zu gleicher Zeit ausbilden, werden öftentheils durch sich selbst begattet. Indessen werden doch verschiedene von Insekten besucht, die sich neben her, wenn auf dem gewöhnlichen Wege die Begattung nicht sollte vollzogen sein, das Vermittelnde, was vielleicht Regen, Wind, unfreundliches Wetter zur eigentlichen Periode der Begattungen verändert haben, nachholen.

Bei diesen Blumen finden sich folgende Vorkehrungen. Sind die Staubgefäße länger als der Stempel, so steht die Blume aufrecht, und die Staubgefäße liegen sich über den Stempel oder die Blume hat eine horizontale Lage und die Staubgefäße krümmen sich schalenförmig, dass sie mit dem Stempel von gleicher Länge werden. Von der ersten Art, kann *Parnassia illustris* zum Beispiel dienen. Bei dieser Pflanze liegen sich die Staubgefäße, deren fünf sind, über den Stempel und zwar in folgender Ordnung. Erst legt sich ein Staubgefäß über die Narbe, streut seinen Pollenstaub aus, alsdann richtet es sich in die Höhe und legt sich zurück, unterdessen ist das zweite schon unterwegs und legt sich auch gleich über, sobald das erste anfängt sich zu entfernen, diesem folgt das dritte, und sobald sich dieses zurückbeugt, kommen die beiden letzten auf einmal. Von der zweiten Art ist die Rosskastanie (*Aesculus Hippocastanum*) u. m. a.

Sind aber bei homogamischen Blumen die Staubgefäße kürzer als der Stempel, so hängt die Blume, mit der herabfallende Pollenstaub die Begattung zu ziehen könne. Selten haben dergleichen Blumen

Willdenow's Grundriss. 1 Th. 29

eine schiefe oder horizontale Lage, und ist d Fall, so krümmt sich der Griffel zurück, d Staubgefässe erreicht. Einige hängende Blumen nur von Insekten begattet werden, weil ben eine solche Lage haben, dass der her Blumenstaub sie nicht treffen kann, dann in der Blumenkrone Haare oder andere Verläng welche die Insekten zwingen, längs dem die Blume zu steigen, so dass sie bei ihrer oder beim öftern Besuch Blumenstaub an d abstreichen müssen.

Die Pflanzen deren Blumen getrennten Ge sind, und wo auf einem Stamm sich männ weibliche zeigen, müssen grösstentheils dur ten befruchtet werden. Nur diejenigen b sich selbst, wo keine Honigbehältnisse sind, männlichen Blumen den weiblichen sehr na als einige Grasarten Typha, Coix, Carex. Diejenigen, welche sich selbst befruchten, b weibliche Blume niedriger als die männlich und ihre Blätter sind sehr fein oder doch tief dass der herabfallende Blumenstaub sie treff z. B. die Fichtenarten (Pinus) u. d. an. Hier sen kann auch der Wind das seinige beitra treibt den Blumenstaub weit in der Luft un dass der ganze Baum in eine Wolke eingel Der sogenannte Schwefelregen, welcher nach tern im Frühjahr fällt, kommt vom Blumens Pinus sylvestris her.

Solche Gewächse, wo auf einem Stam männliche, und auf dem andern bloss weibli men sich finden, haben alle Honigbehältnisse männlichen Blumen sind grösser und mehr in

ren fallend wie die weiblichen, damit die Insekten zuerst von diesen angelockt werden, und alsdann den männlichen Staub zur weiblichen Pflanze tragen können.

Die *Vallisneria spiralis*, eine italiänische Wasserpflanze, ist auch völlig getrennten Geschlechts, die männliche Blume reißt bei ihr los und schwimmt auf dem Wasser umher, damit die Wasserinsekten um so eher den Blumenstaub der weiblichen Pflanze geben können.

Viele ausländische Gewächse blühen bei uns, sie haben vollkommne Zwitterblumen und dennoch tragen sie keinen Samen. Das Klima ist aber häufig nicht die Ursache, dass sie keinen bringen, sondern es fehlt an den Insekten, die zu ihrer Begattung von der Natur bestimmt sind, die wir aber nicht mit in den Gärten verpflanzt haben. Um eine Erfahrung anzustellen, die das Gesagte bestätigt, so darf ich hier nur die *Abroma augustum* nennen. Diese blühte hier seit mehreren Jahren in einem Treibhause, wo kein Insekt zukommen konnte, und hatte nie eine Frucht angesetzt. Der Gärtner machte den Versuch den Blütenstaub mit einem Haarpinsel auf die Narbe mehrerer Blumen zu streichen und bekam vollkommene Früchte, die wieder junge Pflanzen gaben. Und welcher Fälle sind mir mehrere bekannt, die der Raum nicht anzuführen erlaubt. Sollten die Gärtner, welche Kirschen und andere Obstarten früh zu treiben suchen, und immer nur sehr wenige, öfters gar keine Früchte erhalten, ihren Zweck nicht besser erreichen, wenn sie einen Bienenkorb mit Bienen ins Glashaus setzten, und zugleich dafür sorgten, dass mehrere Blumen für diese fleissigen Insekten da wären?

298. Einen hohen Grad der Reizempfänglichkeit scheint die Natur einigen Pflanzen auch nur aus der Absicht gegeben zu haben, damit bei ihnen um so eher das Geschäft der Begattung vollzogen werde. *Barberis vulgaris* hat, wie bekannt, sehr reizbare Staubfäden, beugt man sie ein wenig, so schnellen sie mit Gewalt zum Stempel. *Smith* hat gefunden, dass nur eine kleine Stelle derselben diesen grossen Grad der Irritabilität besitzt. *Cactus Tuna* hat auch viele Reizbarkeit in den Staubgefässen, streicht man sie mit einem Federkiel, so beugen sie sich alle über das Pistill hin. Sobald nun Insekten diese Stellen bei den genannten Pflanzen berühren, so reizen sie die Theile und bewirken die Begattung. Mehrere Pflanzen haben dergleichen eingerichtete Staubgefässe, als die ganze Familie der *Asclepiaden* u. d. m.

Auch die Elasticität der Staubfäden muss bei verschiedenen Pflanzen die Begattung befördern, z. B. bei *Lopezia*, *Urtica*, *Parietaria*, *Medicago*, *Kalmia* u. m. a.

Der Griffel scheint in verschiedenen Blumen einmige Reizempfänglichkeit zu haben, da er mit seiner Narbe die Staubgefässe verfolgt.

Das Schliessen und Oeffnen der Blumen, was man das Wachen derselben nennt (*Vigiliae*) (§. 7.) gehört hier nicht her, obwohl es beiläufig, auch etwas zur Begattung beitragen mag. Es scheint, als wenn das Licht diese Theile reizte und eine Ausdehnung hervorbringt. Vielleicht öffnen sich darum die meisten Blumen beim Sonnenschein. *Portulaca oleracea* und *Drosera rotundifolia* wollen sehr stark gereizt sein, daher öffnen sie sich erst um 12 Uhr des Mittags, aber dieser heftige Reiz erschläft auch um so früher

an Regen, und sie schliessen sich nach einer Stunde. In *Oenothera biennis* scheint der Reiz des Tageslichts zu heftig zu sein, und sie kann sich nicht öffnen, als bis kein starkes Licht mehr auf sie wirkt. Nur steht sie vom Abend die Nacht hindurch bis am Morgen offen, und ist der Tag kühl und trübe, während sie auch am Tage ihre Blumen nicht schliessen. Bei einigen Blumen scheint die Faser wie ein Hygrometer sich zu verhalten, so dass durch Feuchtigkeit die Blume sich öffnet, und bei trockener Luft schliesst. Dieses sieht man bei allen *Carlina*-Arten. So wohl der zu starke Reiz des Sonnenlichts macht, dass *Nymphaea alba* sich am Abend schliesst: Die Nacht hindurch unter Wasser taucht?

Auch scheint das Licht auf die Absonderung der riechenden Stoffe der Blume zu wirken, so dass bei einigen nur durch Licht und Wärme, bei anderen durch die Wärme allein derselbe abgesondert. Unsern Geruchsorganen bemerkbar wird.

299. Zur Vollziehung der Begattung wird erfordert, dass die Narbe feucht sei und die Staubbeutel haben (§. 297.), wenn nun ein Mittel dazwischen kommt, was beides verhindert, so kann sie nicht geschehen. Das Wasser vermischt sich nicht mit dem Pollenstaube, daher spült der Regen denselben ab. Die meisten Blumen haben eine solche Richtung, dass sie nicht so leicht vom Regen getroffen werden können, aber dem ohngeachtet sieht man, dass lange anhaltendes Regenwetter die Erndte des Getreides und vieles vereiteln kann. Daher erheben auch fast alle sichtbarsten Blüthen versehene Wasserpflanzen ihre Blätter über die Fläche des Wassers, nach dem Blüthen senkt sich die unreife Frucht hinunter. Nur die-

jenigen Wassergewächse, welche zur Cryptogamie gehören, und einige wenige als *Najas*, *Capillaria*, *Ceratophyllum*, welche schleimigen Blütenstaub haben, (? L.) der sich mit Wasser eher zu vermischen im Stande zu sein scheint, entwickeln ihre Blumen unter der Fläche desselben. Auch scheint es, als wenn der schleimige Blumenstaub der *Asclepiaden* und *Orchideen* vielleicht vom Wasser leidet.

300. *Kölreuter* erprobte auf eine mühsame Art, wie viel Körner Blumenstaub wohl zu einer vollständigen Begattung erfordert würden. Seine vorzüglichsten Entdeckungen über diesen Gegenstand sind folgende:

Alle Staubbeutel des *Hibiscus syriacus* enthielten 4863 Körner Blumenstaub, von denen nicht mehr als 50 bis 60 zu einer vollkommenen Begattung nöthig waren, Nimm er aber weniger als 50, so kamen nicht alle Samen zur Reife, aber die welche gebildet wurden, waren ganz vollkommen. Zehn Körnchen Blumenstaub war das wenigste, was er bei dieser Blume brauchen konnte, unter dieser Zahl geschah keine Begattung mehr. Die *Mirabilis Jalappa* hatte in einer Blume 293 Körner Blumenstaub, *Mirabilis longiflora* 321, und beiden Pflanzen waren nur zwei bis drei zur Begattung nöthig. Streuete man mehreren auf die Narbe, so wurden deswegen die Samen nicht vollkommener.

Um zu erfahren, ob bei den Blumen, die mehrere Griffel haben, jeder besonders befruchtet werden müsse, schnitt *Kölreuter* sie bei mehreren alle bis auf einen ab, und die Befruchtung geschah so vollkommen wie sie bei allen Griffeln zu erwarten war. So-

ar bei Blumen, deren Griffel ganz getrennt waren, ung durch einen die Befruchtung vor sich. Aus diesem Versuche sieht man, dass die Röhren eines Griffels mit allen andern Gemeinschaft haben müssen, und dass die Natur nur darum mehrere Griffel und mehreren Blumenstaub gebildet hat, damit der Zweck derselben auf keine Weise verloren gehen soll. Die Naturforscher haben hieraus geschlossen, dass das Zellengewebe aller im Fruchtboden befindlichen Fruchtknoten Zusammenhang haben müsse.

(Öffnungen im Zellengewebe sind so wenig hier als sonst vorhanden. Uebrigens liegt aber allerdings Zelle an Zelle. L.)

301. Das grosse bewundernswürdige Geschäft der Zeugung hat verschiedene Naturkundige zu ganz andern Meinungen geführt, die jeder durch Beweise und Gründe zu erhärten sich bemühte. Eine vorläufige Anzeige aller dieser Theorien liegt zu weit ausser den Gränzen unserer Betrachtungen, und es mag genug sein, nur die wichtigsten anzuführen.

Die ersten Naturkündiger glaubten, dass eine zufällige Mischung von festen und flüssigen Theilen, nach Maassgabe der Umstände, Thiere oder Gewächse bilden könnte. Diese Theorie nennt man *generatio equivoca*. Andere glaubten, dass die kleinen Thierchen, welche man im männlichen Samen bemerkte (*animalcula spermatica*), in den Eierstock der Mutter übergehn, und so das künftige Geschöpf bilden. Noch andere nahmen in der Mutter einen Entwurf des künftigen Thieres an, und glaubten, dass der Same des Männchen ihm nur Leben gäbe, um sich zu entwickeln. Diese Theorie heisst das *Präformations-, raedelineations- oder Einschachtlungs-System*. Ei-

ganzlich unterscheiden sich zwar noch diese drei angeführte Namen, dass sich jeder die Sache etwas verschieden dachte; im Grunde kamen sie aber alle dahin überein, dass sie einen Entwurf des Geschöpfes in der Mutter annahmen. Endlich nehmen noch andere Naturforscher eine Vermischung der befruchtenden Feuchtigkeiten des Männchens und Weibchens an, aus dem das künftige Geschöpf entsteht. Diese Theorie heisst die Epigenesis.

Die *Generatio aequivoca* wurde in alten Zeiten bei Insekten, Würmern und Pflanzen angenommen. Man kennt nur zu gut den Ausspruch des *Harvey*, dass alles, was lebt, aus Eiern entsteht; und die immer weiter gehenden Beobachtungen der Naturforscher bestätigen täglich diesen Satz durch neue wichtige Erfahrungen. Ich würde nicht länger bei dieser Theorie verweilen, wenn nicht einige Botaniker die Entstehung der Pilze durch blosse Gährung faulender vegetabilischer Stoffe erklärten. Ihre schnelle Entstehung, und der Standort einiger Arten derselben, haben sie auf die Idee gebracht. — Wenn gleich *Patrie* und einige neuere Naturforscher glauben, dass die letzten Glieder der organischen Körper, wie Schimmelarten und Intestinalwürmer durch *generatio aequivoca* noch jetzt entstehen können und sich dann durch Eier fortpflanzen, so muss ich gestehn, dass mir ihre Hypothese, so schön sie auch aufgestellt ist, noch nicht ganz hat einleuchten wollen.

(In neuern Zeiten haben *Treviranus d. ä.* und *Bodolphi* doch viele bedeutende Gründe für diese Erzeugung, die man besser *generatio originaria* nennt, angegeben. L.)

Die Theorie, dass die Thierchen im männlichen Samen der Thiere in die Mutter übergehn, und das

künftige Geschöpf bilden, hat der Entdecker derselben, *Leuwenhoeck*, zuerst angenommen. Im Gewächsreiche nahmen einige an, das der Blumenstaub Keimzellen enthalte, und diese im Eierstocke der Mutter zu künftige Gewächs bilden. Der eifrigste Vertheiler dieser Theorie war der Herr von *Gleichen*. Einige sind darin so weit gegangen, dass sie unter dem Microscop im männlichen Samen des Esels schon kleine Eselchen und im Blumenstaube der Linde kleine Lindenbäume gesehn haben. Was kann man nicht alles sehn, wenn man nur will! — *Kölreuter* hat Erfahrungen, die wir in der Folge anführen werden, entgegen ganz offenbar diese Theorie.

Das Präformations-System, was ehemals sehr allgemein angenommen wurde, wird jetzt selbst von den grössten Anhängern desselben im Gewächsreiche zweifelt. *Spallanzani*, der im Thierreiche durch seine Untersuchungen die Gegenwart des Geistes vor der Begattung im Eierstocke zu beweisen suchte, gesteht ganz frei, dass dergleichen vor der Beobachtung im Gewächsreiche nicht zu finden sei.

Die Epigenesis oder Zeugung durch Vermischung der männlichen und weiblichen Flüssigkeiten wird von den meisten Physiologen im Thier- und Gewächsreiche als die einzig wahre angenommen. *Kölreuter* bestätigte sie durch viele Versuche, von denen wir hier einen anführen wollen. Er pflanzte den gewöhnlichen Bauerntaback (*Nicotiana rustica*) und den virgatischen (*Nicotiana paniculata*). Der ersten Art nahm er alle Staubgefässe und befruchtete den Stempel derselben mit Blumenstaub der letztern. *Nicotiana rustica* hat eiförmige Blätter und eine kurze grünlich-weiße Blumenkrone; *Nicotiana paniculata* einen beinah

nach halbmal längern Stengel, rundlich-herzförmige Blätter und viel längere gelbgrüne Blumenkronen. Der Bastard, welcher aus beiden entstand, hielt in allen Theilen das Mittel zwischen den genannten Arten. Mit mehreren Gewächsen versuchte er dasselbe und der Erfolg war mit diesem vollkommen übereinstimmend.

Nehmen wir die Theorie der Samenthierchen an, so hätten die Bastarde in ihrer Gestalt nicht von der männlichen Pflanze verschieden sein müssen, und eben so müssten sie das Ansehn der weiblichen Pflanzen haben, wenn das Einschachtlungssystem stattfinden sollte. Der Bastard hielt aber gerade das Mittel in der Gestalt aller seiner Theile, folglich muss er vom Vater und der Mutter etwas bekommen haben, und er entstand durch Epigenesis.

(So entscheidend sind diese Gründe nicht als der Verf. sagt. Bonnet hat schon die Veränderung des Keims durch den männlichen Samen zu erklären gesucht. Genau genommen hält kein Bastard das Mittel. L.)

302. *Kölreuter* konnte nur durch die Vermischung ähnlicher Pflanzen Bastarde erziehen, unnatürliche gaben keine, selbst auch dann nicht, wenn sie nach unserer Art zu classificiren zu einer Gattung gehörten. Man sieht hier, wie die Natur auf diesen Wege unnatürliche Vermischungen zu vermeiden sucht.

Das Beispiel des Maulesels und des Maulthiers, die für völlig unfruchtbar gehalten wurden, beweist die Physiologen als ein Axiom anzunehmen: dass alle Bastarde unfruchtbar sind. In der Zoologie sind uns jetzt viele Beispiele von fruchtbaren Bastarden bekannt, und auch selbst das gepriesene Beispiel des

anlesels hält nicht Stich, da man ihn im wärmern Klima fruchtbar findet.

Auch *Köhlreuter* fand die Bastarde der verschiedenen Tabacksarten und mehrerer Gewächse steril. Der empel war bei ihnen vollkommen, aber die Staubfässer bildeten sich nicht gehörig aus. Es giebt aber sehr viele Beispiele von fruchtbaren Bastarden, die ihre eigenthümliche Gestalt behalten und sich fortpflanzen. Ich will einige mit ihrer Entstehung anführen.

Sorbus hybrida, die Mutter war *Sorbus aucuparia*, der Vater *Pyrus Aria*.

Pyrus hybrida, die Mutter war *Pyrus arbutifolia*, der Vater *Sorbus aucuparia*.

Rhamnus hybridus, die Mutter war *Rhamnus alaternus*, der Vater *Rhamnus Alaternus*.

Welche Vermischungen machen nicht die afrikanischen Storchschnäbel, die man jetzt Kranichschnäbel (*Pelargonium*) nennt, in unsern Gärten? Alle Pflanzen aus der 21. 22. und 23ten Linne'schen Classe, geben meistens fruchtbare Bastarde. *Linne* schrieb eine eigene Abhandlung über die Bastardpflanzen, worin er die Entstehung verschiedener Gewächse erklären wollte; es waren aber nur Muthmassungen, denn keine seiner Behauptungen stimmt mit der Erfahrung überein.

(Auch des Verf. Angaben sind nur Muthmassungen. Bastarde sind oft fruchtbar, aber nur dann, wenn sie sich mit der väterlichen oder mütterlichen Art vermischen. Dieses bezieht sich auch auf das folgende. L.)

Sollte aus den bis jetzt über die Bastarde des Thier- und Pflanzenreichs gemachten Erfahrungen, nicht vielleicht mit einiger Einschränkung die Regel

folgen: dass alle Bastarde fruchtbar sind, aber nur einige ein warmes Klima verlangen, um den männlichen Samen gehörig auszubilden? Ich wage es aber nicht diese Regel für eine ausgemachte Wahrheit anzunehmen, vielmehr wünsche ich, dass sie die Naturforscher genauer prüfen, und aufmerksamer auf die Bastarde in verschiedenen Himmelsgegenden sein mögen, um die Wahrheit auszumitteln.

Kölreuter hat aber noch einige Versuche gemacht, die den deutlichsten Beweis für die Epigenesis und für die Befruchtung der Pflanzen abgeben. Nur eine seiner Erfahrungen zum Beispiel. Er erzeugte von *Nicotiana rustica* und *paniculata* einen Bastard. *Nicotiana rustica* war das Weibchen, *paniculata* aber das Männchen gewesen. Der Bastard hatte, wie alle die er erzeugte, unvollkommene Staubgefäße und hielt das Mittel zwischen beiden Arten. Er befruchtete ihn mit *Nicotiana paniculata* und erhielt Pflanzen davon, die dem *paniculata* ähnlicher waren. Dieses setzte er einige Generationen hinter einander fort und verwandelte auf diesem Weg zuletzt die *Nicotiana rustica* in *Nicotiana paniculata*. Durch diese und mehrere, öfters wiederholte, veränderte und mit andern Pflanzen angestellte Versuche, ergiebt sich ganz deutlich, dass keine Präformation, oder Einschachtelung, statt findet.

Es geht nach der Theorie hier eine Vermischung der männlichen und weiblichen Flüssigkeiten vor sich, aus dem ein drittes erzeugt wird, was vom Vater und von der Mutter etwas in seiner Gestalt erhalten hat. So schön, so überzeugend lassen sich leider nicht alle Theorien beweisen, wie wir es jetzt bei

der Menge gemachter Entdeckungen im Thier- und Pflanzenreiche in Rücksicht der Generation können.

303. Es hat aber weder in den frühern, noch in den spätern Zeiten an Naturforschern gefehlt, die den Gewächsen das Geschlecht ganz abgesprochen haben. *Smellie* scheint auch dieser Meinung zugethan zu sein, indem er *Spallanzani's* Versuch, den er mit einer weiblichen Hanfpflanze, die von allen männlichen entfernt war, ausstellte, und doch, obwohl sehr wenigen, vollkommenen Samen erhielt, zum Hauptbeweis anführt. Wie schwer sind aber dergleichen Versuche, um vor allem Irrthum sicher zu sein, zu machen, und wer bürgt uns dafür, dass wir nicht bei aller Aufmerksamkeit getäuscht werden? *Spallanzani* stellte eine weibliche Pflanze in ein Zimmer, wo allen Insekten der Zugang versperrt war, und bedeckte sie, um noch sicherer zu gehn. Konnte er aber vor der Reife der ersten Blumen die weibliche Pflanze des Hanfs erkennen? Konnte ein kleines Insekt nicht seiner Aufmerksamkeit entgehn und die Pflanze doch befruchten? Wie oft aber finden wir nicht in Pflanzen getrennten Geschlechts, zuweilen einzelne Staubgefässe und wer will behaupten, dass es nicht hier auch der Fall sein konnte? Die wenigen erhaltenen Samen zeigen schon, dass doch einzelne Theile müssen befruchtet sein. Gesetzt aber auch, dass der weibliche Hanf, ohne Befruchtung reifen Samen erzeuge, können wir wohl von diesem einzigen Beispiel auf alle Vegetabilien schliessen? Wir haben ein Beispiel im Thierreich an der Blattlaus, die ohne Begattung sich bis zum Herbst fortpflanzt. Was würde man wohl von dem urtheilen, der aus dieser einzigen

zu zeigen, der in dem Keim (*corculum* §. 123.) besteht. Er bildet sich nach und nach, und ist bei der Sonnenblume (*Helianthus annuus*) drei Tage nach der Begattung, bei der Gurke (*Cucumis sativus*) eine Woche nachher, und bei der Zeitlose (*Colchicum autumnale*) nach einigen Monaten sichtbar. Anfangs ist er flockig, er wird aber nach und nach, so wie die Blase, welche ihn enthält, grösser und fester. Die Blase vergrössert sich nicht bei allen Samen in gleicher Gestalt, bei einigen nimmt sie in ihrem ganzen Umfange zu, bei andern verlängert sich eine Spitze, die bis zur entgegengesetzten Wand gerade aus fortläuft, und nun dehnen sich erst die Seitenwände an.

(Die vom Verf. gegebene Darstellung konnte nicht genau sein, da nach ihm erst genaue Untersuchungen über diesen Gegenstand von mehreren, besonders L. C. Treviranus, angestellt wurden. Der Same besteht aus zwei Membranen, der äussern, in welcher sich keine Gefässe verbreiten, und der innern, durch welcher sie sich verbreiten. Die Stelle, wo sie aus der Nabelschnur hervortreten und sich verbreiten, heisst jetzt *chalaza*. Das Innere besteht in der Regel aus einer doppelten Schicht von Zellgewebe, der äussern und innern. Diese letztere ist oft mit einer Flüssigkeit angefüllt, die man mit dem *liquor amnios* vergleicht, und daher jene Schicht *amnios* nennt. In diesem innern Zellgewebe verbreiten sich keine Gefässe, nur die Nabelschnur geht durch zu der Stelle, wo sich der Embryo entwickelt. Nun sind die Veränderungen von verschiedener Art. Er vergrössert sich die innere Schicht, und die äussere fängt sogleich an zu schwinden, und zwar geht jene Vergrösserung bis zur Reife des Samens, oder es erfolgt ebenfalls ein Schwinden derselben. Im erstern Falle bildet sich das Eiweiss (*albumen* oder *perispermium*), wie die *Euphorbiaceae* z. B. zeigen, im zweiten liegt der Embryo ohne Eiweiss im Samen, wie die *Cucurbitaceae*, *Pyrus*, *Prunus* u. a. zeigen. Oder die äussere Schicht vermehrt sich, und die innere schwindet

sogleich, fehlt auch zuweilen von Anfang an. So entsteht das albumen oder perispermium in andern Pflanzen, besonders in den Monokotyledonen. L.)

305. So gelangt allmählig der Same zu seiner Vollkommenheit, alsdann wenn er seine ganze Reife erreicht hat, trennt er sich auf verschiedene Art von der Mutterpflanze, und ist nun im Stande ein neues Leben anzufangen; in dem alle die erzählten Scenen von neuem in der ihm eigenthümlichen Art gespielt werden. Dieses ist der gewöhnliche Weg, wie Pflanzen sich vermehren. Es giebt aber auch noch Pflanzen die ausser dem Samen sich noch auf eine andere Art fortpflanzen. Am Stengel oder in dem Blattwinkel machen zuweilen, von Natur oder durch Zufall, kleine Spiralgefässe (auch andere innere Theile L.) der Pflanzen Knoten, die sich in Knospen verwandeln, welche sich freiwillig von ihr trennen, Wurzel und Blätter treiben und so eine neue Pflanze derselben Art hervorbringen. Solche Gewächse nennt man lebendig gebährende (*vegetabilia vivipara*). Verschiedene Arten des Lauchs (*Allium*), die Feuerlilien (*Lilium bulbiferum*), das knollige Rispengras (*Poa bulbosa*) u. m. a. thun es von freien Stücken. Die Gartentulpe (*Tulipa Gesneriana*) thut es durch einen einfachen Kunstgriff, wenn man ihre Blume vor der Befruchtung abschneidet, und den Stengel mit den Blättern stehn lässt, sie muss aber eine schattige Lage haben. Auf ähnliche Art behandelt thun es mehrere krautige Pflanzen, besonders *Eucomis punctata* u. s. w. Die Gärtner vermehren durch Stecklinge, Absenker, Propfen, Copuliren und Oculiren auf ähnliche Art die Pflanzen. Die auf einen andern Stamm gesetzte

Willdenow's Grundriss. I Th.

Agricola und *Barnes* waren aber eher in dieser Art von Vermehrung, s Knospe gerade in die Erde und erzogen kommende Pflanzen. Ja *Pothos* und *Pl* sich sogar aus Blättern vermehren.

(Jetzt wird diese Art der Vermehrung len Pflanzen mit vielem Erfolg ang Aloëarten werden meistens aus Blatt Ausgezeichnet ist die Eigenschaft Blättern zu treiben, an *Bryophyll* sonst *Cotyledon calycina* genannt. 1

Bei dieser Art von künstlicher Verme merkenswerth, dass wo die Zweige, od irgend eine Art, sei es durch Stecken, Oculiren zu neuen Pflanzen gemacht v die Pflanze von der sie genommen wu sondern auch als Spielart fortpflanzt. Ma den Theil eines Individuums und macht besondern Pflanze; daher auf diesem Wc arten sich vervielfältigen lassen. Der nur die Art fort, die aus demselben unt Ansehn als Spielart hervorwachsen ka Zweige und in der Knospe ist schon die gebildet, und es ist gar nicht möglich, c

306. Der Stamm der holzartigen Gewächse zeigt durch das beständige Zwischenschieben von Gefässen (s. 264.) sein Alter in den Jahrringen. Die ersten Gefässzirkel fangen an ihre Seitenwände zu verholzen. Das Holz hat in der Regel, wenn es jung ist, eine gelblichweisse Farbe, die sich mit den Jahren nach Beschaffenheit der Pflanze mehr verdunkelt. Der rasche Trieb der Säfte ist nur in der Nähe des Marks oder im Mittelpunkt und im neuen Gefässringe zu finden, in den ältern werden die Säfte langsamer fortgetrieben, und ihre Reizbarkeit ist sehr gemindert. Das Leben jedes Strauchs und Baums, besteht allein im Mittelpunkte des Holzes und im neuen Gefässringe, werden diese verletzt, so muss er absterben. Hat aber ein holzartiges Gewächs mehrere Jahre seine Bestimmung erfüllt, so fangen die Gefässzirkel an, sich zu verstopfen und immer dichter zu werden, dies verursacht, dass die nächst herungelegenen nicht mehr ihre Feuchtigkeit von ihnen nehmen können, dass auch sie ihre Säfte langsamer fortbewegen, und dass der neue Gefässring immer dünner wird. Am Ende stockt auch der Saft in den folgenden Holzringen, der neue Gefässzirkel kann sich nicht ganz ausbilden, wenige Knospen entfalten sich nur, die wenigen Blätter können nicht hinreichende Säfte für das Ganze bearbeiten und das allgemeine gewisse Loos aller organischen Körper, der Tod, setzt dem endlichen Wachsthum unübersteigbare Grenzen.

(Ein Verstopfen zeigt sich in der Natur nicht, wohl aber ziehen sich die alten Jahrringe zusammen und werden dadurch dichter. Um das Mark liegt ein Ring von grössern, frischeren Gefässen, als im Holze, welcher den Trieb fortsetzt. L.)

307. Bei den Standengewächsen verhärten sich

in einem Jahre alle Gefäße des Stengels und es ist nicht möglich, dass sie länger Saft führen können, daher muss er mit dem Ende des Jahres absterben. Die Wurzel derselben setzt, wie der Stamm holziger Gewächse, jährlich einen neuen Gefäßkreis ab, und sie stirbt wie dieser, wenn die Kreise von Gefäßen sich zu sehr verholzt haben. Es treiben also dann an der Seite oder Spitze nach Verschiedenheit der Pflanze neue Aeste hervor, die wieder eben so lange fortwachsen. Mehrere Staudengewächse dauern viele Jahre, verschiedene aber erneuern jährlich ihre Wurzeln.

(Dieses ist nicht so in der Natur. Ohne Verholzung sterben die Stämme der Staudengewächse jährlich ab, wie Blätter abfallen. Die Wurzeln dieser Gewächse bilden niemals jährlich einen neuen Gefäßkreis, sie treiben seitwärts neue Aeste und Stämme. Nur die Wurzeln der Sträucher und Bäume bilden Gefäßringe. L.)

308. Die Kräuter, die mögen nur ein Jahr, wie die Sommergewächse, oder zwei, wie zweijährige Pflanzen dauern, werden durch die Bildung der Blume und Frucht so sehr erschöpft, dass durch die sehr geminderte Reizbarkeit der Gefäße sie sich leicht verholzen, und Wurzel und Stengel nach der Reife der Frucht gänzlich absterben müssen. Raubt man ihnen aber die Blumenknospen beständig, wenn sich diese zeigen, so kann man die Pflanzen mehrere Jahre erhalten. Eben dieses geschieht auch, wenn ihre Blumen gefüllt sind, und sie das Begattungsgeschäft nicht vollziehen, und mithin auch keine Früchte tragen können. Ihre Gefäße behalten die ihnen zur Fortdauer nötige Reizempfänglichkeit, die sonst durch den Aufwand von Kräften verloren gegangen wäre, und die Faser verholzt langsamer.

309. Der natürliche Tod ist aber nicht bei allen Gewächsen gleich. Er erfolgt wie bei allen organischen Körpern auf eine dreifache Art. Erstlich durch Erhärten der Faser, wie bei den Bäumen, Strüchern und Staudengewächsen. Zweitens durch Erschöpfung der Kräfte (§. 308.) wie bei den jährigen und zweijährigen Pflanzen. Endlich drittens durch Zerfließen, wie bei den weichen Pilzen und Schimmelarten. Diese Gewächse ziehn eine Menge Feuchtigkeit an, die mit ihrem Alter vermehrt wird. Es entsteht nie bei ihnen eine Verholzung, sondern sie sterben an zu großer Erweichung, an Uebermass der Feuchtigkeit und anfließen.

(Durch Erhärten der Faser stirbt keine Pflanze. Ein Eichbaum kann noch lange leben, wenn seine Fasern auch eben so hart sind, als sie kurz vor seinem Tode werden können. Nur wenige Pilze zerfließen, und dieses geschieht erst nach dem Tode. Alle Pflanzen sterben auf die zweite Art. L.)

310. Die Grösse und Dauer der Gewächse sind eben wie ihre Gestalt und innere Beschaffenheit sehr mannigfaltig und stehn zusammen in enger Verbindung. Man hat Gewächse, die so zart sind, dass sie mit dem unbewaffneten Auge sich entziehen, so wie andere die eine beträchtliche Höhe erreichen. *Dacrydium cupressinum* auf der Insel Tanna soll drei bis vierhundert Fuss hoch werden. *Loureiro* giebt die Höhe von *Calamus rudentum* zu 500 Fuss an. Wahrscheinlich hat man sich hierin geirrt, da man sie bloss nach dem Augenmasse abschätzte. *v. Humboldt* fand eine Palme, *Ceroxylum andicola*, welche 200 Fuss mass und in Neuhollland traf man *Eucalyptus rostrata*, von eben dieser Höhe. Vor der Hand, bis durch wirkliche Ausmessung die wahre Grösse der

oben genannten Gewächse angegeben ist, muss man diese für die ansehnlichste halten. Uebrigens kommen, in der warmen und heissen Zone, Bäume von 70 bis 100, ja selbst 150 Fuss häufig vor. Auch einige Gewächse des Meeres erreichen eine beträchtliche Länge, so fand man *Fucus*-Arten in der Gegend der Falklandsinseln und eine andere an der Nordwestküste von Amerika, die an 300 Fuss lang gewesen sein sollen.

Die Dauer des Lebens ist bei der zahlreichen Menge von Vegetabilien sehr verschieden. Einige Schimmelarten brauchen nur wenige Stunden zu ihrer Entfaltung, und schwinden eben so schnell. Verschiedene Pilze dauern einen oder wenige Tage, andere Wochen und Monate. Die Sommergewächse leben drei, vier, bis höchstens acht Monate. Die zweijährigen Pflanzen dauern sechszehn, achtzehn, bis vier und zwanzig Monate. Viele Staudengewächse wachsen wenige Jahre, mehrere aber eine lange Reihe derselben. Unter den Sträuchern und Bäumen finden sich welche, die acht, zehn, bis hundert, ja tausend Jahre leben können. Bei uns erreicht die Eiche und Linde das höchste Alter. Die erste kann sechs bis acht Jahrhunderte und darüber durchleben, so wie man von der letztern fast eben so alte Stämme gesehen hat. Die das höchste Alter erreichende Bäume unseres Erdballs sind gewiss der Affenbrodbaum (*Adansonia digitata* §. 267.), die Ceder von Libanon (*Pinus Cedrus*), und verschiedene Palmen. Der Affenbrodbaum lebt aber wahrscheinlich von allen am längsten, man rechnet sein Alter auf ein, wo nicht mehrere Jahrtausende.

VI. Krankheiten der Pflanzen.

311. Die Gewächse sind, wie alle organischen Körper, mancherlei Unfällen unterworfen, die sie befallen können. Die gewöhnlichen Gelegenheitsursachen sind: unschickliches Erdreich, widernatürlicher Standort, späte Nachtfröste, anhaltender Regen, grosse Dürre, heftige Stürme, Schmarotzerpflanzen, Insekten und Verletzungen mancher Art.

Krankheit nennen wir bei ihnen diejenige wider natürliche Beschaffenheit, wodurch ihre Verrichtungen oder wenigstens einige derselben leiden, und der Zweck, zu dem sie bestimmt sind, verhindert wird.

312. Die Krankheiten der Gewächse sind nun verschiedener Art, nemlich: sie befallen die ganze Pflanze und diese werden allgemeine genannt, oder sie befallen nur einzelne Theile derselben, dann heissen sie örtliche Krankheiten. Sporadische nennt man solche, die unter einer Menge derselben Art Pflanzen eine oder andere befallen, wie die Anzei-
hung: epidemische, wovon eine grosse Anzahl zugleich betroffen wird, wie der Brand, der Rost und mehrere andere.

313. Die Krankheiten der Pflanzen sind entweder von der Art, dass sie von aussen dieselben befallen und durch allerlei Umstände oder Unglücksfälle verursacht werden, oder sie entstehen von innern Ursachen. Die erstern sind im Ganzen viel leichter zu heilen als die letztern. Die Krankheiten, welche aus innern Ursachen entstehen, haben ihren Grund in der erhöhten oder geminderten Reizempfänglichkeit der Faser, (und einer Veränderung der Lebensbewegungen. L.) welche durch allerhand Gelegenheitsursachen hervorgebracht werden kann.

Die Kur bei den Pflanzen ist sehr einfach, entweder schneidet man das Schadhafte weg, (und bewahrt die offenen Stellen vor der Luft. L.) oder man verändert den Boden, die Lage und den Wärmegrad. Hierauf allein beschränkt sich die Heilung aller Gewächse. Es finden sich bei ihnen Uebel, wie im Thierreiche, die unheilbar sind, z. B. die Abzehrung, der Baumkrebs, wenn er verborgen ist, die Verstümmelung, die Ungestalttheit u. s. w. Die meisten Uebel lassen sich aber heben.

314. Die *Wunde* (vulnus), ist eine Trennung der festen Theile durch äussere Gewalt. Sie kann vorsätzlich durch Abhauen der Aeste, oder zufällig durch Reiben des Viehes, durch Reiben gegen einen andern Gegenstand, wenn der Stamm vom Winde bewegt wird, durch den Biss der Thiere, durch das Abfallen der Schmarotzerpflanzen, oder auch von ausserordentlich grossem Hagel entstehen. In allen diesen Fällen ist es nöthig, durch einen guten Kütt oder Baumwachs den Einwirkungen der Luft den Zugang zu verstopfen. Ist die Wunde aber schon lange frei

VI. Krankheiten der Pflanzen. 473

und unbedeckt dem Regen und der Luft ausgesetzt gewesen, und ist sie von grossem Umfang, so muss man, ehe der Schaden grösser und gefährlicher wird, den schadhafte Theil bis auf das gesunde Holz wegheiden, und alles mit Baumwachs verstreichen.

Die Mittel Wunden zu verhüten, fliessen aus der Natur der Sache selbst. Man muss vorsichtig beim Abhauen der Aeste sein, dem Vieh den Zugang verwehren, Bäume so ziehn, dass man nicht nöthig hat, sie durch Befestigung an einen Pfahl auszupflanzen, oder wenn es ja nicht zu vermeiden ist, zwei bis drei Pfähle dabei setzen, und mit weichen Materialien sie anbinden, bei grossen Stürmen aber lieber sie sich selbst überlassen; man muss keine Schnarotzerpflanzen dulden. Gegen den Biss kleiner Thiere und den Hagel lassen sich nicht immer Vorkehrungen treffen.

315. Der *Bruch* (fractura), ist die Trennung des Stammes und der Aeste in mehrere Stücke. Er kann entstehen vom heftigen Winde, von zu vielen Früchten, von vielem Schnee, oder auch von einem Blitzstrahl. Merkwürdig ist es, dass der Strahl des Blitzes fast an jeder Art des Baumes verschiedentlich herunterläuft. Die Birke (*Betula alba*) zeichnet sich darin von allen übrigen Bäumen aus, dass der Blitz nie an ihrem Stamm herunterläuft, sondern nur im Gipfel ringsherum die Aeste losschlägt.

Der Bruch, wenn er rein ist, die Aeste oder nur junge Stämme betrifft, kann leicht geheilt werden. Ist er aber mit einer Quetschung verbunden, betrifft er den Stamm erwachsener Bäume, oder gar Bäume von harziger Natur sind, so ist kein Rettungsmittel vorhanden.

Trifft der Bruch junge Bäume und Aeste, selbst

474 VI. Krankheiten der Pflanzen.

Ästern, und wird man es gleich gewahr, so heilt er besonders im Frühjahr und bis Johannis leicht, wenn man alles in die gehörige Lage bringt, fest verbindet, und den Zweig oder Stamm unterstützt. Ist aber zugleich eine Quetschung dabei, trifft er dicke Stämme, so muss man den Ast abschneiden, oder den Stamm umhauen, und neue Äeste aus dem Stamm, oder Loh aus der Wurzel treiben lassen.

Vorsichtsregeln den Bruch zu vermeiden, giebt es keine andere, als Bäumen mit zerbrechlichen Zweigen solche Lage zu geben, dass sie gegen den Wind so viel als möglich geschützt sind, dass man Obstbäumen nicht alle Tragknospen beim Beschneiden lässt, und in den Gärten dafür sorgt, dass der Schnee nicht zu sehr die Äeste belaste. Gegen den Blitzstrahl giebt es kein Mittel, man müsste denn Ableiter anbringen, was zu kostbar sein möchte, und unmöglich auszuführen ist.

316. Die *Spalte* (fissura), ist die Trennung der festen Theile in eine längliche Kluft, welche von freien Stücken erfolgt. Sie entsteht auf zweierlei Art: entweder aus Vollaftigkeit (polysarcia) oder durch Frost.

Die Spalte zu heilen, bedarf es weiter nichts, als mit gutem Baumwachs die Wunde zu belegen, damit das Regenwetter und andere Atmosphärien nicht den Stamm verderben.

Verwahrungsmittel gegen den Spalt sind das sogenannte Aderlassen oder Schröpfen der hartrindigen Bäume, indem man einen zarten Einschnitt durch die Rinde der Länge nach macht. Auch muss eine Pflanze die zu nahrhaften Boden hat, wodurch sie vollaftig

VI. Krankheiten der Pflanzen. 475

ird, in mageren Erdreich versetzt werden. Gegen Frost schützen auch Bedeckungen von Stroh.

Der Spalt durch Frost artet zuweilen in eine Wundheilung (pernio) aus, welche die Forstmänner Wundkluft zu nennen pflegen, aus der dann, besonders den Eichen, eine schwarze Jauche fiesst, die am Ende in ein Geschwür (§. 336.) übergeht.

317. Die *widernatürliche Entblätterung* (defolatio notha) ist, wo die Blätter nicht zur bestimmten Zeit, sondern früher von den Pflanzen genommen werden. Sie entsteht durch Menschen, Insekten, scharfen Rauch, Staub und anhaltende Dürre.

Es mag nun diese Art der Entblätterung geschehn, wodurch sie will, so kommt es nur darauf an, die Natur der Pflanze, welche daran leidet, zu betrachten, und zu welcher Jahreszeit diese sie trifft, ob es ein schnellwüchsiger Baum, und geschieht es dem August, so kann der Baum noch bei guter Gelegenheit sich wieder belauben und der Schaden in so fern ersetzt werden, dass die Pflanze in diesem Jahre zu einem kleinern Schuss thut. Leidet sie aber nach der bestimmten Zeit und es tritt früh kühles Wetter ein, oder leidet sie noch später, so kann sie leicht einige Jahre kränkeln, ehe sie sich wieder erholt. Trifft sie aber ganz im Spätherbste kurz vor dem Abfall der Blätter dieses Uebel, so hat es öfter keine weiteren Folgen, es sei dann, dass sie aus einem wärmeren Klima abstammt, und die getriebenen Zweige noch nicht ganz verhärtet sind, da dann bei eintretender Kälte diese Zweige und vielleicht einige ältere Aesthchen abfallen können. Das Entblättern durch Menschen, was im Frühjahr, besonders beim Maulbeerbaum zur Erziehung der Seidenwürmer geschieht

476 VI. Krankheiten der Pflanzen

kann vermieden oder doch wenigstens ein-
gemildert werden.

Die den Pflanzen schädlichen Insekten
kennen, und die Vermehrungsart derselben
um die nachtheiligen Folgen zu vermeiden,
allzu grossen Vermehrung Einhalt thun.

Gegen scharfen Rauch in der Nähe von
Werken und Fabriken, so wie gegen die
schützt nichts, als veränderte Lage oder ein
Standort.

Gegen anhaltende Dürre ist fleissiges
anzurathen.

Die herbstliche Entblätterung ist natürlich
keine üble Folgen für die Pflanze, es sei denn
die Blätter durch frühe Nachtfröste sehr zu-
gezwungen würden, und dieses kann nur bei
einen ausländischen Pflanzen schaden, die man
Rücksicht sehr in Sicherheit bringen muss.

318. Der Blutsturz (Haemorrhagia)
erlei, durch Verwundung und der freiwillige

Die Birken- und Ahorn-Arten geben
Verwundungen eine grosse Menge von Saft von
wenn er allzu häufig geflossen ist, die Pflanze
kann.

Der freiwillige Blutsturz entsteht von der
Reizempfänglichkeit der Pflanze, und die
Ursache ist fast immer der Boden. Entweder
der Boden zu sauer, wie man ihn im gemeinen
zu nennen pflegt, das heisst, er befördert eine
frühere Abscheidung der Säfte, die wegen ihrer
nicht in die Gefässe können aufgenommen
oben daher ausfliessen müssen, und an der
ätzende Eigenschaft erhalten, wodurch die Th

ist worden; oder der Boden ist zu nahrhaft über-
sättigt und die Pflanze wird davon vollaftig, sie kann
die Feuchtigkeit nicht halten, daher diese ohne
nahgelegenen Theile anzufressen, anfließen, oder
ausserhalb die gummösen Bestandtheile absetzen.

In den meisten Fällen ist der freiwillige Blutsturz un-
heilbar.

Der freiwillige Blutsturz von Vollaftigkeit ist
entweder gummöser Art, wie an den Obstbäumen,
oder wässriger Beschaffenheit, wie am Weinstock;
die letztere Art nennt man auch das Thränen (la-
crymatio). Der gummöse Blutsturz ist selten tödlich,
man muss ihn nicht überhand nehmen lassen,
sondern die Wunde mit Baumwachs zu heilen su-
chen; der wässrige am Weinstock hat auch für diese
Pflanze keine nachtheiligen Folgen. Sie verhält sich
im Winter wie alle holzartigen Gewächse (§. 281.).
In der zur kalten Jahreszeit gemachten Würzelchen zieht
sie ihre viele Feuchtigkeit aus der Erde, die sie in den
Wurzeln führen, da aber die Witterung nicht sobald
zum Austreiben günstig wird, und die Würzelchen
mehr Saft einnehmen, als die dünnen Stengel fassen
können, so schwitzt der Ueberfluss an den Knospen
aus. Im wärmern Klima thränt der Wein nicht, weil
dann die Blätter sich gleich entfalten können, und die
Pflanze gehörig verbraucht werden. Es ist also das
Thränen dem Wein eigentlich nicht natürlich; son-
dern entsteht durch ein kälteres Klima, ist aber der
Pflanze weiter nicht nachtheilig.

319. Der Mehlthau (Albigo), ist ein weissli-
cher schleimiger Ueberzug auf den Blättern der Pfla-
nzen, der öfters ihr Hinwelken befördert. Er entsteht
durch kleine Pflanzen oder Insekten. Die erstere Art

322. Der Aussatz (Lepra), wird an den Stämmen besonders junger Bäume angetroffen. Wenn Stämme ganz mit Lichenen überzogen sind, dass ihre Oberhaut dadurch gänzlich verstopft wird, so nennt man dieses den Aussatz. Alte Bäume können an ihrem Hauptstamm ohne Schaden ganz mit Lichenen bedeckt sein, wenn nur die kleinern Aeste verschont bleiben; haben aber junge Bäume und Sträucher alzu mageren Boden, eine zu dünne Schicht nahrhafter Erde, steinigtes Erdreich, eine unschickliche Lage, nemlich zu feucht, zu trocken; sind sie gegen ihre Natur zu sehr allem Winde bloss gestellt; so fangen sie an zu kränkeln, ihre Rinde kann nicht so lebhaft die Hautverrichtungen bewirken, und sie werden ganz, selbst an den jungen Zweigen mit Lichenen mancher Art bedeckt. Raschwachsende daneben stehende Bäume, die völlig gesund sind, werden gar keine oder sehr wenige Lichenen tragen.

Der Aussatz macht die Pflanzen bei weitem kränker als sie waren, und sie müssen an der Abzehrung sterben, wenn man sie nicht von den Lichenen reiniget, ihre Haut wäscht, und ihnen eine bessere Lage und angemessenern Boden giebt.

323. Die Galläpfel (Gallae), entstehen von kleinen fliegenden Insekten, welche von Linné Cynipen genannt werden. Es sind fleischige runde mannichfaltig ausgebildete Körper, die am Stengel, Blattstiel, Blumenstiel und an den Blättern zum Vorschein kommen. Sie entstehen auf folgende Art: das kleine Insekt sticht mit seinem Legestachel in die Substanz der Pflanze und legt in diese feine Oeffnung ein Ei. Die wenigen verletzten Gefässe erhalten dadurch

ine andere Richtung, sie schlingen sich um das Ei. Der Reiz, den der Stich des Insekts veranlasst, macht, wie in allen organischen Körpern, einen stärkern Zufluss der Säfte nach der verletzten Stelle, die Säfte werden häufiger abgesetzt, als geschehn sollte und es entsteht ein Auswuchs, der ganz fleischig ist. Die kleine aus dem Ei entstehende Made, nährt sich vom Saft, wächst darin vollkommen aus, wird zur Puppe, und zuletzt wieder ein vollkommenes Insekt, das sich auf dieselbe Art fortpflanzt.

Merkwürdig ist es, dass jede besondere Art der Gallie auch eine verschiedene Form des Gallapfels hat. Sollte dieses vielleicht von der eignen Bildung des Eies jeder Art abhängen; da wir wissen, dass unter dem Mikroskop sich die Insekteneier so mannigfaltig gebildet zeigen? An den Eichen giebt es verschiedene Arten Galläpfel, ferner an Salix, Cistus, Ilex, Veronica, Hieracium, Salvia u. s. w.

Die Galläpfel der Salvia pomifera, die daher ihren Namen hat, sollen schmackhaft sein, und im Orient essbar werden.

Mittel gegen die Galläpfel giebt es keine andre, als dass man sie, sobald sie sich entfalten wollen, abschneidet, doch kann dies nur bei zärtlichen Gewächsen, die man erhalten will, geschehen. Selten aber sind sie in solcher Menge, dass sie nachtheiligen Einfluss auf die Pflanzen haben.

324. Der *Fleischzapfen* (folliculus carnosus foliorum), ist ein Gallapfel eigener Art, der lanz pfriemförmig und spitzig ist. Man sieht ihn an Opulus nigra und Tilia europaea, er bedeckt die Blattoberfläche. (Nemlich er ist oft in so grosser Menge vorhanden, dass er die Blattoberfläche bedeckt. L.) Seine

482 VI. Krankheiten der Pflanzen.

Entstehungsart ist dieselbe und er macht durch seine grosse Anzahl die Pflanze krank.

(Gewöhnlich wird er durch Blattläuse (*Aphis* *Chermes*) hervorgebracht. L.)

Die *Verdrehungen* (*contorsiones*) entstehen durch Insekten, indem diese das Aufschwellen und Verdrehen der Blätter bewirken, was diese Krankheit besonders charakterisirt. Man sieht sie bei *Cypripedium*, *Veronica*, *Lotus*, *Vaccinium*.

325. Die *Warze* (*verruca*), eine Krankheit, die sich besonders auf Früchten, z. B. bei *Malus* zeigt. Sie entsteht nicht durch Insekten, sondern scheint bloss durch zufällige Umstände entstehen zu werden.

Von derselben Art sind die *Muttermähler* (*maculae*), man nennt sie gewöhnlich *Wunden*. Sie entstehen durch Verletzungen der Haut. Beide Arten Zufälle sind den Pflanzen nachtheilig, man weiss auch kein Mittel sie zu heilen.

Der *Maser* (*tuber lignosum*), findet sich an den Baumstämmen, seine Entstehung scheint durch Insekten, theils durch Abwechselung der Witterung veranlasst zu werden. Es ist eine Verwundung in den thätigen Gefässen des Holzes, die einen Reiz sich mehrmal verschlingen, ohne Knospen und Zweige zu bilden; sie erzeugt mehr einen grossen Ballen, der öfters, wenn die Lage nicht gut ist, durch Nässe in ein Geschwür überartet. Sehr oft vergrössert er sich ohne Schaden des Baums.

(Er besteht aus unentwickelten Knospen. L.)

326. Die *Zapfenrosen* (squamationes), entstehen wie die Galläpfel (§. 323.). Das kleine Insekt legt, wenn eine Zapfenrose entstehen soll, sein Ei in die Spitze der Knospe. Durch die Verletzung kann der Zweig, welcher sich aus der Knospe bilden würde, nicht entstehen, er bleibt so lang als er war, die Blätter des Zweigs entfalten sich daher alle auf einem Punkt, werden etwas kleiner wie sie sonst sich ausbilden, und das Ganze sieht einer gefüllten Rose nicht unähnlich. An den Weiden sieht man sie öfter.

In Menge können diese Zapfenrosen nachtheilig für die Pflanze, welche sie befallen, sein. Um sie auszurotten, muss man dergleichen unentfaltet abschneiden.

327. Der *Bedeguar* (Bedeguar), zeigt sich nur bei den Rosenarten, er entsteht wie die Zapfenrose, nur mit dem Unterschiede, dass das Insekt, welches den Bedeguar erzeugt, auf einem Haufen in die Mitte der Knospe mehrere Eier legt. Daraus wächst eine faustgrosse fleischige Masse, die ganz mit haarförmigen farbigen Verlängerungen bedeckt ist, niemals aber Blätter hat.

328. Die *Bleichsucht* (Chlorosis), heisst die Krankheit bei den Gewächsen, wo die grüne-Farbe gänzlich verschwindet und alle Theile weiss oder weisslich werden. Sie entsteht aus vermindertem Reiz, die Pflanzen können den Sauerstoff nicht abscheiden, er wird bei ihnen angehäuft. Die Ursachen sind dreifach, nemlich: Mangel des Lichts, Insekten, unschicklicher Boden.

Aus dem Vorhergehenden (§. 285.) ist bekannt,

484 VI. Krankheiten der Pflanzen.

dass eine gesunde Pflanze im Sonnenlicht Sauerstoffgas fahren lässt, und dass die Anhäufung der Kohlensäure ihre grüne Farbe verschwinden macht (§. 27). Wenn bald die Pflanze des Lichts beraubt ist, kann sie keinen Sauerstoff fahren lassen, und daher ihre blassgrüne Farbe, die sich gleich wieder findet, sobald sie der Sonne ausgesetzt wird. Aus der Ursache werden Pflanzen im dunkeln Zimmer, zwischen tiefen Felsenritzen, unter dem dichten Schatten von Sträuchern und Bäumen, so wie bei ähnlichen Umständen bleich.

Insekten, die die Würzelchen der Pflanzen zerstören oder in ihnen nisten und den Nahrungssack zerstören, schwächen ihre Gefässe, machen sie gegen den Einfluss des Lichts unempfindlich (? L.) und bleichsüchtig. Man findet dieses öfters beim Roggen (cereal). Hier ist keine Hülfe möglich.

Unschicklicher Boden, wo ihnen nicht die nöthigen Nahrungsmittel können zugeführt werden, macht sie auch zuweilen bleichsüchtig. In diesem Falle können sie bisweilen durch Veränderung desselben die Gesundheit wieder erlangen.

Eben so werden auch Gewächse durch zu kaltes oder zu warmes Klima bleichsüchtig, und sterben, wenn sie nicht in eine ihnen angemessene Temperatur der Luft gebracht werden.

329. Die *Gelbsucht* (Icterus), unterscheidet sich durch die gelbe Farbe von der Bleichsucht dadurch, dass sie nur von herbstlicher Kälte entsteht. Grösstentheils ist sie der natürliche Tod der Bäume. Nur dann, wenn die Kälte im Herbst früher kommt, als gewöhnlich, kann sie den Pflanzen schaden.

330. Die *Wassersucht* (*Anasarca*), entsteht durch anhaltenden Regen oder zu vieles Gießen. Es schwellen einzelne Theile davon widernatürlich auf, und gehn gewöhnlich in Fäulniß über. So werden verschiedene Zwiebeln oder Knollen durch häufigen Regen ganz aufgetrieben. Das Obst wird wässrig und geschmacklos. Die Samen werden nicht reif oder wachsen schon am Stengel in Pflanzen aus.

Von zu häufigem Begießen leiden die meisten saftigen Gewächse.

Die Wassersucht ist in der Regel bei den Gewächsen unheilbar.

331. Die *Läuseucht* (*Phthiriasis*), nennt man die Krankheit, wo die ganze Pflanze mit kleinen Insekten bedeckt ist, die ihr alle Säfte aussaugen, das Ausdünstungsgeschäft unterdrücken und die fernere Entwicklung der Theile verhindern. Es entsteht diese Krankheit von dreierlei Arten Insekten, nemlich: von der Blattlaus (*Aphis*) deren jede Pflanze eine besondere Art hat; von der Schildlaus (*Coccus*) deren es mehrere Arten giebt. Die Schildlaus, welche in Treibhäusern sich findet (*Coccus Hesperidum*), ist die gefährlichste, diejenigen, welche an den Wurzeln des *Scleranthus*, *Polygonum* u. s. w. gefunden werden, sind weniger nachtheilig; endlich entsteht noch diese Krankheit vom sogenannten Kanker (*Acarus telarius*). Dieses ist eine kleine Milbe, welche auch in den Treibhäusern die Blätter der Pflanzen ganz fein bespinnt und verdirbt. Gegen die Blattlaus hilft fleissiges Nachsehn, Bepinseln mit Seifenwässerlauge oder Tobacksdcockt und starkes Räuhern mit Tobacksbllättern oder Schwefel in einem

486 VI. Krankheiten der Pflanzen.

verschlossenen Zimmer. Dieselben Mittel kann auch gegen die Schildlaus brauchen, aber ausschlüssig hilft das auch, wenn man die Pflanze, sobald die Temperatur erlaubt, plötzlich an einen schattigen Ort ins Freie stellt. Dieses letztere tödtet den Kanker, womit besonders in Treibhäusern die folgenden *Sida*, *Hibiscus*, *Dolichos* und *Phaseolus* gelitten werden.

332. Die *Wurmkrankheit* (*Vermination*) steht nicht durch Würmer, wie im Thierreiche, sondern durch Insektenlarven. Der Stengel, die Blätter und Früchte werden davon befallen.

Der Stengel verschiedener Gewächse, wird oft von den Larven der Insekten durchgefressen, muss zuweilen ganz darüber eingehen. Die *Salix alba*, die Rosskastanie (*Aesculus Hippocastanum*), die Bumskeule (*Typha latifolia*) können in Rücksicht des Stengels als sehr gemeine Beispiele dienen.

Die Blätter werden oft vom bekannten *Wurm* bewohnt. Man sieht dieses häufig an *Kirschblättern* u. s. w.

Die Früchte der Pflaumen, Aepfel, Birnen, Nüsse, so auch die Samen des Getreides u. s. w. werden von Insektenlarven bewohnt, die sie zerstören.

Ausser dem Tödteten der Insektenlarven, gibt es kein Mittel diesen Feinden zu widerstehen.

333. Die *Abzehrung* (*Tabes*) pflegt häufig die Folge verschiedener schon genannter und noch erwähnender Krankheiten zu sein. Sie kann aber auch von unfruchtbarem, unschicklichem Boden, und

gem Klima, ungeschicktem Verpflanzen, von Erschöpfung der Kräfte durch zu häufiges Blühen, von Insekten, Geschwüren u. s. w. entstehn. Die ganze Pflanze fängt allmählig an, weniger zu treiben und vertrocknet dann. Sobald sich die Krankheit zeigt, pflegt selten noch Hülfe möglich zu sein.

Die *Wurmtröckniss* der Fichten (*teredo Pinorum*), ist eine Art vom Abzehrung, die vorzüglich dem Splint und Bast der Fichten betrifft. Diese Krankheit entsteht von anhaltender Dürre, von heftig anhaltendem Frost, besonders nach vorhergegangenen wärmern oder gelindern Tagen, und von sehr heftigen Sturmwinden. Die Kennzeichen der Krankheit sind eine Missfarbe der Nadeln, die mehr ins rothgelbe gefärbt sind, ferner zeigen sich eine Menge kleiner Harzpunkte auf den Zweigen, und endlich verbreitet sich ein fauliger Terpentingeruch, die Rinde löst sich ab und der Splint hat ein schwarzblaues Ansehn. Zu der Zeit findet sich der bekannte Borkenkäfer mit mehreren ähnlichen Arten von Insekten ein. Die Wurmtröckniss ist gänzlich unheilbar, auch kann man bei grossen Wäldern keine andere Massregeln nehmen, als dass man das Wegräumen des Moores und der Nadeln an den Wurzeln der Fichten nicht gestattet, weil dadurch die Bäume geschwächt werden, und um so eher diesem Unfall ausgesetzt sind.

334. Die *Schwäche* (*debilitas seu deliquium*) besteht darin, dass alle Theile, als Stengel, Blätter, Blume u. s. w. erschlaft herunterhängen. Dieses kann von untauglicher Luft, Mangel des Lichts, Mangel der Blätter, Mangel der Feuchtigkeit, allzu

488 VI. Krankheiten der Pflanzen.

starkem Lichte und andern Ursachen, entsteht man zu entfernen sucht, um dem Uebel abzuhelfen.

335. Der *Misswuchs* (*suffocatio incrementi*), ist ein mageres und schwaches Wachstum. Blätter bleichen, werden kleiner und am Ende die ganze Pflanze aus. Der Misswuchs ist von Abzehrung darin verschieden, dass er von zufälligen Dingen herrührt, die sich wegräumen lassen, wodurch die Pflanze sich erholt. Es entsteht Misswuchs nur durch Schmarotzerpflanzen, wie Gewächse, allzu stickigen Standort. Räumt man Hindernisse weg, so erholt sich die Pflanze bald.

336. Das *Geschwür* (*exulceratio*), ist ein gefressener Theil einer Pflanze, aus dem eine Flüssigkeit fließt. Es entsteht nach Wunden, die nicht verwahrt worden sind, oder die eine so üble Wirkung hatten, dass Regen oder Schneewasser darin sickern konnten; es erzeugt sich ferner durch Insekten, Löcher von Schmarotzerpflanzen, oder durch andere Ursachen aus freien Stücken. Von selbst heilt kein Geschwür bei den Gewächsen, sie sind mehr oder weniger tödlich, wenn man nicht Hülfe leistet, man schneidet alles Schadhafte ab und bestreicht den gesunden Theil mit Baumkitt oder Forsythischen Kitt. Oefters hat aus Nachlässigkeit des Gärtners ein Geschwür das Holz, Mar alle Theile eines Baums angefressen, dann muss ohne Zeitverlust alles Schadhafte abgestutzt, und gesagt, durch Baumwachs oder Kitt das Eindringen der Feuchtigkeit verhindern.

Durch unbekannte Ursachen leiden von Geschwüren die Zwiebeln der Hyacinthen und andere flei-

VI. Krankheiten der Pflanzen. 489

erzeln, man muss auch bei ihnen dadurch, dass sie trocken legt, und den schadhafte Theil ausseidet und mit Kitt bestreicht, die Heilung zu bekommen suchen; aber selten erlangt man seinen Zweck, weil die Zwiebeln öfters schon bis an den Mittelakt verdorben sind.

Das beste Arzneimittel der Pflanzen ist noch immer Baumwachs, wenn es gut bereitet ist, aber in vielen Fällen, besonders bei grossen Wunden, ist der Forsythische Kitt, dessen Recept der König von England mit 15000 Thlr. bezahlte, dem Baumwachs weit vorzuziehen. Er besteht aus sechzehn Theilen Kuhmist, acht Theilen trocknen Kalk von einem alten Gebäude, eben so viel Holzasche und einem Theil Flusssand, die zusammen zu einer dicken Salbe geknetet werden. Man kann auch statt des Kuhmistes Ochsenblut, und statt des Kalks trockne Kreide wählen. Dieser Kitt wird nur dünn auf den schadhafte Theil gestrichen, und mit einem Pulver, was aus sechs Theilen Holzasche und einem Theil gebrannter Knochen oder Kreide besteht, abgerieben, bis die Fläche ganz wie polirt ist. Forsyth that Wunder mit diesem Kitt, und heilte alle Schäden der Pflanzen ohne weitere Mühe allein durch ihn. Er hält sich nicht lange, man muss daher nur so viel bereiten als man braucht, oder will man ihn aufbewahren, mit Urin übergiessen. Auch muss man ihn bei trockenem Wetter anwenden, damit er bald den Schaden mit einer Rinde überzieht. Rahn will durch eine Mischung von gestossner Kohle und Kartoffelbrei, oder einer sonst milden Substanz, eben dasselbe ausgerichtet haben, und gestattet derselben noch Vorzüge vor der Forsythischen.

337. Der *Baumkrebs* (carcinoma arborum), entsteht besonders bei den Obstbäumen, wenn sie zu viel Gummi verlieren, und dieses in eine säuerlicheährung übergeht. Häufig zeigt sich auch diese Krankheit in tief liegenden Gürteln nach Ueberschwem-

400 VI. Krankheiten der Pflanzen

zungen. Es zeigt sich ein schwammiger grosser Auswuchs, der selbst bei dem dürresten Wetter eine stehende Sauche fliessen lässt, die alles anfrisst. Man unterscheidet zwei Arten, den effusen und den verbergenden Krebs. Die erste Art wird man leicht an der Rinde bemerken, und kann sie durch Wegnahme der schädlichen Stelle bald heilen, die zweite Art kann aber unter der Rinde schon weit und breit um sich gegriffen haben, ehe man sie sieht. Man muss absehen, ob man nicht durch den Krebs Schaden anrichtet, und nach Wegräumen der verletzten Theile den Fenchelkitt gebrauchen.

Um dem Baumkrebs zu verhüten, muss man den Standort der Pflanze verbessern und zu vermeiden suchen, dass die Obstbäume nicht zu viel Sonnenhitze

338. Der *trockne Brand* (Necrosis), ist das Schwarzwerden und Vertrocknen der Blätter oder Pflanzentheile. Er entsteht von spätem Nachtfrost, von allzu grosser Winterkälte, von brennender Hitze, von Erstickung des Nahrungssaftes in einzelnen Zweigen, und durch kleinere Gewächse.

Späte Nachtfrost tödtet öfters mehrere junge Triebe der Pflanzen, die schwarz werden und verschrumpfen. Man kann kein anderes Verwahrungsmittel dagegen brauchen, als zärtliche Pflanzen, sobald nächtliche Kälte zu befürchten steht, bedecken. Andere wollen die bekannten Frostableiter, welche aus einem gedrehten Stricke von Stroh, der in ein Gefäss mit Wasser geleitet wird, bestehn, sehr gut gefunden haben. Von heftiger Winterkälte leiden ausländische Bäume und schwächliche einheimische. Ihr Holz erfriert, der Bast wird ganz schwarz, und da ist dann keine Rettung mehr möglich. Man muss alles Ver-

VI. Krankheiten der Pflanzen. 491

chte wegnehen, und den Hauptstamm oder die Wurzel wieder aufs neue treiben lassen.

Grosse Hitze kann in Gärten und auch in Wäldern, wenn das Wegräumen des Moores und der dünnen Blätter in den Forsten gestattet wird, denselben Schaden anrichten.

Einzelnen Aesten wird zuweilen durch allzu rasches Wachsthum der andern, die Nahrung entzogen und sie dürrer ab. Dieses kann man ohne Schaden der Pflanze geschehen lassen.

Kleine Pilze verursachen dieselbe Krankheit an den Zwiebeln des Safrans, es ist ein Uredo der diese theils zerstört.

(Vielmehr eine besondere Gattung *Thanatophyllum* Nees, *Sclerotium crocorum* Decand. L.)

An der Goldküste von Afrika weht ein Wind, den man Harmattan nennt, welcher die Pflanze durch Schwarzwerden und Verdürren ihrer Blätter tödtet.

339. Der *feuchte Brand* (*Gangraena*), besteht in einem Feucht- und Weichwerden einzelner Pflanzentheile, die zuletzt in eine faulichte Jauche übergehen. Er befällt nur die Früchte, Blumen, Blätter und Wurzeln, seltener den Stamm. Er entsteht an zu feuchtem, oder zu fettem Boden, durch Anfeuchtung oder Quetschung. Zu heilen ist der feuchte Brand auch nicht, da er nur immer einzelne Theile betrifft, aber wenn man die Ursachen, welche seine Erzeugung veranlassen, entfernt, so ist er zu vermeiden.

340. Der *Kornbrand* (*Ustilago*), zeigt sich besonders an den Getreide- und Gras-Arten; seltener an andern Gewächsen, z. B. *Scorzonera*, *Tragopogon*

492 VI. Krankheiten der Pflanzen.

u. d. m. Er entsteht von einem kleinen Pilze, der ganze Aehre der Gewächse einnimmt, dass sie nicht entfalten kann, und alle Theile in eine schwarze Masse verwandelt, die leicht abschmutzt. In mehreren Jahren sind seiner Entwicklung besonders gedenkt und er pflegt dann sich sehr schnell zu vermehren.

Um den Brand nicht im Getreide zu haben, wählt man solche Samen zur Aussaat, die in einem dumpfigen Orte sind aufbewahrt worden, die nicht auf Feldern gewonnen sind, wo der Brand herrschte. Es ist natürlich, dass man dadurch die Ausbreitung befördert. Man muss auch nicht die Samen zu tief unter die Erde bringen, besonders nicht, wo sehr fetter oder feuchter Boden ist.

Ist der Kornbrand einmal ausgebrochen, so kann sich die damit befallenen Pflanzen nicht heilen. Bei zärtlichen seltenen Gartenpflanzen, kann man dadurch etwas ausrichten, dass man den Theil vor seiner völligen Entwicklung abschneidet, aber im Grossen ist dieses Mittel nicht anzurathen.

(Im Korn machen zwei Arten von Pilzen den Kornbrand. *Caeoma segetum* (Uredo Carbo Decand.) und *Uredo foetida* (U. Caries Dec.). Jener zeigt sich zuerst, indem die Oberhaut reisst, dieser bloss im Innern des Samens. L.)

341. Die *Verstümmelung* (mutilatio); kommt sich besonders bei den Blumen, und man bedient sich der Benennung verstümmelte Blume (flos mutila), wenn einzelne Theile der Blume, besonders die Blumenkrone, nicht zur Vollkommenheit gelangt. Die Ursache derselben ist ungünstiges Klima, und untauglicher Boden. Bei aller Verstümmelung können aber doch öfters dergleichen Blumen vollkommenen Samen zu zeugen.

VI. Krankheiten der Pflanzen. 493

Das Gartenveilchen, so wie die Hundsviole (*Viola lorata et canina*) bringen bei uns oft im Herbst, wenn die nöthige Wärme fehlt, Blüthen ohne Blumenkrone.

Die *Campanula hybrida* bringt hier keine Blumenkrone, in Frankreich und Italien soll sie dergleichen eben. An mehreren Glockenblumen sieht man es hies, dass sie keine Blumenkrone haben, als *Campanula pentagona*, *perfoliata*, *Medinn.* Einige andere Pflanzen als *Ipomoea*, *Tussilago*, *Lychnis*, sind auch diesen Unfällen unterworfen.

Ruellia clandestina hat daher ihren Namen, weil sie zuweilen Blüthen ohne, zuweilen mit Blumenkrone hat. In ihrem Vaterlande, auf der Insel Barbados, soll sie sich eben so verhalten.

Hesperis matronalis bringt sehr oft bei anhaltendem feuchtem Wetter, aus Ueberfluss der Nahrung Blüthen, wo die Blumenkrone sich in einen zweiten Kelch verwandelt hat.

Die Gartennelke (*Dianthus Caryophyllus*) verdroppt die Schuppen ihres Kelchs so sehr, dass die Röhre einer Kornähre nicht unähnlich sieht, und die Blumenkrone gänzlich ausbleibt. Minder auffallend ist diese Krankheit, wenn einige Staubgefässe weniger ausgebildet sind, als der Regel nach in der Blume sein sollten.

Wenn die Verstümmelung von der Art ist, dass der Kelch sich vergrößert, die Blumenkrone nicht mehr Vorschein kommt, die Staubgefässe und Stempel aber so gebildet sind, dass dem ungeachtet durch sie der Samen erzeugt wird, so nennt man dieses eine heimliche Befruchtung (*frutificatio clandestina*) und

404 VI. Krankheiten der Pflanzen.

die einzelne Blume eine heissenblasse Blume (das ist die *destinatus*).

342. Die *Ungestaltlichkeit* (*monstrositas*), die widernatürliche Gestalt einzelner Theile einer ganzen Pflanze. In der Blume und Frucht ist die Gestaltlichkeit öfter von der Art, dass sie deren ganz Zweck hindert.

Der Stengel zeigt sich bisweilen so, dass er dreht, krummgebogen, knorrig, mehr liegend als niedergedrückt ist. Das kalte Klima macht Sporn die Pflanzen rauher, zwergiger und krüppeliger gewisser. Auf hohen Gebirgen sieht man am Ende höchsten Bäume zur Zwerggestalt herabgesunken.

An den Blättern sieht man zuweilen dahn, sie grösser, zahlreicher, dicker, krauser u. s. w. als den, eine Ungestaltlichkeit. Wer kennt nicht den blättrigen Klee, die widernatürlich rothgefärbten Blätter der Buche und andere dergleichen hieher gehörige Verschiedenheiten?

Die Früchte haben auch mancherlei Missgestalten, sie sind sehr gross, sehr klein, zusammengewachsen, schief, krummgebogen u. d. m. Diese können tauglichen Samen bringen. Früchte aber, die doppelt sind, dass wenn man sie öffnet noch innerhalb eine enthalten ist, wie man an der Zitrone sieht, oder solche die keine Samen haben, wie an der Ananas (*Bromelia Ananas*), Pisang (*Musa paradisiaca*), Brodfrucht (*Artocarpus incisa*), Berberitze (*Berberis vulgaris*), verfehlen ganz den Zweck, wozu sie von der Natur bestimmt sind.

Die monströsen Blumen gefallen dem Botaniker nicht, da die zur Begattung wesentlichen Theile ihnen gänzlich fehlen, und man nach ihnen keine Ge-

man bestimmen kann. Sie sind für ihn nur dann wichtig, wenn sie ihm physiologische Aufschlüsse geben. Den Gartenliebhabern gefallen sie vorzüglich und ihr Geschmack ist so verdorben, dass sie die simple schöne Natur verachten, und lieber die üppig gewachsenen Ungestalttheiten in ihre Gärten verpflanzen.

Die Missgestalten der Blumen sind: eine *volle* (*flos multiplicatus*), *gefüllte* (*flos plenus*), *ungestaltete* (*flos difformis*) und endlich *sprossende Blume* (*flos solifer*).

343. Eine *volle Blume* (*Flos multiplicatus*), ist der Anfang einer gefüllten. Man nennt eine Blume *zu* voll, wenn sich die Zahl der Blumenblätter über das Gewöhnliche erstreckt, aber doch Staubgefäße und Stempel übrig sind, um die Begattung zu vollenden und reifen Samen hervorzubringen. Der erste Anfang einer vollen Blume ist die *doppelte* oder *dreifache Blumenkrone* (*corolla duplex vel triplex*); wenn die Blumenkrone sich zwei- oder dreifach vermehrt. Einblättrige Blumenkronen sind oft voll, z. B. *Datura*, *Campanula*; mehrblättrige Blumenkronen haben sehr häufig volle Blumen. So lange in einer Blume noch ein vollkommene Stempel vorhanden ist und sie Samen tragen kann, nennt man sie voll. Die Ursache dieser Missgestalt ist dieselbe, wie bei der folgenden. Dieses Uebel zu heben ist man nicht besorgt, weil die Gärtner die Blumen gern gefüllt und voll sehen; Alte aber einem Botaniker daran liegen, volle Blumen eines Staudengewächses natürlich haben zu wollen, so kann er auf keine andere Weise dazn gelangen, als wenn er der Pflanze nach und nach schlechtes Erdreich giebt.

496 VI Krankheiten der Pflanzen.

344. Eine gefüllte Blume (*Flos plenus*), hat so viel Blumenblätter, dem kein Staubgefäß oder Griffel übrig bleibt. Weil diesen Blumen die zur Begattung nöthigen Theile fehlen, so können sie niemals Samen tragen. Die volle und gefüllte Blume entsteht durch zu fetten Boden. Eine Menge Gefäße werden dadurch mit Nahrungsaft überhäuft, dass die Blumenblätter und Staubgefäße sich spalten und in mehrere Blumenblätter verwandeln. Bei einigen werden die Blumen so sehr gefüllt, dass der Kelch springt.

Einblättrige Blumen sind selten gefüllt, z. B. *Primula*, *Hyacinthus*, *Datura*, *Polyanthes*.

Mehrblättrige Blumen sind am häufigsten gefüllt, z. B. *Pyrus*, *Prunus*, *Rosa*, *Fragaria*, *Ranunculus*, *Caltha*, *Anemone*, *Aquilegia*, *Papaver*, *Paeonia* u. m. a.

Man hat an der Nelke und dem Mohn beweisen wollen, dass gefüllte Blumen Samen tragen können; gewöhnlich aber liegt der Betrug darin, dass man volle und gefüllte Blumen verwechselt. Eine volle kann Samen bringen, aber eine gefüllte niemals.

345. Blumen, die Honiggefäße (*Nectaria*) in Gestalt eines Sporns oder eines Kranzes haben, pflegen entweder den Kranz oder Sporn allein zu vermehren, und die Blumenblätter ganz zu verlieren, oder diese im natürlichen Zustand zu behalten. Sie können auch den Kranz oder den Sporn verlieren, und vermehren nur die Blumenblätter.

Von der ersten Art geben die gewöhnliche Akelei (*Aquilegia vulgaris*) und der gemeine Narciß (*Narcissus Pseudonarcissus*) Beispiele. Bei der Akelei werden die Blumenblätter verdrängt und bloss die Spornen vermehrt. Es pflegen alsdann mehrere Spornen

VI. Krankheiten der Pflanzen. 497

ie Tuten in einander zu stehen. Beim Narciss sind
: Blumenblätter natürlich, der Kranz aber vermehrt.

Eben diese Pflanzen geben auch von der zweiten
t Beispiele; bei der Akelei pflegen alsdann die
ornen ganz zu fehlen, und die Blumenblätter sind
rmehrt, so kann auch dem Narciss der Kranz feh-
n, und die Blumenblätter sind vermehrt. Auf diese
rt füllt sich auch das Veilchen und der Rittersporn.

346. Gewächse, die ein oder nur wenige Staub-
fäße haben, sind selten gefüllt. Werden aber ja
rgleichen Blumen gefüllt, was ein äussérst seltener
ist, so geschieht es nur bei solchen Pflanzen, die
ne einblättrige Blumenkrone haben. Zum Beweise
nn hier *Jasminum Sambac* dienen. Einige natürli-
e Familien haben niemals gefüllte oder volle Blu-
en gezeigt. Solche sind:

- Palmen (§. 153. Nr. 1.),
- die Rohrarten (§. 153. Nr. 3.),
- die Gräser (§. 153. Nr. 4.),
- die keine Blumenblätter haben (*Apetalae*),
- die Kätzchen tragende (§. 153. Nr. 50.),
- die Zapfen tragende (§. 153. Nr. 51.),
- die dreiblättrigen Blumen (§. 153. Nr. 5.),
- die Orchisarten (§. 153. Nr. 7.),
- die Bananengewächse (§. 153. Nr. 8.),
- die Suppenkräuter (§. 153. Nr. 12.),
- die Wasserpflanzen (§. 153. Nr. 15.),
- die zweihörnigen Blumen (§. 153. Nr. 18.),
- die dreiknöpfigen Pflanzen (§. 153. Nr. 38.),
- die sternförmigen (§. 153. Nr. 47.),
- die Doldengewächse (§. 153. Nr. 45.),
- die scharfblättrigen (§. 153. Nr. 41.),
- die quirlförmigen (§. 153. Nr. 42.) u. s. w.,

498 VI. Krankheiten der Pflanzen.

doch machen diese letztern zuweilen, wiewohl eine Ausnahme. Bei den verlarvten Blumen ist an der Gattung *Antirrhinum* eine gefüllte Blume merkt worden. Die Schmetterlingsblumen sind nur an sehr wenigen Pflanzen gefüllt gefunden, z. B. *Coronilla*, *Anthyllis*, *Clitoria*, *Spartia*

347. Wie gesagt, kommen die gefüllten Blumen bei den mehrblättrigen Blumenkronen am gelichsten vor, aber einblättrige Blumenkronen man auch gefüllt, ob sie gleich ehemals bezwungen; zum Beweise können dienen: *Crocus*, *Hyacinthus*, *Polyanthes*, *Convallaria Pnatum*. (Die Jasminen sind nicht selten gefüllt) Die vielblättrigen Blumenkronen füllen sich durch Blumenblätter, die einblättrigen durch die Einschnitten.

Die gefüllten Blumen sind in ihrem Ansehen zusammengesetzten ähnlich, und können von diesen gern mit diesen verwechselt werden; sie sind sehr leicht dadurch zu unterscheiden: 1) dass in der Mitte einer gefüllten Blume noch Ueberbleibsel des Griffels zu finden sind; 2) dass keine Staubblätter und Griffel an jedem Blatte sich zeigen; 3) dass nach dem Verblühen nichts übrig bleibt, und keine Frucht wahrzunehmen ist, und 4) endlich, kein allgemeiner Fruchtboden sich findet.

348. Die zusammengesetzten Blumen werden auf eine besondere Art gefüllt. Die *geschweiften* (*Flores semiflosculosi*), bekommen, wenn sie gefüllt sind, einen sehr langen Fruchtknoten mit einem noch einmal so langen Federchen. Die zungenförmige Blumenkrone, der Griffel und die Staubblätter sind wie natürlich, die Narbe aber ist gespalten

lang als die Blumenkrone. Dergleichen Missgestalten sieht man bei Scorzonera, Lapsana, und Tragopogon.

Nur durch die angezeigten Verschiedenheiten lassen sie sich von den natürlichen, und dadurch, dass sie keinen reifen Samen tragen, unterscheiden.

349. Die *Strahlenblumen* (Flores radiati), werden auf eine doppelte Art gefüllt, entweder durch die *Scheibe* (Discus), oder den *Strahl* (Radius).

Wenn die Scheibe gefüllt wird, so verdrängt sie ganz den Strahl und die röhrenförmigen Blumenkrone verlängern sich, so dass sie fast keulenförmig gestaltet sind, dabei gehen die Staubgefäße ganz verloren, z. B. Matricaria, Bellis, Tagetes. Auf eben diese Art werden auch die zusammengesetzten Blumen, die natürlich aus blossen röhrenförmigen Blumenkronen bestehen, gefüllt, wie Carduus u. s. w.

Von den natürlichen Blumen, die dasselbe Ansehen haben, unterscheiden sich diese gefüllten durch die verlängerte Blumenkrone und den Mangel des Samens deutlich genug.

Wenn der Strahl gefüllt wird, so verdrängt er ganz die Scheibe, und die gefüllte Blume hat das Ansehen einer geschweiften, sie lässt sich aber beim ersten Anblick durch den Mangel der Staubgefäße sehr leicht erkennen. Von den einfachen gefüllten Blumen unterscheiden sich diese durch das Dasein eines Griffels an jedem Blumenblatte. Wie der Strahl einer Strahlenblume im natürlichen Zustande beschaffen ist, ist er auch bei der gefüllten Blume. Ist der Strahl mit fruchtbaren weiblichen Blumen besetzt, so ist die aus blossen zungenförmigen Blumen bestehende gefüllte auch mit fruchtbaren Griffeln besetzt, und kann

500 VI. Krankheiten der Pflanzen.

leicht, wenn natürliche Pflanzen in der Nähe sind, reifen Samen tragen. Besteht der Strahl aus unfruchtbaren weiblichen Blumen, so hat die gefüllte Blume auch dergleichen.

350. Die *ungestaltete Blume* (*Flos difformis*), ist zwar eine nicht gefüllte, aber doch unfruchtbare Blume, die von der natürlichen in der Gestalt abweicht. Sie kommt gewöhnlich bei den einblättrigen Blumenkronen vor. Es gehören dahin einige lippen- und rachenförmige, z. B. *Ajuga*, *Mimulus* und *Linaria*. Diese verlängern sich, bekommen die Gestalt einer eiförmigen Blumenkrone, die oben verengt und in vier Lappen zerschnitten ist, an der Basis verlängern sich verschiedene Sporen; dergleichen nennt man bei diesen Gewächsen *Peloria*. Die *Linaria vulgaris* wird öfters so bemerkt.

Eine andere Art ungestalteter Blume zeigt sich beim Schneeball (*Viburnum Opulus*). Im natürlichen Zustande hat dieser Strauch kleine glockenförmige Blumen, die am Rande mit unfruchtbaren, grossen, radförmigen eingeschlossen sind. Im Garten auf fettem Boden verwandeln sich alle Blumen in grosse radförmige Blumenkronen, die dreimal grösser als gewöhnlich sind; alle Staubgefässe und Griffel verschwinden.

Eine andere Art ungestalteter Blumen hat man auch, aber äusserst selten bemerkt. An einer Schirmpflanze fand sich unter der Dolde eine zusammengesetzte Blume, wie die des Tausendschönchens (*Bellis perennis*). (Siehe das botanische Magazin Bd. I. T. 2.) Eben solche Blume hat Gessner am Ranunkel gefunden. (Siehe Joh. Gessner Dissert. de Ranunculo bellidifloro, Tiguri 1753. 4.) Son-

Merbar ist es am Stengel eines blühenden Ranunkels und eines Doldengewächses, die Blume des Tausendschönchens zu finden. Anfangs glaubte man, dass beider Stengel zusammengewachsen sein möchte, und daher der Stengel des Tausendschönchens wie eingepfropfter Zweig sich entfaltet habe. Es ist aber diese Blume des Tausendschönchens, nach den neuesten Beobachtungen, weiter nichts als eine unvollkommene Entwicklung mehrerer, Blumen des Ranunkels oder des Doldengewächses, die klein und gelb geblieben sind, und welche eine Menge weisser Blätter einhüllen. Vielleicht dass der Stich eines Insekts diese sonderbare Missgestalt erzeugt.

351. Die *sprossende Blume* (*Flos prolifer*), ist eine in einer Blume enthaltene Blume. Gewöhnlich pflegt dergleichen Missgestalt sich bei gefüllten zu zeigen. Man hat zwei verschiedene Arten derselben, einmal bei den einfachen und zweitens bei den zusammengesetzten Blumen.

Bei einfachen Blumen entsteht aus dem Pistill ein Stengel, der Knospen und Blumen treibt. Mit Blättern ist der Stiel selten besetzt, so wie auch selten mehr als eine Blume aus der andern wächst. Beispiele davon hat man an Nelken, Ranunkeln, Anemonen, Rosen, an Geum rivale und Cardamine pratensisemerkt.

Bei den zusammengesetzten Blumen ist das Auswachsen auf eine andere Art, statt dass aus der Mitte der einfachen Blume eine andere hervorwächst, kommen bei den zusammengesetzten aus dem Fruchtboden mehrere Stiele, die Blumen tragen. Beispiele geben: Scabiosa, Bellis, Calendula, Hieracium.

Au den Schirmpflanzen ist auch etwas Aehnliches

342 VI. Krankheiten der Pflanzen.

bemerkt worden, dass birweilen eine Doldo an andern wächst, oder wie ich einmal am Heri *Splendylis* gesehn habe, dass die vier Fess l Doldo an der Spitze mit grünen Blättern und mit nen Dolden besetzt war.

Sprossende Früchte sind eine grosse Selten sie haben aber niemals vollkommenen Samen. habe dergleichen nur einmal an einer Zitrone ge wo an der Spitze der Zitrone ein Stengel sich mi ner zweiten fand. Ausser der Zitrone zweifle dass es eine sprossende Frucht geben kann.


Bei solchen Früchten aber, wo sich der a meine Fruchtboden vergrössern kann, da sieht öfters etwas sprossendes. So sahe ich am Ler baum (*Pinus Larix*) einen sprossenden Zapfen u mals. Ich habe sogar Zapfen gesehn, die Zw treiben, an welchen wieder einige Zapfen saßen. ähnliche Art entstehn sprossende Aehren in fe Boden bei *Secale cereale*, *Phleum pratense*, *Aloq rus pratensis* u. a. w.

352. Eine merkwürdige Monstrosität des Fr knotens ist das Mutterkorn (*Clavus*), bei dem treide. Das Samenkorn wird ausgedehnt, dr grösser und dicker als gewöhnlich, hat aber k Keim. Es entsteht das Mutterkorn oder der Kor fen bei den Getreide- und Gras-Arten von zu ser Feuchtigkeit, wodurch eine Stockung der z renden Gefässe veranlasst wird. Man untersch zwei Arten:

1, Das gutartige Mutterkorn ist bleich veilchen innerhalb weiss mehlig, ohne Geruch und Geschn und es kann ohne Schaden mit Körnern verm werden.

2) Das *bösartige Mutterkorn* sieht dunkel veilchenblau oder schwärzlich aus, hat innerhalb eine bläulich graue Farbe, einen stinkenden üblen Geruch und scharfen ätzenden Geschmack. Das Mehl davon ist zähe, saugt warmes Wasser langsam ein, hat beim Kneten nichts schleimiges. Das Brod sieht veilchenblau aus. Der Genuss macht Krämpfe und die bekannte Kriebelkrankheit. (? L.)

353. Die *Unfruchtbarkeit* (*Sterilitas*), heisst das Unvermögen, Blüthen und Früchte hervorzubringen. Alle gefüllte, ungestaltete und sprossende Blumen sind unfruchtbar, da bei ihnen die Staubgefässe und Stempel vorzüglich leiden. Es giebt aber auch Fälle, wo die Pflanzen in der Art unfruchtbar sind, dass sie nie Blumen hervorbringen. Eine solche Unfruchtbarkeit entsteht vom Klima, von der Vollsaffigkeit, von unschicklichem Boden, von schlechter Behandlung. Pflanzen, die aus einem warmen Klima in ein kaltes versetzt werden, blühen selten. Man sucht ihnen den erforderlichen Grad der Wärme zu geben, und erreicht häufig seine Absicht, aber nicht immer. Die Zwiebeln vom Vorgebirge der guten Hoffnung wollen wärmer im Winter wie im Sommer stehen und blühen dann gewiss. Oefters sieht man Obstbäume, eben weil sie zu vollaftig sind, und ihre äussere Rinde des Stammes zu hart ist, sich also nur in dünner, jähriger Gefässring ansetzen kann, und die Säfte nach oben zu Zweigen angewendet werden, ohne Blüthen fortwachsen. Die Gärtner suchen durch Einstützen einiger Zweige, Behauen der Wurzel, und Uerpflanzen in einen magern Boden, dem Uebel abzuhelfen, aber öfters schlägt ihre Absicht fehl. Das erste und leichteste Mittel ist das sogenannte Ader-



auch die Fruchtbarkeit der Pflanzen. Pflanzten in fette Gartenerde gesetzt wie Cactus, Mesembrianthemum u. s. w., so wohl darin wachsen, aber nie oder sehr selten. Setzt man sie aber in eine aus Lehm vermischte Erde, so blühen sie leicht, was ganz schicklich behandelt werden.

Die schlechte Behandlung hindert in der Blüthe. *Amaryllis formosissima*, vollständig in einem Topf mit Gartenerde wird, treibt viele Blätter, niemals Blüthe. Nimmt man aber die Zwiebel heraus, im Winter hindurch ohne Erde trocken an einem warmen Ort liegen, so blüht sie alle Jahre. Es sind mehrere im Sande warmer Klimate sende Zwiebeln eben so. Es liessen sich viele Beispiele anführen, die ich aber wegen übergahn muss.

354. Der *Missfall* (*Abortus*), was Pflanzen, die mit weiblichen vollkommenen Organen versehen sind, nicht Früchte tragen rührt her, vom Mangel der männlichen Ze

VL Krankheiten der Pflanzen. 505

Pflanze, hohem Alter derselben, von Vollsichtigkeit, oder endlich, wenn die Blume zu einer ungünstigen Jahreszeit erscheint.

Jeder botanische Garten kann hier Beispiele in Menge liefern. Wie oft muss eine exotische Blume Mangel oder aus fehlerhaftem Bau der männlichen Begattungsorgane unbefruchtet verblühen? Wie könnte bei einigen die Frucht erzeugt werden, wenn die Insekten nicht fehlten, denen die Natur die Geschäfte auftrug? In diesem Fall kann der Gärtner selbst hilfreiche Hand leisten.

Die fehlende Wärme, welche zur Zeitigung mancher fremden Frucht gehört, macht dass sie unvollkommen abfallen muss.

Dürre und schlechter Boden bringen uns auch zuweilen um die gehofften Früchte. Hier kann man durch Giessen dem Uebel zuvorkommen.

Die Larven verschiedener Insekten zerstören viele Früchte, ja selbst vollkommene Insekten zernagen sie.

Winde, andere kränkliche Zufälle, welche die Früchte treffen, hohes Alter rauben uns manche ersehnte Frucht. Hier kann nur wenig geholfen werden, und es kommt auf die Umstände an, wie die Früchte befallen wird.

Aus Vollsichtigkeit wirft mancher Obstbaum alle gesetzten Früchte ab, die Ursache ist dieselbe, als wenn er aus Vollsichtigkeit nicht blüht und durch eben vorgeschlagene Mittel kann er geheilt werden. Bei den meisten Zwiebelgewächsen werfen, eben aus Vollsichtigkeit, ihre Früchte unreif ab. Man muss sie daher, sollen dieselben zur Vollkommenheit gedeihen, zuweilen halten. Einige Zwiebelgewächse reifen dann

506 VI. Krankheiten der Pflanzen.

nur ihren Samen, wenn man die unreifen Frücht dem Stengel abschneidet und so liegen lässt.

Blüht eine Pflanze, welche besonders frisch und Insekten verlangt, in der Mitte des Winter überhaupt zu einer Jahreszeit, wo es bei uns kalt ist, dann pflegt selten eine Frucht zu reifen. Hier lässt sich nun nichts machen, es sei denn man durch irgend eine künstliche Behandlung die Pflanze dahin bringt, dass sie im Frühlinge oder Sommer blüht.

VII. Geschichte der Pflanzen.

355. Unter Geschichte der Pflanzen versteht man den Einfluss des Klimas auf die Vegetation, die Veränderungen, welche die Gewächse wahrscheinlich in den Revolutionen unsers Erdballs erlitten haben, Ausbreitung über die Erde, ihre Wanderungen, endlich, wie die Natur für die Erhaltung derselben gesorgt hat.

356. Die Geographen haben sich auf unserer Erde verschiedene Zonen gedacht, indem sie dieselbe in Breitengrade und Kreise abtheilen. Sie nehmen an, (weil es der Regel so ist. L.) dass unter der Linie oder dem Aequator das heisseste Klima, unter den Wendekreisen ein warmes, zwischen den Wendezirkeln und Polarkreisen zwei verschiedene Klimate, ein gemäßigtes und kaltes, und endlich unter dem Polarkreise ein sehr kaltes herrsche.

Im Ganzen stimmen auch diese Abtheilungen ziemlich mit einander, nur machen hierin Berge, Thäler, Flüsse, Sümpfe, Wälder, Meere und der abwechselnde Boden einen grossen Unterschied, so dass es

506 VII. Geschichte der Pflanzen.

Gegenden giebt, die nach der obigen Eintheilung warm sein sollten, und doch zu den gemässigten oder gar kalten gehören und umgekehrt. Man muss daher das physische und geographische Klima gar wohl von einander unterscheiden. Amerika und Asien sind in gleicher nördlicher geographischer Breite mit unserm Welttheil ungleich kälter. Pflanzen, die in Amerika unter dem 42. Grad nördlicher Breite wachsen, vertragen unser Klima von 52 Graden sehr gut. Die Ursache dieser grossen Verschiedenheit scheint bei Amerika in den ungeheuren Sümpfen und Wäldern, bei Asien in der weit gebirgigern erhabenern Lage der Länder zu liegen. Afrika ist unter den Wendezirkeln ungleich heisser, als Asien und Amerika. Die Gebirgsketten in Asien und Amerika und der feuchte Boden mindern die grosse Hitze, so wie der brennende Sand, aus dem fast ganz Afrika besteht, die Wärme befördert. Die Länder des Nordpols sind viel gemässiger, als die des Südpols. (Der Sommer ist in den letztern weniger warm, aber auch der Winter weniger kalt. L.) Das Feuerland liegt unter dem 55 Grade südlicher Breite, und hat ein viel rauheres Klima, als in Europa unter dem 60. herrscht. Gebirge, die mit ihren Gipfeln über die Wolkenregion weit hinaus sehn, haben in allen Breiten der Erde auf der äussersten Spitze perennirendes Eis. Cook fand einen solchen Berg auf den Sandwichs-Inseln, und in Amerika haben die bekannten Andes unter den Wendezirkeln und dem Aequator ewiges Eis, da doch im Thale ein beständiger Sommer herrscht.

(Ueber die Verschiedenheiten des Klimas s. das für diesen ganzen Abschnitt höchst wichtige Werk: *De distributione geographica plantarum*, von Alex. v. Humboldt. Paris 1817. L.)

357. Boden, Lage, Kälte, Hitze, Dürre und Feuchte, haben auf die ganze Vegetation einen grossen Einfluss. Es darf daher keinen befremden, in jeder Gegend des Erdballs eigene nur für diese Lage bestimmte Gewächse zu finden. Wenn man also die Pflanzen der Polarländer wieder auf den Gipfeln hoher Gebirge bemerkt: so sieht man, dass solche nur für kalte Länder bestimmt sind. Eben so wenig ist es zu verwundern, unter einerlei Breite in Asien, Afrika und Amerika auf ebenen Boden viele (? L.) Gewächse zu finden, die allen dreien Welttheilen eigen sind.

(Welche Pflanzenarten in verschiedenen Welttheilen zugleich vorkommen, hat von Humboldt in dem oben angeführten Werk untersucht. Unter den Kryptophyten finden sich die meisten verschiedenen Welttheilen gemeinschaftliche Pflanzen, weniger, doch noch viele unter Moosen und Farnekräutern, viel weniger unter den Monokotyledonen, und äusserst wenige unter den Dikotyledonen. Es ist hier nämlich nur von ursprünglich wildwachsenden, nicht gebaueten oder dadurch verwilderten die Rede. Je mehr die Pflanzen also entwickelt sind, desto beschränkter ist ihr Vaterland. L.)

In einer geographischen Breite können auf unserm Erdballe, wenn keine Gebirge und andere Umstände die Temperatur verändern, in verschiedenen Welttheilen eben die Pflanzen wachsen, aber Gegenden, die in einer Länge liegen, müssen immer verschiedene Produkte des Gewächsreichs erzeugen. Die Mark Brandenburg, die Küste Labrador und Kamtschatka liegen ziemlich in einer Breite, und haben auch viele Pflanzen mit einander gemein. Berlin, Venedig, Triest und Angola haben fast gleiche Länge, aber die Gewächse sind sehr verschieden.

510 VII. Geschichte der Pflanze

358. Es ist bekannt, dass Wärme ein Erfordernis der Vegetation ist. Daraus ganz natürlich, dass mit der grössern Wärme, auch die Zahl der wildwachsenden Pflanzentricher sein muss. Die Verzeichnisse über verschiedene Gegenden unsers Erden zeigen uns, dass die Vegetation nach dem Wärme vermehrt wird. In Süd-Georgien nach Nachrichten zwei wildwachsende in Spitzbergen 30; in Lappland 534; in Is Schweden 1299; in der Mark Brandenburg Piemontesischen 2800; an der Küste Corou geführ 4000; auf der Insel Jamaika eben so Madagaskar über 5000. Fast überall finden wüchse, nur die mit beständigem Nise bedarländer, die höchsten besetzten Gebirge, die dürrn Sandwüsten Afrika's ausgenom kahlen, nackten, durch vulkanisches Feuer Gegenden, wie z. B. die Insel Ascension und lens-Land, sprossen nur kümmerlich weni chen empor.

(Die Verhältnisse der Vegetation in auf das Klima, können so betrachtet dass man nicht allein die Verhältniss Pflanzenarten, welche in bestimmten vorkommen, mit einander vergleicht, auch dass man die Verhältnisszahlen Klassen und Ordnungen vergleicht. angeführte Werk von Humboldt ist hier sisch und der Verfasser hat eine eigen schaft dadurch, eine Pflanzen - Statistil det. Nach ihm wachsen in Island 350, land 500, in Aegypten 1000, dem al Atlas 1600, in Deutschland mehr als Frankreich, Savoyen, Piemont und Bel Phanerogamen wild. Die Monokotyled

VII. Geschichte der Pflanzen. 511

an zwischen den Wendezirkeln kaum den ersten Theil der Phanerogamen aus, in der gemässigten Zone kaum den vierten, gegen den Polkreis aber den dritten Theil aus. In Deutschland verhalten sich die Monokotyledoneen zur ganzen Anzahl der Phanerogamen, wie 1:4, 5, in Frankreich wie 1:4, 4. In der heissen Zone zwischen den Wendezirkeln verhalten sich die Gräser zur ganzen Zahl der Phanerogamen wie 1:15, die Compositae wie 1:6, die Leguminosae wie 1:2; in der gemässigten Zone die Gräser wie 1:2, die Compositae wie 1:8, die Leguminosae wie 1:18; in der kalten Zone die Gräser wie 1:10, die Compositae wie 1:13, die Leguminosae wie 1:30. Dieses lässt sich für alle natürlichen Zonen fortsetzen. Manche natürliche Ordnungen, Gattungen und Arten sind nur bestimmten Zonen und Gegenden eigen, so finden sich nur einige Palmen ausserhalb der Wendezirkel, keine Musaceae, Scitamineae u. a. m., kein Pinus auf der südlichen Hemisphäre, so wie kein Proteaceae der nördlichen. Die Wärme nimmt bekanntlich ab, je höher man steigt, und dieses hat auf die Vegetation einen grossen Einfluss. Man pflegt die Abhang der Gebirge nach Regionen abzuthellen, welche man zugleich nach der Vegetation benennt. So hat Wahlenberg in der nördl. Schweiz folgende Regionen angegeben: 1) die Ebene; 2) die untere Bergregion oder die Region des Wallnussbaums bis 2500 Fuss; 3) die obere Bergregion oder die Region der Buche, bis 4000 Fuss; 4) die alpinische Region, oder die Region der Tannen nach Schouler der Nadelhölzer bis 5500 Fuss; 5) die untere alpinische Region, nach Schouler die Region der Sträucher (*Rhododendron ferrugineum* [*hirsutum*] bis 7000 Fuss; 6) die obere alpinische oder Schneeregion. Umgekehrt lässt sich auch für jede Pflanzenart, die mittlere Temperatur des Jahres bestimmen, bei welcher sie im Freien ausdauern kann, so wie die Temperatur des kältesten Monats, wodurch sie noch nicht getödtet und die Temperatur des heissesten Monats, welche zum Reifen der Frucht erforderlich ist. Oelbaum verlangt eine mittlere Temperatur des Jahres, von 14°,5 — 19° des hunderttheiligen Thermometers, die mittlere Temperatur des käl-

512 VII. Geschichte der Pflanzen.

testen Monats darf nicht unter 5° , 5 fa
wärmsten nicht unter 22° — 23° sein.
tersuchungen dieser Art haben sich an
Humboldt, auch Wahlenberg, Rob.
Schouer, L. v. Buch beschäftigt. L.)

359. Das Klima hat sowohl auf das Wa
als auf die Gestalt des ganzen Gewächses vi
fluss. Die Pflanzen der Polarländer und der
sind niedrig, mit sehr kleinen gedrunge
und nach Verhältniss grossen Blumen. Die
Europens haben wenig schöne Blumen, und
hen mit Kätzchen; die asiatischen prangen
züglich schönen; die afrikanischen haben
sehr fette saftige Blätter und bunte Blumen.
kanische Pflanzen zeichnen sich durch lan
Blätter und die sonderbare Gestalt der Blu
Früchte aus. Die Gewächse aus Neuhollan
scheiden sich durch schmale trockene Blät
eine mehr zusammengezogene Form. Die
des Archipelagus im mittelländischen Mee
meistentheils strachartig und stachlicht. Di
zen Arabiens haben fast alle einen niedrigen
pelten Wuchs. (?) Auf den kanarischen In
die meisten Pflanzen, sogar Gattungen, die in
Klimaten krautartige sind, Sträucher oder Bäu

Auffallend ist aber die Aehnlichkeit zw
Bäumen und Strüchern des nördlichen A
Amerika, da doch die Kräuter und Stauden
beider Welttheile fast gar nichts in ihrer Gest
einstimmendes haben. Ein vergleichendes V
niss mag dies bestätigen.

VII. Geschichte der Pflanzen. 513

<i>nördlichen Asien</i>	<i>Diesen sind in Nordamerika ähnlich:</i>
<i>cappadocicum</i> . . .	<i>Acer saccharinum,</i>
<i>Pseudoplatanus</i> . . .	— <i>montanum,</i>
<i>lea pontica</i>	<i>Azalea viscosa,</i>
<i>da davurica</i>	<i>Betula populifolia,</i>
<i>is glutinosa</i>	<i>Alnus serrulata,</i>
<i>ulus Columna</i>	<i>Corylus rostrata,</i>
<i>aegus sanguinea</i> Pall.	<i>Crataegus coccinea,</i>
<i>us sanguinea</i>	<i>Cornus alba,</i>
<i>is sylvatica</i>	<i>Fagus latifolia,</i>
<i>anea sativa</i>	<i>Castanea pumila,</i>
<i>perus lycia</i>	<i>Juniperus virginiana,</i>
<i>idambar imberbis</i> . .	<i>Liquidambar styraciflua,</i>
<i>us nigra</i>	<i>Morus rubra,</i>
<i>icera Periclymenum</i>	<i>Lonicera sempervirens,</i>
<i>is sylvestris</i>	<i>Finus inops,</i>
<i>Cembra</i>	— <i>Strobus,</i>
<i>anus orientalis</i> . . .	<i>Platanus occidentalis,</i>
<i>us Laurocerasus</i> . . .	<i>Prunus caroliniana,</i>
<i>dodendrum ponticum</i>	<i>Rhododendrum punctatum,</i>
<i>s Coriaria</i>	<i>Rhus typhinum,</i>
<i>is nigrum</i>	<i>Ribes floridum,</i>
<i>us Idaeus</i>	<i>Rubus occidentalis,</i>
<i>bucus nigra</i>	<i>Sambucus canadensis,</i>
<i>rax officinalis</i>	<i>Styrax laevigata,</i>
<i>ja orientalis</i>	<i>Thuja occidentalis,</i>
<i>a europaea</i>	<i>Tilia americana,</i>
<i>us pumila</i>	<i>Ulmus americana,</i>
<i>urnum orientale</i> . . .	<i>Viburnum acerifolium,</i>

n. d. m.

wischen den strauchartigen Pflanzen des Vorge-
snow's Grundriss. I Th.

birgt der guten Hoffnung und Neuholands herrscht ebenfalls eine grosse Aehnlichkeit. Sollte wohl gleiche Uebereinstimmung in Rücksicht des Bodens oder der Lage der Länder, bei der Entstehung der organischen Körper, die Aehnlichkeit welche wir hier finden, erzeugt haben?

Im kalten Klima finden sich mehrere Cryptogamen, besonders Pilze, (? L.) Flechten und Moose, Tetradynamisten, Doldengewächse, Syngenesisten, und überhaupt wenige Bäume und Sträucher.

Im warmen Klima finden sich mehrere Bäume und Sträucher, viele Farrnkräuter, Schlingstauden, Schmarotzerpflanzen, saftige Pflanzen, lilienartige Gewächse, Bananengewächse, Palmen. (S. den Zusatz zu §. 358. L.) Kräuter und Sommergewächse vegetiren nur zur Regenzeit. Gefiederte und gerippte Blätter sind am häufigsten in warmen Himmelsstrichen.

Die Wasserpflanzen haben, so lange sie unter Wasser stehn, feine fadenförmige zertheilte Blätter; kommen sie aber mit ihren Blättern an die Fläche des Wassers, so werden sie breit, mehr rund und an der Basis bald mehr, bald weniger ausgeschnitten.

Pflanzen die auf Hügeln stehn, verhalten sich, in der Gestalt ihrer Blätter, gerade umgekehrt, wenn wir sie mit den Wasserpflanzen vergleichen. Ihre Wurzelblätter sind mehr oder weniger ganz, die Stengelblätter werden aber, je höher sie stehn, immer feiner getheilt. Als Beispiel lässt sich *Scabiosa C. lumbaria*, *Valeriana* u. s. w. anführen.

360. Pflanzen in ihrem wilden Zustande pflegen sich immer gleich zu bleiben, sie ändern zwar zuweilen ab, indess sind doch die Abänderungen nicht so häufig, als wenn sie der Kultur unterworfen wer-

VII. Geschichte der Pflanzen. 515

Es ist sonderbar, dass Thiere und Pflanzen, sobald sie sich im zahmen Zustande befinden, in ihrer Gestalt, Farbe und Geschmack abändern. Alpen- oder Bergpflanzen werden im Thale oder Garten ungleich kleiner, ihre Blätter gewinnen an Länge und Breite, oder ihre Blumen sind kleiner, oder vergrössern sich. Gewächse wärmerer Himmelsstriche verändern so sehr ihr Ansehn, dass ungeübte Botaniker, schwerlich in ihrem natürlichen Vaterlande wieder erkennen. Zahllos ist die Menge der Spielarten unserer Obstbäume und Küchenkräuter.

361. Woher kommt aber die grosse Anzahl verschiedener Gewächse, die unser Erdball erzeugt? Woher diese alle bei der Entstehung desselben vorhanden, oder sind späterhin durch Vermischung verschiedener Gewächse neue Arten entstanden? Schwerlich möchte diese Frage wohl befriedigend beantworten lassen. Linné und einige andere Botaniker nahmen an, dass die Natur nur Anfangs Gattungen gehabt habe, aus deren Vermischungen wären später die Arten entstanden, die dann wieder neue Arten unter sich erzeugt hätten. Es scheint aber nicht, als wenn diese Hypothese jemals statt gefunden hätte. Es müssten doch in unsern Tagen, durch die Vermischungen verschiedener Gattungen dieselben neuen Arten entstehen, und wir würden gewiss schon darüber viele Erfahrungen aufgezeichnet finden. Wenn es jener unermesslichen Kraft, die alles zum Dasein rief, möglich war Gattungen zu bilden, warum sollte sie nicht Arten auch zum Sein gerufen haben? Wir finden zu viel Harmonie, zu viel Uebereinstimmung in der Natur, und sehen, dass alles wie ein Räderwerk genau ineinander greift, dass uns kein Zweifel übrig bleibt,

516 VII. Geschichte der Pflanzen.

der weise Urheber des Ganzen, habe grösstentheils Anfangs alle organische Körper, in der Gestalt, wie wir sie jetzt finden, hervorgebracht. Verschiedene Gattungen von Gewächsen, die in einem Lande zahlreiche Arten haben, lassen vermuthen, dass leicht eine oder andere durch Vermischung entstanden ist. Wir finden zum Beispiel am Vorgebirge der Hoffnung von der Gattung *Erica* beinahe 50, von *Ixia* und *Gladiolus* darüber, von *Protea* über 70 und darüber, von *Sembrianthemum* an 150 Arten, mehrerer Gattungen, die dort zahlreich an Arten sind, nicht zu gedenken. Die grosse Aehnlichkeit verschiedener derselben Gattung, man Mühe hat bestimmte Charaktere aufzufinden, scheint diese Vermuthung zu bestätigen.

Dass fruchtbare Bastarde im Pflanzenreich selten sind (§. 302.), ist schon gesagt worden. In unsern Gärten entstehen zuweilen dergleichen Bastarde, man kann also die Möglichkeit, dass sie sich von Freien sich erzeugen können, nicht läugnen. Die Natur hat aber weisslich dafür gesorgt, dass in der Natur Zustände so leicht keine Vermischung stattfinden kann. Pflanzen die sich ähnlich sind, finden sich in entfernten Weltgegenden, zu ganz verschiedenen Zeiten in der Blüthe, und an unterschiedenen Orten. Aehnliche Pflanzen können sich nur von Bastarden zeugen, aus diesem Grunde fallen nicht viele Arten derselben Gattung in einem Klima wachsen, die Vermischungen ganz wie ein Beispiel zur Erläuterung dieses Satzes: Wie hier drei Arten *Scrophularien* wild wachsen, *Scrophularia verna*, *nodosa* und *aquatica*. Die erste Art steht um die Dörfer in Hecken, sie blüht

Stichjahr. Die zweite steht auf feuchten Triften, an
 üben, und blüht einen Monat später. Die dritte
 wächst in Flüssen, Bächen, Sümpfen und Teichen und
 blüht um mehr als einen Monat später, als die vorige.
 Andere Arten dieser Gattung, die mit diesen Aehnlich-
 keit haben, wachsen in Italien, Sibirien, im Orient,
 Nordamerika u. s. w. Bei allen diesen kann keine
 Bastarderzeugung im natürlichen Zustande vor sich
 gehen. Setzen wir aber in einem botanischen Garten
 die wilde und ausländische Arten dieser Gattung auf
 den Fleck beisammen, so ist es wohl kein Wunder,
 wenn der verschiedene, mancher Art nicht angemes-
 sene Boden, früher oder später, die Blumen erschei-
 nen lässt, und wenn das thätige Insektenheer von ei-
 ner Art zur andern fliegt und wider Willen uns Ba-
 starde bringt, die nie im Freien entstanden wären.
 Man wird in der Folge eine Menge Pflanzen kennen
 lernen, die nirgends ursprünglich wild wachsen, und
 deren Entstehung nur botanischen Gärten zu dan-
 ken haben.

Unsere zahlreichen Spielarten des Obsts, verdan-
 ken wir gewiss zum Theil Bastardmischungen, und
 vielleicht sind einige für besondere Racen gehaltene
 Sorten nur dergleichen Abkömmlinge. Mir ist es
 aber nicht unwahrscheinlich, dass *Pyrus dioica*,
Malva und *prunifolia*, durch solche Vermischungen,
 ihre Existenz erhalten haben.

362. Wenn es aber auch zweifelhaft bleiben
 könnte, ob einige Gewächse durch Vermischung ver-
 schiedener Arten entstanden sind, so lässt sich doch
 vielleicht wohl aus den Beobachtungen die bis jetzt
 gesammelt sind, ein fester Schluss fassen, wie es
 oftmals auf unserm Planeten gewesen sei, und ob

Dieses alles spricht gar deutlich von unserm Erdball betroffen haben. Wasamen Catastrophen sich ereignet, getroffen sind? Dieses alles wird unbleiben, da es an Beweisen fehlt, e Frage zu beantworten.

Indessen sind die Naturforscher gewesen. Sie haben sorgfältig diese ehmäler der Vergangenheit gesammelt und gegenwärtig auf unserer Erde von nischen Körpern verglichen. Anfa dieselben wieder zu finden und konn erklären, wie es möglich gewesen mals Elephanten, Rhinoceros und in unserm Himmelsstrich und in dem haben leben und gedeihen können, und zahlreiche Farrnkräuter unser nöl and bewohnen konnten. Sie suchten pothesen dieses zu erklären, aber selben wurden gar bald durch ne Versteinerungen widerlegt, und ander nig Wahrscheinlichkeit für sich, das bekannte Gesetze der Natur anstiesse

VII. Geschichte der Pflanzen. 519

gegenwärtig nicht mehr auf unserm Planeten lebend anzutreffen sind.

Cuvier hat eine grosse Menge von Säugthierchädeln gefunden, die unser Erdball nicht mehr hat. Die Conchiologen lehren uns, dass jetzo die versteirten Muscheln nicht mehr lebend anzutreffen sind, und die schönen Farrnkräuter im Schiefer, die Stämme, welche in Steinkohle oder versteinertes Holz, selbst in kalten Zonen, wo jetzt kein Baum vorzukommen mehr wachsen kann, verwandelt sind, haben wir nicht mehr als lebende sich fortpflanzende Gewächse.

Die berühmtesten Naturforscher, als *Blumenbach*, *Goethe*, *Lichtenberg*, *Cuvier* u. a. ziehn daraus den wahrscheinlichsten Schluss, dass wenigstens die Schöpfung verloren gegangen sei, und dass die gegenwärtige organische Welt neuerer Entstehung ist.

Sie überlassen es dem Physiker und Astronomen dieses grosse Phänomen zu erklären, glauben aber, dass vielleicht der leuchtende Nimbus der Sonne, dessen wohlthätigem Einfluss wir alles verdanken, sich in grossen Intervallen vermindern und vermehren, ja gänzlich nach periodisch eintretenden Gesetzen, verschwinden könne, und dass alsdann erst bei dem rückkehrenden Glauze der Sonne auf den Trümmern der zerstörten Schöpfung, bei der Gährung der Elemente, eine neue anderer Art entstehe. Das periodisch ab- und zunehmende Licht einiger Fixsterne, so wie das Verschwinden einiger vormals sehr stark glänzenden, scheint dafür zu sprechen.

Es mögen aber die Ueberbleibsel der Vergangenheit von Thieren und Pflanzen auf diese oder eine andere Art bis auf unsere Zeiten erhalten sein, so

520 VII. Geschichte der Pflanzen.

bleibt doch so viel gewiss, dass alle Gattungen, nicht mehr zu finden sind, und dass unsere Zeitrechnung nicht hinreicht, den Termin anzugeben, wozu sich diese oder andere Veränderungen angeschlossen haben.

(In neueren Zeiten haben sich der Graf v. Stern von Schlotheim, Jäger und Ad. Brongniart den versteinerten Pflanzen vorzüglich beschäftigt. Es geht daraus das Resultat hervor, dass Ueberbleibsel von Farrnkräutern am häufigsten vorkommen, dass in den ältern Lagern Ueberbleibsel dieser und den Monokotyledonen allein zu finden sind, dass Ueberbleibsel von Dikotyledonen in den jüngsten Lagern erscheinen. Ueberall gilt das, was der V. schon anzeigt, dass alle diese Ueberbleibsel sehr selten auf noch lebende Arten zurückzuführen sind, L.)

363. In Rücksicht der gegenwärtig auf der

Erde anzutreffenden Gewächse, lehrt die Erfahrung, dass gebirgigte Gegenden reicher an Vegetabilien Ebenen sind, und dass da, wo hohe und unranliche Gebirge sind, die Zahl der Pflanzen beträchtlich ausfällt, als in niedrigen Flötzgebirgen. Land mit hohen und uranfänglichen Gebirgen hat gewöhnliche Pflanzen, die dem, von solchen Gebirgen entblösten, mangeln. Wir finden auf allen Höhen in einer Breite, sie mögen auch noch so ausgedehnt sein, immer dieselben Gewächse, nur dem Unterschiede, dass der verschiedene Bodenniveau Abwechselung macht. Im uranfänglichen Gebirge und am Fusse desselben, treffen wir alle Pflanzen der Ebene wieder. Wir finden, wo hohe Gebirge von uranfänglichem Gestein die Ebene begrenzen, dass alle Pflanzen der Ebene an ihrem Fusse auf ihnen selbst angetroffen werden. Ueberst

VII. Geschichte der Pflanzen. 521

ir die Gebirge, und kommen auf eine neue Ebene, zeigt sich eine andere Vegetation, die man wieder in Fusse der folgenden Gebirgskette antrifft. Aus den Verzeichnissen der Pflanzen verschiedener Länder tropens und fremder Welttheile lässt sich dieses deutlich beweisen. Wer kann hier wohl noch zweifeln; dass die Pflanzen aller Ebenen, vom hohen Gebirge dahin gekommen sind, und dass die uranfänglichen Gebirge unsers Erdballs, die Hauptquellen der Gärten verschiedener Länder ausmachen? Eben daher hat Amerika einen so grossen Reichthum von Gewächsen, weil vom Nord- bis zum Südpol hohe Gebirgsketten mit zahlreichen Nebenarmen es durchschneiden. Daher nährt Canada andere Pflanzen als Pensylvanien, dieses andere als Virginien, dieses wieder andere als Carolina, Carolina andere als Florida u. s. w. Daher hat die Nordwest-Küste von Amerika wieder andere Pflanzen als die Nordost-Küste, die Südwest-Küste desselben Welttheils andere als die Südost-Küste. Inseln die eben sind, haben alle Pflanzen des nahe gelegenen Continents, sind sie aber mit hohen Gebirgen versehen, so mangelt es ihnen nicht an Pflanzen, die man nur auf ihnen antrifft.

Also wäre nach diesen Erfahrungen mit den jetzo anzutreffenden Vegetabilien keine grosse Veränderung vorgegangen, und es verliert jede Hypothese, welche uns die in der Erde vorgefundenen Ueberbleibsel des Urweltgewächse Reichs, unter den gegenwärtigen Verhältnissen des Ganzen, als noch existirende Gewächse anzuzeigen will, an Wahrscheinlichkeit.

364. Sollte nicht vielleicht auf unserm Erdball ehemals das Meer eine grössere Ausbreitung als jetzo

das feste Land, was nach und nach vo
pflanzen und den in den Thälern derse
Gewächsen besäet wurde. Hie und da
grosse Seen mit gesalzenem Wasser st
mäßig verdunstete und das feste St
Dieses Lager von Salz wurde mit Er
Beschaffenheit der Umstände mit in
sich verwandelnden Schlamm durch d
gen oder den Sturmwind bedeckt. (Die
sind älter als viele Gebirge. L) D
Meeres nährt, wie bekannt, seine ei
Gewächse, die nur salzigen Boden lieh
chem, der nicht salzig ist, vergehn. I
schaft solcher Salzlager fanden aber d
zen noch hinlängliche Nahrung und ve
Unterirdische Quellen süssen Wassers
solche Salzlager fort, lösten etwas da
kamen als Salzquellen zum Vorschein.
pflanzen fanden hier ihre Nahrung und
fort. Dieses scheint die Entstehungsart
len zu sein, und erklärt uns vielleicht,
ren Nachbarschaft die Pflanzen des M

VII. Geschichte der Pflanzen. 523

lago maritima, *subulata*, *Glaux maritima*, *Samolus Valerandi*, *Aster Tripolium*, *acris* u. d. m.

365. Wenn auf solche Art, vielleicht nach einer längern Reihe von Jahren, als wir glauben, sich allnählig Land gebildet hatte, so konnten Orkane, Erdbeben, Vulkane, wieder aufs neue ganze Strecken zerstören, und die Form der Länder ändern, wodurch öfters eine grosse Menge von Gewächsen zerstört werden musste, die nachher sich nicht wieder durch die veränderten Umstände weiter zu verbreiten vermochten. Die meisten Gewächse finden wir in ihrem Vaterlande in Menge wild wachsend, aber einige wenige, welche das oben Gesagte zu bestätigen scheinen, hat man nur an einzelnen Stellen unsers Erdballs gesehen. Zum Beweise mögen folgende dienen: *Thunberg* fand auf dem Tafelberge am Vorgebirge der guten Hoffnung nur auf einem einzigen Fleck die *Disa anglicornis* und *Cymbidium tabulare*, und hat sie nachher nirgends weiter angetroffen. *Tournefort* sah auf einem einzigen Felsen der kleinen Insel Amorgos, in Archipelag des mittelländischen Meeres, nur das *Riganum Tournefortii*. *Sibthorp*, der nach ihm dieselbe Reise machte, traf die Pflanze nirgend weiter als am genannten Orte an.

Länder, die jetzo durch Ozeane getrennt sind, können vorzeiten Zusammenhang gehabt haben, wenigstens lassen die gemeinschaftlichen Produkte es annehmen. Auf diese Art kann der nördliche Theil von Amerika mit Europa, Neuhollland mit dem Vorgebirge der guten Hoffnung in Verbindung gewesen sein; eben so die Insel Norfolk mit Neuseeland u. s. w. denn Nordamerika hat verschiedene kleinere europäi-

524 VII. Geschichte der Pflanzen.

sche Pflanzen und in Neu-holland finden sich einige Gewächse des Vorgebirges der guten Hoffnung: so wie Neuseeland, was eine, von dem nahegelegenen festen Lande Neu-hollands, ganz verschiedene Vegetation hat, die meisten Pflanzen hat, die man auf der Insel Norfolk antrifft, namentlich wächst der neuseeländische Flachs (*Phormium tenax*), auf beiden. Aehnliche Vermuthungen liessen sich mehrere, wenn der Raum erlaubte, hier aufstellen,

(Der Verfasser hat sich hier und im Folgenden mehr an Hypothesen gehalten, als die Sache im Einzelnen untersucht. Ich habe in der Anmerkung zu §. 374. einige Andeutungen gemacht, wie dieser Gegenstand mit Gründlichkeit zu behandeln wäre. L.)

366. Ausser der hier bemerkten Art, wie wahrscheinlich die Verbreitung der Gewächse über die Erde vor sich gegangen ist, haben noch viele Dinge gewirkt, einzelne Pflanzen weiter zu verbreiten, als es wohl sonst geschehn sein möchte. Verschiedene Samen haben Widerhaken, kleben an das Fell der Thiere und werden von diesen weiter ausgestreut. Die Vögel gehn den verschiedenen Gesämen nach und schleppen diese oft Meilen weit. An dem Gefieder der Wasservögel kleben die Samen verschiedener Wassergewächse an, und spülen sich von demselben, wenn sie in andern Gewässern sich aufhalten, wieder ab.

Der Same der meisten Gewächse sinkt, wenn er seine vollkommene Reife erlangt hat, im Wasser zu Boden. Ist er in einer harten Schale eingeschlossen, so erhält er sich lange Zeit frisch. Einige Fuss tief in der Erde und auf dem Grunde des Meeres bleibt

VII. Geschichte der Pflanzen. 525

jeder Same lange zum Aufgehn geschickt. Es kann in solche Tiefe keine Luft kommen, und ohne diese wird er nicht zerstört.

Daher kommt es, dass Flüsse und Meere Pflanzen aus weit entlegenen Gegenden führen können. An den Ufern von Norwegen werden gewöhnlich reife, noch ganz frische Samen aus Westindien ausgeworfen. (Der sogenannte Gulfstrom ist die Hauptursache dieser Erscheinung. L.) Wäre ein für diese Gewächse taugliches Klima daselbst, so würden bald Cocosnüsse und andere Gewächse heisser Zonen keimen und zur Vollkommenheit gedeihen. Der Same der Else wird durch unsere Flüsse weit umher getrieben. Viele deutsche Pflanzen werden am schwedischen Meeresstrande, verschiedene spanische und französische an den Ufern von Grossbritannien, viele afrikanische und asiatische an Italiens Gestaden bemerkt.

Der Wind treibt die Samen, welche mit einem Federchen, mit Flügeln, oder häutigen Rändern versehen sind, so wie die aufgeblasenen Samenkapseln weit umher, dass sie an entlegenen Oertern keimen können. Deshalb haben sich einige Gewächse, die leichte Samen tragen, nach den gewöhnlichen Strichen, die der Wind nimmt, verbreitet, und sind weiter fortgepflanzt, als es wohl sonst geschehen möchte. Den geflügelten Samen der Birke (*Betula alba*) jagt der Wind bis auf die Gipfel der Thürme und hoher Felsen, wo er auch öfter keimt. Die Birke ist eben wegen ihres leichten Samens auch durch das nördliche Asien verbreitet, wohin ihr der schwerfällige Same der Eiche (*Quercus Robur*) nicht folgen konnte.

Verschiedene Samenkapseln und Früchte springen mit einer Elasticität auf und treiben den Samen weit

526 VII. Geschichte der Pflanzen.

umher, dahingegen wieder andere Früchte nur in der Nähe ihres Geburtsorts bleiben können, wie besonders solche, die unter der Erde reifen. Das Pistill einiger Gewächse dringt nach dem Blühen in die Erde und wird dasselbst zur Vollkommenheit gebracht. Beispiele der Art geben: *Arachis hypogaea*, *Glycine subterranea*, *Trifolium subterraneum*, *Lathyrus amphicarpea*, *Vicia subterranea*, *Cyclamen*. (Nicht der Pistill dringt in die Erde, sondern Aeste und Blumenstiele. L.) Die Beeren und alle fleischige Früchte können sich auch nicht selbst verbreiten, sie fallen an die Erde und ihre saftige Hülle giebt den jungen Pflanzen Nahrung. Verschiedene Vögel und andere Thiere nähren sich aber von denselben, schleppen sie weit fort und verzehren den fleischigen Theil, lassen aber den Samen fallen, oder der Same geht unverdaut durch ihren Darmkanal und wird so ausgestreut. Auf diese Art wird *Viscum album* von einem Vogel (*Turdus viscivorus*) und eben so *Juniperus communis* u. s. vermehrt.

Mehr aber noch, als Wind, Wetter, Meere, Flüsse und Thiere, die Ausbreitung der Gewächse befördern, thut dies der Mensch. Er, dem die ganze Natur zu Gebote steht, der Wüsteneien in prächtige Gegenden verwandelt, ganze Länder verwüstet und wieder aus ihrem vorigen Nichts hervorruft, hat durch mancherlei Umstände die Ausbreitung vieler Pflanzen begünstigt.

Die Kriege, welche verschiedene Nationen mit einander geführt haben; die Völkerwanderungen; die Ritterzüge nach Palästina; die Reisen verschiedener Kaufleute; der Handel selbst, haben eine grosse Menge von Gewächsen zu uns gebracht, so wie sie unsere

VII. Geschichte der Pflanzen. 527

Pflanzen in andere Gegenden verbreitet haben. Fast alle unsere Gartengewächse stammen aus Italien und dem Orient, so wie auch die meisten Getreidearten denselben Weg zu uns genommen haben. Durch die Entdeckung von Amerika haben wir auch verschiedene Pflanzen erhalten, die vormals gar nicht bekannt waren, jetzt aber allgemein ausgebreitet sind.

Der Stechapfel (*Datura Stramonium*), der jetzt fast durch ganz Europa, das kältere Schweden, Lapp- und Russland ausgenommen, als ein schädliches Kraut bekannt ist, wurde aus Ostindien zu uns gebracht, und durch die Zigeuner so allgemein verbreitet, die den Samen dieses Gewächses als Brech- und Wurm- mittel überall mit sich führten.

Die Schminkebohne (*Phaseolus vulgaris*), die Brechbohne (*Phaseolus nanus*), die Balsamine (*Impatiens balsamina*) und die Hirse (*Panicum miliaceum*) sind aus Ostindien zu uns gekommen.

Der Buchweizen (*Polygonum Fagopyrum*), die meisten Getreidearten und Erbsen haben wir über Asien aus dem Orient erhalten.

Äpfel, Birnen, Pflaumen, süsse Kirschen (*Prunus avium*), Mispeln (*Mespilus germanica*), Elsbeere (*Pyrus torminalis*), und Haselnüsse, sind ursprünglich deutsche Pflanzen. In wärmeren Gegenden aber findet man sie weit schmackhafter. Die verschiedenen Abarten derselben, nebst den übrigen Obstsorten, haben wir auch aus Italien, Griechenland und der Levante bekommen.

Die Rosskastanie (*Aesculus Hippocastanum*), kam durch des *Clusius* Veranstaltungen im Jahre 1550 aus dem nördlichen Asien zuerst nach Europa. Die Kai-

528 VII. Geschichte der Pflanzen.

seckrose (*Fritillaria imperialis*) erhielten wir 1570 zuerst aus Konstantinopel.

Nach der Entdeckung von Amerika wurden viele Pflanzen von dorthier in unserm Himmelsstriche einheimisch gemacht. Die Kartoffel wurde zuerst 1590 von *Kaspar Bauhin* beschrieben, und *Walter Raleigh* theilte im Jahre 1623 die ersten aus Virginien mitgebrachten in Irland aus, von wo sie über ganz Europa verbreitet sind.

Die **Nachtkerze** (*Oenothera biennis*) führten wegen ihrer essbaren Wurzel 1674 die Franzosen ein. Seit der Zeit ist sie so gemein geworden, dass sie fast durch ganz Europa wildwachsend an Hecken, Zäunen und um die Dörfer gefunden wird.

Den **Taback** (*Nicotiana Tabacum*) beschrieb 1584 *Conrad Gesner* zuerst. Im Jahre 1560 wurde er nach Spanien, und 1564 von *Nicol.* einem französischen Gesandten, nach Frankreich gebracht.

Die **Kohl-** und übrigen **Gemüsekrauter** brachten die Griechen nach Rom, wo sie sich durch ganz Italien verbreiteten, und endlich zu uns gekommen sind. Es würde zu weitläufig sein, die Wanderung aller jetzt kultivirten Pflanzen zu bestimmen. Es mag hinreichend sein, nur einige derselben angezeigt zu haben.

Mit den Getreidearten wurden auch viele Pflanzen zu uns gebracht, die jetzt als einheimisch angesehen werden. Solche sind die Kornblume (*Centaurea Cyrenus*), die Rahde (*Agrostemina Githago*), der Hederich (*Raphanus Raphanistrum*), Leindotter (*Myagrum sativum*) u. m. a. Diese Gewächse zeigen sich nur allein zwischen dem Getreide, und kommen niemals an wüste liegenden Ländereien, wo kein Acker gewesen ist, zum Vorschein. Auf eben diese Art sind durch

VII. Geschichte der Pflanzen. 529

den Anbau des Reisses (*Oryza sativa*) in Italien viele Pflanzen aus Ostindien einheimisch geworden, die sich nur zwischen dem Reiss zeigen. Der Reiss wird erst seit 1696 in Italien gebaut.

Die Europäer haben bei ihren Anpflanzungen in fremden Welttheilen alle unsere Küchenkräuter mit sich genommen. Durch diese sind viele europäische Pflanzen nach Asien, Afrika und Amerika gekommen, und haben sich, wenn es das Klima zuließ, weiter verbreitet.

367. Die Natur ist stets geschäftig eine Pflanze zum Vortheil der andern zu benutzen, auch sorgt sie auf die mannigfaltigste Weise für ihre Ausbreitung. Ihre Absicht zu erreichen sind in kälteren Gegenden die Flechten und Moose bestimmt, in wärmeren nutzt sie die Regenzeit, Stürme und dergleichen Veränderungen des Dunstkreises. In unserm Klima, sind ausser den Flechten und Moosen gewöhnlich drei Hauptstürme, die das Verbreiten der Gewächse befördern, nemlich im Frühjahr, in der Mitte des Sommers und im Herbst. Ausser dem Nutzen, die Atmosphäre zu reinigen, haben sie für das Gewächsreich noch einen besondern. Im Frühjahr treiben sie die Samen, welche an den Stengeln der Pflanzen den Winter über hängen blieben, in der Mitte des Sommers den eben reif gewordenen der Frühlingspflanzen, und im Herbst denjenigen, der im Sommer und am Ende desselben seine Vollkommenheit erreicht hat, weit umher. Maulwürfe, Reitwürmer und Regenwürmer haben den Boden aufgelockert und zur

530 VII. Geschichte der Pflanzen.

Aufnahme derselben bequem gemacht, die nämlich Regen schlägt sie in die Erde ein, und durch die wohlthätigen Strahlen der Sonne können sie zu bestimmten Zeitpunkte keimen. Wie leicht durch diesen Weg Samen an Oerter gebracht werden können, die zur Aufnahme derselben gar nicht geschickt sind, und viele ganz verloren gehen, ist leicht einzusehen, deshalb scheint der weise Urheber der Natur den Sommergewächsen eine verhältnissmässig grössere Menge von Samen gegeben zu haben, als eigentlich nöthig wäre. So trägt z. B. eine Pflanze des Getreidischen Korns (*Zea Mays*) 3000, der Sonnenblume (*Helianthus annuus*) 4000, des Mohns (*Papaver somniferum*) 32000, des Tabacks (*Nicotiana Tabacum*) 4000 Samen. Von einer so grossen Menge müssen doch nur wenige auf den ihnen nöthigen Boden gerathen, und von Art weiter fortpflanzen.


Nackte Felsenwände, auf denen nichts wachsen kann, werden durch die Winde mit dem Samen der Flechten bedeckt, der im Herbst und Frühjahr, wenn er zur Reife gedeiht, durch die, zu der Zeit gewöhnlichen Staubregen, zum Keimen gebracht wird. Er wächst aus und bekleidet mit seinem farbigen Laub den Stein. Mit der Zeit treiben Wind und Wetter den feinen Staub in die rauhen Zwischenräume, auch setzen die vergangenen Flechten selbst eine dünne Rinde. Auf dieser karglich ausgestreuten Erde können schon die durch Zufall dahin getriebenen Samen der Moose keimen. Sie dehnen sich aus und machen eine angenehme grüne Schicht, die schon zur Aufnahme kleinerer Gewächse geschickt ist. Durch das Vermöden der Moose und kleineren Pflanzen entsteht allmählig

VII. Geschichte der Pflanzen. 531

ine dünne Erdschicht, die sich mit den Jahren vermehrt, und zuletzt zum Wachsthum verschiedener Kräuter und Bäume bequem wird, bis endlich nach einer langen Reihe von Jahren, da, wo ehemals nackter Felsen war, ganze Wälder mit den prächtigsten Bäumen besetzt, das Auge des Wanderers ergötzen. So verfährt die Natur! Allmählig, gross, bleibend, und für das Ganze wohlthätig sind ihre Wirkungen. Die Moose und Flechten verbessern auf ähnliche Weise den unfruchtbaren dünnen Sand. Die eigenthümlichen Gewächse dieses Bodens sind fast alle mit kriechenden sich weit ausbreitenden Wurzeln versehen, oder sie sind saftig, und ziehn bloss aus der Luft Feuchtigkeit an. Durch solche Gewächse wird der Boden zur Aufnahme der Flechten und Moose geschikt gemacht, um dadurch endlich in gute tragbare Erde verwandelt zu werden.

Die Moose überziehen die Stämme und Wurzeln der Bäume; sie haben die sonderbare Eigenschaft, dass sie bei warmen Wetter vertrocknen, und durch Nässe wieder aufleben. Alle Feuchtigkeit ziehn sie egerig an sich, und halten sie in ihren Zwischenräumen fest. Aus dem Baume nehmen sie keine Nahrung, diese giebt ihnen allein nur die Luft. Im Winter schützen sie den Baum vor der Kälte, bei heuchtem Wetter vor Fäulniss, und bei eintretender Hitze geben sie ihm ihre Feuchtigkeit, und schützen den Stamm und die Wurzeln gegen die sengenden Strahlen der Sonne.

Die Moose und Flechten sind nur den jungen Bäumen, deren Stämme noch in der Rinde sehr thätig sind, nachtheilig, auch können die Moose, wenn sie sehr lang werden, mithin eine grosse Quanti-



vorzüglich an feuchten sumpfigen Oertern Torfmoos (*Sphagnum palustre*). Stehe und Seen werden von ihnen ganz üh durch die an solchen Oertern wachsend sen zuletzt in Wiesen, und mit der 2 und Aecker verwandelt. Nach *Tacitus* vormals der ganze hercynische Wald ein zeigen sich auf den von ihm beschrieb fruchtbare Wiesen und Aecker. Alte unserer Gegend können sich vieler Oe wo ehemals stehende Wasser waren, di bare Aecker und fette Wiesen verwan

Die Eigenschaft der Moose, viele I an sich zu ziehen, macht, dass sie an f am häufigsten wachsen. Die Berggipfel ner zahlreichen Menge von Moosen bede Feuchtigkeit der Wolken begierig an sic Menge von Wolken, welche die Spitz nach sich ziehen und in die sie beständ werden, macht, dass sie nicht alles V können, sondern unter sich in Klüften und ansammeln, wo es von allen Seiten der

VII. Geschichte der Pflanzen. 533

endlich zu einem ansehnlichen Strom an. Wir danken also fast ganz allein (? L.) den so unbedeutend scheinenden Moosen die mächtigsten Flüsse, sind ihnen ferner die Austrocknung grosser Sümpfe und Urmarmachung des unfruchtbarsten Bodens schuldig.

368. Die Erhaltung jedes einzelnen Gewächses, wie die Benutzung jedes vergehenden vegetabilischen und animalischen Theiles, ist die Absicht der Natur. Der kleinste Raum ist zum Aufenthalt irgend eines Thieres oder Gewächses bestimmt. Der fetteste und der magere Boden, der dürre Sand, der nackte Felsen, die höchste Alpe, der tiefste Morast, der Grund der Flüsse, Seen und des Oceans, ja sogar die tiefsten Höhlen unter der Erde, wie die Bergwerke, haben ihre eigenthümlichen Gewächse. Modernde Thiere werden von Schimmelarten und kleinen Pilzen besetzt, die ihre Auflösung noch mehr befördern, und sie in Erde umwandeln, um andern Pflanzen Dünger und Nahrung zu ertheilen. Eben so haben die Bäume, die Stengel, das Holz und andere Theile der Vegetabilien eine unzählige Menge von kleinen Pilzen und Schimmelarten, die ihre Zerstörung befördern müssen. Was offenbar Verheerung und Tod anzukündigen scheint, ist der Schauplatz einer neuen Welt im Werden. Alles, was geschaffen ist, zweckt zum Nutzen des Ganzen ab.

369. Die Pflanzen des süssigen Wassers haben eine stärkere Ausbreitung als die des festen Landes. Das Wasser mildert die Kälte und Hitze des Klimas,

534 VII. Geschichte der Pflanzen.

daher viele europäische Wasserpflanzen auch in unsern Klüften bemerkt werden. Die gewöhnliche Lemniscula (Lemna minor), wächst nicht allein ganz Europa und das nördliche Amerika, sondern kommt auch in Asien vor. Man hat sie in Pennsylvanien, Carolina, Sibirien, der Tartarei, Bucharei, Cochinchina und Japan bemerkt. Die Buntkeule (Typha latifolia), wächst durch Europa, Nordamerika, in Westindien, z. B. auf Jamaika, in Asien, z. B. in Sibirien, China und Bengalen. Die grosse Anzahl Wasservögel, welche jährlich vom kalten Klima zum warmen, durch einen bewundernswürdigen ihnen liegenden Trieb ziehn, sind die Ursache, die Wassergewächse so weit verbreitet sind. Die Samen der meisten im Wasser stehenden Pflanzen kommen gegen die Jahreszeit wo die Vögel weg zur Reife. Er hängt sich an ihr Gefieder fest, auch von ihnen verschluckt und öfter unverdaut mit dem Unrathe herausgebracht.

370. Die im Grunde des Meeres wachsenden Pflanzen können, weil dasselbe nie bis auf den Frost friert oder erwärmt wird, und also fast allemal dieselbe Temperatur hat, in allen Zonen wachsen. Fucus natans, ein gewöhnliches Meergewächs, allgemein unter dem Namen des Seetangs oder Seegrases bekannt ist, findet sich sowohl unter dem Äquator, als bei den Polen. Obgleich eine Zahl von Seegewächsen sich zeigen, so doch viele überall zu finden, und es herrscht ein Unterschied, dass einige ein mehr concentrirtes

VII. Geschichte der Pflanzen. 535

ter, oder einen abwechselnden Boden verlangen. lere wollen tiefer oder höher im Meeresswasser n, und nur auf solche Gewächse des Oceans, die leichten Wasser gefunden werden, hat das käl- und wärmere Klima Einfluss. Ueberhaupt ist zu merken, dass die Hügel oder Berge, welche r der Fläche des Oceans sich finden, kräuterrei-, als die tiefen Schlünde oder Thäler desselben

371. Die Gebirgs- oder Alpenpflanzen sind da, die Gebirgsketten ehemals Zusammenhang gehabt n, der durch den mannigfaltigen Wechsel der e jetzo nicht mehr statt findet, ziemlich diesel- oder es finden sich doch viele, die verschiedenen rgsketten gemeinschaftlich eigen sind, ob gleich derselben wieder ihre eigenthümlichen Gewächse hrt. Ja die gemeinereu Gebirgspflanzen, das t solche, die man auf den Gebirgen von Europa Asien antrifft, scheinen der Schneelinie, welche eographen annehmen, zu folgen, und werden in land, Spitzbergen, Lappland, Nova Zembla, dem ichsten Sibirien und Kamtschatka, auf ebenem e angetroffen, da sie doch in gemässigten Zonen die hohen Berggipfel lieben. Auf den Sibirischen, ländischen, Norwegischen, Schottischen, Helveti- t, Pyrenäischen, Appenninischen und Carpati- t Gebirgen, so wie auf den kleinern Gebirgsket- Deutschlands, als am Harz, in Thüringen, in sien und Böhmen findet sich viele Pflanzen, die e gemeinschaftlich eigen sind. Nur ein Beispiel

536 VII. Geschichte der Pflanzen

statt mehrerer: Die Zwergbirke (*Betula nana*) fehlt sich fast auf allen, die Sibirischen, Apenninischen und Carpathischen Alpen ausgenommen. Sollte nicht diese Uebereinstimmung einiger Vegetabilien, die vielleicht nur durch Winde, Vögel und andere Umstände verbreitet sein können, ihren ehemaligen Zusammenhang beweisen? *Tournefort* sah am Fusse des Berges Ararat die Pflanzen Armeniens, etwas höher die von Frankreich gewöhnlichen, noch höher die, welche Schweden erzeugt, und auf der Spitze die gewöhnlichen Alpenpflanzen, welche wir am Nordpol wieder finden. Aehnliche Bemerkungen wurden von andern Reisenden auf dem Caucasus gemacht.

Auf den Gebirgen von Jamaika sah *Stear* keine europäischen Alpenpflanze, aber viele gemeine europäische Moose traf er daselbst an, als: *Fumarla hygrometrica*, *Bryum serpyllifolium*, *caespiticium*, *Sphagnum palustre*, *Dicranum glaucum* u. a. m. Wir wissen, dass der Same der Moose so fein ist, dass ein einzelnes Korn unserm Auge völlig unsichtbar sich zeigt, und nur ein stark vergrösserndes Mikroskop ihn bemerkbar machen kann. Sollte er, da es gewiss ist, dass er in der Luft schwebt, durch Stürme nicht dahin getrieben sein, und weil er dort ein angemessenes Klima fand, gekeimt haben? Wenigstens lässt sich keine andere Erklärungsart denken.

Vielleicht werden die Samen einiger Flechten wärmerer Gegenden durch Stürme zu uns gebracht, und tragen wegen des ungünstigen Klimas bei uns keine Früchte. Dieses scheint mit *Parmelia caperata* der Fall zu sein, die man im südlichen Europa als in der Provence, Italien u. s. w. an den Stämmen des

VII. Geschichte der Pflanzen. 537

baums, und an den Stöcken, die zur Unterstützung der Weinrebe dienen, fast nie ohne Früchte findet, und die hier bei uns, wo sie so häufig ist, niemals mit bemerkt wird.

Wenn aber die Herren *Forster* auf dem Feuerlande *Pinguicula alpina*, *Galium Aparine*, *Armeria lgaris*, und *Ranunculus lapponicus* fanden; so möchte es wohl schwer fallen zu erklären, wie diese Pflanzen an den entferntesten Winkel des Erdballs gekommen sind. Es fragt sich aber, ob die grosse Ähnlichkeit, welche diese Gewächse mit denen Europas haben, die genannten grossen Naturforscher nicht irre führte, sie für dieselben zu halten, da sie doch wohl unterscheidende Merkmale haben konnten, die sie aber, aus der Ueberzeugung, die europäischen Pflanzen zu sehn, nicht achteten? Wenn *Linné* und andere Botaniker Abarten einer Pflanze in verschiedenen Zonen anführen, so ist ihnen nicht immer zu trauen, und ich habe sehr oft gesehen, dass dergleichen sogenannten Spielarten mehrere beständige Charaktere haben, als viele von ihnen unterschiedene Arten, und dass sie wirkliche besondere Arten ausmachten. Warum sollte auch nicht die Natur unter verschiedenen Breite und Länge Arten geformt haben, die sich nur ähnlich sind.

372. Unter allen Himmelsstrichen fällt uns ein merkwürdiger Unterschied zwischen den Pflanzen auf, es nemlich einige Gewächse gesellschaftlich, andere einzeln sind. Das heisst, einige wachsen immer in grosser Menge dicht beisammen, dahingegen andere zerstreut angetroffen werden, und ein einsiedlerisches

538 VII. Geschichte der Pflanzen.

Leben führen. Der Grund dieser auffallenden Erscheinung scheint im Samen selbst zu liegen, dieser nemlich entweder zu schwer ist, und vom Wind nicht weit fortgeführt werden kann, oder dass der leiseste Hauch desselben fortgerissen wird, oder dass die Elasticität seiner Fruchthülle ihn nur in der Nähe verstreut. Auch ist die Wurzel einiger Gewächse wuchernd und macht dass mehrere Pflanzen an einem Orte immer beisammen stehen müssen.

Die gesellschaftlichen Pflanzen nehmen zumeist grosse Strecken Landes ein. Das gemeine Heidekraut (*Calluna vulgaris*), breitet sich oft Meilen weit aus. z. B. auf der Lüneburger Heide. Die Heide (*Vaccinium Myrtillus*), die Erdbeeren (*Fragaria*), einige *Pyrola*-Arten, verschiedene Simsen (Jungermannen) und einige Bäume gehören hierher. Einsame Pflanzen sind: der Waldkohl (*Turritis glabra*), die Lili (*Anthericum Liliago*), das weisse Seifenkraut (*Saponaria dioica*) u. m. a. Wenn aber Gegenden sehr bevölkert sind, so hat der Mensch schon hier Veränderungen gemacht, dass er nemlich verschiedene Pflanzen anpflanzt, Gewächse dichter zusammenbringt, die weiter entfernt stehen müssen, und dergleichen. Der Unterschied zwischen gesellschaftlichen und einsamen Pflanzen fällt daher nur noch bei solchen auf, die seiner Aufmerksamkeit nicht werth hielt. Bei uns sind hieher die Moose zu zählen, um die der Mann und Oekonom sich weniger bekümmert, sollte. Gesellschaftliche Moose sind: *Sphagnum*arten, *Dicranum glaucum*, *Polytrichum commune* u. m. Einsame sind: *Polytrichum piliferum*, *Phascum*-Arten, *Weissia paludosa* u. m. a.

(Diese gehören kaum hieher, mehr *Buxbauiaphylla*. L.)

373. Die Gewächse sind wie die Thiere an gewisse Breiten gebunden. Verschiedene aus warmen Himmelsstrichen, können nach und nach an unser Klima, ja selbst an eine kältere Himmelsgegend gewöhnt werden. Besonders können Staudengewächse warmer Klimaten, eher an ein kaltes als gemässigttes Klima sich gewöhnen. Im kalten Klima fällt mit dem Anfang des Winters eine hohe Schneedecke, die mit dem wiederkehrenden Frühling schmilzt, wo keine Nachtfröste mehr zu erwarten sind, und welche nur einen Grad Kälte über den natürlichen Frostpunkt nimmt. Im gemässigten Klima friert es aber oft scharf, ohne dass Schnee fällt, und die Pflanze muss dabei natürlich zu Grunde gehn. Aus eben dem Grunde erfrieren die Polar- und Alpenpflanzen, welche eine solche Bedeckung von Schnee an ihrem natürlichen Standort haben, bei uns, wo Fröste ohne Schnee sehr häufig sind. Nur diejenigen Stauden- und Sommergewächse warmer Zonen, welche eine längere Zeit zur Entwicklung ihrer Triebe und Blüthen gebrauchen, als der kurze Sommer eines kalten Klimas erlaubt, können dort nicht unter freiem Himmel gezogen werden, so wie solche, welche einen hohen Grad von Wärme verlangen.

Empfindlicher gegen ein kälteres Klima zeigen sich aber doch Bäume und Sträucher, weil ihr dauernder Stengel über der Erde erhaben ist, und eher dem Wechsel der Witterung leidet. Einige, die aus einem wärmeren Klima abstammen, haben sich an das unsrige gewöhnt, vielleicht weil ihr Zellengewebe

546 VII. Geschichte der Pflanzen.

zäher als das anderer Gewächse ist; (? L.) dahingegen sind aber sehr viele Pflanzen, die sich in dieser Rücksicht unbiegsam zeigen, weil ihre Organe keinen grossen Wechsel der Klimaten erlauben.

Oeffter, lehrt uns die Erfahrung, sterben Pflanzen aus wärmeren Gegenden bei uns im Winter, weil sie nicht den ihnen von der Natur angewiesenen Boden in unsern Gärten haben. Sie sind schon durch den ihnen nicht eigenthümlichen Standort kränklich und daher tödtet sie ein harter Frost bald. Helianthus, Fumaria erfriert bei uns im freien Lande, wenn es gewöhnlicher Gartenerde steht, hingegen hält es den Winter aus, wenn es einen mit Kalksteinen und Lehm gemengten Boden hat.

Die nutzbarsten Gewächse haben aber, wie die Hausthiere, die Eigenschaft in mehreren Zonen gedeihen zu können. Sind aber auch einige an gewisse Himmelsgegenden gebunden, so finden sich dort, wo sie nicht fortkommen können, andere die ihre Stelle vertreten. Unter dem Aequator und den Wendezirkeln aller Welttheile kommen in ebener Lage unsere Getreide-Arten nicht fort, an ihrer Stelle aber werden Reiss (*Oryza sativa*), indisches Korn (*Sorghum vulgare*), und türkisches Korn (*Zea Mays*) kultivirt, da ihnen unsere Getreidearten entbehrlich machen. In Island und Grönland können aber weder unsere, noch die genannten tropischen Getreidearten fortkommen; daher gab ihnen aber die Natur den *Elymus arvensis* in Menge, der im Fall der Noth als Roggen behandelt werden kann.

Essbare Wurzeln und Gemüse fehlen in keinem Klima. Wir haben deren sehr viele wildwachsend,

VII. Geschichte der Pflanzen. 541

man unbeutzt lässt, und welche uns die Noth, bitten wir nicht aus dem Orient unsere Gartenpflanzen erhalten, wohl würde kennen gelehrt haben. Alle unsere Küchenkräuter (§. 366.) sind so biegsam gegen die Abwechselungen des Klimas, dass sie meistens dem Menschen in allen Zonen gefolgt sind.

(S. den Zusatz zu §. 358. L.)

374. Aus dem hier Gesagten, fiesst ganz natürlich, dass nach so vielen und mannigfaltigen Veränderungen es wohl schwer fallen möchte, genau die Pflanze anzugeben, von wo aus jedes Gewächs sich verbreitet habe. Indessen wollen wir es versuchen, im Allgemeinen über die Pflanzen unsers Welttheils und deren wahrscheinliche Ausbreitung etwas zu bestimmen, weil wir ihn genauer, besonders in Rücksicht seines nördlichen Theils, als andere kennen. Griechenland aber, da es uns in botanischer Hinsicht fast gänzlich unbekannt ist, müssen wir davon ausschliessen. Es scheint aber seine Flor von den scandinavischen Bergen und den Küsten Asiens und Afrikas so wie von den Inseln des Archipelagus zu haben. Nach unserer Voraussetzung wären von den höchsten Gebirgen die Pflanzen in die Ebene gewandert, und wir nehmen daher fünf Hauptfloren von Europa an, nemlich: Die nordische, helvetische, österreichische, pyrenäische, und die apenninische Flor.

(S. d. Bemerkung zu §. 365. Da aber Gebirge die Gränzen der Floren gut bezeichnen, so kann man oft nach ihnen die Floren bestimmen: Die Bestimmungen des Verf. sind oft fehlerhaft, auch fehlt es ihnen überhaupt an Genauigkeit. Diese

542 VII. Geschichte der Pflanzen.

wird man nur dann erreichen können, wenn man erst die Gränzen einer Gegend geographisch und klimatisch bestimmt, und dann vergleicht, wie viel Pflanzenarten sie mit einander gemein haben, und wie sich die Zahlen der Arten, welche nicht mit einander gemein haben; zu einander verhalten. L.)

Die *nordische Flor* stammt von den norwegischen, schwedischen und lappländischen Gebirgen ab. Diese ernähren gemeinschaftlich die Pflanzen, welche der hohe Norden erzeugt. Schottland scheint in seinen Gebirgen mit den norwegischen ehemals Zusammenhang gehabt zu haben, weil auf ihnen fast dieselben Gewächse vorkommen.

Die *helvetische Flor* stammt von den Schweizer, Baierschen und Tyroler-Gebirgen ab. Die Berge der Dauphiné, so wie die von Böhmen und Schlesien sind nur Seitenäste derselben Kette. Alle nähren eine grosse Menge von Gewächsen gemeinschaftlich.

Die *österreichische Flor* stammt von den österreichischen, den Krainschen, Steyerländer und Kärnthner Alpen ab. Die Karpathen machen eine Nebenkette derselben aus.

Die *pyrenäische Flor* stammt von den Pyrenäen ab. Die Gebirge von Catalonien, Castilien und Valentia sind Nebenäste derselben.

Die *Apenninen Flor* stammt von den Apenninen ab, die sich in einzelne Nebenzweige verbreiten.

Die helvetische Flor ist von allen am weitesten ausgebreitet. Ganz Deutschland, mit Ausschluss des österreichischen Kreises und Mährens, ferner Preussen, Polen, ganz Frankreich, den südlichsten Theil aus-

VII. Geschichte der Pflanzen. 543

kommen, die Niederlande und Holland haben die Rebe Flor.

Die nordische Flor ist über Dänemark, Schweden und Russland, so wie eines Theils über England verbreitet.

Die österreichische Flor erstreckt sich vom österreichischen Kreis über Mähren, den südlichsten Theil von Polen, Ungarn, Moldau, Wallachei, Bulgarien, Serbien, Bosnien, Croatien, Slavonien, Istria und Dalmatien.

Die Pyrenäische Flor erstreckt sich über ganz Spanien, die Insel Majorka und Minorka; vielleicht auch über Portugal, doch fehlt es hier an Untersuchungen.

(Nord-Portugal hat eine pyrenäische, Süd-Portugal eine atlantische Flor. L.)

Die Apenninische Flor geht über ganz Italien, Sardinien, Corsika, und zum Theil über Sicilien.

Nehmen wir die Pflanzenverzeichnisse der fünfzig unterschiedenen Floren, so wird die auffallende Verschiedenheit der Gewächse sehr bemerkbar.

375. Es ist aber auch leicht einzusehn, dass mancherlei Vermischungen der Floren, nachdem sich das feste Land gebildet und verschiedentlich verbunden hat, haben entstehen müssen. Daher ist das südliche Frankreich, weil dort die helvetische und pyrenäische Flor zusammen fließt, so reich an Vegetabilien, daher mischen sich im Piemontesischen die pyrenäische, helvetische und apenninische Flor, so wie auch durch das Meer noch nordafrikanische Pflanzen eingebracht werden. Aus eben dem Grunde be-

544 VII. Geschichte der Pflanzen.

steht Grossbritannien theils aus der nordischen, theils aus der helvetischen Flor, und in der südlichsten Spitze dieses Königreichs, in Cornwallis, mischen sich schon Gewächse der pyrenäischen Flor, durch die schrägüber liegende spanische Küste, unter die andern. Schweden, Dännemark und Russland haben auch die nordische Flor nicht rein erhalten; viele Pflanzen der helvetischen sind zu ihnen hinüber gewandert. Eben dieses gilt von Deutschland, und besonders von unserer Mark Brandenburg, die ausser der helvetischen Flor einen Theil der nordischen erhalten hat. Von der nordischen haben wir gewiss erhalten: *Malaxis Loeselii*, *Neottia repens*, *Tofieldia palustris*, *Vaccinium Oxycoccus*, *Ledum palustre*; *Andromeda polifolia*, *Linnaea borealis*, u. m. a. Von der helvetischen Flor haben wir: *Erythraea Centaurium*, *Euphorbia Cyparissias*, *Cucubalus Otites* und fast die meisten Gewächse bekommen.

Merkwürdig ist es, dass so gemeine Pflanzen wie *Euphorbia Cyparissias*, und *Cucubalus Otites*, zwanzig Meilen hinter Berlin gerade nach Norden gänzlich aufhören, und gar nicht mehr zu finden sind, ob sie gleich in den nördlichern botanischen Gärten sehr gut fortkommen. Weiter östlich finden sie sich noch bis beinahe zum 60sten Grade einzeln wieder. Vielleicht säen sich diese Gewächse mit der Zeit noch weiter nach Norden hin aus, und gehn immer pördlicher. Wer steht uns dafür, ob sie nicht nach Jahrhunderten um ein beträchtliches weiter sich ausgebreitet haben, ob nicht mehrere Pflanzen auf eine ähnliche Art weiter sich verbreiten, und ob die Flor von Berlin nicht nach vielen Jahren an Arten gewonnen hat?

VII. Geschichte der Pflanzen. 545

Pflanzen die sich stark durch Samen vermehren, oh nebenher mit ihren Wurzeln wuchern, haben schneller sich verbreiten müssen; und man darf daher oh nicht wundern, verschiedene derselben über ganz Europa von einem Ende bis zum andern zu sehn, auch ad diejenigen Gewächse, welche einen leichten Samen haben, den der Wind schnell fortführen kann, ärker verbreitet, als solche deren Gesäme schwer t. Einige solcher Gewächse sind von Lappland bis a die äusserste Spitze Italiens, ja sogar bis nach Nordafrika gewandert.

Das nördliche Asien hat sehr viele europäische Pflanzen, wir finden nach Norden hinauf die nördliche, nach Süden die östreichische und zwischen die die helvetische verbreitet. Es scheint, als wenn oh an den europäischen Gebirgen weit früher Land gesetzt hätte, und als wenn dieses sich bis an die Gebirge Asiens verlängert hätte, ohne dass vieles oder oh nur sehr wenig Land um die asiatischen Gebirge auf der Nordwestküste entstanden wäre. Daher t es kein Wunder, dass bis an dem Ural und an die russische Kette von Bergen, die diesseitige Ebene nur hr wenige asiatische, mehr aber europäische Pflanzen hervorbringt.

Das nördliche Amerika ernährt sehr viele europäische kleinere Pflanzen, und zwar grösstentheils solche r nordischen Flor. Es ist daher wahrscheinlich, ss vormals zwischen beiden Welttheilen eine Verbindung war, die in späteren Zeiten zerrissen ist.

376. Um nach den Voraussetzungen richtigere griffe über die Verbreitung der Vegetabilien unserer Erdkugel zu erlangen, müsste man alle hohe urfängliche Gebirge durchreisen, die Flor eines jeden Villdenow's Grundriss. I Th.

welche Pflanzen von dieser, welche von
kette in die Ebene verpflanzt sind.

Die Küsten der Länder zeigen un
des Innern. An den Küsten finden
Gewächse, die von benachbarten Gege
führt sind. Aus diesem Grunde hat
und Amerika unter dem Wendezirkel
Strande nachgelegenen Ländern, viele
meinschaftlich mit einander. Reiset
genannten Welttheilen weiter dem Inn
den sich diese Gewächse fast gar nicht
der dieser Welttheile zeigt uns seine
Erzeugnisse, die um so reichhaltiger a
nahe vielarmige, mit abwechselndem
Gebirgsreihen, in den Gegenden sich e

Am Vorgebirge der guten Hoffu
darum eine so reiche, eigenthümliche
mischte Flor, weil diese Gegend selbst
gend ist. Madagaskar ist deshalb s
Pflanzen versehen, weil diese grosse
birge hat, und beide Welttheile, neml
Asien, zwischen welchen sie liegt, in
Produkte mitgetheilt haben. Die Bah

VII. Geschichte der Pflanzen. 547

tele der westindischen Inseln und des mexikanischen Oerbusens.

377. Eine oder mehrere Pflanzen, die ursprünglich von der Natur unter allen Breiten unsers Planeten wild angetroffen werden, möchten wohl nicht vorhanden sein.

(Allerdings Schimmelarten: *Aspergillus glaucus* und *Penicillium glaucum*. L.)

solche Gewächse, die eine grosse Ausdehnung annehmen, sind erst durch den Menschen dahin verpflanzt. Die Vogelmiere (*Alsine media*), von der *Linne* und andere annehmen, dass sie überall gefunden würde, ist nur da anzutreffen, wo sie mit den Küchengewächsen hingebracht ist. Ich finde sie aber nicht von den Naturforschern Indiens angezeigt, ob ich gleich glaube, dass sie da auch wachsen könne, aber im heissesten Afrika möchte ich doch wohl zweifeln, dass sie sich fortzupflanzen im Stande sei.

Dem gemeinen Nachtschatten (*Solanum nigrum*) und der Erdbeere (*Fragaria vesca*) wird eine grosse Ausbreitung zugeschrieben. Die Naturforscher haben aber ähnliche Pflanzen für Spielarten der gewöhnlichen europäischen Arten angesehen, und diesen Gewächsen eine grössere Verbreitung zugeschrieben, als ich wirklich findet. Nur die an den Küsten gewöhnlich sich zeigenden Gewächse sind von der Natur weiter verbreitet, als andere, die das Innere hervorringt. Unter diesen möchten der Portulac (*Portulaca lerracea*), die Saudistel (*Sonchus oleraceus*), und die Sellerie (*Apium graveolens*) die einzigen sein, welche sehr weit gewandert sind. Von diesen werden sich aber auch die beiden letztern in den heissesten Zonen nicht finden.

(In der ganzen Lehre von der Ge-
zwei Ansichten gegen einander
einen sind die Pflanzen an den ver-
len, wo sie sich noch finden, urs-
den gewesen, nach der andern er-
ursprünglich nur an einem Orte
sich von dort umher. Die, welche
Theorie huldigen, berufen sich au-
che z. B. auf den Gipfeln der
Schweiz, in Lappland und Nord-A-
men. Die, welche der zweiten i-
ben, führen wirkliche Beispiele
rungen, und besonders die Armut
an. Man wird erst bestimmt un-
wie weit die eine oder die andere
sei, wenn man genauere Vergle-
Verhältnisse der Floren zu einander
als bisher geschehen ist und eben
über die klimatischen Verhältnisse

III. Geschichte der Wissenschaft.

378. **D**ie Botanik, als ein Zweig der Naturgeschichte, ist erst in neuern Zeiten zu der Vollkommenheit gediehen, wie wir sie jetzt sehn. Man mag die Kenntnisse der Alten noch so sehr erheben, so waren sie doch in der Naturgeschichte am weitesten zurück. Ein Kräuterkenner in jener Zeit zu sein, wollte nicht viel sagen. Die ganze Kenntniss bestand in wenigen, sehr ungewissen, durch Tradition erhaltenen Namen. Wie in der Folge die Menschen einsahen, dass Kenntniss der Natur sehr nützlich sei, wandten sie auch mehreren Fleiss darauf. Man gab sich Mühe, durch bestimmtere Wörter die Verschiedenheit des Baues auszudrücken, und Nichtkenner darauf aufmerksam zu machen. Nach der für alle Wissenschaften so vortheilhaften Entdeckung der Buchdruckerkunst, war man auch darauf bedacht, Zeichnungen von Gewächsen auf eine wohltheile Art zu verfertigen. Die ersten Pflanzenabbildungen waren Holzschnitte. Gewächse die sich in der Gestalt sehr von andern auszeichnen, sind leicht in Holzschnitten zu kennen; nur feinere Pflanzen, die mit mehreren

550 VIII. Geschichte der Wissenschaft.

Aehnlichkeit haben, sind schwieriger in dergleichen Figuren auszudrücken. Die besten haben *Rudbeck*, *Clusius*, *C. Bauhin* und *Dodonaeus* gegeben. Die Kunst, natürliche Gegenstände in Kupfer zu graben, war für die Kräuterkunde von grösserm Nutzen. Nun war man im Stande, durch feine Kupferstiche die Kenntniss der Gewächse gemeinnütziger zu machen. Die besten Kupfer haben *Linné* im *Hortus cliffortianus*, *Smith*, *Cavanilles* und *Heritier* gegeben. Einige Botaniker liessen Kupferstiche nach Art der Holzschnitte verfertigen, die bloss den Umriss der ganzen Pflanze vorstellen. Solche sind in *Plumier* und des jüngern von *Linné* Werken. Um wohlfeilere Abbildungen von Pflanzen zu geben, bestrich man Gewächse, die aufgetrocknet waren, mit Buchdrucker-Schwärze, und drückte sie auf Papier. Solche Pflanzenabdrücke müssen zwar sehr genau werden, aber die feineren Theile der Blume gehn völlig verloren. Die besten haben wir von *Junghans* und *Hoppe*. Unter den mit Farben erleuchteten Kupferstichen sind die des *Roxburgh*, *Masson*, *Smith*, *Sowerby*, *Andrews*, *Trew*, (*Sibthorp* L.) und *Jacquin* die vorzüglichsten; besonders zeichnet sich der von *Venteur* herausgegebene *Jardin de la Malmaison* aus; aber an Schönheit und Richtigkeit der Ausführung übertrifft die *Flore portugaise* des Grafen v. *Hoffmannsegg* und Professors *Link* alle bis jetzt erschienene Kupferwerke. Bei diesen Abbildungen ist Kunst und Natur auf das sorgfältigste vereinigt, und alle übrigen farbigen Abbildungen stehn diesen weit nach.

Von einem Botaniker verlangt man jetzt eine richtige und genaue Kenntniss aller wildwachsenden Pflanzen, von der grössten bis zur kleinsten, eine

VIII. Geschichte der Wissenschaft. 551

richtige Kenntniss aller Ausdrücke und Theile derselben, eine genaue Bekanntschaft mit den natürlichen Familien des Gewächsreichs, und endlich eine richtige Kenntniss der Eigenschaften, Sonderbarkeiten und Kräfte aller Gewächse. Man belegt im gemeinen Leben den, der gute Abbildungen von Gewächsen giebt, und der nach der äussern Gestalt einige Gewächse zu unterscheiden weiss, mit dem Namen eines Botanikers. Jener hat gar kein Verdienst, und sein Werk kann nur, wenn die Gewächse gut vorgestellt sind, als Kunstwerk Beifall verdienen. Dieser kann auch nicht als Kräuterkenner gelten, weil er nicht die systematische Kenntniss dieser Wissenschaft hat und die Kennzeichen angeben kann, wodurch die Gewächse unterschieden werden. Nicht trockenere Kenntniss des Namens macht den Botaniker aus. Er vergleicht jedes Gewächs mit allen entdeckten, sucht Unterschiede, und beobachtet die Natur genau. Blosser Nomenklatur kann nie wahres Vergnügen gewähren, dagegen sorgfältig angestellte Beobachtungen den reichhaltigen Stoff zum Nachdenken geben. Der Botaniker zeigt dem Arzt, Oekouomen, Forstmann und Technologen die brauchbaren Gewächse an, ohne ihn können sie keine richtige und gewisse Versuche anstellen.

Die Geschichte der Botanik zeigt uns die allmählichen Fortschritte, welche der Mensch in Erforschung des Gewächsreichs gemacht hat. Zur bequemen Uebersicht ist sie hier in verschiedene Epochen abgetheilt.

ERSTE EPOCHE.

Von Entstehung der Wissenschaft bis auf Brunfels.

379. Die ersten Bewohner unserer Erde mussten gleich Anfangs sich mit den Früchten, die zur Befriedigung ihrer wenigen Bedürfnisse hinreichten, bekannt machen. Die Erfahrung zeigte ihnen aber bald, dass viele dieser Gewächse dem Menschen schädlich wären. Diese, nebst denen zur Nahrung tauglichen, waren ihnen nur bekannt. Wie sie sich aber mehr ausgebreitet hatten, und die Bedürfnisse des Lebens sich vermehrten, mussten sie schon auf mehrere Nahrungsmittel denken. Verschiedene Krankheiten, die gewöhnlichen Folgen, wenn der Mensch die Gesetze der Natur verletzt, zwangen sie, sich nach Hülfsmitteln umzusehn, die sie im Gewächsreich durch ein glückliches Ungefähr oder von den Thieren kennen lernten. Auf diese Art lernten die Bewohner von Ceylon den Nutzen der Ophiorrhiza. Ein kleines Thier, (*Viverra Ichneumon*), was sich von giftigen Schlangen nährt, frisst, sobald es von ihnen gebissen wird, aus Instinkt die Wurzel der genannten Pflanze. (? L.) Die Ceyloner versuchten die Kräfte derselben und fanden ein treffliches Mittel, den Schlangenbiss unschädlich zu machen. Auf ähnliche Art lernten die Amerikaner, in gleichen Fällen, den Nutzen der *Aristolochia Anguicida* und *Serpentaria*. So entstand die Kenntniss einiger Arzneipflanzen. Der Vater lehrte sie den Sohn, dieser den Enkel und so weiter kennen. Durch Tradition, damals das einzige Mittel, Dinge der Vergessenheit zu entreissen, kamen die Namen derselben auf die spätere Nachkommenschaft.

Im Orient, wo Anfangs allein der Sitz der Ge-

VIII. Geschichte der Wissenschaft. 553

ursamkeit war, gab man sich auch die meiste Mühe, die Nützliche und Schädliche verschiedener Naturprodukte kennen zu lernen. Die Chaldäer theilten ihre Kenntnisse den Aegyptiern, diese den Griechen mit.

Unter den Griechen fingen endlich alle Wissenschaften an, und *Aesculap* suchte durch Mittel aus dem Pflanzenreiche verschiedene Krankheiten zu heilen. (? L.) Die Arzneikunde wurde aber bald ein Gegenstand der Religion. In Tempeln, die der Verehrung der Götter gewidmet waren, hing man die Vorschriften des *Aesculaps* auf. Die Priester allein übten sich mit Aufsuchen der Arzneipflanzen und Heilung der Kranken ab. Man nannte sie, als Nachkommen des *Aesculaps*, *Asclepiaden*.

Der Vater der Arzneikunde, *Hippocrates*, erweiterte die Erfahrungen des *Aesculaps*, und hinterliess verschiedene medicinische Werke. In diesen Schriften ist der kranke und gesunde Zustand des Menschen ausführlich abgehandelt; bei den Heilungsarten hat er 34 Pflanzen erwähnt. Es sind aber bloss Namen. *Hippocrates* wurde 459 Jahre vor Christi Geburt auf der Insel Cos geboren. Er ist sehr alt geworden, nur sind die Nachrichten über sein Alter (und den ganzen Schriftsteller überhaupt .L.) ziemlich ungewiss; denn einige behaupten, er sei 89, andere 90, noch andere 94, und endlich einige 109 Jahr alt geworden. Die Namen der Gewächse, welche er angeführt hat, sind schwer zu errathen, denn die grössten Naturforscher und Philologen sind seit langer Zeit damit beschäftigt gewesen, sie richtig zu bestimmen; aber alles scheint ungeschicklich, werden wohl immer noch Zweifel übrig bleiben.

(Die meisten Namen kommen in dem hippokratischen Buche *de morbis mulierum* vor. L.)

556 VIII. Geschichte der Wissenschaft.

ner Naturgeschichte handelt er über das Gewächsreich. Er sagt unter andern: es gäbe noch wohl mehrere Pflanzen, die an Zäunen, auf Wegen und dem Felde wüchsen, sie hätten aber keine Namen und wären ohne Nutzen. Im 56sten Jahre ward er das Opfer seiner naturhistorischen Untersuchungen, da er des Vesuv's Feuerausbrüche erforschen wollte.

Mehrere Römer erwähnten noch einige Pflanzen; allein das von ihnen Angeführte war schon von ihren Vorgängern gesagt worden.

Ausser einigen Asiaten, dem *Galenus*, *Oribasius*, *Paulus Aegineta* und verschiedenen andern Aerzten, ist gar nichts über die Producte des Gewächsreichs geschrieben worden; was diese Männer uns hinterlassen haben, sind trockene Namenverzeichnisse, aus denen nichts zu nehmen ist.

Gleich nach Christi Geburt machten sich viele Aerzte, als *Mesue*, *Serapio*, *Rasis*, *Avicenna* und mehrere andere in Arabien und Spanien berühmt. Von den Arzneigewächsen haben sie aber nur die, von ältern Schriftstellern angezeigten, genannt.

Jetzt folgt ein grosser Zeitraum, worin beinahe alle Wissenschaften schliefen. Was noch hie und da über medicinische und naturhistorische Gegenstände geschrieben wurde, war blosse Compilation der ältern Schriftsteller mit mönchischer Gelehrsamkeit ausgeschmückt. So ging es der Botanik bis ins sechszehnte Jahrhundert, wo sie *Brunfels*, ein Deutscher, aus dem lethargischen Schlafe weckte.

ZWEITE EPOCHE.

Von *Brunfels* bis auf *Cäsalpin*, vom Jahre 1530
bis 1583.

380. In der vorigen Epoche ist in einem Zeit-

VIII. Geschichte der Wissenschaft. 557

in von Jahrtausenden wenig oder gar nichts für die Heilkunde gethan. Mit Verzeichnissen von höchstens 600 Pflanzen war der Grund gelegt, aber zum Ende selbst noch keine Aussicht vorhanden.

Diese zweite Epoche eröffnet schon frohere Auszeiten. Alle Wissenschaften gingen an neues Leben bekommen, und die Klöster waren nicht mehr ein-der Sitz des menschlichen Wissens. *Brunfels*, *Fuchs*, *Dodonäus*, *Lobel*, der unvergessliche *sins* und der grosse *Casalpin* brachen die Bahn.

Otto Brunfels, eines Böttchers Sohn, wurde zu-erst am Ende des funfzehnten Jahrhunderts gebo-ren. Er war erstlich Carthäuser-Mönch, wurde nach-her Cantor in Strasburg, und nach einem neunjährig-en Aufenthalt daselbst, widmete er sich mit so vie-lem Beifall der ausübenden Arzneikunde, dass er nach-her berufen wurde, wo er anderthalb Jahr mit vie-ler Liebe die Heilkunde ausübte, und endlich den 23. September 1534 daselbst von allen beweint starb. In einem Werke *) hat er die ersten Holzschnitte gelie-fert, wie er überhaupt der erste Botaniker in Deutsch-

*) *Otto Brunfelsii Historia plantarum. Argentorati, Tom. I. 1530. Tom. II. 1536. Im Jahre 1537 und 1539 erschienen neue Ausgaben davon herausgekommen. Eben dieses Werk hat er in deutscher Sprache unter dem Titel: Con-stantin Cräuterbuch vormals in teutscher Sprach dermassen erschienen noch im Truck ausgegangen. Strassburg 1532 herausgegeben; der zweite Theil erschien 1537. Man hat eine Frankfurter Ausgabe in Fol. von 1546, und eine Strasburger in 4to von 1534. Seine Werke sind sehr selten. Er hat noch einiges Medicinische und über des Dioscoridi Pflanzen geschrieben*

nach Hornbach, wo er Arzt und war. Im 56sten Jahre seines Alter Hornung 1554. Nach der Sitte des derte er seinen Namen Bock in die griechische Benennung *Tragus*. I handelte er mit ziemlicher Genauig land wachsenden Pflanzen ab, und guren, die nicht ganz schlecht sind ten Gewächse vor. Man macht i dass er auf die Kräfte der Gewäch habe, da sie ihm doch nicht unbel tadelt vorzüglich, dass er die alten nig benutzte.

Euricus Cordus wurde in einem geboren, und starb 1538. Er lehrte zeneikunde in Erfurt, Marburg und aller Zeugniß war er einer der ge seiner Zeit. Er hat Verschiedenes vorzüglich der Alten geschrieben **

*) Hieronymus Boak oder Bock; ge terbuch von den vier Elementen, Thiere schen; Strassburg 1546. Fol. Man hat

VIII. Geschichte der Wissenschaft. 559

Sein Sohn *Valerius Cordus* wurde 1515 geboren, und hatte das Unglück, auf der Reise zu Rom 1544 an einem Pferde erschlagen zu werden. Er trat in seines Vaters Fussstapfen. Sein Werk über die Pflanzen ist sehr selten *), und die Ausgabe des Dioscorides, welche er besorgte, wird noch geschätzt.

Conrad Gesner, der grosse Polyhistor seiner Zeit, wurde in Zürich 1516 geboren, und starb daselbst 1565. Er hat über verschiedene Theile der Botanik und Arzneikunde geschrieben. Seine vorzüglichsten Werke sind **).

Leonard Fuchs ward 1501 in Baiern geboren. Er studirte zu Heilbrunn, Erfurt, Ingolstadt, und kam nach mancherlei Schicksale als Lehrer nach Tübingen, wo er den 10. Mai 1566 starb. Der Kaiser Carl der Fünfte schätzte ihn sehr, und hat ihm viele Ehrenbezeugungen erwiesen. Er hat eine eigene Geschichte der Pflanzen geschrieben, von der man viele Ausgaben im Deutschen, Französischen und Lateinischen hat ***).

*) *Valerii Cordi Historia stirpium. Argentorati 1561. Fol.* Der berühmte Conrad Gesner hat dies Werk nach seinem Tode herausgegeben. Die Figuren sind von Bock entlehnt, und nur 60 sind neu. Die Zürcher Ausgabe ist ganz die alte.

**) *Conradi Gesneri Enchiridion historiae plantarum. Basiliae 1541. 8vo. De plantis antehac ignotis; ohne Jahrzahl und Druckort in 12mo. Historia plantarum, Basileae 1541. 4mo. De raris et admirandis herbis, quae, sive quod nocu-
lucant, sive alias ob causas, Lunariae nominantur. Tü-
ri 1555. 4to.* Ein äusserst seltenes Werk.

***) *Leonardi Fuchsi de Historia stirpium commentarii*

560 VIII. Geschichte der Wissenschaft.

Die Alten, den *Dioscorides*, *Galen*, *Hippocras* u. s. a. hat er durch Noten zu erläutern gesucht, und gerieth darüber mit dem berühmtesten Arzt und Philologen, *Johann Heynbut* oder *Hagenbut*, der sich an *Cornarus* nannte, in Streit. *Cornarus* schrieb gegen ihn in einer kleinen Schrift, *Vulpecula excoriata*, betitelt. Fuchs antwortete in einer andern Schrift, den Titel *Cornarus furiens* ist; worauf jener den Satz mit einem Werke, *Mitra s. Brabyla pro vulpecula excoriata asservanda* benannt, beschloss.

Peter Andreas Matthiolus, Arzt zu Siena, wurde 1500 geboren, und starb zu Trident 1577 an der Pest. Ein sehr berühmter Arzt, dem man auch verschiedene neue Arzeneien zu danken hat. Die Alten, vorzüglich den *Dioscorides*, hat er am meisten studirt. Sein Kräuterbuch ist in italiänischer Sprache geschrieben, man hat auch französische und deutsche Ausgaben davon *).

Rembert Dodonaeus wurde zu Mecheln 1517 geboren. Er war kaiserlicher Leibarzt, und der Beschreibung seiner Geschicklichkeit in Deutschland, Frankreich und Italien bekannt. Im Jahre 1583 wurde er als Professor nach Leyden berufen, wo er auch 1585 starb. Sein

insignes, Basileae 1542. Fol. Es sind 512 Figuren, von denen viele aus Brunsfels vergrößert sind. Alle Bäume und die kleinsten Kräuter sind von gleicher Grösse. Man hat eine Ausgabe in 8vo, dies ist die erste.

*) *Peter Andreas Matthiolus* Kräuterbuch durch *Joachim Camerarium*. Frankfurt 1590. Fol. mit 1069 Figuren. Die erste italienische Ausgabe war ohne Figuren, und kam 1548 zu Venedig heraus.

VIII. Geschichte der Wissenschaft. 561

erachtetes Werk *) übertrifft alle seine Vorgänger, sowohl an Genauigkeit der Holzschnitte, als an guten Beschreibungen. Es finden sich 1330 gute Figuren darin, von denen viele aus dem Fuchs, Clusius und Batthiolus genommen sind.

Matthias von Lobel, Arzt des Königs Jacob des Ersten in England, war zu Ryssel in Flandern 1538 geboren, und starb in London 1616. Mit einem Arzt, Namens Peter Pena, in der Provence, arbeitete er gemeinschaftlich die *Adversaria*, einen Theil seines Werks aus; er sagt auch, dass ihm derselbe viele selbige Gewächse geschickt habe. Einige wollen ihn beschuldigen, dass er in seinen Werken **) verschiedene Figuren erdichtet habe, und einige Pflanzen als in England wildwachsend angezeigt, die keiner nach ihm finden konnte.

Was die erste Beschuldigung betrifft, so liegt sie wohl in der schlechten Ausführung einiger Zeichnungen, die nicht getreu genug entworfen sind. Seine *lymphaea lutea minor septentrionalium* ist eine schlechte Figur der jetzt in Deutschland entdeckten

*) Remberti Dodoonaei stirpium Historiae pemptades VI. Antwerp. 1616 Fol.

**) Matth. de Lobelii (de l'Obel) Plantarum seu stirpium historia et adversaria, Antwerp. 1576. Fol. ist schon selten. Die Zahl der Figuren beläuft sich auf 1495.

Icones Plantarum. Antwerp. 1581. Pars I. et II. Queer so. Der Verleger des vorigen Werks, Christoph Plantin, hat die Ausgabe, ohne Lobels Namen auf den Titel zu setzen, besorgt. Es sind 1096 Platten, auf welchen sich 2173 Figuren befinden, von denen die meisten aus Clusius und Dodoonäus Werken genommen sind.

Willdenow's Grundriss. I Th.

Nach dem Willen seiner Aeltern sollte
den, und ging deshalb nach Löwen. Bald
seinen Vorsatz, und von Liebe zu
gerissen, unternahm er die mühsamsten
lichsten Reisen durch Spanien, Portugal,
England, die Niederlande, Deutschland.
Schon im 24sten Jahre bekam er die W
ihm aber der berühmte Arzt Rondelet
Gebrauch der Cichorien heilte. Im 39n
er sich in Spanien, da er mit dem Pfei
rechten Arm dicht über dem Ellenboge
hatte er dasselbe Schicksal mit dem re
Im 55sten Jahre verrenkte er sich in W
Fuss; acht Jahre nachher die rechte
letzte Verrenkung wurde von den Ael
und er hatte das Unglück, an Krücken
sen. Die grossen Beschwerlichkeiten
beim Gehn ausstehn musste, verhind
die zur Gesundheit nöthige Bewegun
und er bekam einen Bruch, Verstopfun
leibe und Steinschmerzen. Bei seine
Umständen ward ihm das Leben am kai

VIII. Geschichte der Wissenschaft. 563

war das grösste Genie seiner Zeit, und trieb, wie einer seiner Vorgänger, mit einem Enthusiasmus und inner Beharrlichkeit das botanische Studium, die weder vor noch nach ihm ihres gleichen gehabt hat. Seine Schriften *) zeigen den grossen Botaniker, und werden immer unentbehrlich bleiben. Die Holzschnitte sind sauber, die Figuren kenntlich, und die Beschreibungen meisterhaft. Schade, dass ein Mann mit so vielen Verdiensten gerade ein so trauriges Schicksal haben, und der erste Märtyrer der Botanik werden musste!

D R I T T E E P O C H E.

*Von Cäsalpin bis auf Caspar Bauhin, vom Jahre
1583 bis 1593.*

381. In dieser Epoche macht *Cäsalpin* den ersten Versuch, eine systematische Form in die Botanik zu bringen. Mehrere folgen seinem Beispiel. Die Wissenschaft breitet sich mehr aus. Es werden Reisen in fremde Welttheile gethan, und der grosse *Caspar Bauhin* sucht alles Entdeckte zu ordnen.

Andreas Cäsalpin war aus Arezzo im Florentinischen gebürtig. Er wurde nach Rom gerufen, wo er als Leibarzt Clemens des achten den 25. Hornung 1602 starb. Vor ihm hatte man ohne alle Ordnung die Gächse beschrieben, und war gar nicht darauf bedacht, durch Aehnlichkeiten, die man in gewissen Heilen aufsuchte, das Studium zu erleichtern. Sein

*) Caroli Clusii rariorum plantarum historia. Tom I. et II. Antwerp. 1601. Fol. Er hat viele kleine Abhandlungen, z. B. Plantae pannonicae, hispaniae, historia aromatum geschrieben, die alle in diesem grossen Werke enthalten sind.

564 VIII. Geschichte der Wissenschaft.

System (§. 136.) macht ihn unvergesslich. Die Schriften dieses Botanikers *) sind so selten, dass man sie nur dem Titel nach noch kennt.

Jacob Dalechamp ward in dem Städtchen Caen in der Normandie im Jahre 1513 geboren, hielt sich die grösste Zeit seines Lebens in Lyon auf, und starb daselbst 1588, oder wie andere wollen 1597. Er war der erste, der eine allgemeine Geschichte aller entdeckten Pflanzen schreiben wollte; durch viele Geschäfte wurde er aber an der Fortsetzung verhindert. Ein geschickter Arzt zu Lyon, Namens Johann Mattheus, setzte auf Zureden des Buchdrucker Rovilli die angefangene Werk fort **).

Joachim Camerarius ist zu Nürnberg den 6. November 1534 geboren, und starb den 11. October 1598. Als Knabe hielt er sich in Wittenberg bei Melancthon auf, und studirte nachher in Leipzig die Arzneikunde. Er reisete darauf durch Italien, und wurde 1551 in Rom Doctor. Mit den grössten Kräuterkennern seiner Zeit stand er in der genauesten Verbindung. Durch den grossen Eifer für die Botanik erwarb er sich die Achtung des Prinzen Wilhelm, Landgrafen zu Hessen, der ein grosser Gartenfreund war,

*) Andr. Cäsalpini de plantis libri XVI. Florent. 1583. 4to. Ejusd. Appendix ad libros de plantis et quaestiones peripateticas. Romae 1603. 4to.

***) Jacobi Dalechampii Historia generalis plantarum, opus posthumum. Leyd. 1587. Vol. I. II. Fol. 2686 Holzschnitte enthalten die meisten Abbildungen von Cordus, Fuchs, Celsus, Tragus, Matthioli, Dodonäus und Lobel. Ueber 400 Figuren sind zweimal bis dreimal vorgestellt, und die wenigen eigenen sehr schlecht.

VIII. Geschichte der Wissenschaft. 565

und dessen Garten zu Cassel er in Ordnung bringen musste. Seiner Schwester Sohn, Joachim Jungermann, ein junger sehr geschickter Botaniker, reisetete auf seinen Antrieb nach dem Orient, hatte aber das Unglück, auf der Reise durch eine ansteckende Krankheit das Leben zu verlieren. Camerarius hat viele kleine Schriften über botanisch-ökonomische Gegenstände, und auch über die Gewächse der Alten geschrieben. Sein vorzüglichstes Werk *) enthält 47 Abbildungen, die aus der Gesnerschen Sammlung sind. Er kaufte nemlich die ganze Gesnersche Sammlung von Holzschnitten, die sich auf 2500 Stück beliefen. Diese hat er bei seiner Ausgabe des Matthiolus und in einem andern Werk, was noch geschätzt wird **) benutzt.

Jacob Theodor Tabernaemontanus, ein Schüler des Tragus, hat sich seinen Namen vom Geburtsort Berg-Zabern, einem Städtchen im Zweibrückschen, gegeben. Er war erst Apotheker in Kronweissenburg,

*) Joach. Camerarii hortus medicus philosophicus, Franc. ad Moen. 1588. 4. Eine kleine Schrift des Johann Thal, eines Arztes in Nordhausen, *Sylva hercynica*, ist angedruckt. Diese enthält ein genaues Verzeichniss aller Gewächse des Harzes, Thal starb 1583 zu Nordhausen, da er mit dem Pferde stürzte.

**) Joachim Camerarii de plantis epitome P. Andr. Matthioli. Francof. ad Moen. 1586. 4to, mit 1003 Figuren. Iter in montem Baldum Fr. Calceolarij ist noch mit angedruckt. Franciscus Calceolarius, oder wie er eigentlich hiess, Calzolaris, war Apotheker zu Verona, und hatte diese Beschreibung der Pflanzen, welche sich auf dem Berge Baldo finden, im Italienischen 1566, im Latein. 1571 schon vorher zu Venedig herausgegeben.

566 VIII. Geschichte der Wissenschaft.

reisete darauf nach Frankreich, kam als Doctor zurück, und starb zuletzt als churfürstlicher Leibmedikus zu Heidelberg 1590. Wegen seiner Geschicklichkeit wurde er allgemein geschätzt. Sein Werk *) hat er nicht ganz ausgearbeitet, der zweite und dritte Theil desselben ist von einem andern, und nicht so gut wie der erste.

Seit die Portugiesen um Afrika den Weg nach Indien gefunden hatten, giengen des Handels wegen viele nach diesem Welttheile, so wie auch nach Columbus Entdeckung von Amerika, die Gewinnsucht einige dorthin zog. Unter diesen waren verschiedene, die aus Trieb zur Naturgeschichte jene Reise unternahmen. Die merkwürdigsten sind: Garzias ab Horto **).

*) Jacob Theodor Tabernaemontanus Neuw vollkommenes Kräuterbuch; darinnen über 3000 Kräuter mit schönen künstlichen Figuren etc. etc. Frankf. a. M. 1588. Tom. I. Fol. Den zweiten Theil hat Doctor Nicolai Braun 1590 herausgegeben. Man hat noch mehrere Ausgaben, die Caspar Bauhin besorgte, zwei zu Frankf. a. M. von 1613 und 1625, und zwei zu Basel von 1664 und 1697. Die lateinische Ausgabe ist in Queer 4to unter dem Titel: Icones plantarum sive stirpium tam inquilinarum, quam exoticarum, zweimal in Frankfurt am Mayn; nemlich 1588 und 1590 erschienen. Unter den Figuren sind viele von andern entliehen, sie sind alle sehr kenntlich. Die lateinischen Ausgaben finden sich selten.

**) Leibarzt des Königs von Portugal, schrieb über die Gewürze 1563 in 4to, wovon in allen Sprachen Uebersetzungen sind. Clusius hat diese Abhandlung bei seinem größern Werke andrucken lassen.

VIII. Geschichte der Wissenschaft. 567

Christoph a Costa *), Joseph a Costa **), Nicolaus Monardes, Gonsalvus Ferdinand Oviedo, Franciscus Lopez de Gomara, Franciscus Hernandez ***) u. m. a.

Leonhard Rauwolff, ein Deutscher, unternahm eine beschwerliche Reise nach dem ganzen Orient. Er durchreiste in den Jahren 1573 bis 1575 Syrien, Arabien, Mesopotamien, Babylon, Assyrien und Armenien. Nach seiner Zurückkunft wurde er Arzt zu Augsburg. Der Religion wegen musste er aus seiner Vaterstadt flüchten, und starb 1596 als Arzt bei der österreichischen Armee. Er hat eine vollständige Beschreibung seiner Reise †) herausgegeben.

Prosper Alpin, aus der Stadt Marostica im Vene-

*) Ein Chirurgus von Portugiesischen Eltern in Africa geboren, schrieb Verschiedenes über die Gewürze, was auch in grössern Werk des Clusius mit abgedruckt ist.

**) Ein Jesuit, schrieb über Thiere, Pflanzen und Steine in Barcelona 1578 in 4to ein Werk.

***) Arzt des Königs Philipp des Zweiten von Spanien: *Opera plantarum, animalium et mineralium Mexicanorum historia*. Romae 1651. Sehr selten, aber wegen der schlechten Abbildungen wenig mehr zu brauchen.

†) Leonhardi Rauwolff, bestallten Medici zu Augsburg, geantliche Beschreibung der Reis, so er in die Morgenländer vollbracht, in vier verschiedene Theile abgetheilt. Lautingen 1583, 4to, mit 43 Figuren von orientalischen Pflanzen. Diese Ausgabe allein hat Holzschnitte und ist seltener als die ältere, die 1582 in Frankfurt herausgekommen ist. Man hat Uebersetzungen dieser Reise ins Französische und Englische. In der Leydener Bibliothek wird das von ihm auf der Reise gesammelte Herbarium von 350 Pflanzen aufbewahrt.

568 VIII. Geschichte der Wissenschaft.

tianischen gebürtig, ging aus Liebe zur Botanik nach Egypten. Nach seiner Zurückkunft übte er die Arzneikunde in Venedig, darauf in Genua aus, und kam zuletzt als Lehrer nach Padua, wo er 1617 gestorben ist. Er hatte allgemein das Lob eines geschickten Mannes. Die Botanik verdankt ihm folgende Schriften *).

Johann Bauhin wurde 1541 zu Lyon geboren. Er war ein Schüler des Fuchs, verliess sein Vaterland, hielt sich eine Zeit lang in Yverdon, einer Stadt im Canton Vaud auf, und ging nach Mülmpelgard, wo er als Leibarzt des Herzogs von Württemberg 1613 starb. Den grössten Theil der Schweiz und Italien hat er durchreist. Schon als Jüngling arbeitete er an seinen grossen Werke **), was er erst nach 52 Jahren zur Vollkommenheit brachte.

Fabius Columna oder *Colonna*, ein Italiener, wurde 1567 geboren, war Präsident der Akademie zu Neapel, und starb 1648. Er widmete sich besonders deshalb der Botanik, um ein Mittel zu entdecken, wodurch er von epileptischen Zufällen, die er von Jugend auf hatte, geheilt werden könnte. Unter allen

*) *Prosperi Alpini de plantis Aegypti liber.* Venet. 1590. 4to. Eine andere Ausgabe erschien ebendasselbst 1592. Man hat noch zwei Auflagen zu Padua von 1639 und 1680, endlich auch eine Leydener von 1735.

Ejusdem *de plantis exoticis libri duo.* Venet. 1656. 4. von seinem Sohne, *Alpinus Alpini* genannt, herausgegeben.

**) *Johannes Bauhini Historia plantarum.* Tom. I. II. III. Genevae 1661. Fol. mit 3600 Holzschnitten. Das Werk ist erst nach seinem Tode auf Kosten des Herrn von Grafried durch *Domin. Chabraeus* herausgekommen.

VIII. Geschichte der Wissenschaft. 569

lanzen fand er die Valeriana am wirksamsten. Das Studium der alten Kräuterkenner beschäftigte ihn sehr; seinen Schriften *) ist er den Alten gefolgt, ohne eine systematische Form anzunehmen. Unter allen botanischen Werken enthalten die seinigen die ersten Kupfer, bei denen nur zu tadeln ist, dass alle Pflanzen von gleicher Grösse, sie mögen gross sein, oder klein, vorgestellt sind. Die Zeichnungen zu den Kupfern hat er selbst verfertigt. In seinen Werken hat er keine systematische Ordnung beobachtet, er zeigt aber, wie man nach den Blüthen und Früchten Gattungen entwerfen könne, aber sein Vorschlag ward nicht in Anwendung gebracht. Fast nach einem Jahrhundert führte Tournefort diese Idee wirklich aus:

*) Fabii Columnae *πυροβρασμος*, sive plantarum aliquot historia, in qua describuntur diversi generis plantae variores, et magis facie viribus respondentes antiquorum Theophrasti, Dioscoridis, Plinii aliorumque, delineationibus ab aliis usque non animadversae. Neapel 1592, mit 36 Kupfern. Es giebt eine neuere Ausgabe zu Florenz 1744, mit 38 Kupfern, die ungleich häufiger ist.

Ejusdem minus cognitaram nostra coeruleo orientum *irpium exprosas* Tom. I. II. Romae 1606, 4to. Eine neuere Ausgabe von 1616 mit 131 Kupfern, worauf 247 Pflanzen vorgestellt sind. Dies Buch ist äusserst selten; neu kostet es 2 Thaler 12 Groschen, ich weiss aber, dass man es schon mit 20 Thalern bezahlt hat. In der neuen Ausgabe sind die Kupfer schöner, und ist noch eine Abhandlung de *lupura* abgedruckt.

her kam er als Rektor nach Hambur
22. September 1657. In seinen Schri
viele und grosse Kenntniss der Natu
wüchsrreich hat er sehr richtig geu
was er über die Terminologie und v
sagt, ist ganz nach Art des Linné g
ren Jungs Schriften mehr bekannt
hätte er einen grössern Wirkungsl
wäre schon damals die Botanik so
wie sie jetzt steht.

Johann Wray, oder wie er
Jahre 1669 nannte, *Ray* oder *Rajus*,
Notley, einem Dorfe in der Provinz
November 1628 geboren. Durch Grossl

*) Johann. Loeselii plantarum rariorum
in Borussia catalogus. Regiomonti 1654.
Ausgabe in Frankfurt 1673. 4to.

Ejusd. Flora prussica edidit Joan. G.
Regiomonti 1703. 4to. Mit sehr schönen

**) Joach. Jungi Doxoscopiae physicae
goge physica doxoscopica. Hamburgi 16

VIII. Geschichte der Wissenschaft. 573

ich, Deutschland, die Schweiz und Italien ist er mit der Aufmerksamkeit auf alle Produkte der Natur reist. Er war ein Geistlicher, und Mitglied am Vereinigkeits-Collegio zu Cambridge, gab aber vor seinen Reisen diese Stelle auf, privatisirte nachher, und starb als Mitglied der Londner Societät den 17. Januar 1705. Die grösste Zeit seines Lebens brachte er auf dem Lande zu. Die Gestalt der Blume, auf die er zuerfort sein System baute, wollte ihm nicht gefallen, und es entstand deshalb zwischen diesen Gelehrten ein Streit. Er hat sehr viel botanische Werke geschrieben, von denen nur einige angezeigt werden können *). In einigen Stücken ahmte er dem Jungern, doch ganz ist er ihm nicht gefolgt. Unstreitig war er der fleissigste Botaniker, der zugleich die grösste Belesenheit hatte.

Johann Sigismund Elsholz wurde zu Berlin 1623 geboren, war Arzt des Churfürsten Friedrich Wilhelm und starb den 19. Hornung 1688. Er ist der erste, welcher über die Pflanzen der Mark Brandenburg geschrieben hat **).

Paul Boccone, nachher *Sylvius* genannt, wurde zu Savona im Genuesischen den 24. April 1633 geboren, und starb den 22. December 1704. Er war ein siziliensischer Mönch, lebte zu Palermo, und machte

*) *Catalogus plantarum circa Cambrigam nascentium, ambrigae 1660. 8vo.* Dies war des Rajus erstes Werk, das anonymisch erschien.

Joh. Raji *Historia plantarum generalis.* Lond. Pars I. 1686. II. 1688. Tom. III. 1703. Fol. das wichtigste und letzte Werk, was er schrieb.

**) *Johanni Sigismundi Elsholmii Flora marchica. 1683. 8.*

sel gegen die Brust. Da er die Aufsat-
tanischen Garten zu Oxford hatte,
Früchte der Pflanzen genauer, als s
beobachten. Am meisten hat er sich
theilung der Schirmpflanzen berühmt
seinem grossen Werke mit abgedruckt
delt besonders, dass man die Gattungen

*) Pauli Boccone icones et discriptiones
rum Siciliae, Melitae, Galliae et Italiae, edic-
niae 1674. 4to., mit 52 Kupfern, worauf 1
gestellt sind. Morison erhielt von Carl Ha-
ris lebte, das Manuscript und die Zeichnun-
und ihm allein haben wir die Herausgabe

Ejusd. Museo di Fisica et d'Esperienze
1607. 4to.

Ejusd. Museo di piante rare della Sic-
Tom. II. 1647. 4to. Diese beide letzteren m-
aus, was sehr selten ist, aber zugleich schle-
gen als das erstere enthält.

**) Roberti Morisonii Historia plantarum

VIII. Geschichte der Wissenschaft. 575

h den Arzneikräften oder willkürlichen Merkmalen bestimmte, und wollte, dass man dieselben nach Gestalt bestimmen möchte.

Jacob Barrelier wurde 1634. zu Paris geboren, lehrte sich der Arzneikunde, und da er eben im Begriff war, den Doctorhut anzunehmen, ward er ein minikaner-Mönch. Er machte viele und häufige Reisen durch Frankreich, Spanien, die Schweiz und Italien. Auf seinen Reisen war die Naturgeschichte Hauptgegenstand. Von Pflanzen, Insekten und Conchylien verfertigte er Zeichnungen, und wollte, dass die Art des Columna, ein botanisches Werk unter diesem Titel, Hortus mundi oder Orbis botanicus, herausgegeben, worin alle Pflanzen sollten enthalten sein. Auf einer Reise durch Italien zog er sich eine Engländerkrankheit zu, woran er zu Paris den 17. September 1683 starb. Die Abbildungen sind nach seinem Tode herausgekommen *).

Franciscus van Sterrebeck war Prediger in Antwerpen und starb 1684. Vor ihm hatte man sich wenig um die Pilze bekümmert. Er nahm viele von Clusius, fügte noch eine Menge dazu, und schrieb ein anderes Werk darüber **). Die Abbildungen sind

*) Jacobi Barrelieri Plantae per Galliam, Hispaniam et Italiam observatae; opus posthumum accurante Antonio de Clusio. Parisiis 1714. Fol. mit 1327 Kupfern worauf 1455 Pflanzen vorgestellt sind. Auf den letzten Tafeln sind viele Conchylien abgebildet. Verschiedene Abbildungen sind aus dem Clusius und andern genommen.
**) Francisci van Sterrebeck Theatrum fungorum, of het theatrum der Campernoelgien etc. Antwerpiae 1654. 4to. Inzwischen sind noch drei Ausgaben von 1675, 1685 und 1695 erschienen.

576 VIII. Geschichte der Wissenschaft.

aber sehr schlecht, weil er auf die wahren Kenntnissen derselben gar nicht geachtet hat, und es scheinen erdichtet zu sein.

Jacob Breyn, Kaufmann und verschiedener Stätten Mitglied in Danzig, wurde 1637 geboren, starb 1697 an einem Durchfall. Mit den größten Kräuterkennern seiner Zeit stand er im Briefwechsel und erhielt durch sie sehr seltene Gewächse, die in besondern Werken *) bekannt machte.

Heinrich von Rheede tot Draakenstein wurde geboren, und starb den 15. December 1691. Er Gouverneur der holländischen Besitzungen in Indien, und hielt sich vorzüglich in Malabar auf. Der geschickte Mahler liess er die vornehmsten Pflanzen zeichnen, und beschrieb sie nebst ihrem Nutzen in dem Werke **).

Christian Menzel wurde in der Mark Brandenburg zu Fürstenwalde den 15. Junius 1622 geboren. Viele nützliche Reisen zur Erforschung der Gewächse.

*) *Jacobi Breynii Exoticarum et minus cognitarum plantarum Centuria I.* Gedani 1678. Fol. hat er auf seine eigenen Kosten herausgegeben; die 109 Kupfer sind sauber, die Beschreibungen gut.

Ejusd. *Prodromi rariorum plantarum fasciculus I.* Gedani 1739, 4to, mit 32 Kupfern. Dies Werk ist von seinem Sohn Joh. Phil., Arzt zu Danzig herausgegeben, auch einige kleine botanische Abhandlungen geschrieben.

**) *Rheedii Hortus malabaricus indicus cum notis et comment.* Joh. Commelini. Tom. I — XII. 1676 — 1693. Fol. mit 794 sehr saubern prächtigen Kupfern. Die Beschreibungen sind sehr genau, und der Natur getreu. Das Werk ist sehr selten.

VIII. Geschichte der Wissenschaft. 577

1 Vaterlandes soll er unternommen haben; auch er in vielen Sprachen eine grosse Fertigkeit, er sogar in der chinesischen bewandert gewesen soll. Er war Leibmedicus in Berlin, und starb 6. November 1701 *).

Johann Commelyn, ein Holländer und Professor botanik zu Amsterdam, hat vorzüglich über die amsterdamer Garten cultivirten seltenen Pflanzen geschrieben. Sein schönstes Werk **) kam erst nach seinem Tode heraus. Viele wichtige Anmerkungen sind sich von ihm im Hortus malabaricus.

Nicolas Commelyn, ein Bruders-Sohn des vorigen, geboren in Amsterdam, wurde 1667 geboren, und starb den 25. December 1731. Er trat ganz in die Fußstapfen seines Onkels ***).

Nehemias Greew (gest. 1711.) Sekretär der königlichen Societät der Wiss. zu London, ist unter Neuern der erste, welcher auf die Anatomie der

Christ. Menzelii Index plantarum multilinguis seu Picturae botanonymos polyglottos. Berol. 1682, Fol. mit 11 Kupfern, worauf 40 Pflanzen nicht gut abgebildet sind. Es ist

Joan. Commelini Horti medici Amstelodamensis rariorum plantarum orientalis quam occidentalis Indiae plantarum descriptiones et icones. Opus posthumum a Fried. Ruyschio et J. Kiggelario. Amstelod. 1697, Fol. Die Kupfer sind schön und die Beschreibungen genau.

*) Casp. Commelini Flora malabarica. Leyd. 1696, in 8vo.

Ejusd. Praeludia botanica. Amstelod. 1701 et 1702, 4to. seines Onkels grossem Werke gab er den zweiten Theil, 1701, in Fol. heraus.

Menow's Grundriss, 1 Th.

578 VIII. Geschichte der Wissenschaft.

Pflanzen den Gebrauch der Vergrößerungsgläser angewandt, und dadurch zuerst zu einer genauern Einsicht der Pflanzentheile führte. Sein erstes Werk, the *Anatomy of Vegetables* begun. Lond. 1671. 12., ist allerdings nur ein Anfang. Aber sein grosses Werk *The Anatomy of plants*. Lond. 1682. Fol., enthält die Entdeckung der Spiralgefässe und andern feinen Pflanzentheile. Er will nichts von Malpighis Entdeckungen gewusst, sondern das Werk 1671 schon der Societät der Wiss. übergeben haben, wogegen doch die Dürftigkeit des Werkes von 1671 absteht.

Marcellus Malpighi, geb. zu Bologna 1628 gest. 1694 und Professor daselbst, zuletzt auch päpstlicher Leibarzt, hat sich um die Anatomie der Pflanzen grosse Verdienste erworben. Er hat gewiss, ohne von einem andern zu wissen, die Spiralgefässe entdeckt, und sehr viele vortreffliche Untersuchungen über den feinern Bau der Pflanzentheile gemacht. Seine *Anatomia plantarum* kam 1675 zu Lond. Fol. heraus und wurde zu Leiden 1687. 4. nachgedruckt. L.)

Rudolph Jacob Camerarius, Professor zu Tübingen, wurde den 18. Februar 1665 geboren, und starb den 11. September 1721. Ausser einigen Dissertationen und kleinen Abhandlungen, welche in den *Actis Acad. Nat. Curios.* stehn, hat er kein grosses botanisches Werk geschrieben. Seit Plinius Zeiten hatte man zwar vom Geschlechte der Pflanzen gesprochen, aber noch nichts Bestimmtes darüber gewusst, durch ihn wurden die ersten Versuche gemacht.

Paul Herrmann wurde zu Halle im Magdeburgschen den 30. Julius 1640 geboren, war lange Zeit Arzt auf der Insel Zeylon, begab sich darauf nach dem Vorgebirge der guten Hoffnung und kam mit

VIII. Geschichte der Wissenschaft. 579

in einer reichen Sammlung seltener Gewächse nach Holland, wo er Prof. zu Leyden ward, und den 25. Januar 1695 starb *).

Augustus Quirinus Rivin, Professor der Botanik zu Leipzig, wurde den 3. December 1653 geboren, und starb den 30. December 1722. Er war einer der ersten Kräuterkenner seines Jahrhunderts. Sein System zeigt, dass er ein sehr guter und scharfer Beobachter der Natur war **).

Leonhard Pluknet, ein Londner Arzt, der mit unermüdetem Eifer alles Merkwürdige des Gewächsteichs bei übrigens nicht günstigen Glücksumständen zu sammeln suchte, und eine Sammlung von 8000 Pflanzen, was zu der damaligen Zeit erstaunend viel sagen wollte, zusammenbrachte. Gegen das Ende seines Lebens unterstützte ihn die Königin von England, machte ihn zum Professor und Aufseher des Gartens zu Hamptoncourt. Er ward 1642 geboren, und starb 1706. Kein Kräuterkenner hat so viel Gewächse zusammengebracht und gekannt, als er zu seiner Zeit. Seine Sammlung wird noch im britischen Museo zu London aufbewahrt. Ob er gleich eine grosse Menge von Gewächsen besass, so war er doch nicht System-

*) Pauli Hermanni Horti academici Lugduno-Batavi catalogus. Leyd. 1687, 8vo.

Ejusd. Paradisus Batavus. Leyd. 1698, 4to. Nach seinem Tode von Sherard. herausgegeben. Ein sehr brauchbares Werk.

Ejusd. Museum Zeylanicum. Leyd. 1717, 8vo, eine andere Ausgabe von 1726.

**) A. Q. Rivini introductio generalis in rem herbariam. Lips. 1690. Fol. Ein seltenes Werk mit schönen Kupfern

580 VIII. Geschichte der Wissenschaft.

matiker genug, wahre Verbesserungen zum Vortheil der Wissenschaft zu machen *).

Jacob Petiver, ein reicher Gewürzkrämer in London, der sich mit dem Studio der ganzen Naturgeschichte beschäftigte, und Mitglied der Londner Societät war, starb 1718. Eigene neue Entdeckungen hat er wenige gemacht. In seinem Werke **) sind die Abbildungen aus seinem Naturalienkabinette oder aus andern Schriftstellern genommen.

Carl Plumier, ein Franziscaner-Mönch, wurde zu Marseille den 20. April 1646 geboren. Er machte dreimal eine Reise nach Westindien, um die Producte des Thier- und Gewächsreichs zu bestimmen; endlich starb er auf der kleinen Insel Gadis am Seehafen von Cadix 1704. Auf seinen Reisen hat er die Gewächse sehr sauber abgebildet, und die genauesten Beschreibungen davon verfertigt. Von seiner zahlreichen

*) Leonhardi Plukenetii Phytographia. Lond. 1691, 1692, 4to. mit 328 Kupfern.

Ejusd. Almagestum botanicum. Lond. 1696. 4to.

Ejusd. Almagesti botanici mantissa. Lond. 1700. 4to mit 22 Kupfern.

Ejusd. Amaltheum botanicum. Lond. 1705, 4to, mit 104 Kupfern. Alle diese Werke sind unter dem allgemeinen Titel: Opera omnia und machen ein Ganzes aus. Auf allen Kupfern sind zusammen 3000 Pflanzen abgebildet.

**) Jacobi Petiveri opera omnia ad historiam naturalem spectantia. Vol. I, et II. Fol. III, 8. Lond. 1764. Dieses Werk enthält alle seine Schriften zusammen. Auf den Kupfern sind Thiere, Versteinerungen und Pflanzen untermischt vorgestellt. Der dritte Theil enthält nur Text, und ist in 8vo gedruckt.

VIII. Geschichte der Wissenschaft 581

Sammlung hat er, und nach seinem Tode einige Botaniker wenig nur bekannt gemacht *). Der grösste Theil seiner Zeichnungen und Manuscripte wird auf der National-Bibliothek zu Paris bewahrt.

FÜNFTE EPOCHE.

Von Tournefort bis Vaillant, vom Jahre 1694 bis 1717.

383. *Tournefort* fängt eine neue Reform mit der Botanik an. Er bestimmt die Gattungen genauer nach den Blumen, und führt alle entdeckten Pflanzen auf. Man fährt nach *Tourneforts* Methode fort, die sich über ganz Europa ausbreitet, die Gräser und ausländischen Gewächse zu ordnen, bis *Vaillant* zeigt,

*) Charles Plumier description de plantes de l'Amerique avec leurs figures. Paris 1693. Fol. mit 108 Kupfern. Ein sehr seltenes Buch.

Caroli Plumieri nova plantarum americanarum genera. Parisiis 1703. 4to.

Ejusd. Filices ou Traité de Fougères de l'Amerique. Paris 1705, Fol. mit 172 Kupfern, worauf 242 Gewächse vorgestellt sind. Dies seltene Werk enthält die Abbildungen aller amerikanischen Farnkräuter, und ist in dieser Art noch das vorzüglichste.

Ejusd. plantarum americanarum fasciculi X curante J. Burmanno. Amst. et Lugdb. 1755, Fol. mit 262 Kupfern, worauf 418 Pflanzen vorgestellt sind.

Plumier hinterliess 1400 Zeichnungen von Pflanzen, von denen 418 durch den geschickten Maler Aubriet auf *Vaillants* Veranlassung copirt und an Boerhaave geschickt wurden. Diese hat nachher Burmann in 10 Fascikeln unter dem eben angeführten Titel herausgegeben.

582 VIII. Geschichte der Wissenschaft.

dass noch nicht alle Gattungen richtig bestimmt sind, und der Wahrheit näher kommt, als alle seine Vorgänger.

Joseph Pitton, vom Geburtsorte *Tournefort* genannt, wurde zu *Aix* in der *Provence* den 5. Junius 1656 geboren, machte verschiedene Reisen durch Frankreich, die pyrenäischen Gebirge, England, Holland, Spanien und Portugal, und eine auf Kosten des Königs nach der Levante. Er wurde nachher Professor der Botanik zu Paris und Ritter. Durch einen unglücklichen Zufall quetschte er sich die Brust an einem schnell vorbeijagenden Wagen, und verlor am 28. November 1708 das Leben. Sein System, auf die bessere Bestimmung der Gattungen, erwarben ihm einen grossen Ruhm, der nur durch Linné's Verdienste verdrängt werden konnte. Auf der Reise im Orient hatte er einen gewissen Gundelsheimer zum Gesellschafter, der nachher in Berlin der Stifter des botanischen Gartens ward. Die *Tourneforts*che Kräutersammlung wird in der Pariser Bibliothek, und die des Gundelsheimer wird auf der Bibliothek der Akademie der Wissenschaften zu Berlin verwahrt *).

Ritter *Hans Sloane*, ein Irländer, wurde 1690 geboren, studirte in Frankreich die Arzneikunde, ging

*) J. Pitton Tournefort Relation d'un voyage de Lerat Paris 1717, in 4to. Vol. I. II. Davon hat man eine deutsche Uebersetzung, die in drei Octavbänden zu Nürnberg 1776 herausgekommen ist. Es sind viele Pflanzenabbildungen darin.

Ejusd. institutiones rei herbariae. Tom. I. II. III. Paris 1719, 4to, mit 489 Kupf. Dies ist die dritte von Jussieu besorgte Ausgabe, die ältere habe ich nicht gesehen.

VIII. Geschichte der Wissenschaft. 583

auf nach Jamaika, und ward zuletzt Arzt in London und Präsident der dortigen Societät. Er starb den Januar 1753. Seine zahlreiche Sammlung von Naturalien wird im britischen Museo aufbewahrt. war ein grosser Beförderer der Wissenschaften *).

Wilhelm Sherard, wurde 1659 zu Bushby in Leicestershire geboren. Er machte verschiedene Reisen nach Frankreich, Deutschland, Holland und der Schweiz. Im Jahre 1702 ward er Mitglied der Commission für kranke und verwundete Seeleute und bald hier ging er als Consul nach Smyrna. Er sammelte auf allen seinen Reisen sehr eifrig die ihm vorkommenden Gewächse und hinterliess eine reichhaltige Sammlung, welche an 12000 Arten enthielt, noch jetzo auf der Oxforder Bibliothek aufbewahrt. Er schickte auch Samen an seinen Bruder Jacob Sherard, der einen schönen Garten auf seinem Lande zu Eltham bei Oxford hatte. Er starb den 12. August 1738 und vermachte der Universität zu Oxford Capital von 3000 Pfund Sterling, dessen Zinsen Besoldung eines Professors der Botanik verwenden sollten. Ihm verdankt ausser einigen andern Abhandlungen die Kräuterkunde die Herausgabe von Hermanns *Paradisus batavus* und Vaillants *herbarium parisiense*. Er unterstützte bei seinen günstigen Glücksumständen dieses Studium sehr, und

* Hans Sloane Esq. a. voyage to Madeira, Barbadoses, St. Christophers, Jamaica, with the natural history. don 1707, Fol. Ein sehr seltenes Werk, was in London ist, wegen seiner Seltenheit, mit 10 Pfund Sterling bezahlt wird.

584 VIII. Geschichte der Wissenschaft.

wollte einen *Piaax plantarum*, worin alle bekannte Gewächse vorkommen sollten, herausgeben.

Olaus Rudbeck wurde den 15. März 1660 zu Upsal geboren, promovirte 1690 zu Utrecht, ward der Nachfolger seines Vaters, und starb den 31. März 1740. Sein Vater war der berühmte schwedische Polyhistor *Olaus Rudbeck*, Professor der Botanik zu Upsala. Er wollte in zwölf Bänden mit schönen Holzschnitten eine Menge seltener Gewächse beschreiben. Sein Werk führt den Titel: *Campi Elysei*. Durch den grossen Brand der 1702 beinahe ganz Upsal verheerte, ging seine Bibliothek, Kräutersammlung und auch dieses Werk verloren. Zwei Exemplare vom ersten Theile und sechs vom zweiten existiren nur noch, und werden als grosse Seltenheit aufbewahrt *). Der Vater überlebte den Verlust nicht, und starb den 12. December 1702. Der Sohn hat, ausser einigen Dissertationen, nichts Botanisches geschrieben.

Johann Jacob Scheuchzer, Professor der Mathematik zu Zürich, wurde den 2. August 1672 geboren, und starb 1738. Er hat verschiedene botanische Reisen über die Alpen unternommen **), durch die er sich berühmt gemacht hat.

*) Ich habe ein Exemplar dieses äusserst seltenen Werk in der Bibliothek des Herrn Kriegs Rath von Leysser in Halle gesehen. Der jetzige Besitzer des Linnéischen Herbariums hat eine neue Auflage davon unter folgendem Titel besorgt: *Reliquiae Rudbeckianae, sive camporum elyseorum libri primi, qui supersunt, adjectis nominibus Linnaeanis*. London 1789. Fol.

**) J. Jacob. Scheuchzeri novem itinera per alpinas regio-

VIII. Geschichte der Wissenschaft. 585

Johann Scheuchzer, ein Zürcher Arzt, hat sich ein sterbliches Verdienst um die Kräuterkunde erworben, da er die Gräser genauer zu bestimmen suchte. in Werk hat nur den einzigen Fehler, dass die Beschreibungen zu weitläufig sind *).

Maria Sybilla Merian, die Tochter des berühmten holländischen Kupferstechers Matth. Merian, wurde 1647 geboren. Aus grosser Liebe zur Insektologie reiste sie nach Surinam, um die Verwandlungen derartigen Insekten zu beobachten. Nach ihrer Zurückkunft gab sie ein prächtiges Werk **) über die Verwandlungen der Insekten heraus, wobei verschiedene Pflanzen abgebildet waren, die Casper Commelyn botanisch bestimmt hat. Einige Exemplare hat sie mit eigener Hand aufs prächtvollste illuminirt. Sie starb 1717.

Herrmann Boerhaave, wurde bei Leyden in dem Orte Voorhout 1668 geboren. Sein Vater, ein Predi-

ca facta. Tom. I—IV. Leydae 1723. 4. Unter den vielen Kupfern sind 38 Pflanzenabbildungen.

*) Joh. Scheuchzeri *Agrostographiae prodromus*. Tiguri 1708. Fol.

Ejusd. *Agrostographia; seu graminum, juncorum, cyperorum, cyperoidum usque ad finem historia*. Tiguri 1719, 4. Das erste Werkchen ist in diesem Buche mit abgedruckt.

**) *Maria Sybilla Merian Metamorphosis insectorum Surinamensium*. Hagae Com. 1726, Fol. mit 72 Kupfern. Der Text ist lateinisch und französisch. Man hat ältere Ausgaben in holländischer und französischer Sprache mit weniger Kupfern. Die von der Verfasserin selbst illuminirte Ausgabe ist daran kenntlich, dass alle Figuren die entgegengesetzte Lage, als in den unilluminirten Editionen haben.

sen Zufall seine theologische Laufbahn
er Professor der Medicin, Chemie und
starb den 30. September 1738. Als
forscher ist er durch ganz Europa be-

Engelbert Kämpfer wurde in den
1631 geboren. Keiner der ältern K
so grosse und weitläufige Reisen un
reiste zehn Jahre durch Russland,
kaspischen Meers, Persien, Arabien,
mandel, an den Ufern des Ganges,
Siam und Japan, woselbst er zwei
In einem besondern Werke *) hat
zweiten Reise bemerkten Merkwürd
gemacht, und verschiedene Gewächse
panische beschrieben. Es ist in fünf
von welchen der letzte die Beschrei
bildungen der japanischen Pflanzen en
ste Heft, worin über 500 Abbildun
Ganges wachsender Pflanzen gewese
verloren gegangen. Er starb den 12

*) Herm. Boerhaave Index alter plant

VIII. Geschichte der Wissenschaft. 587

Ludwig Feuillée, ein Franziskaner-Mönch, machte eine Reise nach Peru und Chili. Er hat ein genaues Tagebuch über naturhistorische Beobachtungen hergegeben, und vorzüglich auf die zur Arzneikunde dienlichen Gewächse geachtet *).

SECHSTE EPOCHE.

Von *Vaillant* bis auf *Linnee*, vom Jahre 1717 bis 1735.

384. *Vaillants* forschender Geist sieht die Mängel des *Tournefortschen* Systems, und seiner Gattungen ein; er bestimmt neue Gattungen, sucht die kleinen Gewächse, als Moose und Pilze, zu ordnen, und zeigt deutlich das Geschlecht der Pflanzen. Was *Vaillant* nicht vermochte, die Moose ganz und richtig zu ordnen, dies thun *Dillon* und *Micheli*. *Linne's* grosser Geist giebt der ganzen Wissenschaft ein besseres Ansehen, und die Botanik wird das, was sie längst hätte sein sollen, ein auf festen Gründen ruhendes Gebäude.

Sebastin Vaillant wurde den 26. Mai 1669 zu *Éigny* in Frankreich geboren. Er widmete sich der Chirurgie; aber die grosse Liebe zum Pflanzenreiche machte, dass er vorzüglich diese Wissenschaft stu-

*) *Louis Feuillée Journal des observations physiques, mathématiques et botaniques, faites par ordre du Roi sur les côtes orientales de l'Amerique meridionale.* Paris, Tom. I. II. 1714. Tom. III. IV. 1725. 4. Man hat einen Auszug des botanischen Theils ins Deutsche übersetzt unter folgendem Titel: des Pater Ludwig Feuillée Beschreibung zur Arznei dienlicher Pflanzen, übersetzt von D. Georg Leonhard Huth. Nürnberg 1756, 4to.

Wasserlinse hat er zuerst bemerkt

S I E B E N T E E P C

Von Linné bis Hedwig, vom Jahr

385. *Linne* bewies das Geschl zeigte den einzig wahren Weg, Gaten, er fand ein neues System, erdium, und ordnete endlich alle entSeine Schüler gehn in alle Weltgegen neue Pflanzen. Sein System ver ganz Europa, und findet überall Ananen der Moose werden endlich von

Carl von Linné ward in Schweden Namens *Rashult* in der Provinz *Småland* 1707 geboren. Sein Vater, ein Prediger Theologie studiren sollte, der maber lieber im Freien, und sammelt

VIII. Geschichte der Wissenschaft. 589

47. Die kleinsten Pflanzen wusste er, gleich Vailant, genau zu untersuchen. Die Moose hat er aufsteigend bestimmt, und seine Beschreibungen sind ein Muster von Deutlichkeit. Er konnte selbst zeichnen und in Kupfer stechen *).

Johann Christian Buxbaum, wurde zu Merseburg 1704 geboren. Er studirte in Leipzig, Jena und Wittenberg. Der grosse Friedrich Hoffmann in Halle empfahl ihn dem Grafen Alexander Romanzof, der nach Constantinopel als Gesandter ging. Er durchreiste alle Provinzen Griechenlands, und kam nach Petersburg zurück. Er verliess diesen Ort krank von den Folgen einiger Ausschweifungen der Liebe, und starb in Wermsdorf bei Merseburg den 17. Julius 1730 **).

*) Joh. Jacob. Dillenii Catalogus plantarum sponte circa sem nascentium. Francof. 1719. 8vo.

Ejusd. Hortus Elthamensis Londini 1732, Fol. mit 314 kleinen Kupfern, worauf 417 Pflanzen vorgestellt sind. Dieses Werk ist noch einmal ohne Text unter folgendem Titel ausgegeben: Horti Elthamensis icones et nomina. Lugd. Bat. 1744, Fol. mit Linnéischen Benennungen.

Ejusd. Historia Muscorum Oxon. 1741, 4to, mit 85 Kupfern, auf denen fast 600 Moose abgebildet sind. Ein unvergleichliches Werk. In diesem Theile der Botanik war fast nichts gethan, und durch dies Buch sind die Moose am vollkommensten bearbeitet. Es ist sehr selten, denn man hat nur 250 Exemplare. Ein besonderer Abdruck der Kupfer ist in London 1763 herausgekommen.

(Noch ist anzuführen: J. Raji Synopsis methodica stirpium britannicarum. Ed. 3. cur. Jac. Dillenio Lond. 1724. 6. da diese Ausgabe so vermehrt ist, dass man sie mehr ein Werk von Dillen als von Ray aufführen kann. L.)

**) J. C. Buxbaumii Plantarum minus cognitarum Cent.

noch in der Meinung stand, dass Gleditsch
rieth darüber mit Linné in Streit. Gleditsch
dass Linné Recht hätte.

Albrecht von Haller, wurde 1708 ge-
studirte in Leyden unter der Anführung
Boerhaave, wurde Professor der Anatomi-
nik in Göttingen, verliess diesen Musensi-
gab sich nach Bern, wo er Präsident
Raths ward, und starb im December 1777
eins der grössten Genie's unsers Jahrhun-

C. Linnaei Flora Lapponica. Amstelod. 1737,
re Jahreszahl, da ich das jetzt seltene Buch sa-
Die zweite Auflage von Smith erschien zu Lon-

C. Linnaei Genera plantarum. Leid, 1737
Lugd. Bat. 1742. 8vo., nachher herausgegeben
Schreber, Hänke.

C. Linnaei Philosophia botanica. Stockh. 1751
her herausgegeben von Schreber und Sprengel.
Auflage 1809, ist sehr vermehrt.

C. Linnaei Species plantarum. Stockh. 1753
Ed. 2. ibid. 1762. Voll 2. nachher von Reichb.

VIII. Geschichte der Wissenschaft. 593

Anatom, Physiolog, Botaniker, Arzt, Dichter, Pöker und Litterator *).

Johann Gottlieb Gleditsch, wurde den 5. Hornung 4 in Leipzig geboren. Er studirte in seiner Vater-
lt, und machte verschiedene Reisen durch Sachsen.
Berlin, wo er sich nachher, um die anatomischen
lesungen zu besuchen, aufhielt, ging er nach den
ern des Herrn von Zietzen in Trebnitz; woselbst
sinen botanischen Garten anlegte. Da Friedrich der
zige die Akademie wieder in Aufnahme brachte,
rd er wieder nach Berlin gerufen. Er erhielt den
rakter als Hofrath, und endigte sein thatenvolles
en den 5. October 1786. Ein rastloser Fleiss, sanft-
Charakter und immer heitere Gemüthsart machten
als Greis noch lebenswürdig. Von seinen Schrif-
will ich nur diejenigen, welche ihm den meisten
um brachten, anführen **).

Johann Burmann, Professor der Botanik zu Am-
dam, der im Besitz der seltensten Kräutersammlung
aus Afrika und Asien war, machte viele dieser
ätze bekannt ***). Er nahm aber niemals die Lin-
che Methode an.

) Albrechtii ab Haller historia stirpium indigenarum Hel-
ae. Bernae 1768. Tom. I. II. III. Fol. mit 48 Kupfern.

) Joh. Gottl. Gleditschii Methodus fungorum. Berol.
3, 8vo.

Ejusd. Systema plantarum a staminum situ. Berol. 1764,

*) Joh. Burmanni Thesaurus Zeylanicus, Amst. 1737,
mit 110 Kupfern, worauf 155 Pflanzen abgebildet sind.
Ejusd. rariorum africanarum plantarum Decas I—X.
telod, 1738—1739, 4to, mit 100 Kupfern, worauf 215
seltensten Gewächse vorgestellt sind.

Willdenow's Grundriss. I Th.

594 VIII. Geschichte der Wissenschaft.

Johann Friedrich Gronov, Doctor und Bürger zu Leyden, ein grosser Freund von Linné, machte die gesammelten Pflanzen von Rauwolf und Clay bekannt, und suchte sie genau nach dessen Mässen zu bestimmen *). Er ist 1783 gestorben.

George Eberhard Rumph, wurde in Hanau geboren. Er ging als Arzt nach Ostindien, wo er auf der Insel Amboina Bürgermeister und Ober-Kaufmann wurde. Mit grossem Fleisse sammelte er alle Producte Indiens, besonders die Gewächse. In seinem Alter hatte er das Unglück das Gesicht einzubüssen, so dass er alle Gegenstände durchs Gefühl betasten musste. Er starb 1706. Seine Zeichnungen und Manuscripte hat J. Burmann herausgegeben **).

Johann Gottlieb Gmelin, wurde 1710 in Tübingen geboren, ging auf Anrathen einiger Freunde 1727 nach Petersburg, wo er von der Academie nach einer Zeit als Mitglied aufgenommen wurde. Er machte eine Reise durch Sibirien, und starb 1755. Aus den zurückgelassenen Handschriften des unglücklichen *Stellers* schrieb er ein Werk ***), dessen beider Theile nach seinem Tode herauskamen.

*) Joh. Friedr. Gronovii flora virginica. Pars I. Lugd. 1743, 8vo.

Ejusd. Flora orientalis. Lugd. 1755, 8vo.

**) Georgii Everhardi Rumphii Herbarium amboinense. T. I—VI. cum auctuario. Amst. 1750—1755, Folio 694 Kupfern.

***) Joh. Gottl. Gmelin Flora sibirica. Tom. I—II. Leningrad. 1748—1769, 4to, mit 299 Kupfern. Die letzten Theile sind von seinem Brudersohn Sam. Gmelin herausgegeben.

VIII. Geschichte der Wissenschaft. 595

Johann Hill, ein Engländer, hatte die Idee, alle vom Linné erwähnten Pflanzen in Kupfer stechen zu lassen. Dies grosse Werk *) ist aber fast für Jedermann der schlechten Abbildungen und des ungeheneren hohen Preises wegen unbrauchbar. Die Pflanzen sind höchstentheils nicht nach der Natur, sondern nach Beschreibungen gemacht; man kann leicht denken, dass sie auf diese Art den natürlichen nicht einmal ähnlich sind.

Carl Allione, Professor der Botanik zu Turin. In vor wenigen Jahren verstorbener Kräuterkenner, der sich sehr um die Gewächse seines Vaterlandes Verdienst gemacht hat **).

George Christian Oeder wurde nach Kopenhagen im Jahre 1752 gerufen, wo er als Professor der Botanik angestellt ward. Im Jahre 1770 hob man das Institut, bei dem er angestellt war, auf. Er wurde darauf Stiftsamtmann in Drontheim und zuletzt ging er als Landvogt nach Oldenburg, wo er bis an das Ende seines Lebens, was den 28. Januar 1791 erfolgte, blieb. Wenige Jahre vor seinem Tode liess er sich in den Adelstand erheben. Ausser mehreren botanischen Schriften, hat er sich vorzüglich durch die Herausgabe der Flora Danica, die vom König von Dänne-

Smelin herausgegeben; der fünfte Theil aber, welcher von den Cryptogamisten handelt, ist nicht erschienen.

*) Johann Hill vegetable System Vol. I—XXVI. London 1759—1775, Fol. mit 1521 Kupfern, worauf 5624 Pflanzen abgebildet sind, worunter sich aber kein Baum, Gras oder Cryptogamist befindet.

**) Caroli Allionii Flora pedemontana. Tom. I. II. III. August. Taurin. 1785, Fol. mit 92 Kupfern.

596 VIII. Geschichte der Wissenschaft.

mark noch gegenwärtig unterstützt wird, verdient gemacht *).

Nicolaus Laurentius Burmann, kürzlich verstorbener Professor zu Amsterdam, ein Sohn des Johann Burmann, hat die grosse Kräutersammlung, welche ihm sein Vater hinterliess, zum Vortheil für die Wissenschaft benutzt, und nach Art seines Lehrers, des grossen Linné, bekannt gemacht **).

Johann Anton Scopoli, wurde zu Fleimstahl in Tyrol 1723 geboren. Grösstentheils ohne Unterricht ward er durch sich selbst der grosse Mann, der scharfe Beobachter der Natur. Er war erstlich Arzt zu Idria, kam darauf nach Schemnitz in Ungarn als Professor, und zuletzt nach Pavia, wo er den 3. Mai 1788 starb. Durch viele microscopische Untersuchungen verlor er ein Jahr vor seinem Ende das Gesicht. Es ist zu verwundern, wie ein Mann, dessen ganzes

*) *Flora Danica*. Hafn. Fol. Oeder fing dieses prächtige illuminierte Werk an herauszugeben im Jahre 1766. Er hat drei Bände bis zum Jahre 1770 besorgt. Jeder Band enthält 3 Hefte und das Heft hat 60 Kupfertafeln. Nach ihm hat der berühmte Zoologe, der Conferenz-Rath Otto Friedrich Müller es fortgesetzt, der im Jahre 1787 starb. Nach dessen Tode wurde die Herausgabe dem Prof. Vahl aufgetragen, und gegenwärtig sind 21 Hefte davon erschienen; also 1260 Kupfertafeln dänischer Gewächse. (Nach Vahls Tode setzt Prof. Hornemann das Werk fort. L.)

**) N. L. Burmanni *Flora indica*. Lugd. 1768, 4to, mit 67 Kupfern, worauf 176 der seltensten Gewächse abgebildet sind.

VIII. Geschichte der Wissenschaft. 597

Leben aus einer Kette von Unglücksfällen zu bestehen scheint, es so weit hat bringen können *).

Johann Christian Daniel von Schreber, wurde 1739 geboren. Er ist gegenwärtig Geheimer Hofrath, Präsident der Kaiserlichen Academie und Professor in Erlangen. Ein Schüler des Linné und einer unserer grössten Botaniker, dessen grosse Verdienste allgemein anerkannt sind. Seine Werke haben das Gepräge des reifsten Nachdenkens und der richtigsten Beobachtungen **). (Er starb 1810. L.)

Nicolaus Joseph Edler von Jacquin ward in den Niederlanden geboren; reiste auf Kosten des Kaiser Franz des Ersten nach Westindien, wurde darauf Professor in Schemnitz, von wo er als Professor nach Wien ging. Dieser noch lebende grosse Botaniker, hat sich um die Erweiterung der Wissenschaft sehr verdient gemacht, so dass wir durch ihn die meisten neuen Entdeckungen im botanischen Fache erhalten haben. Nur Schade, dass seine Werke alle sehr kostbar sind ***).

*) Joh. Ant. Scopoli *Flora carniolica*. T. I. II. Vindb. 1772, 8vo, mit 65 Kupfern.

Ejusd. *Deliciae Florae et Faunae Insubricae*. T. I. II. et III. Ticini 1786. Fol. mit 75 Kupfern. Ein sehr prächtiges Werk, von dem nur wenig Exemplare vorhanden sind.

**) J. C. D. Schreberi *Spicilegium Florae lipsiensis*. Lips. 1771, 8vo.

Dessen Beschreibung der Gräser, 1ster und 2ter Theil, 1ste bis 3te Ausgabe. Leipz. 1769—1780, mit 40 illuminirten Kupfern. Schade, dass der würdige Verfasser dieses treffliche Werk nicht fortsetzt.

***) N. Jos. Jacquini *Flora austriaca*. Vol. I—V. Vindob.

598 VIII. Geschichte der Wissenschaft.

(Er starb 1817. Sein Sohn Joseph Franz, Professor der Botanik zu Wien, hat sich durch die *Eclogae botanicae*. Vol. I. Vienn. 1816. Fol., und andere Schriften bekannt gemacht. L.)

Johann Christian Schäffer, geistlicher Rath zu Regensburg, darf hier nicht mit Stillschweigen übergangen werden, da er der erste war, welcher die Pilze in farbigen Abbildungen besonders herausgab. Für den deutschen Botanisten ist sein Werk in Rücksicht der grössern Arten klassisch *).

1773—1778, Fol. mit 500 illuminirten Kupfern. Ein seltenes Werk.

Ejusd. *Miscellanea austriaca*. Vol. I. II. Vindob. 1778, 1781, 4to, mit 44 illuminirten Kupfern.

Ejusd. *Collectanea ad Botanicam, Chymiam et Historiam naturalem*. Vol. I—V. Vindob. 1786—1796, 4. mit 106 illuminirten Kupfern.

Ejusd. *Icones plantarum rariorum*. Vol. I—III. Vindob. 1781—1793, Fol. mit 648 illumin. Kupfern.

Ejusd. *Oxalis*. Vindob. 1794, 4to, mit 81 Kupfern, von denen 75 illuminirt.

Ejusd. *Plantarum rariorum horti caesarei Schönbrunnensis descriptiones et icones*. Vol. I. II. Vindob. 1797, Fol. mit 250 illuminirten Kupfern.

Ejusd. *Fragmenta botanica*. Fasc. I. Vindob. 1800, mit 13 illuminirten Kupfern und dazu gehörigem Text, worin mehrere von ihm nicht abgebildete Gewächse beschrieben sind.

*) D. Jac. Christ. Schäffer *Fungorum qui in Bavaria et Palatinatu circa Ratisbonam nascuntur icones, nativis coloribus expressae*. Vol. I—IV. Ratisb. 1762, 4to, mit 330 illuminirten Kupfern. Der vierte Theil enthält die systematische Bestimmung aller.

VIII. Geschichte der Wissenschaft. 599

Carl von Linné, der Sohn, wurde zu Upsal den 2ten Januar 1741 geboren. In seinem neunzehnten Jahre wurde er schon Demonstrator der Botanik, erhielt nach des Vaters Tode die botanische Professur und starb den 1sten November 1783. Er hatte grosse botanische Kenntnisse, aber den Vater übertraf er nicht *).

Peter Jonas Bergius, Professor der Naturgeschichte zu Stockholm, ist durch seine vortrefflichen Untersuchungen einiger capschen und surinamischen Gewächse erühmt worden **).

Samuel Gottlieb Gmelin, Professor der Botanik in Petersburg, ein Brudersohn des vorigen, wurde 1753 geboren. Er wurde auf seinen Reisen in den asiatisch-russischen Provinzen vom Chan der Chaitakken gefangen genommen, und starb 1774 kurz vor seiner Entlassung im Gefängnisse. Durch eine genaue Beschreibung der Seegewächse hat er sich sehr berühmt gemacht ***).

Peter Simon Pallas, wurde in Berlin 1740 geboren, ging nach Petersburg, wo er auf Kosten der Kaiserin Katharina der Zweiten durch die asiatischen un-
ter Russland stehenden Länder Reisen machte. Mit den Früchten dieser Reise hat uns dieser grosse Na-

*) Carl a Linné Supplementum plantarum. Brunsw. 1781, 8vo.

**) P. Jon. Bergii Plantae capenses. Holmiae 1767, 8vo, mit 5 Kupfern.

***) Sam. Gottl. Gmelini Historia Fucorum. Petrop. 1768, 4to, mit 33 Kupfern.

Dessen Reisen durch Russland, 1ster bis 3ter Theil. Petersburg. 1770—1789, 4to, mit 18 Kupfern.

600 VIII. Geschichte der Wissenschaft

turforscher auf der Kaiserin Kosten kürzlich bekannt gemacht. Es wäre zu wünschen, dass dies prächtige Werk bald von ihm fortgesetzt würde *). (Starb 1810 zu Berlin, wo er das Ende seines Lebens in Ruhe zubringen wollte. L.)

Johann Gerhard König, aus Kurland gebürtig, hatte die Apothekerkunst erlernt, studirte nachher unter Linné. Er ging darauf nach Kopenhagen, von wo aus er eine Reise nach Island im Jahre 1765 unternahm. Nach seiner Rückkunft ging er als Missions-Arzt im Jahre 1768 nach Trankbar in Ostindien. Auf der Hinreise sammelte er am Vorgebürge der guten Hoffnung viele damals noch unbekannte Pflanzen, die er seinem Lehrer Linné übersandte. Sein Eifer für die Kräuterkunde war unbegrenzt, nur waren seine Glücksumstände nicht die glänzendsten. Er trat zwar als Naturforscher in die Dienste des Nabob von Arcot, wodurch sein Gehalt sich vermehrte, was er auf Er-

*) P. S. Pallasii Flora Rossica. Tom. I, Pars I. II. Petropol. 1784, 1788, Fol. mit 100 illuminirten Kupfern. Man hat einen Abdruck des Textes in 8vo.

Ejusd. Species Astragalorum descriptae et iconibus coloratis illustratae cum appendice. Lips. 1800, Fol. mit 91 illum. Kupfern. In diesem Werke sind alle Arten der Gattung Astragalus, die dem Verfasser bekannt waren, beschrieben, und grösstentheils abgebildet. Ausser dem aber sind noch einige neue Arten von Robinia und Sophora durch Beschreibungen und Abbildungen darin erläutert.

(Illustrationes plantarum imperfecte vel nondum cognitae. Lips. 1803—1806. Fasc. 1—4. Fol. über Sahnpflanzen.

Icones plantarum selectarum. Lips. 1809. Fol. L.)

VIII. Geschichte der Wissenschaft. 601

rechnung der Natur verwandte, aber er fand bei dieser Verbesserung, dass dieses Gehalt dem ungeachtet nicht hinreichte, seinen grossen Plan auszuführen; daher hielt er beim Directorium von Madras um eine Erlaubnis an, die ihm auch bewilligt wurde. Er starb, ehe seine gesammelten Entdeckungen der Welt vollständig bekannt zu machen, den 26. Junius 1785. Einige Abhandlungen stehen von ihm in verschiedenen indischen Schriften, und in Retzii *observationes botanicae* ist im 3ten Heft seine meisterhafte Beschreibung aller ostindischen Monandristen, und im sechsten Heft die Bestimmung aller indischen Epidendrumarten.

Christian Friis Rottböll, im Jahre 1797 verstorben, war Professor der Botanik zu Copenhagen, hat sich durch die Bekanntmachung vieler ausländischen Pflanzen sehr berühmt gemacht. Sein grösstes Verdienst steht in der Bestimmung verschiedener exotischer Pflanzensorten *).

Fusée Aublet, ein Franzose, widmete sich der Apothekerkunst, reiste mit guten botanischen Kenntnissen nach Gujana in Amerika. Nachdem er dort eine sehr grosse Menge Entdeckungen im Pflanzenreiche gemacht hatte, ging er nach der Insel Frankreich oder Mauritius, kehrte endlich nach Frankreich zurück, wo er vor mehreren Jahren gestorben ist. Es ist nur zu beklagen, dass Aublet nicht zuverlässig in der Angabe der Gattungscharacteristika ist. Neuere Kräuterkenner, welche die von ihm besuchten Gegenden bereiset

*) Christiani Friis Rottboell *Descriptiones et Icones plantarum*. Hafniae 1773, Fol. mit 21 Kupfern. Man hat vom Jahre 1786 eine unabgeänderte Auflage.

602 VIII. Geschichte der Wissenschaft.

haben, fanden, dass die Zergliederungen der Pflanzen viele Unrichtigkeiten enthalten, und dass es scheint, als habe er diese nach Willkühr entwerfen lassen *). *Johann Reinhold Forster*, vormals Professor in Halle, und sein Sohn *George Forster*, Geheimer Rath und Bibliothekar zu Maynz, machten mit Capitain Cook eine gemeinschaftliche Reise um die Welt. Mit denen bei dieser Gelegenheit entdeckten Gewächsen haben uns beide grosse schon verstorbene Naturforscher bekannt gemacht **).

Conrad Mönch, Hofrath und Professor zu Marburg, hat sich besonders durch viele gute botanische Beobachtungen berühmt gemacht ***).

*) *Fusée Aublet Histoire des plantes de la Gujane Française. Tom. I—IV. Londres et Paris 1775, 4to, mit 302 Kupfern.*

**) *Joh. Reinh. Forsteri Characteres generum plantarum, quas in itinere ad insulas maris australis collegit. Lond. 1776, 4to, mit 75 Kupfern.*

Georg Forsteri Plantae esculentae insularum oceani australis. Halae 1786, 8vo.

Ejusd. Florulae insularum australium prodromus. Göttingae 1786, 8vo.

**) *C. Moench Enumeratio plantarum indigenarum Hassiae, praesertim inferioris. Pars Prior. Casselis 1777, 8vo. Der zweite Theil ist nie erschienen.*

Ejusd. Verzeichniss ausländischer Bäume und Sträucher des Lustschlosses Weissenstein bei Cassel. Frankf. und Lpz. 1785, 8vo mit 8 schwarzen Kupfern.

Ejusd. Methodus plantas horti botanici et agri Marburgensis a staminum situ describendi. Marburgi 1794, 8vo.

VIII. Geschichte der Wissenschaft. 603

Die Bestimmungen der Gattungen sind vorzüglich gut. L.)

Bulliard, 1796 verstorbener Demonstrator der Botanik zu Paris, hat verschiedenes über die um Paris wachsenden Pflanzen geschrieben, und in seinem innern Werke die seltensten Pilze bestimmt *).

Ritter Lamarck, Professor der Helminthologie, und Mitglied des National-Instituts zu Paris, hat sich durch ein grosses botanisches Werk **) als einer der geachteten Botaniker gezeigt.

Andreas Johann Retzius, noch lebender Professor der Botanik zu Lund in Schweden, wurde den 3. October 1742 geboren. Viele durch Reisende entdeckte neue Gewächse, und einige sehr gute Beobachtungen danken wir diesem gründlichen Naturforscher ***).

Carl Peter Thunberg, Ritter des Wasa-Ordens und Professor zu Upsal, ist eines Land-Predigers Sohn, der Holland und Frankreich besuchte, und, in Holland von Freunden unterstützt, Reisen nach dem Berglande der guten Hoffnung, Zeylon, Java und Japan machte. Er hat sehr vieles über einige Gegenden des Pflanzenreichs geschrieben, und wir haben noch mehr von ihm zu erwarten. Seine japanische

*) Bulliard Herbiez de la France, Paris ohne Jahreszahl, Fol. mit 600 sehr sauber illumin. Kupfern.

**) Chevalier de Lamarck Encyclopédie méthodique, T. II. III. Paris 1783, 1784, 4to, mit vielen Kupfern. Dieses Werk ist nachher von mehreren Botanikern fortgesetzt worden.

***) And. Joh. Retzii observationes botanicae, Fasc. I—IV. psiae 1779—1791, Fol. mit 19 Kupfern. (Vor kurzem gestorben. L.)

ausserhaupt der wissenschaftlichen Naturphi-
ben von ihm ein prächtiges Werk, als
vom Südindien, zu erwarten. Dieser
scher ist der Beförderer aller Ken-
tur *). (Starb 1826 im hohem Alter

Wir begnügen uns, um nicht zu
sein, einige berühmte Kräuterkenner

*) C. P. Thunbergii Flora Japonica.
mit 29 Kupfern.

Ejusdem Icones plantarum Japonicarum
Fol. davon erst 20 schwarze Kupfer ersch
fortgesetzt. L.)

Ejusd. Prodrömus plantarum capensis
8. mit 3 Kupfern. Enthält die kurzen Cl
Vorgebirge der guten Hoffnung von ihm
zen. Die vollständige Flora capensis w
scheinen, wodurch der sehnliche Wunsch
befriedigt wird. (Der Anfang ist bereits e

VIII. Geschichte der Wissenschaft. 605

anzuführen, die eine genauere Anzeige verdienten, als: *Miller, Ludwig, Amman, van Royen, Jussier, Sauvages, Gesner, Steller, Gerber, Georgi, Lottard, Messerschmidt, Kalm, Hasselquist, Osbeck, Pong, Vandelli, Forskal, Adanson, Schmiedel, Moon, Lightfoot, Gouan, Necker, Weigel, Mur- re, Commerson, Sparrmann, Wulffen, Leers, Cranz, Reus, Pollich, Weber, Asso, u. m. a.*

A C H T E E P O C H E.

Von Hedwig bis jetzt, vom Jahre 1782 bis 1810.

386. Obgleich Linné alle natürlichen Producte kante, und im Gewächsreich das Geschlecht der pflanzen beobachtete, so war er doch so glücklich gewesen, bei den Cryptogamen diese Theile zu sehen. Nur allein *Hedwig* hatte das Glück, dies Geheimniss der Natur zu belauschen. Ihm verdanken wir eine bessere Kenntniss der Cryptogamie. Viele verdienstvolle Männer haben die gefährlichsten Reisen in alle Gegenden des Erdballs unternommen, von denen haben wir noch die Bekanntmachungen vieler neuen Produkte zu erwarten. Dies ganze Jahrhundert kann in Rücksicht der Naturgeschichte mit Recht das Jahrhundert der Entdeckungen genannt werden. Wenn aber den Naturforschern mehr der Nutzen ihrer Arbeiten am Herzen läge, so würden sie uns nicht mit so grossen theuren Werken, und oft wiederholten Bildungen beschenken, welche dies Studium zum Untharsten machen. Seit *Linnés* Tode haben wir das Unglück, eine Pflanze unter sechs verschiedenen Namen, und schon bekannte mit neuen Benennungen zu erhalten. Bleibt diese Anarchie in unserm Studio,

606 VIII. Geschichte der Wissenschaft.

so haben wir die alten Zeiten zu erwarten, wo je nach Willkühr die Pflanzen umtauft.

Johann Hedwig, wurde den 8. October 1730 in Kronstadt in Siebenbürgen geboren. Er studirte in Leipzig, ging von dort nach Chemnitz im Erzgebirge als Arzt, verliess 1781 diesen Ort und liess sich in Leipzig nieder, wo er im Jahre 1789 als Professor der Botanik angestellt ward. Schon in Chemnitz entdeckte er die wahren Blumen der Moose. Der 17. August 1774 war der so merkwürdige Tag, an dem er *Dicranum pulvinatum* unter einer starken Vergrößerung die Blumen dieser Gewächse zuerst sah. Er setzte diese merkwürdige Entdeckung fort, und dehnte sie auf die übrigen Cryptogamen aus. Durch ihn wurde die Cryptogamie eine völlige Reform und zweckmässige Gattungen erhalten. Er starb viel zu früh für die Wissenschaft, den 18. Februar 1799 *).

*) *Joannis Hedwigii Fundamentum Historiae naturalis muscorum frondosorum. Pars I. II. Lipsiae 1782, mit 10 Kupfern.*

Ejusd. Theoria generationis et fructificationis plantarum cryptogamicarum. Petropol. 1784, 4to, mit 37 illuminirten Kupfern. Davon ist 1798 eine stark vermehrte und verbesserte Auflage erschienen.

Ejusd. Descriptio et Adumbratio muscorum frondosorum. Tom. I—IV. Lipsiae 1787—97, mit 160 sauber illuminirten Kupfern. Wird nicht weiter fortgesetzt.

Ejusd. Species Muscorum. Lips. 1801, 4to, mit 77 illuminirten Kupfern. Dieses vortreffliche Werk ist nach dem Tode des Verfassers durch den D. Schwägrichen zu Leipzig herausgegeben worden, der uns auch einen Nachtrag zu verspricht. (Vier Bände sind erschienen. L.)

VIII. Geschichte der Wissenschaft. 607

Jonas Dryander, Magister. Ein Schwede von Geburt, der sich bei Sir Joseph Banks aufhält. Er ist im gründlicher Kräuterkenner, der sich durch einzelne Abhandlungen sehr verdient um die Botanik gemacht hat. Die Beschreibungen der Banks'schen Büchersammlung, die er herausgegeben hat, zeigt von seinen Kenntnissen *). (Starb 1810. L.)

Carl Ludwig l'Heritier de Brutelle, der 1800 zu Paris gestorben ist, hat sich durch Bekanntmachung verschiedener neuen Pflanzen berühmt gemacht. Besonders hat er viele peruvianische Gewächse, die *Combey* auf seiner Reise entdeckte, beschrieben. Seine Werke sind alle in ungewöhnlich grossem Format geschrieben, mit vielen saubern Kupfern und äusserst costbar **).

*) *Catalogus Bibliothecae historico-naturalis Josephi Banks auctore Jona Dryander. Tom. III. Londini 1797, 8.* Der dritte Band enthält die botanischen Schriften, welche nach einer besondern Ordnung aufgestellt sind. Was aber dieses Werk jedem Botaniker unentbehrlich macht, ist, dass nach dem Linné'schen System alle bekannte und neue Pflanzen, welche die Botaniker in periodischen Schriften, und in Abhandlungen von Akademien und gelehrten Societäten beschrieben haben, genau aufgeführt sind.

**) *C. Lud. l'Heritier Cornus. Parisiis 1788, Fol. mit 6 Kupfern.*

Ejusd. Sertum Anglicum. Parisiis 1788, Fol. mit vielen Kupfern. Dieses Werk ist nicht beendigt.

Ejusd. Stirpes novae, Fasc. I—IV. 1784—1789, Fol. mit 84 schwarzen sauber gestochenen Kupfern. Ob dieses Werk, so wie seine *Geraniologie* und *Sertum anglicum* fortgesetzt wird, ist noch nicht bekannt.

608 VIII. Geschichte der Wissenschaft.

George Franz Hoffmann, aus dem Baierschen gebürtig, vormals Professor in Göttingen, gegenwärtig in Moskau, hat einige noch nicht genug bestimmte weitläufige Gattungen durch genaue Abbildungen und Beschreibungen sehr gut auseinander gesetzt (Starb 1826. L.)

Anton Joseph Cavanilles, aus Valencia gebürtig, ein Abbé, der sich beim spanischen Gesandten in Paris aufhielt (er ging als Erzieher des Duque del Infantado mit demselben nach Paris L.) nachher in Madrid Professor der Botanik war, und im Jahre 1803 starb, hat verschiedene Länder Spaniens bereiset, und sich um die Wissenschaft durch die Bekanntmachung und gründliche Auseinandersetzung der Monadelph

Ejusdem *Geraniologia seu Erodii, Pelargonii, Geranii Monsoniae et Grieli historia, iconibus illustrata.* Paris 1787, Fol. Es sind nur 44 Kupfer ohne Text bis jetzt erschienen. Er hat uns noch eine Beschreibung der Gattung *Solanum*, und die Herausgabe von *Dombay* fl. peruviana versprochen.

*) *Georgi Francisci Hoffmanni Enumeratio Lichenum* Fasc. I—IV. Erlangae 1784, 4to, mit vielen Kupfern. Schade, dass er dies Werk nicht fortsetzt.

Ejusd. *Historia Salicum.* Tom. I. Lipsiae 1785, Fol. mit 24 Kupfern. Dies Werk ist noch nicht beendigt, und es wäre zu wünschen, dass der Verfasser es fortsetze.

Ejusd. *Plantae Lichenosae.* Tom. I—III. Lipsiae 1786, 1796, Fol. Jeder Band hat 24 prächtige illuminierte Kupfer, es wird fortgesetzt. Dies Werk ist für den Botaniker sehr brauchbar, nur sind die Gattungen nicht zum glücklichsten benannt. (Seitdem nicht fortgesetzt *Genera Plantarum umbellatarum.* Mosquae 1814. 8. L.)

VIII, Geschichte der Wissenschaft. 609

rühmt gemacht. In einem besondern Werke hat er
e im botanischen Garten zu Madrid seltenen, so wie
nige spanische Gewächse und mehrere andere die
se in Südamerika entdeckte, beschrieben *).

Johann Jacob Römer und *Paulus Usteri*, zwei
ärzte in Zürich, haben sich dadurch um die Botanik
hr verdient gemacht, dass sie Journale für dieselbe
rausgaben, worin viele Entdeckungen gesammelt
nd, und das Studium mehrere Liebhaber als zuvor
kam. Anfangs gaben sie ein solches Journal ge-
sinschaftlich heraus **), hernach aber hat jeder ein
sonderes errichtet ***).

Jóseph Gärtner, Arzt zu Kalve bei Stuttgart, ist

f) Ant. Jos. Cavanilles *Monadelphiae Classis Dissertatio-
e decem. Matriti 1790. 4to, mit 296 schönen Kupfern.*

*Ejusd. Icones plantarum. Vol. I—VI. Matriti 1791—
101. Fol. Jeder Band hat 100 sauber gestochene schwarze
opfer.*

**) *Magazin für die Botanik*, herausgegeben von J. J. Rö-
mer und P. Usteri, 1—4 Band. Zürich 1787—1790. 8vo.

**) Herr D. Usteri gab nachher heraus:

Annalen der Botanik 1—2 Bd. Zürich 1792, 1793. 8.

Neue Annalen der Botanik 1—18 Stück. Zürich 1794—
100. 8.

Dieses letzte Journal enthält sehr viele interessante Nach-
richten.

(Kurz vor seinem Tode 1818 übernahm Römer mit
m Professor Schultes zu Landshut ein grosses Werk:
ar. a Linné *Systema Vegetabilium editio decima quinta*
r. J. J. Römer et J. A. Schultes. Stuttgart. 1817. Er
ar nur an den vier ersten Bänden Mitarbeiter; nach sei-
m Tode setzt Herr Schultes das Werk allein fort.)

Willdenow's Grundriss. 1 Th.

610 VIII. Geschichte der Wissenschaft.

im Jahre 1791 gestorben. Er hat sich ein grosses Verdienst um die richtige Bestimmung der Samen gemacht. Sein Werk ist eins der brauchbarsten, weil es eine grosse Lücke in der Kenntniss dieser Theile ausfüllt *).

Olof Swartz, Professor zu Stockholm, hielt sich in den Jahren 1783 bis 1787 in Westindien auf, wo er, obgleich vor ihm Browné, Sloane, Plumier, Aublet, Jacquin und einige andere diese Länder bereist hatten, viele noch ganz unbekannte Gewächse entdeckte. Er hat uns mit den neu entdeckten Schätzen jener Weltgegend bekannt gemacht, und viel zur genauern Kenntniss dieser Gewächse beigetragen, besonders hat die Kenntniss cryptogamischer Gewächse und der Orchideen durch seine Entdeckungen gewonnen **). (Starb 1818. L.)

Jacob Eduard Smith, ein Arzt zu London, und Präsident der Linnéischen Societät daselbst, hatte das

Herr D. Römer hat ein neues Journal angefangen, was sich durch Eleganz und Wahl der Gegenstände auszeichnet, nämlich:

Archiv für die Botanik, 1ster Band und 2ten Bandes 1—3 Stück. Leipzig 1796—1801, 4to

(Es sind im Ganzen drei Bände erschienen, die bis zum Jahre 1803 gehen. L.)

*) *Josephi Gärtneri de fructibus et seminibus plantarum*. Vol. I. II. Stuttgart 1788. 1791, 4to, mit 180 saubern Kupfern.

**) *Olof Swartz nova genera et species plantarum seu Prodromus descriptionum vegetabilium maximam partem incognitorum, quae sub itinere in Indiam occidentalem digessit*. Holmiae 1788, 8vo.

VIII. Geschichte der Wissenschaft. 611

ick, die ganze Linnéische Kräutersammlung an sich kaufen. (Starb 1828. L.)

In glücklichere Hände konnte wohl nicht leicht die Sammlung gelangen, denn viele seltene und bis so ungewiss bekannte Gewächse derselben Sammlung, hat er uns besser bestimmt, so wie er sich auch die Bekanntmachung vieler neuer Pflanzen, besonders neuholländischer, und um die sichere Eingangs besserer Gattungen bei den Färrnkräutern, ein lebendes Verdienst erworben hat. Seine Schriften sind dem Botaniker sehr wichtig *).

Wilhelm Aiton, Aufseher des königlichen Gartens Kew bei London, starb 1794. Er war ein guter

Ejusd. *Observationes botanicae*. Erlangae 1791. 8. mit Kupfern.

Ejusd. *Icones plantarum incognitarum quas in India identitali detexit atque delineavit*. Fasc. I. Erlang. 1794. Es sind bis jetzo nur erst 6 sauber illuminierte Kupfer erschienen.

Ejusd. *Flora Indiae occidentalis aucta atque illustrata descriptiones plantarum in prodromo recensitarum*. T. I. Erlangae 1797, 1798. Wird noch fortgesetzt. Der erste Theil hat 15 saubere Kupfer, worauf die Zergliederung neuen Gattungen vorgestellt ist.

Ejusd. *Synopsis filicum*. Kiliae 1806. 8. mit 5 Kupfern.

) Jacobi Eduard Smith, *Plantarum icones hactenus inae*. Londini Fasc. I. II. III. 1789—1791. Fol. mit 75 saubern Kupfern:

Ejusd. *Icones pictae plantarum rariorum*. Fasc. I—III. d. 1790—1793. Fol. maj. Ein kostbares Werk, in jedem Heft desselben sind 6 sauber illum. Kupfer.

612 VIII. Geschichte der Wissenschaft.

Beobachter, und hat uns eine schöne Beschreibung d. Pflanzen des Kewschen Gartens gegeben *).

Anton Laurentius von Jussieu, Professor am Museum zu Paris, und Mitglied des National-Instituts hat mit überaus grossem Scharfsinn die Gattungen in ein natürliches System aufgestellt, und seinen natürlichen Familien sowohl künstliche, als auch habituelle Charaktere gegeben, so dass der Ueberblick der ganzen Vegetation dadurch sehr erleichtert, und das Studium fester begründet wird. Von seinem vorzüglichen Werke **), wird bald durch ihn selbst eine umgearbeitete Auflage erscheinen. (Noch nicht erschienen. L.)

Johann von Loureiro, ein Portugiese, ging als Missionair nach Cechinchina; da er aber ohne Arzneikunde sich keinen Eingang verschaffen konnte, so

EjUSD. Specimen of the Botany of New Holland. Vol. I. Fasc. I—IV. Lond. 1793, 1794. 4. Jedes Heft enthält 4 illuminirte Kupfer.

EjUSD. Flora britannica. Vol. I. II. III. 1800. 8vo. Dieses Werk geht bis zur 24 Klasse zur Ordnung Musci, die übrigen Cryptogamen werden in einem besondern Theile nachfolgen.

*) Hortus Kewensis or a catalogue of the plants cultivated in the Royal Botanic Garden at Kew by William Aiton. Vol. I. II. III. London 1789. 8., mit wenigen sauberen Kupfern. Es wird jetzt eine neue Auflage von diesem brauchbaren Werke erscheinen. (Erschienen Lond. 1813—1813. Vol. 1—5. 8. L.)

**) Antonii Laurentii de Jussieu genera plantarum secundum ordines naturales disposita. Parisiis 1789. 8. Eine Ausgabe besorgte davon Usteri zu Zürich im Jahre 1791.

VIII. Geschichte der Wissenschaft. 613

te er die Produkte des Gewächsreichs. Nach einem dreissigjährigen Aufenthalte ging er über Kanton portugiesischen Schiffen nach Mozambique, und kehrte nach Portugal zurück. Wir haben von ihm ein sehr schätzbares Werk über die auf seiner Reise gesammelten Pflanzen erhalten *).

Jacob Julian La Billardiere, Arzt zu Paris, wollte nachdem er zuvor die Gebirge der Dauphiné und von Savoyen durchreiset hatte, unterstützt vom Minister Vergennes, eine botanische Reise durch Kleinasien bis an das caspische Meer unternehmen. Er kehrte von Marseille den 19. November 1786 ab, und kehrte den 26. Februar 1787 nach Syrien. Die Pest, welche aber damals sehr heftig in den Gegenden, die er bereisen wollte, wüthete, und ein Krieg der nachher ausbrach, veränderten seinen Entschluss, dass er Syrien untersuchen konnte. Funfzig bis sechzig entdeckte Pflanzen hat er in einem besondern Werke meisterhaft zu beschreiben den Anfang gemacht. Mit dem Schiffe, was den unglücklichen Entdeckungsegler La Peyrouse aufsuchen wollte, machte er die Reise als Naturforscher, und gab uns eine Beschreibung der Gewächse Neuhollands **).

*) *Joannis de Loureiro Flora Cochinchinensis*. Tom. I. II. Ulissiponae 1790. Eine Octav-Ausgabe mit Anmerkungen, die ich 1793 im Haude-Spenerschen Verlage besorgte.

**) *J. J. Billardiere Med. D. Icones plantarum rariorum Asiae descriptionibus et observationibus illustratae*. Parisiis. Decas I. 1791. Decas II. 1791. Die Kupfer und Beschreibungen sind vortreflich. Schade, dass nichts weiter davon erschienen ist.

Es sind bis 1812 fünf Decaden erschienen. L.)

614 VIII. Geschichte der Wissenschaft.

Martin Vahl, Professor in Kopenhagen, starb den 24. December 1804, er hatte durch den grössten Theil von Europa und im nördlichen Afrika Reisen unternommen. Die arabischen Forskalschen Pflanzen, so wie die westindischen Gewächse, welche seine Freunde von Rohr, Ryan und West gesammelt hatten, und viele asiatische Pflanzen, so wie eine grosse Menge selbst beobachteter, hat er in seinen Schriften bekannt gemacht *), und sich als einen der grössten Botaniker unsers Jahrhunderts gezeigt. Kurz vor seinem Tode fing er ein Werk an, das die Beschreibung aller bekannten Gewächse enthalten sollte, wovon aber der erste Theil nur durch ihn erschienen ist *).

Friedrich Stephan, Professor und Collegienrath

Novae Hollandiae plantarum specimen. Tom. I. II. Paris 1804. 1806. 4to. Es enthält 265 schwarze Kupfersteine, worauf alle neue von ihm in jener Weltgegend entdeckten Pflanzen vorgestellt sind.

(*Sertum austro-caledonicum. Vol. 1. 2. Paris. 1824. 1825. Fol. L.*)

*) Martini Vahl *Symbolae plantarum. Pars I—III. Hafniae 1790—1794. Fol.* jeder Theil hat 25 Kupfer, folglich enthalten alle Bände deren 75.

Ejusd. *Eclogae botanicae Fasciculus I. II. Hafniae 1798. 1798.* Das Heft hat 10 schwarze Kupfer.

Ejusd. *Icones illustrationi plantarum americanarum et eclogis descriptarum inservientes. Decas I. II. Hafniae 1798. 1799. Fol.*

*) Ejusd. *Enumeratio plantarum vel ab aliis vel ab ipso observatarum. Vol. I. Hafniae 1804. 8. Vol. II. Hafniae 1805. 8.;* ist durch die Hrn. Tönder Lund, Hornemann, Thonning besorgt, die auch die Fortsetzung liefern werden.

VIII. Geschichte der Wissenschaft. 615

1. Moskau, aus Leipzig gebürtig, hat sich besonders verdienstlich um die Flor von Moskau erworben *), und so haben wir von ihm ein schönes Werk über neue asiatische Pflanzen zu erwarten.

Friedrich Alexander von Humboldt, Königlich russischer Kammerherr, und Ritter des rothen Adler-Ordens, (erster Klasse, und wirklicher Geheimerath. L.) wurde zu Berlin den 14. September 1769 geboren. Alle Fächer der Naturkunde umfasst er mit sichem Erfolge, so dass alle ihm bedeutende Aufklärungen und Zusätze verdanken. Er unternahm in Gesellschaft eines hoffnungsvollen Botanikers *Aimé Bonpland* eine Reise durch den grössten Theil der spanischen Besitzungen von Amerika, und brachte einen reichen Schatz von Naturalien mit sich zurück. Von seinen Entdeckungen im Pflanzenreiche ist erst folgendes bekannt gemacht **).

*) F. Stephan enumeratio stirpium agri Mosquensis. Moscae 1792. 8.

Ejusd. Icones plantarum mosquensium. Decas I. Moscae 1795. Fol.

**) Florae fribergensis specimen edidit Frid. Alex. ab Humboldt. Berolini 1793. in 4., mit vier schwarzen sauberen Kupfern, worauf 19 neue unterirdische Gewächse vorgestellt sind. Sein erstes botanisches Werk, was besonders Rücksicht der unterirdischen Cryptogamen und der physischen Bemerkungen wichtig ist.

Plantes équinoxiales de Mrs. Alexandre de Humboldt et de Bonpland. Tom. I. Paris 1805. Fol.

Eorund. Monographies de Melastome et d'autres genres de cet ordre 1. 2. 3. livraisons. Paris 1806. Fol. Jedes Heft enthält 5 sauber illuminierte Kupfer.

(Mimosae et autres plantes légumineuses. Par. 1819. Fol.

616 VIII. Geschichte der Wissenschaft

Christian Conrad Sprengel, vormalig Rector zu Spandau, jetzo privatisirender Gelehrter zu Berlin, entdeckte durch mühsame Beobachtungen die wahre Art, wie die Natur für die Befruchtung der Pflanzen gesorgt hat. Er hat ein besonderes Werk über diesen Gegenstand geschrieben, das einen Schatz von wichtigen Bemerkungen enthält *). (Bereits verstorben. L.)

Heinrich Adolph Schrader, Professor und Medicinalrath zu Göttingen, hat ausser den cryptogamischen getrockneten Gewächsen, die er zur Verbreitung dieses Studiums herausgegeben hat, noch verschiedene Werke geschrieben, die viele schöne Beobachtungen enthalten **).

Die auf seiner Reise gefundenen Pflanzen hat Professor Kunth beschrieben, in dem Werk: *Nova genera et species plantarum quas — in perigrinatione ad plagam aequinoctialem orbis novi collegerunt, descripserunt, partim adumbraverunt Amat. Bonpland et Alex. d. Humboldt ex schedis autographis Amati de Bonpland in ordinem digessit Car. Sig. Kunth. Paris. 1815—1825. gr. 4.* Die Zusätze über die Geographie der Pflanzen sind von Humboldt selbst; dieselben sind auch in folgendem Werke besonders abgedruckt: *De Distributione geographica plantarum. Lüttich und Paris 1817.*

*) Das entdeckte Geheimniss der Natur im Bau und in der Befruchtung der Blumen von C. C. Sprengel. Berlin 1793. 4. mit 23 Kupfern, worauf eine grosse Menge sauberer Figuren zusammengedrängt sind.

**) *Spicilegium Florae germanicae* Auctore H. A. Schrader. Hannov. 1794. in 8. mit 4 Kupf., worauf verschiedene cryptogamische Gewächse und die Samen einiger Galium-Arten vorgestellt sind.

VIII. Geschichte der Wissenschaft. 617

Wilhelm Roxburgh, ein Engländer von Geburt, jetzt Arzt zu Samulcottah an der Küste Coromandel, hat auf Veranlassung des Doctor Russel zu Madras in Indica, und auf Kosten der englischen ostindischen Compagnie unter der Aufsicht des berühmten Sir Joseph Banks in London ein prachtvolles Werk, was die nützlichen indischen Pflanzen enthält, herauszugeben angefangen, das aber sehr kostbar ist *)

Johann Christoph Wendland, aus Landau gebürtig, Gartenmeister zu Herrenhausen bei Hannover, hat an den zahlreichen, daselbst kultivirten Gewächsen viele wichtige, interessante Beobachtungen und Entdeckungen gemacht, die er uns in verschiedenen Ab-

EjUSD. nova genera plantarum, pars prima. Lips. 1797. Fol. mit sechs überaus sauber illum. Kupfern. Es enthält dieses Werk einige Gattungen der Pilze.

EjUSD. Journal für die Botanik. Stück 1—6. Göttingen 1799—1801. 8. wird fortgesetzt.

EjUSD. Neues Journal für die Botanik. 1—3 Bd., 1806—1809. 8.

EjUSD. Flora germanica. Tom. I. 1806. 8., mit 6 Kupfern, worauf besonders neu oder schwierig zu erkennende Gräser vorgestellt sind. (Nicht fortgesetzt. L.)

(Monographia generis Verbasci. Fasc. 1. 2. Göttingen 1813. 1823. L.)

*) Plants of the Coast of Coromandel selected from drawings and descriptions presented to the hon. Court of Directors of the East India Company, by William Roxburgh. Med. D. Vo. I. II. London 1795—1804, in Landkartenformat. Jeder Band besteht aus 4 Heften, und das Heft enthält 25 prächtig illumin. überaus schöne Kupfer. Viele neue indische Pflanzen sind darin abgebildet, vortrefflich vergliedert und gut in englischer Sprache beschrieben.

618 VIII. Geschichte der Wissenschaft

handlungen, besonders aber in seinen Schriften mitgetheilt hat *).

(Alphabetical list of the plants of St. Helena: ad Beaton's tracts relative to the island of St. Helena. Lond. 1816. 4. Flora indica, ed. Wallich et Carey. Calcutt. Vol. I. 2. 1821. 1824. 8. L.)

*) *Sertum Hannoveranum seu plantae rariores quae in horti Hannoverae vicinis coluntur descriptae ab H. A. Schrader, delineatae et sculptae a J. C. Wendland. Göttingae 1795, Fol. maj.* Herr Wendland hat dieses Werk anfangs in Gesellschaft des Herrn Medicinalraths Schrader herausgegeben und so sind 3 Hefte erschienen. Das 4. Heft ist vom Herrn Wendland allein. Die Abbildungen und Kupfer sind vom Herrn Wendland selbst gemacht und gestochen, in den ersten Heften sind die Beschreibungen auch, ausser den Beobachtungen grösstentheils sein Eigenthum; das letzte Heft ist ganz seine Arbeit. Ueberhaupt sind 24 schön illuminirte Kupfer neuer oder wenig bekannter Pflanzen darin.

Botanische Beobachtungen nebst einigen neuen Gattungen und Arten von J. C. Wendland. Hannover 1798. Fol. mit 4 illuminirten Kupfern, worauf 33 Zergliederungen der Pflanzen genau vorgestellt sind.

Ejusd. *Ericarum icones et descriptiones fasc. I. Hannoverae 1798. 4.* Jedes Heft enthält 6 sauber illuminirte Heidearten, mit deren deutschen Beschreibung und lateinischen Charakteren. (Wird fortgesetzt. L.)

Ejusd. *Hortus Herrenhusanus. Hannov. 1798. fasc. I-3. Fol.* Das Heft enthält 6 illum. Abbildungen.

Ejusd. *Collectio plantarum tam exoticarum quam indigenarum. Vol. I. Hannov. 1808.*, auch unter dem Titel: Sammlung ausländischer und einheimischer Pflanzen. Erster Band. 4., mit 86 illuminirten Kupfern.

VIII. Geschichte der Wissenschaft. 619

C. H. Persoon, aus dem südlichen Afrika am Vorgebirge der guten Hoffnung gebürtig, ein jetzt zu Paris privatisirender Gelehrter, hat sich mit besonderem Fleiss auf die Kenntniss der Pilze gelegt, und ist einer unserer ersten Mycologen. Sein Hauptwerk, was die Bestimmung aller entdeckten Arten von Pilzen enthält, ist jedem Freunde der Wissenschaft unentbehrlich *).

Franz Masson, ein Gärtner und eifriger Botaniker. Er wurde vom König von England im Jahre 1772 nach dem Vorgebirge der guten Hoffnung, um Pflanzen für den Garten zu Kew zu sammeln, geschickt, und blieb daselbst zwei und ein halb Jahr. Darauf machte er verschiedene andere botanische Reisen in warmen Klimaten auf Kosten des deutschen Kaisers, des Königs von Frankreich und Spanien, und wurde auf Kosten Englands 1786 zum zweitenmal nach dem Vorgebirge der guten Hoffnung geschickt, wo er 10 Jahr blieb, und in diesem langen Zeitraum mehr als vorher, und mehr als seine Vorgänger zu

*) *Synopsis methodica fungorum auctore D. C. H. Persoon. Pars I. II. Goettingae 1801. 8.*

Jetzt hat er alle bekannte Gewächse mit ihren Diagnosen in Taschenformat in einem besondern Werke beschrieben, was den Titel führt:

Synopsis plantarum. Pars I. II. Parisiis 1805. 1807. 16.
Worin die bis jetzt bekannten Pflanzen mit Ausschluss der letzten Klasse aufgeführt sind

(Abhandlung über die essbaren Schwämme übers. von Dierbach Heidelb. 1822. 8. *Mycologia europaea. Vol. 1. 2. Erlang. 1822. 1824. L.*)

Geschichte der Wissenschaft.

entd [redacted] Gelegenheit hatte. Er hat uns mit den von ihm n [redacted] entdeckten Stapelien bekannt gemacht *).
[redacted] *Elias von Bridel*, wurde den 28. November 1797 zu Grassier, einem kleinen Dorf des Kantons Bern geboren. Er reiste nach Paris und besuchte die Schweizer-Gebirge, um Pflanzen, vorzüglich aber Moose zu sammeln. Gegenwärtig ist er Legations-Rath und Bibliothekar in Gotha. Wir verdanken ihm eine vollständige Geschichte der Laubmoose, mit deren fernern Bearbeitung er [redacted] beschäftigt ist **).

*) *Stapeliae novae*, or a collection of several new species of that genus discovered in the interior parts of Afrika by Francis Masson. Lond. 1795. Fol. mit 41 sauber illuminirten Kupfern. Auf jeder Platte ist eine neue Art abgebildet. Da er bei seinen Reisen im Innern von Afrika diese saftigen Pflanzen aushob, und in seinem Garten an der Capstadt kultivirte; so sah er von vielen Arten die Blumen, die bei einer flüchtigen Reise nicht immer anzutreffen sind.

**) *Muscologia recentiorum seu Analysis, historia, et descriptio methodica omnium muscorum frondosorum hucusque cognitorum ad normam Hedwigii a S. E. Bridel*. Gothae, Tom. I. 1797, II. Pars I. II. 1798, 1801. 4. Der erste Theil enthält die Geschichte der Laubmoose, die Entdeckung des Geschlechts, die Gattungen und deren Schicksale. Im zweiten Bande sind die Arten beschrieben. Von den dabei befindlichen schwarzen Kupfern erklären viere die Gattungen der Laubmoose, die übrigen enthalten neue Arten.

Ejusd. Muscologiae recentiorum supplementum seu species muscorum. Pars I. Gothae 1806. 4. Ist eine neue Auflage seiner *Muscologia* ohne Kupfer, die sehr viele Zusätze und Verbesserungen enthält. Der erste Theil enthält

VIII. Geschichte der Wissenschaft. 621

Eugenius Johann Christoph Esper, Professor in Erlangen, wurde den 2. Junius 1742 zu Wunsiedel geboren. In der Zoologie hat er sich besonders durch Bearbeitung der europäischen Schmetterlinge, und Zoophyten bekannt gemacht. Gegenwärtig fängt er an, ein vollständiges Werk über die Seegewächse, welche man Tange (*Fucus*) nennt, herauszugeben *), und ist in dieser Epoche der erste Deutsche, der diese schwierige Gattung bearbeitet. Er trägt aber nur alle entdeckte Arten zusammen, und untersucht nicht, was uns noch fehlt, die Befruchtungsorgane. (Starb 1810. L.)

Heinrich Andrews, ein geschickter Maler zu London, hat mehrere sehr seltene Gewächse und alle capische Heiden, welche in den englischen Gärten erzogen werden, durch saubere Abbildungen kenntlich gemacht **).

die Laubmoose mit einfachem Peristom. (Der vierte Theil erschien 1818. L.)

*) *Icones fucorum* oder Abbildungen der Tange, herausgegeben von E. J. C. Esper. 1. Theil. Nürnberg 1800. 4. mit 111 illuminirten Kupfertafeln, und deren Beschreibung. Zu wünschen wäre es, dass einige der gegebenen Abbildungen mit mehrerer Genauigkeit und weniger Härte gemacht wären.

**) *The Botanist's Repository for new and rare plants in english and latin* by Henry Andrews. Vol. I — V. London 1797 — 1804. 4. Jeder Band enthält 72 sauber illuminierte Kupfer mit einem Blatte Beschreibung. (Wird fortgesetzt. L.)

Ejusd. *Engravings of Heaths with botanical descriptions*, in latin, english. Nr. 1 — 32. London. Fol. Das Heft ent-

622 VIII. Geschichte der Wissenschaft

Erich Acharius, Professor und Provinzialmedicus zu Wadstena in Schweden, bereicherte die Wissenschaft mit einem Werke, was zur näheren Kenntniss der Lichenenarten unentbehrlich ist. Er hat die gewöhnlichste Familie der Lichenen in bessere und feinste Regeln sich gründende Gattungen gebracht, und überhaupt die Kenntniss dieser Gewächse sehr erleichtert *). (Starb 1819. L.)

Renatus Desfontaines, Professor der Botanik in Paris, unternahm 1783 eine Reise nach der Barbarei. Er verweilte daselbst über zwei Jahre und durchstrich die Reiche von Tunis und Algier, so wie den Theil des Atlasgebirges. In einem besondern Werke macht er uns mit seinen Entdeckungen bekannt **), besonders reich ist die Ausbeute an Ge-

hält 3 illuminierte Kupfer, und zu jedem einen halben Bogen Beschreibung, aber weder die Kupfer, noch die Beschreibung sind numerirt. (Wird fortgesetzt. L.)

*) *Lichenographiae Succicae Prodrömus* auctore *E. Achario*. Lincopiae 1798. 8., mit zwei schön illuminierten Kupfern.

Ejusd. Methodus qua omnes detectos Lichenes secundum organa carpomorpha ad genera species et varietates rediguntur atque observationibus illustrare tentavit. Holm 1803. 8. Zwei Theile mit einem Supplement und 8 Kupfertafeln, worauf die Gattungen vorgestellt sind.

Ejusd. Lichenographia universalis. Götting. 1810. 4., mit 12 Abbildungen der Gattungen.

**) *Flora atlantica sive Historia plantarum quae in Africa agro Tunetano et Algerensi crescant*. Auctore *Renato Desfontaine*. Tom. I. II. Parisiis 1798. 4., mit 261 sehr schön

VIII. Geschichte der Wissenschaft. 623

ren, Schirmpflanzen, rachenförmigen, krenzförmigen Schmetterlings- und zusammengesetzten Blumen aber fast karglicher an Cryptogamen.

E. P. Ventenat, Bibliothekar des Pantheons und Mitglied des National-Instituts, starb den 13. August 1808 zu Paris, er machte uns mit den seltenen und neuen Gewächsen, die in dem prächtigen und sehr pflanzenreichen Garten des Herrn Cels und zu Malmaison gezogen wurden, näher bekannt *).

Graf Franz von Waldstein, Ritter des Maltheser Ordens zu Wien, und *Paul Kitaibel*, Professor zu Pesth, sind jährlich mehrere Gegenden von Ungarn nach allen Richtungen durchreiset, und haben über hundert neue Gewächse entdeckt, die sie in eigenen besondern Werke beschreiben **). (Kitaibel starb 1818. L.)

er gestochenen schwarzen Abbildungen, welche die meisten neuen von ihm entdeckten Arten vorstellen.

*) *Description des plantes nouvelles et peu connues cultivées dans le jardin de J. M. Cels, avec figures, par E. P. Ventenat.* Paris 1799. kl. fol. mit 100 sauber gestochenen Kupfern.

Ejusd. *Choix de plantes dont la plupart sont cultivées dans le jardin de Cels.* 1—5 livraison. Paris 1803. fol. Jedes Heft hat 6 sauber gestochene schwarze Kupfer.

Ejusd. *Jardin de la Malmaison* 1—11 livraison. Paris 1803. gr. fol. Jedes Heft enthält 6 mit der äussersten Sorgfalt illuminierte Kupfer.

**) *Plantae rariores Hungariae iconibus illustratae aucto-ribus F. de Waldstein et P. Kitaibel.* Vol. I. II. Viennae 1802. 1805. Fol. Jeder Theil mit 100 sehr sauber illuminierten Kupfern und musterhaften Beschreibungen der Arten.

624 VIII. Geschichte der Wissenschaften

Hippolytus Ruiz und *Joseph Pavon*, Prozedur zu Madrid, machten vom Jahre 1777 bis 1788 wissenschaftlich durch Peru und Chili Reisen, um Gewächse und Thiere dieser entfernten Weltgegenden zu lernen. Die Zahl der von ihnen neuen Gewächse übertrifft alle Erwartungen, die Kräuterkunde niemals auf einemmale einen so fruchtlichen Zuwachs erhalten hat, als durch die beiden geschickten Botaniker. Sie würde noch ansehnlicher ausgefallen sein, wenn ihnen nicht mancherlei Unglücksfälle viele ihrer gesammelten Schätze wären verloren gegangen *).

Andreas Michaux, ein französischer Naturforscher, der Mitglied des National-Instituts zu Paris ist, hat zwanzig Jahre im Orient und nördlichen Amerika gereiset. Von der Liebe zu den Pflanzen angetrieben, entschloss er sich um die pflanzenreiche Insel Madagaskar kennen zu lernen, mit den vom (

*) *Florae Peruvianae et Chilensis Prodrum sive Catalogum Generum plantarum peruvianarum et chilensium descriptiones et icones auctoribus H. Ruiz et Pavon. 1794. Fol. mit 37 schwarzen Kupfertafeln, welche die Gliederung der Blumen und Früchte von 149 neuen Arten enthalten. Die Beschreibungen derselben sind lateinisch und spanisch.*

Eorundem *Flora Peruviana et Chilensis sive descriptiones et icones plantarum peruvianarum et chilensium. Tom. I. 1798. Tom. II. 1799. Fol.* Der zweite Band enthält nur bis zur Classe Pentandria Monogynia. Zum ersten Theile gehören 106, zum zweiten 116 sehr sauber gezeichnete schwarze Kupfertafeln, welche die neuen Arten zeigen und auf jeder Tafel sind zwei Pflanzen abgebildet.

VIII. Geschichte der Wissenschaft. 625

audin zu einer Entdeckungsreise commandirten Schiffen abzugehen. Leider verlor an ihm die Botanik einen der eifrigsten Forscher; er ward in seinem hohen Alter ein Opfer des ungesunden Klimas von Madagascar, wo er im Jahre 1804 starb. Wir haben von ihm folgende Werke *).

Aubert du Petit-Thouars zu Paris, hat auf den Inseln Madagascar, Bourbon und Isle de France sich mehrere Jahre aufgehalten, und jetzt den Anfang gemacht, seine wichtigen Entdeckungen der gelehrten Welt mitzutheilen **).

Palisot de Beauvois, Mitglied des National-Instituts zu Paris, unternahm die höchst gefährliche Reise nach den Königreichen Oware und Benin im heissen Afrika. Von dort hat er eine zweite Reise nach dem südlichen Amerika gemacht. Wir haben von ihm eine vollständige Flora der genannten in Hinsicht der Naturgeschichte noch gar nicht bekannten Reiche zu

*) *Histoire de Chênes de l'Amérique* par André Michaux. Paris 1801. Fol., mit 36 schwarzen vortrefflich gestochenen Kupfern. Die Eichen sind sehr kenntlich abgebildet und die Beschreibungen gut, nur wäre den Charakteren der Arten mehrere Bestimmtheit zu wünschen.

Ejusd. *Flora boreali-americana*. Tom. I. II. Paris 1803. 4, mit 51 Kupfern.

**) *Histoire des végétaux recueillis sur les isles de France, Réunion et Madagascar*. Paris 1804. 4. Es ist erst ein Heft mit 10 schwarzen Kupfern erschienen.

(*Histoire des plantes Orchidées, recueillies sur les trois es australes d'Afrique*. Paris 1822. 8. L.)

Willdenow's Grundriss. 1 Th.

626 VIII. Geschichte der Wissenschaft.

erwarten, womit er bereits den Anfang gemacht hat *). (Starb 1819. L.)

*Johann Centurius Graf von Hoffmannsegg und Heinrich Friedrich Link, Professor der Botanik zu Rostock, waren gemeinschaftlich in den Jahren 1735 bis 1797 ganz Portugal durchreiset, und hatten auf ihren Wanderungen eine beträchtliche Zahl neuer Gewächse entdeckt, die jetzt von ihnen beschrieben werden, und in einem prachtvollen Werke, dergleichen in artistischer Hinsicht noch nie erschienen ist, bekannt zu machen angefangen *).*

*) Flore d'Oware et Benin en Afrique. Tom. I. Paris 1805. Fol., mit 60 sauber illuminirten Kupfertafeln.

(Essai d'une nouvelle agrostographie. Paris 1812. 8. Mar-
cologie ou traite sur les mousses in Mem. de la soc.
Linnéenne de Paris, I. L.)

**) Flore portugaise, ou description de toutes les plantes qui croissent naturellement en Portugal. 1—5 livraison 1806. Fol. Jedes Heft enthält fünf sauber illuminirte Abbildungen neuer Gewächse mit einem sehr zierlichen geschmackvollen Umschlag. (Es sind 14 Hefte erschienen. L.)

(Es sei mir erlaubt hinzu zu fügen: Grundlehren der Anatomie und Physiologie der Pflanzen v. H. F. Link. Götting. 1807. Nachträge das. 1809. Nachträge 2tes Hft das. 1812. Abbildungen und Beschreibungen seltener Pflanzen im Berliner Garten. Fasc. 1—10. Berlin 1822 bis 1828, und Abbildungen neuer und seltener Gewächse des königl. bot. Gart. zu Berlin. Fasc. 1—8. Berlin 1828.—1830, beide mit Herrn Otto herausgegeben. Enumeratio plantarum horti berolinensis altera. Vol. 1—2. Berol. 1821. Spec. plant. ed. Willd. Tom. 6. P. 1 und 2. Berol. 1824—1825, Hortus regius be-

VIII. Geschichte der Wissenschaft. 627

Da die engen Grenzen eines Grundrisses keine vollständige Geschichte der Botanik gestatten, so sei mir erlaubt, die merkwürdigsten Botaniker nur noch namentlich anzuführen, als: *Abbot, Adams, Afzelius, Albertini, Aman, Balbis, Batsch, Baumarten, Bellardi, Bernhardt, Bivona Blandow, Bolm, Bonato, Boos, Bory de St. Vincent, Bosc, Braune, Credemeyer, Brignoli, Brotero, Broussonet, Brückner, Cels, Cervantes, Correa, Crome, Curtis, Cyrillo, Dahl, Danaa, Decandolle, Desrousseaux, Delharling, Dickson, Dillwyn, Ditmar, Dombey, Duval, Ehrhart, Euphrasen, Fahlberg, Fischer, Floerke, Függe, Fraser, Froelich, Funk, Geuns, Goodenough, Jaenke, Hagen, Haworth, Hayne, Hellenius, Henkel von Donnersmarck, Holmskiold, Hoppe, Horneemann, Hornschuch, Hornstaedt, Hosak, Horsfield, Iost, Isert, Klein, Lambert, Langsdorff, La Peyrouse, Ledebour, Lichtenstein, Liljeblad, Lindsay, Lumnitzer, Lund, Mertens, Martyn, Marschall von Bieberstein, Menzies, Mikan, Mirbel, Mohr, Mühlener, Mussin-Puschkin, Mutis, Nee, Nocca, Olivier, Panzer, Patterson, Perron, Poiret, Poiteau, Re, Reentisch, Redouté, Richard, Riche, Rohr, Roth, Rottler, Rudge, Rudolphi, Russel, Ryan, Salisbury, Savi, Schleicher, Schmidt, Schousboë, Schrank, Schultes, Schulz, Schumacher, Schwaegrichen, Schweiger, Schweinitz, Seetzen, Sole, Sowerby, Sprengel, Starke, Steven, Sternberg, Suter, Tafalla, Tauscher, Thonning, Thore, Thouin, Timm, Trattinnick, Trevisanus, Turpin, Turner, Ucria, Vellozo, Vest, Vil-*

tanicus Berolinensis. Tom. I. Berl. 1827. Handbuch zur Erkennung der Gewächse. 4r. Th. Berl. 1829.

628 VIII. Geschichte der Wissenschaft.

Iars, Viviani, Wagener, Wahlenberg, Walter, Weber, Weigel, West, Wiborg, Willenet, Woodward, Zea, Zuccagni u. v. a.

(Ausführlicher verdienen folgende Schriftsteller genannt zu werden, wobei ich bemerke, dass ich mir über alle noch lebende Botaniker weder Lob noch Tadel erlaubt habe. L.)

Carl Agardh, Professor in Lund. *Synopsis algarum Scandinaviae*. Lund. 1817. 8. *Species algarum rite cognitae*. Lund. 1820. 8. *Icones algarum ineditae*. Lund. 1820. 8. *Systema algarum*. Lund. 1824. 8.

Friedr. Gottl. Barling, Dr. Beiträge zur Botanik. Götting. 1824—25. 8. Der erste Band enthält: *Diatomeae descriptae et illustratae*.

Joh. Jac. Bernhardt, geb. zu Erfurt 1774. Professor daselbst, hat sich durch viele einzelne Abhandlungen bekannt gemacht, so wie durch seine Schrift: „Ueber Pflanzengefässe.“ Erfurt 1805.

Anton Bertolone, Professor zu Boulogne. *Amoenitates italicae*. Bonon. 1819.

W. S. J. G. Besser, zu Krzeminec in Gallizien. *Primitiae Florae Galiciae austriacae*. Vienn. 1809. 2 Th. kl. 8. *Enumeratio plantarum in Vollhynia etc. collectarum*. Viln. 1822. 8.

C. L. Blume, Director des botanischen Gartens in Batavia, hat einen grossen Theil von Java in botanischer Hinsicht durchsucht, und seine Entdeckungen und Beobachtungen in mehreren einzelnen Abhandlungen und folgenden Werken bekannt gemacht: *Catalogus van de gewassen in't Plantetuin te Buitenzorg*. Batav. 1823. 8. *Bydragen tot de Flora van nederlandsche Indië*. St. 1—5. Bat. 1825—1826. *Flora Javae*. Bruxelles 1829. Wird fortgesetzt.

James Bolton. *Filices Britanniae*. Lond. 1785—90.

VIII. Geschichte der Wissenschaft. 629

4. History of Fungusses about Halifax. Lond. 1788—1791. T. 1—3, übersetzt von Willdenow. Berlin 1795—1797. 3 Theile, der vierte erschien Berlin 1820 von den Brüdern Nees v. Esenbeck bearbeitet.

Bory de St. Vincent, vormalig in Kriegsdiensten, hat Reisen auf Isle de France, Bourbon und Madagaskar gemacht, auch unterwegs die Canarischen Inseln besucht. In seinem Essai sur les isles fortunées. Par. 1803. 4. und Voyage dans les quatre principales îles d'Afrique. Par. 1804, sind viele botanische Beobachtungen.

Adolph Brongniart, Mitglied der Pariser Akademie, hat viele einzelne Abhandlungen geschrieben, die sich im Dictionnaire des sciences naturelles, in den Annales des sciences naturelles, im Nouveau Bulletin des sciences de la Société philomatique etc. befinden.

Felix Awellar Brotero, früher Professor zu Coimbra, nachher Director des botanischen Gartens zu Ajuda bei Lissabon, starb 1828. Von ihm haben wir Phytographia Lusitaniae selectior. Olissip. 1801, ganz neu bearbeitet. Olissip. 1816. Flora Lusitanica ibid. 1804. P. 1—2.

Robert Brown, früher Aufseher der Sammlungen von Sir Joseph Banks, jetzt am Bankschen Museum angestellt. Er hat die neue Ausgabe vom Hortus Kewensis besorgt, und sehr viele einzelne Abhandlungen geschrieben, die in verschiedenen Englischen Zeitschriften zerstreut sind. Von diesen Abhandlungen hat C. G. Nees von Esenbeck Uebersetzungen geliefert, und diese unter dem Titel: Rob. Brown's vermischte Schriften. T. 1—3. Smalkalden, Leipzig und Nürnberg. 1825—27. herausgegeben. Ferner: Prodrömus Florae Novae Hollandiae. Lond. 1810. P. 1. nachge-

I. Geschichte der Wissenschaft

in Oken's Isis und im 3ten Bande von Nees v. Eichenbeck's Uebersetzung.

Augustin Pyramus De Candolle, vormal's Professor zu Montpellier, jetzt zu Genf. *Astragalogia*. Paris 1802. Fol. *Flore française*. T. 1—5. Par. 1805. 8. T. 6. *ibid.* 1815. *Regni vegetabilis systema naturale*. T. 1—2. 1818—1821. *Prodromus systematis naturalis*. Vol. 1—3. Paris. 1824—27. 8. *Icones selectae plantarum, quas in systemate naturali descripsit*. Vol. 1—2. Paris. 1820—22. Fol. *Plantes rares du jardin de Genève*. Fasc. 1. 2. Genève 1825. Fol. *Mémoires sur les Légumineuses*. Paris 1825. 4. Auch hat er die Beschreibungen zu den *Plantes grasses* und den *Liliacees* von Redouté gemacht. Ausserdem sind viele zerstreute Abhandlungen von ihm.

Wilhelm Carey, Arzt in Serampore in Ostindien. *Hortus bengalensis* 1821. 8. Auch hat derselbe in Gemeinschaft mit dem Dr. Wallich die *Flora indica* von Roxburgh herausgegeben.

Heinrich Cassini hat viele botanische Abhandlungen, die in verschiedenen Französischen Zeitschriften zerstreut sind, geschrieben.

Adalbert von Chamisso in Berlin, hat in den Jahren 1815—18 den Kapitain Kotzebue bei seiner Reise um die Welt begleitet, und macht jetzt seine Entdeckungen und Beobachtungen in Schlechtendal's *Linnaea* bekannt. Früher schon hatte er sich durch seine *Annotation. ad Flor. ber.* bekannt gemacht. Ferner haben wir von ihm: *Uebersicht der nutzbarsten und der schädlichsten Gewächse etc.* Berl. 1827.

Theodor Friedrich Colladen in Genf. *Histoire naturelle et médicale des Cascs*. Montp. 1816. 4.

VIII. Geschichte der Wissenschaft. 631

N. A. Desvaux, Journal de botanique. Vol. 1—5. Par. 1808—1814. 8.

Jac. Dickson, Samenbündler zu London, starb 822. Plantae cryptogamicae Britanniae. Lond. 1787—904. Fasc. 4. Nachdruck zu Zürich 1788—1794. T. 4.

Lud. Weston Dillwyn. Synopsis of the british confervae. Fasc. 1—20. 4. Anfang einer Uebersetzung von F. Weber und Mohr. Götting. 1803—05. 4 Hefte.

L. P. F. Ditmar, Syndicus der Stadt Rostock, liebt die Pilze Deutschlands als eine Abtheilung von turms Flora in Abbildungen und Beschreibungen heraus.

David Don. Prodromus florae nepalensis. Lond. 825. 8. und mehrere einzelne Abhandlungen.

Mich. Felix Dunal, Professor in Montpellier. Histoire des Solanum. Montpell. 1813. 4. Solanorum enumerumque affinium synopsis. Montpell. 1816. 8. Monographie de la famille des Annonaceae. Par. 1817. 4.

Christ. Gottfr. Ehrenberg, Profecsor in Berlin, at in den Jahren 1820 bis 1825 Aegypten, Syrien und rabien durchreist und wird uns jetzt mit seinen ntdeckungen und Beobachtungen in einem eigenen Verke bekannt machen. Früher schon hatte er Sylae mycologicae berolinensis. Berlin 1818. 4., so wie mehrere einzelne Abhandlungen geschrieben.

Friedr. Ehrhart, war Botanikus zu Hanover und farb 1795, er hat durch seine sehr genanen botanischen Untersuchungen in Deutschland viel angeregt. eine Bemerkungen sind enthalten in: Beiträge zur Naturkunde. T. 1—6. Hannov. 1787—1792.

F. G. Eschweiler. De fructificatione generis Rhinomorphae commentatio. Elberf. 1822. 4. Systema lichenum. Norimbg. 1824. 4.

632 VIII. Geschichte der Wissenschaft.

H. A. Flörke, Professor zu Rostock, beschäftigt sich seit langer Zeit mit den Lichenen, hat einzelne Abhandlungen darüber geschrieben und giebt ausgesuchte Arten derselben in trocknen Exemplaren heraus.

El. Fries, Lehrer der Botanik zu Lund. *Notitiae Florae suecicae*. P. 1—8. 1814 etc. *Observationes mycologicae*. 2 P. Hafn. 1815—18. 8. *Flora hollandica*. Lund. 1818—19. 8. *Systema mycologicum*. Vol. 1—2. Lund. et Gryphiswald. 1821—23. 8. *Plantae homone-mae*. Lund. 1825. 8.

J. A. Froelich, Leibarzt des Fürsten von Ellwangen, bekannt durch eine Monographie der Gattung *Gentiana*. Erlang. 1796.

Gaudichaud, hat in den Jahren 1817—1820 eine Reise nach den Mascarenas- und Falklandsinseln unternommen und eine Flora dieser Inseln im 5ten Bande der *Annales des sciences naturelles* bekannt gemacht.

Jo. Gaudin, Prediger und Professor zu Lausanne. *Agrostologia Helvetica*. Vol. 1—2. Paris. 1811. 8. *Flora Helvetica*. 1828—29. Zürich.

Jo. Gay. *Monographia des Lasiopetalées*. Paris 1821. 4. *Fragment d'une monographie des Büttneriacées*. Paris 1823. 4., und mehrere einzelne Abhandlungen.

Carl Christ. Gmelin, Arzt zu Karlsruhe. *Flora badensis*. Vol. 1—4. Carlsruh 1805—1826. 8.

A. G. Hagen, Professor der Chemie und Botanik zu Königsberg in Preussen, starb 1828, hat sich früher durch seine Beschreibung der Lichenen in Ostpreussen, so wie jüngst durch seine Floren von diesem Lande verdient gemacht.

VIII. Geschichte der Wissenschaft. 633

A. H. Haworth bei London. *Observations on the genus Mesembrianthemum*. Lond. 1794. 8. *Miscellanea naturalia*. Lond. 1803. 8. *Synopsis plantarum succulentarum*. Lond. 1812. 8. *Supplementum*. Lond. 1819. 8.

Fr. G. Hayne, Professor zu Berlin. *Getrene Abbildungen und Zergliederungen deutscher Gewächse*. Berlin 1798 etc. 4. *Getrene Darstellung und Beschreibung der in der Arzneikunde gebräuchlichen Gewächse*. Band 1—10. Berlin 1805—1826. *Terminologie der Pflanzen*. Berlin 1799 etc. *De coloribus corporum naturalium commentatio*. Berl. 1809.

August St. Hilaire, Mitglied der Pariser Akademie hat Brasilien bereist. *Plantes usuelles des Brésils*. Fasc. 1—6. Paris 1824—25. 4. *Flora Brasiliæ meridionalis*. Fasc. 1—4. Paris 1824—26. 4. und mehrere einzelne Abhandlungen.

Will. Jaks. Hooker, ein Engländer. *Muscologia britannica* by W. J. Hooker and Taylor. Lond. 1818. *Flora scotica*. Edinbg. 1821. 8. *Exotic flora*. Vol. 1—3. Edinbg. 1823—1826. 8. *Musci exotici und Jungermanniæ* in einzelnen Heften.

D. H. Hoppe, Professor zu Regensburg. *Botanisches Taschenbuch*. Regensburg 1790—1807. 8. und viele Abhandlungen in der botanischen Zeitung, in *Sturms Flora* etc.

J. W. Hornemann, Professor der Botanik zu Kopenhagen, jetzt Herausgeber der *Flora danica*. *Hortus Hafniensis*. Vol. 1—2. Hafn. 1813—15. 8.

Friedr. Hornschuch, Prof. der Botanik in Greifswalde. *Dissertatio de Voitia et Systylis*. Erlang. 1818. 4. *Bryologia germanica*. Vol. 1. Norimbh. 1823 und mehrere einzelne Abhandlungen.

Keimen der Charen. Leipz. 1825. 8
in Sturms Flora und mehrere einzeln

Jos. Koch, Prof. in Erlangen. I
fessor Mertens die neue Ausgabe v
besorgt und ausserdem mehrere ein
gen geschrieben.

Carl Sigism. Kunth, Professor
berolinensis. Tom. I. Berl. 1813. I
gen zu Humboldt's Nova genera et s
plantarum aequinoctialium orbis novi
ris 1822—25 und mehrere einzelne A

Gustav Kunze, Professor in Lei
sche Hefte. 1—2. Leipzig 1817—23
einzelne Abhandlungen.

Aylmer Bourke Lambert, ein En
des Ruiz- und Pavonschen, so wie
und Pallasischen Herbariums. Desc
nus Cinchona. Lond. 1797. 4. Desc
nus Pinus. Lond. 1803. Fol. nov. ed.

VIII. Geschichte der Wissenschaft. 635

Artatio plantarum domingensium decadem sistens.
Ryph. 1805. 4. Flora altaica. Berol. 1829. 8.

Joh. Christ. Georg Lehmann, Professor in Ham-
burg. Monographia generis Primularum. Lips. 1817.
Generis Nicotianarum historia 1818. 4. Plantae e fa-
milia Asperifoliarum. P. 1. 2. Berol. 1818. 4. Mono-
graphia generis Potentillarum, 1820. 4. Icones planta-
rum rariorum. Fasc. 1—4. 1820. etc. Fol.

Joh. Linddley, Professor der Botanik in London.
Muscarum monographia. Lond. 1820. 8. Collectanea
botanica. Fasc. 1—3. Lond. Fol. Digitalis monogra-
phia. Lond. 1822. Fol.

Hans Christ. Lyngbye. Tentamen hydrophytolo-
giae danicae. Hafn. 1819. 4.

Friedr. Marschall von Bieberstein, starb 1826.
Beschreibung der Länder am kaspischen Meer. Frankfurt,
1806. 8. Flora taurico-caucasica. Vol. 1—3. Charkov,
1808—19. Centuria plantarum rariorum Rossiae meri-
tionalis. Charkov. 1810. Fol.

Carl Phil. Friedr. von Martius, vormals zu Er-
langen, jetzt Professor in München, hat in den Jahren
1817—1820, eine Reise nach Brasilien unternommen.
Vor seiner Reise schon gab er die Flora cryptogamica
Brelangensis. Norimb. 1817. heraus und nach seiner
Rückkunft haben wir ausser einzelnen Abhandlungen
folgende Werke von ihm erhalten: Reise in Brasilien.
München 1824. 4. Genera et species palmarum, quas
in itinere per Brasiliam collegit. Monach. 1823. Fol.
Nova genera et species plantarum brasiliensium. Vol.
1—3. Monach. 1824—1827. Fol. Specimen materiae
medicae brasiliensis. Monach. 1824. Fol. Er arbeitet
jetzt an einer vollständigen Flora von Brasilien, von
welcher die Agrostologia. Stuttgart und Tübingen

606 VIII. Geschichte der Wissenschaft.

1820 durch C. G. Nees von Esenbeck bereits erschienen ist.

Franz Mauri. Romanarum plantarum Cent. 1–12. Bonn. 1817–20.

Franz Carl Mertens, Prof. in Bremen, hat außer mehreren Abhandlungen auch eine neue ganz umgearbeitete Ausgabe von Roehlings Deutschlands Flora, in Verbindung mit dem Prof. Koch in Erlangen herausgegeben, von welcher bis jetzt die ersten beiden Theile. Frankf. a. M. 1823. 1826. 8. erschienen sind.

Ernst Heinr. Fried. Meyer, Professor in Königsberg, hat mehrere Abhandlungen über die Gattungen *Juncus* und *Luzula* geschrieben. *Monographia generis Junci.* *Synopsis Luzulae.* *Synopsis Juncorum.* Goett. 1823. 8.

Georg Fried. Willh. Meyer, Oekonomierath in Hannover. *Primitiae florae Essequeboënsis.* Goetting. 1818. 4. Die Entwicklung und Fortpflanzung der Flechten. Goett. 1825. 8.

C. F. Brisseau-Mirbel, Professor zu Paris, hat mehrere Schriften über die Anatomie der Pflanzen geschrieben. S. seine Exposition de la Theorie de l'organisation vegetale. Paris 1809.

Joseph Moretti, Prof. in Pavia. *Memoire ed osservazioni intorno a diversi oggetti risguardanti le scienze naturali.* Pavia 1820. 8. und mehrere einzelne Abhandlungen.

Carl Gottfr. Nees von Esenbeck, Professor in Bonn und Präsident der Leopoldinischen Akademie der Naturforscher. *Das System der Pilze und Schwämme.* Nürnberg 1817. *Synopsis Asterum herbaceorum.* Erlang. 1818. 4. *De Cinnamome commentatio.* Bonn. 1823 und viele einzelne Abhandlungen. Auch hat

VIII. Geschichte der Wissenschaft. 637

albe mit Weihe die deutschen Brombeersträucher ausgegeben und mit Hornschuch die Bryologia germanica. Jetzt hat er die Agrostologia brasiliensis zu Martius Flora bearbeitet.

Maximilian Prinz von Wied-Neuwied, hat eine wissenschaftliche Reise nach Brasilien unternommen. seinen Entdeckungen haben uns die Herren Schrank, Nees v. Esenbeck und von Martius bekannt gemacht.

Friedr. Otto, Gartendirector, Inspector des botanischen Gartens bei Berlin, hat mit mir die Abbildung seltener Gewächse des hiesigen botanischen Gartens herausgegeben und ausserdem mehrere einzelne Abbildungen geschrieben.

Joach. Em. Pohl, Dr. Med. in Wien. Plantarum italicarum icones et descriptiones hactenus ineditae. 1826. Fol., wird fortgesetzt.

J. L. M. Poiret, Voyage en Barbarie. Par. 1789. Er hat er die Encyclopedie botanique vom 5. Bande so wie auch das Supplement dazu bearbeitet.

Cyrus Pollini, Professor in Verona. Viaggio al lago di Garda. Verona 1816. 8. Sulle alghe viventi nel lago di Garda. Verona 1817. 8. Flora veronese. Vol. 1—3. Verona 1822—24. 8.

Franz von Portenschlag-Ledermeyer, gestorben. Enumeratio plantarum in Dalmatia lectarum. 1824. 8.

Carl B. Presl. Custos am Kaiserl. Königl. Musei in Prag. Flora cechica. Prag. 1819. 8. Cypripedium et gramineae siculae. Prag. 1820. 8. Deliciae botanicae. Prag. 1822. 8. Reliquiae Häukeyanae. Vol. 1. Prag. 1825—1828. Fol. wird fortgesetzt. Flora a. Prag. 1826. 8.

lungen.

Carl Rafinesque-Schmalz, in
ratteri di alcuni nuovi generi e nu
mali e piante di Sicilia. Palermo
delle scienze. P. 1. Palermo 1814
viciana. New York 1817. 8.

Ludwig Reichenbach, Professor
nographia generis Aconiti et Del
Fol. Magazin der ästhetischen Bo
Leipzig 1821 — 25, 4. Icones plan
Die erste Centurie erschien Leipz
seitdem fortgesetzt. Die zweite A
lers gemeinnützigem Handbuch d
Altona 1827. Taschenbuch für Gar
1827. Botanik für Damen. Leipz.

Ludwig Claude Richard, Profe
1821, war ein berühmter und vortr
Analyse du fruit. Paris 1808. 8. A
chideis europ. Paris 1817. und me
handlungen.

VIII. Geschichte der Wissenschaft. 639

Th. in Stettin. Dissertio de Junco. Halas 1801. 8.
ra sedinensis. Stettin 1824. 8.

Alb. Wilh. Roth, Arzt zu Vegesak bei Bremen.
träge zur Botanik. Th. 1. 2. Brem. 1782—1783.
ntamen florae germanicae. P. 1—3. Lips. 1788—
0. 8. Catalecta botanica. Fasc. 1—3. Lips. 1797
6. 8. Neue Beiträge zur Botanik. Frankf. 1802. 8.
anische Bemerkungen. Leipz. 1807. 8. Novae plan-
um species, praesertim Indiae orientalis. Halberst.
1. 8. Enumeratio plantarum Phaenogamarum in
mania sponte nascentium. Pars 1. Lips. 1827. 8.

Carl Asmund Rudolphi, Professor der Anatomie
Berlin, durch seine Anatomie der Pflanzen, Berlin
7 und mehrere einzelne Abhandlungen bekannt.

Joseph Sabine, Secrétaire der Horticultur-Société.
rasser mehrerer Abhandlungen in englischen Zeit-
riften.

Rich. Ant. Salisbury, ein Engländer. Icones stir-
um rariorum. Lond. 1791. Fol. Prodromus stirpium
horto ad Chapel-Allerton. Lond. 1796. 8. Paradi-
s londoniensis. Vol. 1. 2. Lond. 1805—08. 4. und
hrere einzelne Abhandlungen.

Christian Schkuhr, Mechanikus zu Wittenberg,
b. 1740. gest. 1811, hat sich durch sein botanisches
ndbuch, besonders einzelne Theile desselben, grosse
rdienste erworben.

F. L. Dietrich v. Schlechtendal, Professor in Ber-
. Animadversiones in Ranunculeas Candollii. Fasc.
2. Berol. 1819. 1820. 4. Flora berolinensis. Vol. 1.
Berol. 1823. 1824. 8. Adumbrationes plantarum.
sc. 1—3. Berol. 1825. 1826. 8. Linnaea, ein Journal
die Botanik. Vol. 1—4. 1826—29.

Franz Wilh. Schmidt, war Professor in Prag und

640 VIII. Geschichte der Wissenschaft.

starb 1796. Er war ein sehr guter Beobachter. In mehreren einzelnen Abhandlungen haben wir ihn Flora boëmica. Cent. 1—4. Prag. 1793. 1794

Joh. Carl Schmidt, Arzt in Leipzig, hat in Kurze Deutschlands Schwämme in getrockneten Exemplaren 1816—1818, so wie die mycologischen herausgegeben.

P. C. A. Schousboe, Dänischer Konsul in Nantien. Jagttagelser over vaextriget i Marocco. Kopenh. 1800. 8. und deutliche Bemerkungen über Gewächse in Marokko, übersetzt von Maria Leipzig 1800. 8.

Joach. Fried. Schouw, Professor in Kopenhagen. Versuch einer allgemeinen Pflanzen-Geographie. 1823. 8.

Franz von Paula Schrank, Mitglied der K. Akademie zu München. Bayersche Flora 1. 2. München 1789. 8. Primitiae Florae Salisburgensis. I 1792. 8. Reise nach den südlichen Gebirgen von Bayern. München 1793. 8. Plantae rariores hortiensis. Fasc. 1. 2. Monach. 1817. Fol. und in einzelnen Abhandlungen.

Joh. August Schultes, Prof. in Landshut. Reichs Flora. B. 1—2. Wien 1794. 8. Linné Syll. vegetabilium ed. XV. Vol. 1—7. Stuttg. 1817—18. Die ersten Bände hat er mit dem verstorbenen J. Schultes und den letzten mit seinem Sohn dem Dr. Schultes herausgegeben.

Carl Friedr. Schultz, Arzt zu Neu-Brandenburg im Meklenburgischen. Prodromus florae Stargard.

VIII. Geschichte der Wissenschaft. 641

L. Berol. 1806. 8. Supplementum I. Neobrandenb. 19. 8.

Carl Heinrich Schultz, Professor in Berlin. Ueber die Circulation des Saftes im Schöllkraut. Berlin 21. Die Natur der lebenden Pflanze. Berl. 1823.

Friedrich Schwägrichen, Professor in Leipzig. Supplementum 1 et 2 zu Hedwigs species muscorum undosorum. Lips. 1811—26. 4. Historiae muscorum patricorum prodromus. Lips. 1814. 8. Jetzt bearbeitet die Moose zu Willdenows Species plantarum.


Aug. Fried. Schweigger, geb. 1783 Professor zu Tübingen, wurde im Jahre 1821, begriffen auf einer wissenschaftlichen Reise, in Sicilien ermordet. Er war auch vorzüglicher Zoolog und ist durch mehrere einzelne schätzbare Abhandlungen, so wie durch seine Flora Erlangensis. Erlang. 1811., die er mit F. Körte herausgegeben hat, bekannt.

Ludw. Dav. v. Schweinitz, Missionär der Mährischen Brüder-Gemeine in Nord-Amerika hat mit J. v. Albertini Conspectus fungorum in agro Niskiensi nascentium. Lips. 1805. 8., herausgegeben. Ferner: Fungum americanum monographia 1822 und mehrere einzelne Abhandlungen.

Nic. Carl Seringe in Genf. Essai d'une monographie des saules de la Suisse. Bern 1815. 8. Melanges botaniques. Vol. 1. Bern 1818. 8. Musée helvétique d'histoire naturelle. Vol. 1. Genev. 1823. 4.

Jac. Sims, hat nach Curtis die Herausgabe des Botanical Magazin besorgt.

Jac. Sowerby, war ein vorzüglicher Pflanzenmaler Willdenow's Grundriss. 1 Th.



Halle 1802 — 4. 3 Bände. 2te Aufl.
halensis tentamen novum. Halle 18
florae halensis cum cent. novarum
Observationes botanicae in floram
Vom Bau und der Natur der Gewä
8. Plantarum minus cognitarum pug
1815. 8. Plantarum umbelliferarum
1813. 8. Species umbelliferarum min
1818. 4. Novi proventus hortorum J
nensis. Halle 1818. 8. Grundzüge
lichen Pflanzenkunde. Leipzig 1820
dolle's Théorie élémentaire de la bot
Die Umbelliferen im 6ten Bande von
tes systema vegetabilium. Neue
ganzen Umfang der Pflanzenkunde.
1820—22. 8. Caroli Linnæi Systema
16; Vol. 1—5. 8. Goetting. 1825—18
zelne Abhandlungen.

Caspar Graf von Sternberg, Präsi

VIII. Geschichte der Wissenschaft. 643

Ernst Steudel, Arzt in Esslingen. *Nomenclator botanicus*. Vol. 1. 2. Stuttgart. 1821—24. 8.

Christian Steven, Russischer Etatsrath und Aufseher des Kaiserl. Gartens zu Nikita, hat mehrere botanische Abhandlungen geschrieben.

Robert Sweet, *Hortus suburbanus Londinensis*. Lond. 1818. 8. Geraniaceae. Lond. 1820. etc.

Michael Tenore, Professor zu Neapel und Director des botanischen Gartens daselbst. *Flora neapolitana*. fasc. 1—6. Neapol. 1811. Fol. *Prodromus florae neapolitanae*. Neap. 1811—1813. 8. *Synopsis novarum plantarum, quae in prodromo describuntur*. Neap. 1813. 8.

Leopold Trattinnik, Custos am Kaiserl. Königl. Museum in Wien. *Fungi austriaci, ad specimina viva expressi*. Vindeb. 1804—1805. *Archiv der Gesellschaftskunde*. Fasc. 1—4. Wien 1811. 1812. 4. *Flora des österreichischen Kaiserthums*. Wien 1816—1820. 2 Bände. 4. *Genera nova plantarum iconibus observationibusque illustrata*. Fasc. 1. Viennae 1825. 4. seq. neue Arten von Pelargonien. Wien 1825. gr. 8.

Ludw. Christ. Treviranus, Professor, vormals zu Stock, jetzt zu Breslau. Vom inwendigen Bau der Pflanzwächse. Götting. 1806. Beiträge zur Pflanzenphysiologie. Götting. 1811. Von der Entwicklung des Embryo und seiner Umhüllung im Pflanzenei. Berlin 1815. 4. Vermischte Schriften anatomischen und physiologischen Inhalts von G. R. und L. C. Treviranus. Götting. 1816—20. 4. Zeitschrift für Physiologie mit Tiedemann und G. R. Treviranus herausgegeben. Bd. 1. Heidelberg. 1824. seq. *Horti botanici Vratialis-*

644 VIII. Geschichte der Wissenschaft.

viensis plantarum vel novarum vel minus cognitarum manipulus.

Carl Bernh. Trinius, Mitglied der Akademie zu St. Petersburg. Fundamenta agrostographiae. Vindob. 1820. 8. Clavis agrostographiae antiquioris. Collog. 1822. 8. De graminibus unifloris et sesquifloris. Petrop. 1824. 8. Species graminum iconibus et descriptionibus illustratae. Fasc. 1—4. Petrop. 1825. 24. und mehrere einzelne Abhandlungen.

Dawson Turner, ein Engländer, A synopsis of the british Fuci. Lond. 1802. Muscologie hibernicae spicilegium. Yermouth 1804. 4. Fuci, or coloured figures and descriptions etc. Vol. 1—4. 1807. Fol.

Lor. von Vest, Professor zu Klagenfurt, bekannt durch sein Manuale botanicum. Klagenf. 1805. und viele einzelne Abhandlungen.

Domin. Viviani, Professor in Genua. Annali di botanica. 1. 2. Genova 1802. 1804. 4. Florae italicae fragmenta. Gen. 1808. 4. Florae libycae specimen. Gen. 1824. Fol. Florae corsicae prodromus, cum appendice. Gen. 1824. 1825. 4.

Georg Wahlenberg, Professor und Demonstrator der Botanik zu Upsala. Flora Lapponica. Berol. 1812. 8. De vegetatione et climate in helvetia septentrionali. Turici 1813. 8. Flora Carpathorum principum. Goetting. 1814. Flora upsaliensis. Upsal. 1820. Florae suecicae. P. I. et II. Stockholm 1824—1826. 8. und mehrere einzelne Abhandlungen.

Nathan Wallich, Director des botanischen Gartens in Calcutta. Tentamen florae nepalensis illustratae. Calcutt. et Seramp. 1824. Fol. und mehrere


VIII. Geschichte der Wissenschaft. 645

Esse Abhandlungen, auch erwarten wir von ihm eine ora nepalensis.

Joh. Emanuel Wickström, Custos am akademischen Museum in Stockholm. Dissertatio de Daphne. Mal. 1817. 4. und mehrere einzelne Abhandlungen.

G. H. Weber, Vater, Professor zu Kiel, gehörte zu Fr. W. Weiss (Plant. cryptogam. Flor. Götting. 1770. 8.) zu den ersten Deutschen, welche sich in die kryptogamischen Pflanzen verdient machten. Sein Spicilegium Florae Göttingensis. Gothae 1778 ist noch immer schätzbar. Sein Sohn, Professor daselbst, ist sich durch das Botanische Taschenbuch auf 1807, welches er mit dem verstorbenen M. H. Mohr herausgab, und worin die Moose gar sehr genau abgehandelt, so wie auch seinen Historiae Muscorum hepaticorum Prodrömus. Kiel. 1815. rühmlich bekannt gemacht.

C. L. Willdenow, geboren zu Berlin 1755 gestorben 1812 und Professor daselbst. Ein Mann hoch verdient um die Botanik. Prodrömus Florae berolinensis. Berol. 1787. Tract. bot. med. de Achilleis. Hal. 1789. Histor. Amaranthorum. Turici 1790. Fol. Phytographia. Erlang. 1796. Fol. Dieser Grundriss, wovon die erste Ausgabe Berl. 1792. erschien. Anleitung zum Selbststudium der Botanik. 1 Aufl. Berl. 1804. 2te Aufl. 1810. Car. a Linné Species plantarum. Berol. 1797. T. 1. der letzte Theil, welcher die Farne abhandelt, erschien 1810. Berlinische Baumzeit. Berl. 1796. 2te Aufl. 1811. Enumeratio plantarum Horti botanici Berolinensis. Berol. 1809. 2 Th. ortus Berolinensis. Berol. 1809. Fol. Fasc. I—X.



Erklärung der Kupfer.

ERSTES KUPFER.

1. Das Blatt von *Pelargonium peltatum* ist schildförmig (peltatum p. 91) und fünfeckig (quinguangulare p. 76).
2. Das Blatt von *Citrus Aurantium* ist eiförmig (ovatum p. 74), ganzrandig (integerrimum p. 77) und hat einen geflügelten Blattstiel (petiolus alatus p. 52).
3. *Parmelia stellaris* ist eine Flechte (*Lichenes* p. 236) mit kreisförmigem Laube (thallus orbiculatus p. 99) und Schüsselförmigen (scutellae p. 204) in der Mitte.
4. *Agaricus conspurcatus* ein Pila (*Fungus* p. 236). Der Strunk (stipes p. 48) hat einen sitzenden Ring (annulus sessilis p. 109) der Hut ist nablicht (pileus umbonatus p. 110) und sparrig (scurrosus p. 111).
5. Eine körnige Wurzel (radix granulata p. 27) von der *Saxifraga granulata*.
6. *Peziza* ein kleiner Pilz (*Fungus* p. 236) mit nacktem Strunk (stipes nudus p. 48) und hohlem Hute (pileus concavus p. 110).
7. *Gastrum pedicellatum* ein Bauchpilz (*Gasteromycus* p. 236) mit sternförmigem Umschlag (peridium stellatum p. 116) von kuglichter Gestalt (globosus p. 114) und haariger Oeffnung (orificium ciliatum) des Umschlages (peridium) p. 115).
8. Das Blatt der *Spiraea Filipendula*, es ist ungleich gefiedert (interrupte-pinnatum p. 85). Das Blättchen (pinnula p. 95) ist lanzettensförmig (lanceolata) und ungleich gezähnt (inaequaliter dentata).
9. Der Blumenschaft (scapus p. 47) des Feldschachtelhalms (*Equisetum arvense*). Dieses Gewächs gehört zu den Gliederfaarn (*Gonopterides* p. 235).

10. Die Blume vom *Equisetum* stark vergrößert, zeigt vier Staubgefäße und einen Stempel ohne Griffel.
11. Die Aehre des *Equisetum* besteht aus sehr zahlreichen gestielten, schildförmigen, sechseckigen Fruchtböden (*receptaculum peltatum sexangulare*), davon einer hier vergrößert abgebildet ist, woran die sackförmigen Decken (*indusia corniculata* p. 116) befestigt sind, welche die in voriger Figur beschriebenen Blumen enthalten.
12. Die Wurzel der *Spiraea Filipendula* ist knollig und hängend (*tuberosa pendula* p. 28).
13. Die Wurzel des *Cymbidium Corallorhizon* ist gezähnt (*dentata* p. 25).
14. *Celastrus buxifolius* hat einen geknieten Stengel (*caulis flexuosus* p. 40), Dornen (*spinæ* p. 123) umgekehrt eiförmige Blätter (*folia obovata* p. 94), die büschelweis stehn (*fasciculata* p. 90).
15. *Polypodium vulgare*, ein Farnkraut, (*Filix* p. 235), der Stock ist wagerecht (*caudex horizontalis* p. 34), die Knospe schneckenförmig gedreht (*gemma circinata* p. 120), der Wedel ist halb gefiedert (*frons pinnatifida* p. 97). Auf der Unterflache des Wedels sind runde Häufchen (*sori subrotundi* p. 69).
16. Eine handförmige Wurzel (*radix palmata* p. 27) von der *Orchis latifolia*.
17. Eine häutige Zwiebel (*bulbus tunicatus* p. 28), von *Alhum Cepa*.
18. Eine bodenförmige Wurzel (*radix testiculata* p. 27) von der *Orchis mascula*.
19. Die schuppige Zwiebel (*bulbus imbricatus* p. 28) von *Lilium bulbiferum*.
20. *Sida hederacfolia* hat einen rankigen Stengel (*caulis sarmentosus* p. 40), herzförmige Blätter (*folia cordata* p. 73), die ausgeschweift (*repanda* p. 78), gestielt (*petiolata* p. 91) und zwar randstielig (*palacea* p. 91) sind. Der Blumenstiel ist schaftartig (*pedunculus radicalis* p. 54), die Blumendecke einfach (*perianthium simplex* p. 131), die Blumenkrone malvenartig (*corolla malvacea* p. 140), die Staubfäden verwachsen (*filamenta connata* p. 153).
21. Die büschelartige Wurzel (*radix fascicularis* p. 27) von *Epipactis Nidus avis*.

ZWEIFTES KUPFER.

22. Ein rautenförmiges Blatt (*folium rhombeum* p. 75) von *Hibiscus rhombifolius*.

23. *Malva tridactylites* hat ein dreitheiliges Blatt (*folium trifidum* p. 72), einblumigen Blumenstiel (*pedunculus uniflorus* p. 53) doppelte Blumendecke (*perianthium duplex* p. 131), malvenartige Blumenkrone (*corolla malvacea* p. 140) und gehört zur 16ten Linnéschen Klasse (*Monadelphia* p. 225).
24. Ein geigenförmiges Blatt (*folium panduraeforme* p. 75), von der *Euphorbia cyathophora*.
25. *Banisteria purpurea*, hat einen rechts gewundenen Stengel (*caulis dextrorsum volubilis* p. 41), gegenüberstehende Blätter (*folia opposita* p. 89), die elliptisch sind (*elliptica* p. 74) und trägt eine Doldentraube (*corymbus* p. 66).
26. Der Theil eines Grashalms (*culmus* p. 46) mit einem Blatte, an dessen Basis das Blathäutchen (*ligula* p. 107) zu sehen ist.
27. *Passiflora tiliaefolia* hat einen runden Stengel (*caulis teres* p. 42), herzförmiges Blatt (*folium cordatum* p. 73), gepaarte Aetherblätter (*stipulae geminae* p. 102), eine Achselranke (*cirrhus axillaris* p. 118), einblumigen Blumenstiel (*pedunculus uniflorus* p. 53), vielblättrige Blumenkrone (*corolla polypetala* p. 138). Honiggefäße die aus geraden Faden (*fila recta* p. 149) bestehn, und einen gestielten Fruchtknoten (*germen pedicellatum* p. 160).
28. *Nepenthes destillatoria*, hat ein lanzettensförmiges Blatt (*folium lanceolatum* p. 75) das einen gestielten Schlauch (*ascidium pedicellatum* p. 106) trägt.
29. Ein vierseitiger Stengel (*caulis tetragonus* p. 43), mit sternförmigen Blättern (*folia stellata* p. 90) die zu sechsen beisammen stehn (*sexa* p. 90) und linienförmig (*linearia* p. 75) sind.
30. Eine VVicke mit abwechselnd gefiederten Blättern (*folia alternatim pinnata* p. 85), die Blättchen (*pinnulae* p. 95), sind stechend (*mucronatae* p. 72). Die Blumen stehn in einer Traube (*racemus* p. 64), die Blumenkrone ist schmetterlingsartig (*corolla papilionacea* p. 141).
31. Ein eiförmiges Blatt (*folium ovatum* p. 74) was ausge-
randet ist (*emarginatum* p. 72).
32. *Humulus Lupulus* hat einen links gewundenen Stengel (*caulis sinistrorsum volubilis* p. 41), gegenüber stehende Blätter (*folia opposita* p. 89), die dreilappig (*triloba* p. 76) und gezähnt (*dentata* p. 78) sind.

DRITTES KUPFER.

33. *Orchis latifolia* blüht in einer Aehre (*spica* p. 62), die Nebenblätter (*bractae* p. 104) hat. Der Fruchtknoten

- ist unten, (germen inferum p. 160), die Blüthenkrone orchisähnlich (corolla orchidea p. 142).
34. *Poa trivialis* hat eine Rispe (panícula p. 66).
35. Das Blatt von *Lacis fluviatilis* ist zerrissen (laciniatum p. 77) und kraus (crispum p. 81).
36. Eine zusammengesetzte Dolde (umbella composita p. 65) hat eine allgemeine Hülle (involucrum universale p. 108) und eine besondere (partiale p. 108).
37. Das Kätzchen (amentum p. 68) von *Corylus Avellana* besteht aus Schuppen (squamae p. 136).
38. *Bupleurum rotundifolium* hat einen durchwachsenen Stengel (caulis perfoliatus p. 41, s. folium perfoliatum p. 92), eine arme Dolde (umbella depauperata p. 60) und fünfblättrige Hülle (involucrum pentaphyllum p. 108).
39. *Scelopendrium officinarum* hat einen verworrenen Wedel (frons daedalea p. 72) und gehört zu den Farnekräutern (Filices p. 235), hat auf der Unterfläche linienförmige Häufchen (sori lineares p. 69), die in der Quere stehn (transversi p. 69), mit einer doppelten Decke (indusium duplex p. 117).
40. Die Spindel (rachis p. 49) von einem Kätzchen der *Corylus Avellana*.
41. Die Blume vom *Arum maculatum* hat eine einklappige Scheide (spatha univalvis p. 105), in deren Mitte der Kolben (spadix p. 67) steht.
42. Der Kolben (spadix p. 67) der vorigen Blume hat unten weibliche, oben männliche Blüten.
43. Die Alterdolde (cyma p. 66) von *Viburnum Opulus*, hat am Rande grosse geschlechtslose Blumen (flore neutri p. 128).
44. *Sagittaria sagittifolia* hat pfeilförmige Blätter (folia sagittata p. 73), einen rinnenförmigen Blattstiel (petiolum canaliculatus p. 52) einen Schaft (scapus p. 47) der dreiseitig (trigonus) ist. Die Blumen stehn in Quirl (verticillus p. 58) und sind dreiblättrig (corolla tripetala p. 141).

VIERTES KUPFER.

45. Ein Staubgefäß der *Digitalis purpurea*. Der Staubfaden (filamentum p. 152) ist zusammengedrückt, gekrümmt (incurvum p. 153), der Staubbeutel ist gedoppelt (anthera didyma p. 155).
46. Der Stempel von *Turnera frutescens*. Der Fruchtknoten ist länglich (germen oblongum), dreifurchig (tri-

- sulcum), auf ihm sitzen drei Griffel (*styli tres*) die vietheilig (*multifidi* p. 161) sind.
47. Ein Staubgefäß, dessen Staubfaden ausgebreitet (*filamentum dilatatum* p. 153) und dessen Staubbeutel herzförmig (*anthera cordata*) ist.
 48. Ein Staubgefäß mit ausgebreiteten herzförmigen Staubfaden (*filamentum cordatum* p. 153) und aufrecht stehendem Staubbeutel (*anthera erecta* p. 156).
 49. Die Blume von *Linaria repens* hat eine verlarvte Blumenkrone (*corolla personata* p. 140), unten hat sie einen Sporn (*calcar* p. 148).
 50. Die ganze Blume von *Teucrium fruticans* hat eine einlippige Blumenkrone (*corolla unilabiata* p. 140), die Staubfäden sind fadenförmig (*filamenta filiformia* p. 153), aufwärtssteigend (*adscendentia*), der Griffel ist fadenförmig (*stylus filiformis* p. 161), die Narbe zweitheilig (*stigma bifidum* p. 163), die Blume gehört zur vierzehnten Linnéschen Klasse (*Didynamia* p. 225).
 51. Die Blumenkrone der vorigen Blume besonders, ist einblättrig (*corolla monopetala* p. 138), sie hat nur eine Unterlippe (*labium inferius* p. 144).
 52. Die Blume des *Philadelphus coronarius*. Die Blumenkrone ist vierblättrig (*corolla tetrapetala* p. 141).
 53. Die Blumendecke der vorigen ist einblättrig (*perianthium monophyllum* p. 131), viertheilig (*quadrifidum* p. 131), weil die Staubgefäße zahlreich sind und auf der Blumendecke stehn, gehört die Pflanze zur zwölften Linnéschen Klasse (*Icosandria* p. 225).
 54. Der Stempel der vorigen Blume (*pistillum* p. 160).
 55. Ein Staubgefäß mit ausgebreitetem Staubfaden und aufliegendem Staubbeutel (*anthera incumbens* p. 156), der beweglich ist (*anthera versatilis* p. 157).
 56. Eine malvenartige Blumenkrone (*corolla malvacea* p. 140) mit verwachsenen Staubfäden (*filamenta connata* p. 156).
 57. Die Blumendecke der vorigen Blume ist doppelt (*perianthium duplex* p. 131), in der Mitte derselben sieht man deutlich die zusammengewachsenen Staubfäden.
 58. Die Staubgefäße der *Carolina princeps*, deren Staubfäden unten zusammengewachsen, oben aber frei sind, die meisten Staubfäden sind bei dieser Figur weggeschnitten, ein einziger ist stehn geblieben, woran man sehn kann, dass er ästig (*filamentum ramosum* p. 153) ist. Die Staubbeutel sind rund und stehn aufrecht.
 59. Die Blume von *Centaurea Cyanus* ist zusammengesetzt (*flos compositus* p. 127), und mit einer allgemeinen

Blumendecke (*anthodium* p. 134) umgeben, die dachziegelförmig (*imbricatum* p. 135), kreiselförmig (*tubulatum* p. 135) ist.

60. Ein Blümchen aus der Mitte der vorigen Blume genommen, ist röhrig (*corolla tubulosa* p. 138), der Fruchtknoten hat ein Federchen (*pappus* p. 136).
61. Das Blümchen vom Rande der *Centaurea Cyanus* ist umgestaltet (*corolla difformis* p. 139).
62. Die Blume der *Campanula rotundifolia* hat eine fünfteilige Blumendecke (*perianthium quinquepartitum* p. 131), und eine glockenförmige Blumenkrone (*corolla campanulata* p. 138).
63. Das Staubgefäß von *Vaccinium* hat einen fadenförmigen Staubfaden, und zweihörnigen Staubbeutel (*anthera bicornis* p. 155).
64. Das Staubgefäß vom *Taxus baecata* hat einen schiffelförmigen gezähnten Staubbeutel (*anthera peltata et dentata* p. 155).
65. Das Staubgefäß von *Laminum* hat einen aufliegenden Staubbeutel (*anthera incumbens* p. 156) der haarig ist (*pilosa* p. 155).
66. *Galanthus nivalis* hat eine einblumige Scheide (*spatha uniflora* p. 105), eine lilienartige dreiblättrige Blumenkrone (*corolla liliacea tripetala* p. 141), einen dreiblättrigen Kranz (*corona triphylla* p. 149), der Fruchtknoten ist unten (*germen inferum* p. 160).
67. Ein Staubgefäß mit pfriemförmigem Staubfaden (*filamentum subulatum* p. 153) und aufrechtem pfeilförmigen Staubbeutel (*anthera erecta* p. 156 *sagittata* p. 155).
68. Das Staubgefäß von *Glechoma hederacea* hat einen niereenförmigen Staubbeutel (*anthera reniformis* p. 155) der seitwärts festsetzt (*lateralis* p. 156).
69. Ein Staubgefäß mit angewachsenem Staubbeutel (*anthera adnata* p. 157).
70. Der Stempel von *Iris germanica* hat einen gefurchten Fruchtknoten (*germen oblongum sulcatum*) der Griffel ist fadenförmig (*stylus filiformis* p. 161), der Narben sind drei, (*stigmata tria*) die kronenartig sind (*petaloides* p. 163).
71. Die Blume der *Iris germanica* hat den Fruchtknoten unten (*germen inferum* p. 160), eine einblättrige, lilienartige Blumenkrone, die sechstheilig (*sextipartita*) ist; drei Einschnitte stehn aufrecht, und drei sind zurückgebogen, auf diesen letztern zeigt sich der Bart (*barba* p. 149).
72. Die Blume der *Salvia officinalis* hat eine rachenförmige Blumenkrone (*corolla ringens* p. 139).

73. Die Blumendecke derselben ist Lippenförmig (*perianthium bilabiatum* p. 132).
74. Der Stempel der Blume hat vier Fruchtknoten, einen fadenförmigen Griffel und zweitheilige Narbe.
75. Die Blume von *Bellis perennis* ist zusammengesetzt (*flos compositus* p. 127), und zugleich eine Strahlenblume (*flos radiatus* p. 129), der mittlere Theil heisst die Scheibe (*discus* p. 129), der Rand wird Strahl (*radius* p. 129) genannt.
76. Dieselbe Blume von der Hinterseite vorgestellt, woran die allgemeine halbkugelfunde Blumendecke (*anthodium hemisphaericum* p. 135) zu sehen ist.
77. Ein kegelförmiger allgemeiner Fruchthoden (*receptaculum commune conicum* p. 202).
78. Die Blume von *Galium boreale* seitwärts vorgestellt.
79. Die Blumenkrone desselben ist radförmig (*corolla rotata* p. 139), und die Pflanze gehört zur vierten Klasse (*Tetrandria* p. 225).
80. Ein Staubgefäss der *Salvia officinalis*. Es steht qucer über einem andern Faden, ist beweglich und geghedert (*filamentum articulatum* p. 153).
81. Die aufgeschnittene Blume von *Symphytum officinale* zeigt 5 Klappen (*fornicee* p. 148), worunter die Staubgefässe befestigt sind, aus deren Zahl man sieht, dass die Pflanze zur fünften Klasse (*Pentandria* p. 225) gehört.
82. Dieselbe Blume hat eine becherförmige Blumenkrone (*corolla cyathiformis* p. 138).
83. Die Blume der *Periploca graeca* hat eine fünfblättrige Blumenkrone (*corolla pentapetala* p. 141) mit hornförmigen Fäden (*fila corniculata* p. 149).
84. Eine zungenförmige Blumenkrone (*corolla ligulata* p. 139) aus der folgenden Blume genommen. Die Staubbeutel sind verwachsen (*antherae connatae* p. 156) als das Kennzeichen der neunzehnten Klasse (*Syngenesia* p. 225).
85. Die Blume von *Hieracium murorum* ist zusammengesetzt (*flos compositus*), besteht blos aus zungenförmigen Blumenkronen. Man nennt sie eine geschweifte Blume, *flos semiflosculosus* p. 128), sie gehört zur ersten Ordnung der neunzehnten Klasse (*Syngenesia Polygamia aequalis* p. 228).
86. Eine einzelne Blume aus dem *Carduus nutans*, sie ist röhrig (*corolla tubulosa* p. 138).
87. Dieselbe aufgeschnittene Blume zeigt den Charakter der neunzehnten Klasse.

88. Die Blume der *Periploca graeca* ohne Blumenkrone und hornförmige Fäden. Es ist bloss die Kappe (cucullus p. 147) mit den Staubgefässen zu sehn.
89. Der Stempel derselben Pflanze stark vergrössert, der Fruchtknoten ist doppelt, der Griffel einfach und die Narbe sehr gross.
90. Ein Staubgefäss der vorigen Pflanze, sehr stark vergrössert mit dem Bart (barba p. 149).
91. Ein Blumenblatt der *Periploca graeca*, aufwärts gebogen mit zwei hornförmigen Fäden.
92. Ein Staubgefäss derselben, wie Fig. 90., nur dass die Staubbeutel schon geöffnet sind.
93. Ein vielblumiges Grasährchen (*spicula multiflora* p. 61) *Festuca elatior*.
94. Drei Staubgefässe nebst Stempel und Honiggefässen desselben Grases. Das Honiggefäss (nectarium p. 150) umgiebt den Fruchtknoten. Die beiden Narben sind federartig (*stigmata plumosa* p. 163), die Staubfäden sind haarförmig (*filamenta capillaria* p. 152), die Staubbeutel zweispaltig (*antherae bifidae* p. 155).
95. Die Blumenkrone desselben Grases mit Stempel und Staubgefässen, die Blumenkrone ist zweispelzig (*bivalvis* p. 133).
96. Der Balg mit dem gedrehten Fruchtboden, der Balg ist zweispelzig (*gluma bivalvis* p. 133).
97. Derselbe Balg einzeln, woran man sehen kann, dass die Spelzen (*valvulae* p. 133) von ungleicher Länge sind.
98. Die Blume der *Stapelia hirsuta* um den fünften Theil verkleinert.
99. Die beiden Fruchtknoten derselben.
100. Der vielblättrige Kranz (*corona polyphylla* p. 149) derselben Blume.
101. Ein vielblumiges Grasährchen (*spicula multiflora*) vom *Bromus secalinus*.
102. Der zweispelzige Balg desselben.
103. Die zweispelzige Blumenkrone mit einer Granne (*arista* p. 124).
104. Der zweispelzige Balg mit der gebogenen Spindel (*rachis* p. 49).
105. Die schmetterlingsartige Blumenkrone (*corolla papilionacea* p. 141) einer *Vicia*.
106. Die Fahne (*vexillum* p. 142) derselben Blume.
107. Die Flügel (*Alae* p. 142) derselben.
108. Das Schiffchen (*carina* p. 142) derselben.

09. Die Staubgefäße dieser Blume haben das Kennzeichen der siebzehnten Klasse (*Diadelphia* p. 225).

FÜNFTES KUPFER.

10. Die Blume der *Lychnis Viscaria* hat eine röhrenförmige Blumendecke (*perianthium tubulosum* p. 132), nelkenartige Blumenkrone (*corolla caryophyllacea* p. 141), und gehört in die zehnte Klasse (*Decandria* p. 225).
11. Das Blumenblatt (*petalum* p. 142) dieser Pflanze hat einen langen Nagel (*unguis* p. 142), und einen zweizähligen Kranz (*corona* p. 149).
12. Die Blume der *Cucullaria excelsa* stark vergrößert. Sie hat eine unregelmässige Blumenkrone (*corolla irregularis* p. 142), einen Sporn, (*calcar* p. 148), die Staubbeutel (*antherae* p. 154) sind auf dem untern Blumenblatte befestigt und die Narbe ist keulförmig (*stigma clavatum* p. 162).
13. Dieselbe Blume in natürlicher Grösse.
14. Eine trichterförmige Blumenkrone (*corolla infundibuliformis* p. 139) mit einem Bart (*barba* p. 149), verschlossen, von *Lasiostoma cirrhosum*.
15. Die Blume der *Rupala montana*, deren Staubgefäße auf der Spitze der Blumenblätter stehen (p. 253).
16. *Lacis fluviatilis* hat eine einfache Blume ohne Kelch und Blumenkrone, man nennt eine solche nackt (*flos nudus* p. 128).
17. Die Blume von *Ascium coccineum* hat hinter der Blume ein gestieltes schlauchartiges Nebenblatt (*bractea ascidiformis* p. 106).
18. Die Blume der *Matthiola scabra* hat eine becherförmige Blumendecke (*perianthium urceolatum* p. 132) und becherförmige Blumenkrone (*corolla cyathiformis* p. 138), die gezähnt (*crenata*) ist.
19. Die Blume der *Ruyschia Surubea* hat ein sitzendes, zweilappiges, schlauchartiges Nebenblatt (*bractea ascidiformis* p. 106).
20. Die Blumenknospe dieser Pflanze ohne schlauchartiges Nebenblatt.
21. Das schlauchartige Nebenblatt allein.
22. Die Blume geöffnet.
23. Der kuchenförmige Fruchtboden (*receptaculum placentiforme* p. 202) mit Blumen besetzt von der *Dorstenia cordifolia*.
24. Eine einzelne männliche Blume (*flos maseulus* p. 128) derselben.

Erklärung

- weibliche Blume (flos foemineus p. 128) d.
Blume der *Dimorpha grandiflora*, welche
der sonderbaren Blumenkrone auszeichnet.
127. männliche Blume eines Laubmooses mit
bedeckten Saftfäden (paraphyses p. 152),
abgefasst (p. 152), von denen einige stäuber
nicht so weit entfaltet sind, und wieder
n. ausgestäubt haben.
- Staubgefäß vom Torfmoose (*Sphagnum*).
elbe stäubend.
- Staubfaden mit drei keulenförmigen Saftfä
dmooses.
- Mooses mit Stempel u
laubmoose.
- ines Laubmooses ohne
yses p. 164).
- den.
- ne von am hat eine unregelmä
menarone (corolla ir
gularis p. 142).
135. Die gestülten T p (cuculli p. 147) ders
den Staubg n Stempeln.
136. Die haarige ypra villosa p. 180) v
trichum coh.
137. Der Deckel (operculum p. 180) von *Polytrichum* e
138. *Bryum androgynum* hat einen 5stigen Stern
männlichen Blumen sitzen auf Stielen und si
förmig (flores capituliformes p. 129), die Büch
cae p. 179) stehn auf langen an der Spitze d
gels entspringenden Borsten (setae terminales
einer Büchse sieht man eine halbe Mütze (cal
mediata p. 180); eine andere mit und noch e
Deckel.
139. *Polytrichum commune* hat einen einfachen St
Büchse ist mit einer haarigen Mütze bedeckt.
140. Die Borste (seta p. 55) dieses Mooses mit de
(Perichaetium p. 137) und die Kapsel ohne D
141. Die Büchse desselben Mooses mit dem Deckel
Ansatz (apophysis p. 182).
142. Dasselbe Moos mit männlicher sternförmiger
(flos disciformis p. 129).
143. Die Blume von *Senecio vulgaris* hat eine gek
gemeine Blumendecke (anthodium calyculatum
144. Die Blume von *Sterculia crinita* hat einen
Fruchtknoten (germen pedicellatum p. 160).
145. Die Blume von *Cheiranthus annuus* hat eine l
mige Blumenkrone (corolla cruciata p. 141).

16. Die Blume einer Narzisse hat eine einblumige Scheide (spatha uniflora p. 105), eine lilienartige Blumenkrone (corolla liliacea p. 141) und einblättrigen Kranz (corona monophylla p. 149).
17. Das Blumenblatt des Cheiranthus annuus, woran die Platte (lamina p. 142) und der Nagel (unguis p. 142) zu sehn ist.
18. Die vierblättrige Blumendecke (perianthium tetraphyllum p. 131) dieser Pflanze, mit dem Stempel und einer Drüse (glandula p. 146) im Grunde der Blume.
19. Der Griffel und die Staubgefäße derselben Pflanze, woran man sieht, dass sie zur funfzehnten Klasse (Tetradynamia p. 225) gehört.
20. Die Blume des Hypericum hat eine rosenartige Blumenkrone (corolla rosacea p. 140), die Staubfäden sind in mehrere Bündel vereinigt, woraus das Kennzeichen der achtzehnten Klasse (Polyadelphia p. 225) zu sehn ist.
21. Der Stempel derselben Blume hat drei Griffel (trigynia p. 227).
22. Die Blume der Centaurea Verutum hat eine allgemeine dornige Blumendecke (anthodium spinosum p. 135), die Dornen sind ästig (spinæ ramosæ p. 135).
23. Die Blume der Fuchsia excorticata hat eine trichterförmige Blumenkrone (corolla infundibuliformis p. 139), vierblättrigen Kranz (corona tetraphylla p. 149), und dreilappige Narbe (stigma trilobum p. 163).
24. Dieselbe Blume aufgeschnitten, woran man die achte Klasse (Octandria p. 225) erkennen kann.

SECHSTES KUPFER.

5. Eine querdurchschnittene Samenkapsel (capsula p. 168) von Colchicum autumnale. Sie ist dreifächrig (trilocularis p. 169).
6. Dieselbe Kapsel, ganz an der Spitze aufspringend (apice dehiscens p. 170), und dreiklappig (trivalvis p. 169).
7. Zwei sich lösende Samen der Caulis daucoides, welche stachelicht (semina aculeata) sind.
8. Ein einzelner Same derselben Pflanze.
9. Die Frucht der Magnolia grandiflora hat das Ansehn eines Zapfens (p. 186). Sie besteht aus einfächrigen zweiklappigen Kapseln (capsulae uniloculares bivalves p. 169) die übereinander liegen. Die Samen haben eine sehr lange Nabelschnur (funiculus umbilicalis p. 189), die weit herunterhängt; sie sind aber mit einer

sieht.

164. Der Same von *Clematis Vitalba* hat (cauda p. 197).
165. Eine aufgeschnittene Hautfrucht der *A*
166. Ein Büschel Hautfrüchte (utriculus) der Pflanze.
167. Eine linienförmige Kapsel (capsula) von *Linum montanum*.
168. Ein Same dieser Kapsel mit der Vv.
169. Dieselbe Kapsel aufgesprungen, worin (columella p. 169) zu sehn ist.
170. Eine Balgkapsel (folliculus p. 168) der
171. Die Nuss aus der Steinfrucht der *Pet* um den dritten Theil verkleinert.
172. Dieselbe Steinfrucht (Drupa p. 172) ganz verkleinert.
173. Diese Steinfrucht querdurchgeschnitten, eine zweifächrige Nuss (nux bilocularis p. 173).
174. Die Hülse (legumen p. 177) von *Pisu*
175. Dieselbe geöffnet, woran die Kennzeichen zu sehn sind.
176. Die Büchse (theca p. 179) von *Polyt* stark vergrößert, hat unten einen platten Aufsatz (apophysis depressa p. 183), ist wie ein 32mal gezähntes Maul (peristoma p. 181) und ist mit einem Zwergfelde (p. 182) verschlossen.
177. Die Büchse der *Tetraphis pellucida* hat

- 182. *Dicranum* hat ein sechszehnmahl gezähntes Maul mit gespaltenen Zähnen (*dentis bifidi* p. 181).
- 183. *Trichostomum* hat dasselbe Maul, nur dass die Zähne viel tiefer gespalten sind.
- 184. *Barbula* hat ein Maul mit gedrehten Zähnen (*dentis contorti* p. 182).
- 185. Ein Samenkorn mit gestieltem Federchen (*pappus stipitatus* p. 195), was fedrig (*plumosus* p. 196) ist.
- 186. Ein Samenkorn mit gestieltem haarigen Federchen (*capillaris* p. 196).
- 187. Ein Schötchen (*silicula* p. 176).
- 188. Die Scheidewand (*dissepimentum* p. 185) derselben Frucht, mit Samen besetzt.
- 189. Ein Samenkorn mit sitzendem Federchen (*pappus sessilis* p. 195) was borstenartig (*setaceus* p. 196) ist.
- 190. Eine aufgesprungene Schote (*siliqua* p. 176) an der die Scheidewand sichtbar ist.
- 191. Dieselbe geschlossen.
- 192. Die Gliedhülle (*lomentum* p. 178) von *Bactrylobium* *Fistula*.
- 193. Der Zapfen *strobilus* (p. 186) der *Pinus Picea* stark verkleinert.
- 194. Die Gliedhülle des *Bactrylobium* *Fistula* geöffnet, um deren Kennzeichen zu bemerken.

SIEBENTES KUPFER.

- 195. Die Blume von *Helleborus niger* hat eine rosenartige Blumenkrone (*corolla rosacea* p. 140), die Pflanze gehört zur dreizehnten Klasse (*Polyandria* p. 225).
- 196. Das Honiggefäß dieser Blume ist eine Kappe (*cueullus* p. 147).
- 197. Ein herzförmig schiefes Blatt (*folium subdimidiato-cordatum* p. 75) der *Begonia niuda*, der Rand ist wellenförmig (*undulatum* p. 78). In Rücksicht der Adern ist es aderrippig (*venoso-nervosum* p. 82).
- 198. Ein aderrippiges Blatt (*folium venoso-nervosum* p. 82).
- 199. Ein blättriger Kopf (*capitulum foliosum* p. 60) von *Gomphrena globosa*.
- 200. Ein dreirippiges Blatt (*folium trinervium* p. 81).
- 201. Ein fünffach geripptes Blatt (*folium quintuplinervium* p. 82).
- 202. Ein siebenfach geripptes Blatt (*folium septuplinervium* p. 82).
- 203. Ein herzförmiges Blatt, das gekerbt (*crenatum* p. 78) und siebenrippig (*septemnervium* p. 82) ist.

204. Die ganze Steinfrucht (drupa p. 172) der *Myristica moschata*.
205. Die gemeine Eichel ist eine Nuss (nux p. 172).
206. Die Nuss der *Myristica moschata* von der sogenannten Muskatenblume umgeben, die eigentlich eine zerschlissene Samendecke (arillus lacerus p. 194) ist.
207. Ein dreifach dreizähliges Blatt (folium triternatum p. 84).
208. *Hovenia duleis* hat Blumenstiele, die sich in einen fleischigen Körper verwandeln der einem Fruchtboden nicht unähnlich ist (p. 201).
209. Die Nuss der *Myristica moschata* ohne Samendecke.
210. Die Frucht der *Passiflora foetida* mit der bleibenden Blütendecke (perianthium persistens p. 130).
211. Die Nuss der *Myristica moschata* aufgeschnitten, worin der Kern (nucleus p. 172) zu sehen ist.
212. Die aufgeschnittene Kürbisfrucht (pepo p. 175) der *Passiflora foetida*.
213. *Fragaria vesca* hat einen fleischigen Fruchtboden (receptaculum carnosum p. 200) und trägt die Samen frei (vegetabile gymnospermum (p. 165)).
214. Die Frucht vom *Anacardium occidentale* hat einen birnförmigen Fruchtboden (p. 201) und eine Nuss (aus p. 172).
215. *Gomphia Japotapita* hat einen fleischigen Fruchtboden (receptaculum carnosum p. 201) auf welchem Beeren (baccae p. 173) sitzen.
216. *Semecarpus Anacardium* hat einen fleischigen Fruchtboden, worauf eine Nuss befestigt ist.
217. Das Blatt von *Inga Unguis cati* ist doppelt gezweit (folium bigeminatum p. 84).
218. Ein flacher Fruchtboden (receptaculum planum p. 202), der punktiert (punctatum p. 203) ist.
219. Die Feige (*Ficus Carica*) hat einen geschlossenen Fruchtboden (receptaculum clausum p. 202).
220. Dieselbe aufgeschnitten um die innerhalb befindlichen Blumen zu zeigen.
221. Ein kegelförmiger Fruchtboden (receptaculum conicum p. 202).
222. Ein verbunden gefiedertes Blatt (folium conjugato-pinnatum).

ACHTES KUPFER.

- 223 *Boletus bovinus* ein Pilz (Fungus p. 236) mit nacktem

- Strunke (*stipes nudus* p. 48) rundem Hute (*pileus convexus* 110) der unten Löcher (*pori* p. 113) hat.
14. *Hydnum imbricatum* ein Pilz (*Fungus* p. 236) der auf der Unterseite des Huts Stacheln (*echini* p. 113) hat.
15. *Agaricus integer* ein Pilz, der auf der Unterseite des Huts Plättchen (*lamellae* p. 112) hat.
16. *Peltidea canina* eine Flechte (*Lichen* p. 236) mit lederartigem Laube (*thallus coriaceus* p. 99) und Schildern (*peltae* p. 204).
17. *Jungermannia resupinata* ein Lebermoos (*Hepatica* p. 236) mit vierklappiger Kapsel (*capsula quadrivalvis* p. 171).
18. Eine *Euphorbia* mit warzenförmigen Blättern (*folia verrucosa* p. 89).
19. *Berckheya ciliaris* hat dachziegelförmige Blätter (*folia imbricata* p. 90) die gewimpert (*ciliata* p. 79) sind.
20. *Mesembrianthemum uncinatum* hat ein hakenförmiges Blatt (*folium uncinatum* p. 89).
21. *Mesembrianthemum deltoideum* hat deltaförmige Blätter (*folium deltoides* p. 89).
22. Ein säbelförmiges Blatt (*folium acinaciforme* p. 88).
23. Der gegliederte Stengel (*caulis articulatus* p. 43) eines Cactus.
24. Ein dreimal gezweites Blatt (*folium trigeminatum* p. 84) von *Inga tergemina*.
25. Ein halbrunder Stengel (*caulis semiteres* p. 42).
26. Ein dreikantiger Stengel (*caulis triquetrus* p. 43).
27. Ein viereckiger Stengel (*caulis quadrangularis* p. 43).
28. Ein spatelförmiges Blatt (*folium spathulatum* p. 75).
29. Ein gliedweise gefiedertes Blatt (*folium articulate* pinnatum p. 86) von *Fagara Pterota*.
30. Ein herablaufend gefiedertes Blatt (*folium decursive* pinnatum p. 86) von *Melanthus major*.
31. Ein doppelt zusammengesetztes Blatt (*folium decompositum* p. 86) von *Aegopodium Podagraria*.
32. Ein schrotsägenförmiges Blatt (*folium runcinatum* p. 77).
33. Ein leierförmiges Blatt (*folium lyratum* p. 77).
34. Ein hobelförmiges Blatt (*folium dolabriforme* p. 89).
35. Ein parabolisches Blatt (*folium parabolicum* p. 74).
36. Ein gefusstes Blatt (*folium pedatum* p. 85) von *Helleborus niger*.
37. Ein dreifach gefiedertes Blatt (*folium tripinnatum* p. 86).
38. Ein ungleiches (*folium inaequale* p. 73) und doppelt gezähntes (*duplicato-dentatum* p. 78) Blatt von *Ulmus campestris*.
39. Ein doppelt gefiedertes Blatt (*folium bipinnatum* p. 86).

250. Eine tutenförmige Knospe (*gemma convoluta* p. 119).
 251. Eine eingerollte Knospe (*gemma involuta* p. 119).
 252. Eine zurückgerollte Knospe (*gemma revoluta* p. 119).
 253. Eine doppelt liegende Knospe (*gemma conduplicata* p. 120).
 254) Eine reitende Knospe (*gemma equitans* p. 120).
 255) Eine zwischen gerollte Knospe (*gemma obvoluta* p. 119).
 256. Eine gefaltete Knospe (*gemma plicata* p. 120).
 258. Eine doppelt tutenförmige Knospe (p. 120).
 259) Eine doppelt eingerollte Knospe (p. 119).
 260) Eine doppelt eingerollte Knospe (p. 119).
 261. Ein Deckel (*operculum* p. 180) mit der Franze (*imbria* p. 181).
 262. Eine doppelt zurückgerollte Knospe (p. 119).
 263) Eine reitende Knospe (p. 120).
 264) Eine reitende Knospe (p. 120).
 265. Ein sparrig gerissenes Blatt (*folium squarrosolaciale* p. 77), was herabläuft (*decurrens* p. 92), und den Stengel dadurch geflügelt (*caulis alatus* p. 42) macht.
 266. Eine Doldentraube (*corymbus* p. 66).
 267. Eine präsentirtellerförmige Blumenkrone (*corolla hypocrateriformis* p. 139).
 268. Eine kugelförmige Blumenkrone (*corolla globosa* p. 138).
 269. Eine trichterförmige Blumenkrone (*corolla infundibuliformis* p. 139).
 270. Eine gekelchte allgemeine Blumendecke (*anthodium orlyculatum* p. 135).
 271. Eine bandförmige Blumenkrone (*corolla ligulata* p. 139) von *Aristolochia Clematidis*.
 272. Eine zweilippige Blumenkrone (*corolla bilabiata* p. 140).
 273. Eine becherförmige Blumenkrone (*corolla cyathiformis* p. 138).
 274. Eine tellerförmige Blumenkrone (*corolla urceolata* p. 139).
 275. Eine röhrlige Blumenkrone (*corolla tubulosa* p. 138).
 276. Eine keulenförmige Blumenkrone (*corolla clavata* p. 138).
 277. Eine einfache Aehre (*spica simplex* p. 63).
 278. Eine einfache Traube (*racemus simplex* p. 64).

NEUNTES KUPFER.

279. Ein Stückchen von der Oberhaut des *Lilium chalcodonicum* stark vergrößert, worauf die Spaltöffnungen (*stomata* p. 341) zu sehn sind.

- 280. Ein ähnliches Stückchen von *Althum Cepa*.
- 281. Ebenfalls dergleichen Stückchen von *Dianthus Caryophyllus*.
- 282. Drei Spiralgefäße (*vasa spiralia* p. 837) stark vergrößert.
- 283. Die Samenkapsel der *Peziza pustulata* stark vergrößert zeigen 16 Samen, von denen immer zwei in einer Haut eingeschlossen sind (p. 172).
- 284. *Peziza pustulata* in natürlicher Grösse.
- 285. Ein gefingert gefiedertes Blatt (*folium digitato-pinnatum* p. 86) von *Mimosa pudica*.
- 286. *Peziza villosa* in natürlicher Grösse.
- 287. Die Samenkapsel derselben stark vergrößert zeigt 8 Samen (p. 171).
- 288. Ein unentfalteter Schaft der *Utricularia vulgaris* mit den Blättern an welchen die Blasen (*ampullae* p. 107) hängen.
- 289. Ein Zweig der gemeinen Eiche, woran die Blätter buchtig (*folium sinuatum* p. 77) sind, zwischen welchen Ausschlagsschuppen (*ramenta* p. 103) stehn.
- 290. Ein dreifach geripptes Blatt (*folium triplinervium* p. 82).
- 291. Die blühende Dolde eines *Cyperus*, an dessen Hauptblumenstielen eine Tute (*ochrea* p. 105) zu sehn ist.
- 292. Ein ohrförmiges Blatt (*folium auriculatum* p. 73).

ZEHNTES KUPFER.

- 293. *Pteris longifolia* hat einen gefiederten Wedel (*frons pinnata* p. 97), linienförmige Häufchen (*sori lineares* p. 69), welche dem Rande nachgehend (*marginales* p. 69) und fortlaufend (*continui* p. 69) sind. Die Decke ist fortlaufend (*indusium continuum* p. 117) und randständig (*marginale* p. 117).
- 294. Die zweiklappige Kapsel (*capsula bivalvis* p. 171) eines Farrnkrauts.
- 295. Die geringelte Kapsel (*capsula gyrata* p. 171) eines Farrnkrauts, welches schon aufgesprungen ist.
- 296. Dieselbe noch geschlossen.
- 297. Ein mit Löchern aufspringende Kapsel (*capsula mukilolaris poris dehiscens* p. 171) auf der Rückseite der Spitze eines Wedels von *Danaca nodosa* in natürlicher Grösse.
- 298. *Polypodium Otites*, verkleinert abgebildet, hat einen Wedel mit gefiedert zusammenfliessenden Blättern (*frons pinnata, pinnis confluentibus* p. 97), auf dessen Rückseite runde Häufchen (*sori subrotundi* p. 69) sind.
- 299. *Cribraria vulgaris* in natürlicher Grösse, ein Bauchpilz (*Gasteromycus* p. 236).

300. *Lycopus europaeus* hat gerissene Blätter (folium laciatum p. 77), die gegeneinander über stehn (appendiculae p. 89), und die Blumen in sitzenden Quirlen (verticillatae p. 58) stehn.
301. *Cribraria vulgaris* stark vergrößert, an der der Umschlag sich kreisförmig abgelöst hat (peridium circumcissum p. 115), wodurch das Haarnetz (capillitium p. 199) bar geworden ist.
302. Derselbe Bauchpilz, wo auch schon der Umschlag gelöst hat, der aber noch mit Samen angefüllt ist.
303. Zwei in der Quere gehende Kapseln des Wedels *Danaea nodosa*, welche Figur 297. vorgestellt ist.
304. *Baeomyces gracilis* hat ein sprossendes Gestell (pedicelliferum p. 51).
305. *Osmunda cinnamomea* verkleinert. Der fruchtbare Kelch (frons fructificans p. 98) ist gefiedert, der unfruchtbare (sterilis p. 98) aber doppelt halbgefiedert (natifida p. 97).
306. Der untere Theil des Kelchs einer Blume von *Peltandra*, der quer durchschnitten ist, um das Röhrenbündel (p. 148) zu zeigen.
307. Die ganze Blume von *Pelargonium*, woran die Einsetzung des Röhrlins bis an den Blumenstiel bemerkt ist. Die Blumenkrone ist unregelmässig (corollae p. 142).
308. *Erythroxylon Coca* hat bedeckt gerippte Blätter (obtectovenosum p. 82), und seitenständige Blüthen (pedunculi laterales p. 54).
309. Die Blume von *Melia Azedarach* trägt eine Wulst (p. 149).
310. Die Wulst derselben Blume geöffnet, um die Fächer zu zeigen.
311. *Phallus impudicus* sehr verkleinert. Er hat eine eiförmige Wulst (volva gelatinosa p. 109), einen eiförmigen Hut mit netzförmigem Ueberzug (Hymenium reticulatum p. 114).

ELFTES KUPFER.

Enthält die verschiedenen Farbenmischungen, Seite 286 und folgende beschrieben sind. Der untere Maasstab bezieht sich auf die Seite 17 an Länge der Pflanzen.

Register

Iler lateinischen Ausdrücke.

	Pag.		Pag.
um perianthium	132	acuti echini	113
fructum	222	acutum folium	71
	504	acutum operculum	180
pinnatum folium	85	acutum stigma	162
	240	acutus dens perianthii	133
ae	216	acutus sinus	79
ileus	111	Adansonii systemata	222
lanta	41	adductores	164
	241	adnata anthera	157
arbores	381	adnatum operculum	181
folium	76	adpressum folium	92
m	166 172	adscendens caudex	31
pileus	125	adscendens caulis	39
rme folium	88	adscendentia filamenta	154
	175	adversum folium	92
a planta	44	aequale anthodium	135
oneae	193	aequalia filamenta	154
ones	189 240	aequales lamellae	112
n folium	80	aequales pori	113
caudex	33	aequalis corolla	142
caulis	42	aequalis polygamia	218
caudex	33	aërea radices	22
	101 113 280	aeruginosus	287
ta ligula	107	aestivatio	16 144
ta paraphysis	152	afora pericarpia	220
tum folium	71	aggregatae	239
tum operculum	150	aggregata gemma	120
tus [dens] perian-	133	aggregata radix	29
	107	aggregata seta	55
gula	107	agrostologia	5
gulatus caulis	42	akena	166
inguli	79	ala	142 168 193

	Pag.		Pag.
articulata radix	28	baccata drupa	173
articulata siliqua	177	baccatae siliculae	177
articulate-pinnatum folium ..	86	baccatus arillus	193
articulatum filamentum	153	baccatus pepo	175
articulatum folium	88	bacciferae	217
articulatum legumen ..	179	badius	287
articulatum lomentum ..	179	barba ..	143 148 149
articulatus caulis	43	barbatus	12
articulatus pilus	126	basis	31 200
articuli	98	basi dehiscens capsula ..	170
arundinaceae	219	basi solutum folium	91
ascidiformes bracteae ..	106	Batschii dispositio	244
ascidium	101 106	bedeguar	483
asparagi	240	berberides	241
asper	11	bialata semina	198
asperifoliae	239	bicornes	238
asphodeli	240	bicornis anthera	155
ater	288	bicuspidatum folium ..	80
atriplex	240	bidentatum folium	73
atropurpureus	288	bidentatum perianthium ..	131
atrovirens	287	biennes plantae	212
attenuatum amentum ..	68	bifariam imbricata folia ..	91
auctum anthodium	135	bifida anthera	155
aurantia	241	bifida ligula	107
aurantiacus	287	bifidi dentes	181
aurata folia	292	bifidum filamentum	153
aureo-variegata folia ..	292	bifidum folium	72
aureus	287	bifidum perianthium ..	131
auricula	101 103	bifidum stigma	163
auriculatum folium	73	bifidus cirrhus	118
avenium folium	83	bifidus stylus	161
axillare capitulum	60	biflora spatha	106
axillare folium	87	biflora spicula	61
axillares flores	54	biflorus pedunculus	53
axillaris cirrhus	118	bigeminatum folium ..	84
axillaris glomerulus	60	bigeminum folium	84
axillaris inflorescentia ..	70	hignoniae	240
axillaris pedunculus	54	bijugum pinnatum-folium ..	96
axillaris seta	56	bilabiata corolla	140
axillaris spica	63	bilabiatum perianthium ..	132
axillaris spina	123	bilobum folium	88
azureus	286	biloculare folium	88
Bacca	166 173	biloculare semen	189
baccata capsula	170	bilocularis anthera	155
		bilocularis bacca	179

	Pag.		Pag.
bilocularis capsula	169	Cacti	24
bilocularis nux	172	cacumen	5
bilocularis pepo	175	caducae stipulae	16
binatum folium	84	caducum perianthium	17
binervium folium	94	caducus pappus	18
bipartitum perianthium	132	caecomycetes	25
bipinnata frons	97	Caesalpini systema	25
bipinnatifida frons	97	caesius	28
bipinnatum folium	86	calamariae	216 29
bipinnatus caulis	46	calathidium	58 2
bis bifidus caulis	46	calcar	147 18
biseriales lamellae	112	calycanthemae	2
biseriales sori	70	calyciflorae	238 21
biserialis frons	70	calyciforme involucrem	18
bisperma capsula	170	calycostemon	22
bitematum folium	84	calycostemonis	22
bivalvacea capsula	170	calyculatus pappus	18
bivalve indusium	116	calyculatum anthodium	18
bivalvis capsula 169	171	calyptra	145 171 173
bivalvis gluma	133	calyptratus arillus	18
bivalvis spatha	105	calyx	127 129 130
bivasculares	218	cambium	347
Boerhavi systema	218	Camelii systema	220
borragineae	240	campanaceae	220
botanica	4	campanulaceae	240
botanologia	4	campanulata apophysis	18
botryodes inflorescentia	57	campanulata calyptra	18
brachiatus caulis	37	campanulata corolla	18
brachium	17	campanulatus pileus	110
bractea	101 104	canaliculatum folium	8
bracteatus racemus	64	canaliculatum legumen	17
bracteatus verticillus	59	canaliculatus	1
bromeliae	240	canaliculatus petiolus	5
brunneus	287	candidus	2
bulbifer caulis	42	cannae	2
bulbosa radix	24 28	canus	2
bulbosus caudex	31	capillare filamentum	1
bulbosus pilus	125	capillare folium	1
bulbosus stipes	49	capillares	9
bulbus	20 22	capillaris pappus	1
bullatum folium	81	capillaris radix	1
bursicula	159	capillaris stylus	1
byssacea radix	29	capillitium	193
byssacea volva	109	capillus	1
byssi	235 237	capitatae	1

aller lateinischen Ausdrücke. 669

	Pag.		Pag.
tum stigma	162	centralis embryo	191
tus verticillus	58	centralis inflorescentia ..	70
liformis flos	129	centralis radix	29
lum	56 57 59	centralis stipes	49
rides	241	cernuus caulis	39
catio	16	cernuus racemus	64
olia	241	cerviculata apophysis ..	183
a	166 168	chalaza	190 464
oma arborum ...	489	character	217
.....	142	character essentialis	247
tum folium	83	character factitius	247
is	14	character naturalis	247
is	288	chyliferus ductus	354
ia radix	24	chlorosis	483
tum folium	88	chorion	463
tum legumen	177	cicatrisata radix	26
tum receptaculum	200	cicatrissatus caudex	31
tus arillus	193	cicatrissatus caulis	49
tus caulis	43	cicatrix fructificationis ..	381
tus pepo	175	cichoraceae	240
tus stipes	48	ciliata ligula	107
phorum	55	ciliata spica	63
ginenn folium ..	78	ciliato-dentatum peristo-	
ginenn arillus	194	ma	182
phyllacea corolla .	141	ciliatum anthodium	135
phyllae	238 241	ciliatus	12
sis	128 166 172	ciliatus pappus	196
ila	199	cinarocephalae	240
.....	193 197	cinereus	288
x	21 33	cinnabarinus	288
x adscendens ..	19 31	circinata gemma	120
x descendens	19	circinatus aculeus	124
x intermedius	19 22 30	circumcissa capsula	170
x perpendicularis		circumcissum peridium	115
adiceis	30	circumcissus utriculus ..	167
ula	159	cirrhosum folium	118
centes plantae	44	cirrhosum pinnatum fo-	
ormis caudex	31	lium	118
um folium	87	cirrhus	101 117 279
.....	31 33 35	cisti	241
stricto sic dictus .	32	cistula	205
radix	24	clandestina fructificatio	494
iris ductus	342	clandestinus flos	494
res folliculi	343	classis	214
le semen	190	clausum perianthium ...	132

	Pag.		
clausum receptaculum ..	202	compositus flos	
clausum sporangium	184	compositus racemus	
clavata corolla	138	compressa frons	
clavata paraphysis	152	compressa glandula	
clavatum receptaculum ..	202	compressi echini	
clavatum stigma	162	compressum folium	
clavatus pileus	111	compressum legumen	
clavatus stylus	161	compressus caulis	
clavus	502	compressus petiolus	
clinandrium	159	concavum folium	
coactaneum amentum	68	concavum stigma	
coarctata panicula	67	concavus pileus	
coarctati rami	38	concolor	
coccineus	288	conductor fructificationis	
cochleatum legumen	178	conduplicata gemma	
coeruleus	286	conferta folia	
cohaerentes apice dentes	182	conferta umbella	
colorata gluma	133	conferti rami	
coloratum perianthium ..	132	confertus verticillus	
coloratus	14	confluentes pori	
columella	169	conglobata radix	
columna	159	congregatae	
columniferae	239	conica apophysis	
columnula	182	conicum capitulum	
coma	104	conicum operculum ..	
commune receptaculum ..	200	conicum receptaculum ..	
communis calyx	136	conicus strobilus	
communis corolla	127	coniferae	2
communis pedunculus ..	53	conjugata spica	
communis petiolus	53	conjugato-pinnatum foli	
comosa radix	26	conjugatum folium ...	
comosa spica	63	conjungatus racemus ...	
comosum capitulum	60	conjunctorium	
completa capsula	169	connatae antherae	
complexantes gemmae ..	119	connata filamenta	
composita bacca	175	connatae stipulae	
composita corolla	127	connatum folium	
composita radix	29	connatum indusium ...	
composita spica	63	connecticulum	
composita umbella	65	conniventia filamenta ..	
compositae	218	contextus cellulosus ...	
compositi irregulares flores	220	contextus cellulosus con	
compositi regulares flores	220	positus	
compositi regulares et ir-		contextus cellulosus laxi	
regulares flores	220	contextus cellulosus irri	
compositum folium	83	gularis	

aller lateinischen Ausdrücke. 671

Pag.	Pag.
is cellulosus sim-	costa 193 199
x 335	costa media 49
is cellulosus stricte	costatum folium 81
dictus 334	cotyledones 188 192
um indusium ... 117	crassus stylus 161
us sorus 69	crenato-pinnatifidum fo-
ioncis i. 482	lium 80
ie 239	crena 95
tilitas 315	crenatum folium 78 79
umbella 66	cribrosus 14
um folium 83	crispum folium 81
um operculum .. 180	crista 193 196
um receptaculum 202	cristata anthera 155
is pileus 110	croceus 288
ta gemma 119	cruciata corolla 141
tum stigma 163	cruciferae 241
tus cirrhus 118	cruciforme stigma 163
uli 240	cruciformes loculi 158
m 188	crustaceo-foliaceus thallus 59
m filamentum .. 153	cryptogamia 225 233
m folium 73 79	cryptogamologia 5
um legumen 177	cryptophyta 237
is stipes 48	cryptostemon 223
is thallus 99	cryptostemonis 222
..... 31 32	cubitus 17
thallus 100	cucullata corona 150
latum filum 149	cucullatum folium 83
latum indusium . 116	cucullus 147
..... 198	cucurbitaceae 239 241
m podetium 50	culmiferae 216
..... 127 137	culmus 33 46
eus flos 128	euneiforme filamentum . 153
orae 242	euneiforme folium 72
..... 148 149	euniculus 151
iae 238	euspidatum folium 72
ta peranthia 144	cutis 319
..... 319	cyaneus 286
a capsula 170	cyathiformis corolla 138
baacca 174	cyathiformis fungus 114
um lomentum .. 178	cyathiformis glandula .. 146
us pepo 176	cyathus 101 121
..... 110	cylindracea radix 24
's 238	cylindrica apophysis 183
ferae 216 240	cylindrica spica 63
is 57 66	cylindricum amentum .. 68

	Pag.	
cylindricum anthodium ..	135	deliquescent caulis
cylindricum podetium ..	50	deliquium
cylindricus stipes	49	deltoides folium
cylindricus strobilus	186	demersum folium
cylindrus	148 149	demersus caulis
cyma	57 66	dendrologia
cyphella	101 115	dens
Daedaleae lamellae	112	dentata anthera
dadaleum folium	72	dentata calyptra
dauciformis radix	25	dentata radix
debilis caulis	39	dentato-crenatum folium
debilitas	487	dentato-dehiscens per-
Decandollii dispositio ..	241	dium
decandria	225	dentatum folium
decemflorus verticillus ..	59	dentatum perianthium ..
deciduae stipulae	102	dentatum stigma
decidium perianthium ..	130	dentes bifidi
deciduus stylus	162	dentes contorti
declinata filamenta	153	dentes geminati
declinatus caulis	39	dentes perianthii
declinatus stylus	161	denticulatus pilus
decompositum folium ..	86	depauperata umbella ..
decorata anthera	156	dependens folium
decumbens caulis	40	dependens involacrum ..
decumbens podetium ..	51	depressa apophysis
decurrens folium	92	depressum folium
decurrens ligula	107	dermoblastae
decurrentes lamellae ..	112	descendens caudex
decursive-pinnatum fo-		descriptio
lium	86	desma
decussata folia	90	devius embryo
decussatus caulis	37	dextrorsum caulis volub.
deflexus caulis	38	diadelphia
defoliatio	15	diagnosis
defoliatio notha	476	diandria
dehiscens drupa	173	diantherae
dehiscens loculicida	170	dichogamia
dehiscens peridium	115	dichogamia androgyna ..
dehiscens septicida	170	dichogamia gynandra ..
dehiscens septicida cen-		dichotomum folium
tralis	170	dichotomus caulis
dehiscens septicida pariet-		dichotomus stylus
talisis	170	dicotyledones 189 192 21
deliquescent panicula ..	67	didyma anthera
		didynamia

aller lateinischen Ausdrücke. 673

	Pag.		Pag.
ctura	250	dissimilis pappus	196
olla	139	distans verticillus	59
..... 495	500	disticha folia	90
opus	196	disticha spica	62
s	37	disticha spicula	61
..... 27		distichus ramus	37
atum folium	86	divaricatus caulis	38
ium	84	divergens caulis	38
..... 227		divergentes loculi	158
nientum	153	divergentes rami	38
yptra	180	divisa radix	29
tha	105	divisa spina	123
apitalum	60	divisi echini	114
avolucrum	108	dodecandria	225
illus	194	dodrans	17
ppus	195	dolabriforme folium	89
leus	111	dorsalis arista	125
rticillus ...	59	dorsiflorae filices	213
..... 225	230	drupa	166 172
..... 295		drupaceae siliculae	177
lla	141	ductulosum folium	94
alares flores	220	ductus cellulares	343
ares flores	220	ductus chyliferus	543
na	149	dumosae	239
olucrum	108	duplex corolla	495
rianthium	131	duplex indusium	117
pus	195	duplex perianthium	131
..... 224		duplex peridium	115
..... 241		duplicata radix	29
ina	198	duplicato - dentatum fo-	
ca	174	lium	78
ca	173	duplicato - pinnatum fo-	
is	129	lium	86
..... 219		duplicato - ternatum fo-	
..... 128		lium	84
..... 14		durum achaenium	172
..... 129	151	durum putamen	172
li (sc. anthe-			
..... 156		Ebracteatus racemus ...	64
..... 90		ebracteatus verticillus ...	59
ca	174	echinatus	13
..... 172		echini	113
gumen	178	eglandulosus petiolus ...	53
..... 16		elaecagni	240
t	168	elasticitas	315

	Pag.	
clater	193 199	euphorbiae
elementa	1	evalvis capsula
ellipticum folium	79	evanescentes radix
emarginatum folium	72 80	exasperata seta
emarginatum stigma	162	excentralis stipes
embryo	190 463	excentricus embryo
emersum folium	93	excurrentis caulis
endogeneae	213	exesus
endocarpium	167	exogeneae
endorhizae	192	exorhizae
endospermium	191	expansa peranthia
endospermicus embryo	191	exculptus
enervium folium	83 94	exstipulatus caulis
enneandria	225	exsucca bacca
enodis caulis	43	exsucca drupa
enodis culmus	46	exsuccus pepo
ensatae	238	exterius dehiscens inde-
ensiforme folium	75	sium
epicarpium	166	externa tunica
epicarpium flos	161	externum peridium
epidemicus morbus	461	externum perigonium
epidermis	319	extraaxillaris inflorescen-
epigenesis	456	tia
epigyna corolla	241	extrafoliaceae stipulae
epigyna stamina	154 241	extrafoliaceus pedunculus
epiphragma	182	extremitas cotyledonaris
epiphyllispermae	224	extremitas radicalis
epiphyllispermae filices	212	exulceratio
epiphyti	237	
epispermicus embryo	190	F actitius character
epispermium	190	fartum podetium
equitans folium	91	farinosum legumen
equitans gemma	119	farinosus
erecta anthera	156	fasciculata folia
erectum folium	92	fasciculata radix
erectum podetium	51	fasciculata spica
erectum semen	190	fasciculatum lignum
erectus annulus	109	fasciculatus caulis
erectus caulis	39	fasciculus
erectus culmus	47	fasciculus ductulorum
erectus embryo	191	fastigiati rami
erectus racemus	64	faux
ericae	240	favosi pori
erosum folium	78	favosum receptaculum
essentialis character	247	

aller lateinischen Ausdrücke. 675

Pag.		Pag.
..... 13	flocci	56
flos 295	floccosus contextus	336
..... 14	florale folium	87
s 287	florescentia	16
..... 56	flos 31	127
..... 20	floriferae	219
radices 24 27	flosculosus flos	128
upa 173	foemineus flos	128
dix 22 27	folia 31	71
sa 355	foliacea ochrea	106
ulis 43	foliaceus thallus	98
me podetium . 51	foliaris cirrhus	118
..... 241	foliaris pedunculus	55
..... 250	foliatio	119
peristoma 181	foliatus racemus	64
us contextus ... 336	foliiferae et floriferae her-	
us thallus 100	maphroditae gem-	
n 152	mae	119
1 213 230 235	foliiferae et floriferae	
239 240	gemmae	119
ilamentum 153	foliiferae et floriferae dis-	
frons 98	tinctae foliferae gem-	
paraphysis 152	mae	119
radix 27	foliiferae et floriferae mas-	
stylus 161	culae gemmae	119
..... 148 149	foliifero-floriferae gem-	
ulentum 151	mae	119
..... 171 181	foliola anthodii	136
..... 27	foliola perianthii	133
ium 72 80	foliolis decrescentibus pin-	
gitudinaliter pe-	natum folium	86
..... 115	foliolum	95
ianthium 131	foliosa spica	63
..... 474	foliosum capitulum	60
irales 337	foliosus caulis	41
podetium 51	foliosus verticillus	59
caulis 44	folium	71
stipes 48	folliculi cellulares	343
folium 73	folliculus	166 168
me folium 72	folliculus carnosus folio-	
mis frons 96	rum	481
..... 52	fornix	148
28 287	fovea	147 148
ilis 39	foveolatus	13
caulis 40	fractura	473

	Pag.	
fragile putamen	172	gemmae
fragilis caulis	38	generatio aequivoca
frondescens	15	generatio originaria
frondosi musci	237	genericum nomen
frondosus culmus	46	geniculata arista
frons	31 96	geniculata frons
fructificans caulis	42	geniculata radix
fructificans frons	98	geniculatus caulis
fructificatio	16	geniculatus culmus
fructificatio clandestina	493	geniculum
fructificationis partes	6	gentianae
fructus	31 161	genus
frustraena polygamia	229	geoblastae
frutescentia lilia	381	gerania
frutescentia palmarum	381	germen
frutices	212 380	germinatio
fruticosa gramina	381	gibbosum folium
fruticosus truncus	35	gibbum folium
fugax annulus	110	glaber
fugax pappus	195	glabra calyptra
fulera	31 100	glabrum receptaculo
fulcratus caulis	39	glandula .. 101 122
fungi 24 108 224 230	239 240	glanduloso-punctatus
funiculus umbilicatus	189	glandulosus petiolus
furcatus pilus	126	glaucus
fuscus	287	Gleditschii systema
fusiformis radix	25	globosa anthera
G	143	globosa apophysis
galeatae	217	globosa corolla
galla	480	globosa glandula
gangraena	491	globosa radix
gasteromyci 115 235	236	globoso-clavata para
gastromycetes	237	globosum anthodiur
gelatinosa volva	109	globosum capitulum
gelatinosus thallus	99	globosum receptaculo
geminatae stipulae	102	globosum stigma
geminata radix	29	globosus fungus
geminati dentes peristomii	181	globosus strobilus
geminatus aculeus	124	globulus
geminatus pappus	196	glochis
gemma 23 101 118 119	121	glomerata spica
gemmiformis flos	129	glomerulus
		gluma
		glumella
		glutinosus

	Pag.		Pag.
us	101 122	hermaphroditi et neutri	
terides	235	flores	295
amentum	68	hermaphroditus flos 128	295
ia	212 224 238	Herrmanni systema	217
ibus affinia	224	hesperideae	238
ata radix	27	heteroclitae	217
atus	13	heteropus embryo	191
atus thallus	100	hexagonus caulis	43
osa pollinis massa	159	hexafora pericarpia	220
.....	288	hexandria	225
catio	16	hexapetali irregulares flo-	
les	238	res	220
anae	240	hexapetali regulares flores	220
ae	241	hilum	186 190
spermae herbae ..	218	hirsutus	11
spermia	228	hirtus	11
lria	225 229	hirtus caudex	34
orum	151	hispidus	11
mium	159	historia naturalis	1
.....	159	holospermicus embryo ..	190
capsula	171	homallopiphyllae ...	135 196
n	14	homogamia	445
a	205	homotropus embryo ..	191
m	14	horizontale folium	93
.....	171	horizontalis caudex ...	34
is	6 241 261	horizontalis radix	26
rrhagia	476	Hornemauni systema ...	232
systema	224	humifusus caulis	40
.....	127	humus	396
m folium	73	hyalinus	269
ceae	239	hydropterides	235 236
haericum antho-		hymenium	101 112 114
um	135	hypnotheridium	58 128
haericum capitu-		hypha	33 56
m	60	hyphomycetes	237
ae	235 236 240	hypocarpus flos	161
i musci	237	hypocrateriformis corolla	139
us	287	hypogyna stamina ..	154 241
dria	225	hypostroma	56
eus caulis	43	hypothecium	206
.....	212	Icosandria	225
ium	6	icterus	484
phroditi et foemi-		idiogyna stamina	241
i flores	295	imbricata aestivatio	144

	Pag.	
imbricata folia	90	integra calyptra
imbricata radix	28	integra ligula
imbricata spica	62	integra panicula
imbricatum anthodium ..	135	integra radix
imbricatus thallus	99	integra volva
impari pinnatum folium ..	85	integrum folium
imperfecti flores	220	integrum perianthium ..
inaequale folium	73	interius dehiscens indu-
inaequales lamellae	112	sium
inaequales pori	113	intermedius caudex
inaequalia filamenta	154	interruptae lamellae
inaequalis corolla	142	interrupta spica
inaequilocularis anthera ..	156	interrupte pinnatum fo-
inaequivalvis anthera ...	156	lium
inanis caulis	44	interruptus sorus
incitabilitas	317	intervalvia capsula
inclusa gemma	121	intrafoliaceae stipulae ..
incompleta capsula	169	intrafoliaceus pedunculus
incumbens anthera	156	inundatae
incurvata aestivatio	144	inversum semen
incurvum filamentum ..	153	inversus annulus
incurvum folium	92	inversus embryo
incurvus aculeus	124	involveratus pedunculus
indicans macula	446	involutum 101 107 1
individuum	1	involuta aestivatio
indivisum folium	76	involuta gemma
indusium	69 101 116	irides
inermis caudex	33	irregularis corolla ..
inermis caulis	42	irregulariter dehiscens
inermis stipites	48	ridium
inferius labium	144	irritabilitas
inferum germen	160	isostemonones
inferus flos	161	isthmis interceptum
inflatum perianthium ...	132	mentum
inflatus petiolus	52	iulus
inflexum folium	92	jasmineae
inflorescentia	31 56	jugum
infractus culmus	47	junci
intricatus caulis	45	Jussieu systema
infundibuliformis corolla	139	
innovans caulis	45	Knautii systema
inspicipiles pori	113	
integer caulis	36	Labelliformis frons
integer pappus	195	labellum .. 142 143
integerrimum folium 77 78	388	labia

aller lateinischen Ausdrücke. 679

	Pag.		Pag.
lla	140	laxus contextus cellulosus	335
.....	240	laxus racemus	64
rianthium ..	132	laxus utriculus	167
.....	107	legumen	166 177
.....	109	leguminosae	216 241
urib	80	lepidotus	13
is	194	leprosus thallus	99
.....	477	lepra	480
.....	94 143	liber	319 335
anthii	133	libera anthera	156
olium	77	libera gemma	121
.....	216	liberum filamentum	153
.....	288	lichenes	235 237
.....	343	lignosa capsula	170
olium	81	lignosae	216
pes	49	lignosa radix	24
tum	114	lignosum legumen	177
.....	10	lignosus caulis	43
a	180	lignum	378
intermedius	31	lignum fasciculatum	378
.....	27	lignum reticulatum	378
.....	56	ligula	101 107
.....	112	ligulata corolla	139
.....	142	lilacinus	268
.....	126	lilia	212 240
.....	12	liliacea corolla	141
himi	114	Liljebaldi systema	233
folium ...	74 75	limbus	143
a	163	linea	17
s	54	lineare folium	74 75
ulae	102	linearis anthera	154
era	156	lineatum folium	82
ryo	191	linearis sorus	69
.....	54	linearis spica	63
erulus	60	linearis spicula	61
inculus	54	lineatus	14
c	29	linguiforme folium	89
a	63	Linnei systema	225
s	49	lirella	205
s	161	lividus	288
ns anthera	156	lobatum folium	76 80
edunculus ..	54	lobatus thallus	99
.....	288	lobi	94 143
.....	240	loculamenta	158 169
.....	39	loeli	158

	Pag.		Pag.
loculis disjunctis anthera	156	masa pollinis	159
loculosa radix	24	maturatio	16
loculosum folium	88	medulla	329
loculosus caulis	44	melastomae	241
locusta	61	meliae	241
lomentaceae	239	mellico	478
lomentum	166	membrana	190
longitudinalis embryo	191	membranaceo - dentatum	
longitudinalis sorus	69	peristoma	182
longitudinaliter dehiscens		membranacea valvula	133
capsula	171	membranaceum legumen	171
longitudinaliter fissum pe-		membranaceum folium	87
ridium	115	membranaceus arillus	194
lorulum	100	membranaceus caulis	43
lucidus	10	membranaceus thallus	99
lunatum folium	73	membrana interna	188
lanatus sorus	69	membranaceus contextus	336
luridae	238	menispermata	241
lympatica vasa	341	mesocarpium	166
lyratum folium	77	meiostemonones	234
lysimachiae	240	methodus	244
		micans	10
Macula	482	miniatus	288
macula indicans	446	minores frutices	380
maculatus	14	minuti pori	113
magnoliae	241	minutissimi pori	113
Magnoli systema	222	miscellaneae	234
malphigiae	241	mobilis annulus	110
malvacea corolla	140	Moenchii systema	223
malvaceae	241	molendinacea semina	198
mamillatum operculum	181	monadelphia	225
marcescens peranthia	144	monandria	225
marcescens perianthium	130	monantherae	223
marcescens spatha	105	moniliformia vasa	339
marcescens stylus	162	moniliformis radix	28
marginale indusium	117	monocotyledones	192
marginalia capsula	169	monocotyledones spatuloi-	213
marginalis embryo	191	deae	224
marginalis pedunculus	55	monoecia	225
marginalis sorus	69	monogamia	229
marginatum-argenteo fo-		monogynia	227
lium	292	monoici flores	295
marginatus pappus	195	monopetala corolla	138
margo membranaceus	196	monopetala liliacea co-	
masculus flos	128	rolla	141

aller lateinischen Ausdrücke. 681

	Pag.		Pag.
aylla corona	149	musci . 211 213 224 230	240
ayllum anthodium 134		" 235 236 239	240
ayllum perianthi-		musci frondosi	211
..... 131		musci hepatici	211
erygia semina .. 198		mutica anthera	155
ryrena drupa	173	mutica valvula	134
erma bacca	174	mutilatio	493
ermum legumen 178		myrti	241
asitas	494		
am	275	Naevi	462
ni systema	216	najades	240
nata paraphysis .. 152		napiformis	25
natum folium ... 72		napiformis caudex	30
natum operculum 180		napiformis radix	21
ngularis caulis 43		narcissi	240
ata semina	198	natans caulis	40
psulares	217	natans folium	93
ps radix	26	naturalia	1
ntatum perianthi-		naturalissima structura . 250	
..... 131		necessaria polygamia ... 229	
lum filamentum 153		necrosis	490
lum perianthium 131		nectariferae squamae 146 147	
lum stigma	163	nectariferi pori 146 147	
lus cirrhus	118	nectarium 127 145 151	
lus stylus	161	nemoblastae	361
ora spatha	105	nervatus	14
ora spicula	61	nervatum folium	81
orus verticillus .. 59		neuter flos	128 295
ularis bacca 174		nidulans radix	29
ularis capsula 169 171		niger	268
ularis nux	172	nitens	10
ularis pepo 175		niudus	10
ritum perianthi-		nodosus caulis	43
..... 132		nodosus culmus 46	
icatus flos	495	nodosus pilus	126
rials sorus	70	nomen genericum	298
pala	133	nomen sonorum	214
liquae	238	nomen triviale	298
lvacea capsula .. 170		non cohaerentes dentes 182	
lviv capsula	170	non dehiscens capsula , 170	
lviv gluma	133	non dehiscens peridium 115	
lum anthodium .. 135		nothae radices	29
tus	12	notha defoliatio	475
lus stipes	48	nucacea capsula	172
..... 240		nucleus	173 190

	Pag.		
nuda arista	124	octona folia	
nudum capitulum	60	oleraceae	
nudum peristoma	181	onagrae	
nudus caulis	41	opacus	
nudus culmus	47	operculata capsula	
nudus flos	128	operculum	
nudus racemus	64	opposita folia	
nudus stipes	48	opposite pinnatum foli	
nudus verticillus	59	oppositi-florus pedunc	
nullum peristomium ...	184	oppositi-folia stipulae	
numerus	250	oppositi-folius pedunc	
nutans caulis	40	oppositi loculi	
nutans racemus	65	oppositi rami	
nux	166	orbiculatum folium ..	
nyctagynes	240	orbiculatus thallus ...	
		orbiculus	
O bo cordatum folium ..	94	orchidea corolla	
obiecto venosum folium	82	orchideae	2
obliqua ochrea	106	ordine duplici dentat	
obliqua radix	26	peristoma	
obliquum folium	92	ordine simplici den	
obliquus caudex	34	tum peristoma	
obliquus culmus	47	ordo	
oblonga anthera	154	orgya	
oblonga glandula	146	ovale folium	
oblonga spicula	61	ovata spica	
oblongum folium	74	ovata spicula	
oblongum stigma	162	ovate oblongum foli	
obovata apophysis	183	ovato-lanceolatum ..	
obovatum folium	94	ovatum amentum ..	
obtusa paraphysis	152	ovatum folium	
obtusati anguli	79	ovatus pileus	
obtuse angulatus caulis	42	ovatus strobilus	
obtusae echini	113		
obtusum folium	72	P alaceum folium ..	
obtusum podetium	50	palaris radix	
obtusum stigma	162	palatum	
obtusus dens perianthii	133	palea	
obtusus sinus	79	paleacea radix	
obvolvata gemma	119	paleaceum receptacu	
ochraceus	287	paleaceus caudex ...	
ochrea	101	paleaceus pappus ...	
octandria	225	paleaceus stipes	
octodentatum peristoma	181	pallide-flavens	
octoflorus verticillus ...	59	palmae	212

aller lateinischen Ausdrücke. 683

	Pag.		Pag.
lix	27	patens perianthium	132
folium ...	76 80	patentes rami	38
culus	124	patentissima panicula ..	67
.....	17	pecten	199
rne folium	75	pectinatum folium	80
.....	57 66	pedatum folium	85
caulis	37	pedicellatae stipulae ...	103
spadix	68	pedicellata gemma	120
ae	241	pedicellata glandula ...	146
a corolla ..	141	pedicellatum germen ..	160
ae	239	pedicellus	53
.....	114	pediculus	53
operculum .	181	pediculares	240
adix	30	peduncularis cirrhus ...	118
.....	12	pedunculata umbella ..	65
s lana	197	pedunculatus verticillus	58
.....	216	pedunculus	32 53
130 136 193	194	pedunculus radicalis ...	47
.....	346	pelta	204
.....	12	peltata anthera	155
na folium ...	74	peltata frons	97
m	151	peltatum folium	91
a	147 151	peltatum indusium	116
stemon	223	peltatum stigma	162
hora calyptra	180	pendula radix	28
.....	151	pendulus caulis	40
planta	372	pendulus racemus	65
caulis	39	penicilliforme stigma ..	163
ia	151	pentagonus caulis	43
.....	151	pentandria	225
ia	335	pentapetala corolla	141
semen	190	pentaphyllum perian-	
um folium ..	85	thium	131
cificationes	6	pentaphyllus pappus ..	195
ivolucrum ...	108	pentaptera semina	198
edunculus ...	53	penumato-chymifera ..	337
etiolus	53	pepo	166 175
achis	50	pes	17
umbella	65	peranthia	144
alva	109	peranthodium	134
folium	76	perfoliatum folium	92
perianthium ..	131	perfoliatus caulis	41
.....	204	perforatum	14 51
ulis	37	perforatus pileus	111
lium	92	perianthium	130

	Pag.		Pag.
pericarpium	165 166	pilosa anthera	13
perichactium . 130 137	140	pilosum filamentum	13
peridium	101 115	pilosum receptaculum	13
perigonium	130	pilosus	11
perigyna corolla	241	pilosus caudex	13
perigyna stamina . 154	211	pilosus pappus	13
perigynium	145 151	pilus	101 125 126
periphereus embryo ..	191	pinna	13
perispermium	191 464	pinna partialis	13
peristoma	181	pinna propria	13
peristomium	181	pinnata frons	13
pernio	475	pinnata pinnis confluen-	
peronatus stipes	49	tibus frons	13
perpendicularis caudex	30	pinnatifidum folium . 77	94
perpendicularis radix ..	26	pinnatifidus thallus	13
persistens annulus	110	pinnatum bijugum folium	13
persistens pappus	195	pinnatum cirrhosum fo-	
persistens perianthium .	130	lium	118
persistens spatha	105	pinnatum cum impari	
persistens stylus	162	folium	13
persistentes stipulae	102	pinnatum foliolis decre-	
personata corolla	140	centibus fol.	80
personatae	239	pinnatum folium	80
pertusus	14	pinnatum quadrijugum	
petaloideum stigma	163	folium	13
petalostemon	223	pinnatum quinquejugum	
petalostemonis	222	folium	13
petalum	138 142	pinnatum trijugum fo-	
petiolaris cirrhus	118	lium	13
petiolaris pedunculus ..	54	pinnatus caulis	13
petiolatae stipulae	133	pinnula	13
petiolata glandula	123	piperitae	238
petiolatum ascidium	106	pistillum	137 169
petiolatum folium	91	placenta	190
petiolus	33 48 52	placentiforme receptacu-	
phoeniceus	288	lum	202
phthiriasis	485	placentiformis radix	13
phyllum	133 136	plana glandula	146
physica	1	plana umbella	60
phytologia	4	plantae	217
pictus	14	plantae acaules	4
pileus	101 110	plantae acormosae	4
pilidium	205	plantae caulescentes ..	4
pilifer	11	plantagines	30
piliferum folium	94	planum anthodium	13

aller lateinischen Ausdrücke. 685

	Pag.		Pag.
alium	88	polysperma vegetabilia	165
adusium	116	polyspermae	219
perculum	180	polyspermum legumen	178
ceptacul. 200	202	polystemonos	224
eus	410	pomaceae	239
s	495 496	pomiferae	218
tae	361 362	pomum	166 175
.....	147 148	Pontederac systema ...	222
nma	120	pori	113 340
folium	81	poris dehiscens capsula	171
hymenium ...	114	poropterides	235
ileus	111	portulacae	241
ies	240	praeceox amentum	68
rista	124	praeformationis systema	457
stigma	163	praedelineationis systema	457
pappus	196	praemorsa radix	25
pilus	126	praemorsum folium ...	72
.....	188	prasinus	287
.....	33 55	preciae	238
nium	190	primaria rachis	50
.....	240	procumbens caulis	40
.....	152 159	prolifer caulis	36
.....	17	prolifer flos	495 501
.....	158	proliferum podetium ?.	51
hia	225	propago	101 121
t	225	propagalum	101 121
dones	189	prope apicem embryo .	191
....	225 227 228	prope basin embryo ..	191
ores	296	proportio	250
e	240	propria pinna	97
caulis	43	propria vasa	343
.....	227	proprium receptaculum	200
ia paraphysis	152	proprius petiolus	53
corolla 138	140	proscolla	159
liliacea co-		prospyises	164
.....	141	prostratus caulis	40
corona	149	proteae	240
um anthodium	134	pruina	183 199
um involucrem	108	pruinosis	13
um perianthium	131	pseudo-gyrata capsula .	171
s pappus	195	pubescens	11
semina	198	pubescens pilus	126
.....	474	pubescens stigma	163
a bacca	174	pulverulentus thallus ...	99
a capsula	170	pulvinulus	101 122

	Pag.		Pag.
pulvis	122	quinquenervium folium	8
punctata vasa	338	quinqvevasculares	22
punctatum folium	83	quintuplicato - pinnata	8
punctatum receptaculum	203	frons	8
punctatus	10	quintuplinervium folium	8
puniceus	288		
purpureus	288	Racemosus spadix	68
putamen	172	racemus	56 57 64
putamineae	238	rachis	31 61
pyriformis apophysis ..	183	radiatus flos	129
Quadrangulare folium	76	radicale folium	5
quadrangularis caulis ..	43	radicalis pedunculus ..	3
quadrialata semina	198	radicans caudex	40
quadrifarimatum folium ..	83	radicans caulis	30
quadridentatum perian-		radicans folium	30
thium	131	radicans rachis	30
quadridentatum peristo-		radicatio	30
ma	181	radiciformis caudex ..	30
quadrifariam imbricata ..		radicula	20 30 191
folia	91	radiculosa radix	122
quadrifidum folium	72	radii	65 128
quadrifidum perianthium ..	131	radix	20
quadrifidum receptacu-		radix stricte sic dicta ..	21
lum	202	Raji systema	218
quadrifidus stylus	161	ramentaceus caulis	160
quadrifureatus pilus ...	126	ramentum	101 103
quadrilocularis anthera ..	156	rameum folium	87
quadrilocularis capsula ..	169	rami	32 55
quadrinatum folium ...	84	ramosa frons	98
quadripartitum perian-		ramosa panicula	67
thium	132	ramosa radix	26
quadrivalvis capsula ...	171	ramosa spica	63
quadrivasculares	218	ramosa spina	223
quadruplicato - pinnata ..		ramosae lamellae	112
frons	97	ramosae spinae anthodii ..	138
quaterna folia	90	ramosissima panicula ..	6
quina folia	90	ramosissimum podetium ..	5
quinatum folium	84	ramosissimus caulis ...	3
quinquangulare folium ..	76	ramosissimus culmus ..	4
quinquealata semina ...	198	ramosum filamentum ..	1
quinquedentatum perian-		ramosum folium
thium	131	ramosum podetium
quinquefidum folium ..	72	ramosus caulis
quinquelobum folium ..	76	ramosus culmus
		ramosus pilus

aller lateinischen Ausdrücke. 687

Pag.		Pag.	
..... 35	reticulatus bulbis	26	
horizontalis radi-	retinaculum	159	
..... 30	retroflexi rami	38	
ceae	retusum folium	72 80	
ella	reversi rami	38	
gemma	revoluta gemma	119	
n folium	revolutum folium	93	
lum	revolutum stigma	163	
ta	revolutus cirrhus	118	
lum	rharni	241	
ileus	rhizoblastae	362	
ibryo	rhizoma	20 22	
emus	rhizomatoideae radices	24	
tus	rhizospermae filices	212	
arista	rhocadeae	238	
ami	rhododendra	240	
a vasa	rhombeum folium	75	
mi	rectus	143	
folium	rigidus caulis	38	
perianthium	rima dehiscens capsula	171	
caulis	rimosus	19	
corolla	rimosus caulis	44	
minale	rimosus thallus	100	
lapideum vel	ringens corolla	139	
le	ringentes	224	
vegetabile	Rivini systema	220	
olia	Rogenii systema	224	
e folium	rosacea corolla	140	
s anthera	rosaceae	288	
n folium	roseus	288	
rudex	rostellum	188 191	
culis	rostratum operculum	180	
edix	rostrum	193 197	
punctatus	rotaceae	238	
a corolla	rotata corolla	139	
radix	rotundi pori	113	
- clavata para-	rubiaceae	241	
..... 152	rubigo	479	
- venosum fo-	rugosus	14	
..... 81	rugosum folium	80	
m hymenium	rugosus thallus	100	
m lignum	runcinatum folium	77	
m peridium	rutaceae	241	
m peristoma	Sacculus colliquamentum	463	
s arillus			

Die folgenden Aussagen sind wahr oder falsch? Begründen Sie Ihre Antworten.

1. Die erste Gruppe ist die Gruppe der "Kleinrentner". Diese Gruppe ist die größte Gruppe und besteht aus denjenigen, die eine kleine Rente erhalten. Sie sind in der Regel älter und haben eine geringere Lebenserwartung.

[illegible]

Table 1. *Summary of the data used in the analysis*

(The following are the names of the persons who have been elected to the various offices of the Association.)

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \dot{V}(t) = -\int_{\mathbb{R}^n} \sin(\cos \gamma) d\gamma = -\pi + \pi = 0$$

© 2000 Blackwell Science Ltd *Journal of Internal Medicine* 247: 369–375





Tab. II.





694 Register aller lateinischen Ausdr.

	Pag.	
villosus	11	vitices
villus	126	volubilis caulis ...
violaceus	289	volva
virgatus caulis	38	vulnus
virginitas	15	Wachendorfi syst
viscidus	13	Willdenowii dispos
viscidus pileus	111	tema Linnei ...
vis mortua	315	Xylomgates
vitellinus	287	Xylomyci
vitellus	191	
vites	241	

B ü c h e r - A n z e i g e.

auf folgende neuere botanische Werke unseres Ver-
trauen wir das betreffende pp. Publicum nur auf-
merksam machen zu dürfen, da sie ihrer allgemein aner-
kenten Brauchbarkeit wegen, keine besondere Empfeh-
lung nöthig haben.

F. Link, Königl. Geheimer Medicinalrath, Ritter etc.
Handbuch zur Erkennung der nutzbarsten, und am häu-
figsten vorkommenden Gewächse. Zwei Theile; jeder
Theil à 2½ Thlr.

Auch unter dem Titel:

Lehrbuch der Kräuterkunde zu Vorlesungen, entworfen von
J. Willdenow. Zweiter und dritter Theil.

deselben elementa philosophia botanicae, cum Tabulis
Iconicis IV. gr. 8. 1¼ Thlr.

Reichsberg, F. — Das Aufrocknen der Pflanzen für's
Herbarium und die Aufbewahrung der Pilze, nach einer
Methode, wodurch jenen ihre Farbe, diesen ausserdem
auch ihre Gestalt erhalten wird. Mit einem Kupfer und
Tafelnetze. 8. — cart. — 1 Thlr.

Meyen, F. J. F. — Phytotomie, in gr. 8., mit
vierzehn Kupfertafeln in gr. 4. — 3 Thlr.

Berlin, Haude und Spenersche Buchhandlung.

Einmal in der Woche wurde
das Wasser aus dem Brunnen
entnommen und in die
Küchenschüssel gegeben.
Es wurde dann mit
einem Löffel umgerührt.

Das Wasser wurde
dann in die
Küchenschüssel
gegeben und
mit einem Löffel
umgerührt.

Das Wasser wurde
dann in die
Küchenschüssel
gegeben und
mit einem Löffel
umgerührt.

Das Wasser wurde
dann in die
Küchenschüssel
gegeben und
mit einem Löffel
umgerührt.

Das Wasser wurde
dann in die
Küchenschüssel
gegeben und
mit einem Löffel
umgerührt.

Das Wasser wurde
dann in die
Küchenschüssel
gegeben und
mit einem Löffel
umgerührt.

Das Wasser wurde
dann in die
Küchenschüssel
gegeben und
mit einem Löffel
umgerührt.

Das Wasser wurde
dann in die
Küchenschüssel
gegeben und
mit einem Löffel
umgerührt.

Das Wasser wurde
dann in die
Küchenschüssel
gegeben und
mit einem Löffel
umgerührt.

Das Wasser wurde
dann in die
Küchenschüssel
gegeben und
mit einem Löffel
umgerührt.

Das Wasser wurde
dann in die
Küchenschüssel
gegeben und
mit einem Löffel
umgerührt.

Das Wasser wurde
dann in die
Küchenschüssel
gegeben und
mit einem Löffel
umgerührt.






Tab. IV.








Tab. VI.
























1  <i>caeruleus</i>	2  <i>coeruleus</i>	3  <i>azuræ</i>
4  <i>celestis</i>	5  <i>atrovirens</i>	6  <i>sepioides</i>
7  <i>profusus</i>	8  <i>flavovirens</i>	9  <i>glauca</i>
10  <i>luteus</i>	11  <i>ochraceus</i>	12  <i>pallide-flavus</i>
13  <i>sulphureus</i>	14  <i>vitellinus</i>	15  <i>pyrogæus</i>
16  <i>brunneus</i>	17  <i>cyaneus</i>	18  <i>balæus</i>
19  <i>sarcolæus</i>	20  <i>minutus</i>	21  <i>luteolæus</i>
22  <i>coccineus</i>	23  <i>roseus</i>	24  <i>croceus</i>
25  <i>punicæus</i>	26  <i>purpureus</i>	27  <i>roseus</i>
28  <i>atro-purpureus</i>	29  <i>violaceus</i>	30  <i>lilacinus</i>
31  <i>ater</i>	32  <i>niger</i>	33  <i>cinereus</i>
34  <i>griseus</i>	35  <i>canus</i>	36  <i>lividus</i>

Mensura trium unciarum







